

22

ЮГАННА ЗАХАРІЯ ПЛАТНЕРА

доктора и профессора медицины

въ лейбцигѣ

ОСНОВАТЕЛЬНЫЯ

НАСТАВЛЕНІЯ

ХИРУРГИЧЕСКІЯ

МЕДИЧЕСКІЯ

и

РУКОПРОИЗВОДНЫЯ

161577.

въ пользу учащимся

**съ прибавленіемъ къ тому изобрѣтенныхъ нѣко-
торыхъ инструментовъ или орудій и другихъ
вещей къ лѣкарскому искусству принад-
лежащихъ.**

**Переведены съ Латинскаго языка на Россійской Санктпетер-
бургской Адмиралтейской Гошпитали Штапъ Лѣкаремъ**

МАРТИНОМЪ ШЕИНЫМЪ.



ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ

при Императорской Академіи Наукъ.

1761 года.



ВСЕРОССИЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

ВСЕНИЖАЙШЕЕ ПРИНОШЕНІЕ



Попечительная ревность къ
Наукамъ , и неусыпное
Правительствующаго Се-
ната объ оныхъ стараніе , сопряженное
единственно съ благоволеніемъ и щедро-

)(2

стами

тами нашей Всемилошпвѣйшей Государины , возбуждаешъ почти каждаго къ оказанію Опечесству своихъ заслугъ , коль бы они велики или малы ни были , наипаче кшо хоща посредствено въ обученіи полезныхъ наукъ или художествъ упражнялся. Россійскій народъ со временъ перваго Основателя наукъ въ нашемъ Опечествѣ Государа **ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО**, не токмо снисхожденіемъ , милоспїю и награжденіями къ ученію , и къ принесенію чрезъ оное плода возбуждаешся ; но видя почти повседневно происходящїя отъ онаго пользы безъ принужденія и добровольнымъ любленіемъ къ наукамъ разумъ и силы свои устремляешъ. Свидѣтельствующъ о семъ издаваемыя въ свѣшъ разныя сочиненія и переводы

на

на Россійскомъ языкѣ , которыя и отъ
иностранныхъ съ похвалою пріемиюся ,
кои чистая оныя сами въ удивленіе при-
ходятъ , что чрезъ столь краткое время
науки такъ процвѣли въ Россіи , какъ
бы уже не одно столѣтіе прошло отъ
ихъ младенчества или перваго насаж-
денія. Географія , Навигація , Архите-
ктура , Медицина и прочія знанія ,
которыя прежде сего въ Россіи мало
извѣстны были , нынѣ столь намъ от-
крыты , что уже имѣемъ природныхъ
Россійскихъ Географовъ , Мореплавате-
лей , Архитекторовъ и Медиковъ и мо-
жешъ быть въ краткое время попомки
наши увидятъ все оное гораздо въ боль-
шемъ совершенствѣ , имѣя несомнѣнную
надежду на всещедрое Августѣйшія Мо-
нархини нашея покровительство , и на

неусыпное стараніе и предстательство
о наукахъ Правительствующаго Сенапа.

Довольно уже есть примѣровъ ,
коими очевидно доказывается доброхот-
ствующая склонность , любленіе и по-
читаніе къ ученію высокихъ и истин-
ныхъ рачителей государсва , въ чемъ
они единственно стараются подражать
своей и общей наукъ Покровительницѣ.
Щедрыя трудовъ награжденія , возвы-
шеніе чиновъ , отправленіе для наукъ
въ чужія зѣмли , и обѣщанія наивящ-
шихъ милостей не явные ли суть зна-
ки попеченія и усердія къ Опеческву ?
кон я чувствуя съ благодарностію ,
пачеже и пользуясь возобновеніемъ шо-
ликихъ благодѣяній , каковыя нынѣ Пра-
вительствующій Сенапъ къ дѣламъ
моимъ

моимъ явишь благоволилъ , чрезъ оп-
 правленіе ихъ для обученія Медицины
 за море. Пріемлю дерзновеніе , сію пе-
 реведенную мною Плапнерову Хирургію,
 служащую въ прісбщеніе Гейсперовой
 Анапоміи , прежде мною на Россійскомъ
 языкѣ въ свѣшъ изданной , препоручишь
 въ высокое Правительствующаго Се-
 наша покровительство.

Новость сего труда извинишь ме-
 ня въ томъ , естли въ немъ что не
 ясно изображено , или по сходству и по
 подобію другихъ вещей наименовано.
 Изобрѣшеніе приличныхъ названій , или
 учебныхъ словъ коль трудно естъ ,
 всякому упражняющемуся въ наукахъ
 извѣстно.

Но я , предаю все сіе на волю
 каждаго , и уповаю швердо на высокое
 Пра-

Правишеслѣствующаго Сенапа благоволеніе , кѣ поспѣшеслѣзованію предпріяшаго мною впредѣ намѣренія.

Всенижайше прошу , о милоспировѣ сего моего шруда воспріяшій , дабы чрезѣ шо и прочіе въ наукахѣ упражняющіеся Россійскіе подданные охоту и поощреніе имѣшь могли , чего ошѣ всего сѣрца желаю.

МАРТИНЪ ШЕЙНЪ.

Пред-



ПРЕДСКАЗАНІЯ О ХИРУРГІИ,

что есть Хирургія, о ея съ Медициною
нераздѣльности, и о должности Медика
и Хирурга въ дѣйствахъ хирурги-
ческихъ.

§. 1.



Хирургія собственно и по производству
имени своего есть Медицины или вра-
чевства та часть, которая рукою ис-
цѣленіе приноситъ, или та, которая о человѣческомъ
здравіи наблюдаютъ, и болѣзни рукою, и лѣкарствами
снаружи къ пѣлу прикладываемыми, врачуютъ.

§. 2.

Здравіе у человѣка состоитъ въ невредности
всего дѣйства жизненнаго, естественнаго, и душев-
наго. Ежелижъ сіи дѣйства не по надлежащему начнутъ
дѣ-

дѣлаются, изъ того разные болѣзней роды происхо-
дятъ; а всѣ врачуютъ Хирургія, но чаще вредности
чащеи тѣлесныхъ наружныхъ.

§. 3.

Хирурги или Лѣкари лѣчатъ и однѣми руками
и различными инструментами. Онижъ издавна лѣ-
чатъ опухоли, раны и болячки (*), которое лѣченіе
одними лѣкарствами производится. Того ради наука
Хирургія на медицинскую и руководѣльную раздѣляется.

(*) Смолр. у ЦЕЛСА въ предислов. Кн. 7.

§. 4.

Медицинская Хирургія еще раздѣляется: Ибо къ
ней надлежитъ не только знаніе всѣхъ лѣкарствъ,
которыя на разныхъ мѣстахъ тѣлесныхъ, поврежден-
ныхъ, прикладываются, но и тѣхъ, которыя внутрь
принимаются, и весь порядокъ содержанія въ пищу
и питіи. Понеже сими бѣдствія, болящимъ отъ мно-
гихъ вещей слѣдующія, уничтожаются, и самое лѣ-
карское пользованіе не помалу вспомошествоется.

§. 5.

Таковой лѣченія способъ, руками исправляемый,
лѣкарства прямо накладываютъ (*) рукою, желѣ-
зомъ, огнемъ, и различными инструментами и
машинами распоршіяся части соединяютъ (σύνθεσις),
сросшіяся раздѣляютъ (διάρρηξις), внутрь вонзенныя,
вонъ извлекаютъ (ἐξάραξις) уродное или излишнее
прочь

прочь отбемлетъ (ἀφαίρεσις), иныя приспаиваетъ (προῖεσις) не на мѣстѣ своемъ находящееся, и исторгнутое или вышибинное вспаиваетъ (διέρχουσις) (**)

(*) Вмѣсто примѣра быть можетъ время, въ которое различныя составленія лѣкарствъ, обыкновенно прикладываемыя перемѣнять надлежитъ. Припарки густыя [Катаплазмата] и припарки жидкія [Эмисемата] чрезъ чешыре или пять часовъ перемѣнять должно. И ежели больной не дослѣно плашьемъ одѣтъ, и на воздухъ холодномъ лежитъ, почаще. Мазь [Унгuenta] и пластыри (Эмпластра) чрезъ 12, а иногда чрезъ 24 часа лежать на ранахъ могутъ. О ранахъ ниже сказано будетъ, что много въ ихъ лѣченіи пособствуетъ нечастое перевязываніе. Ежелижъ они другою мокротою, тносмъ, и хоромъ ш. е. сокомъ острымъ елейнымъ и воднымъ, мочью, каломъ, желчью и симъ подобными мажутся, то тряпки и лѣкарства чаще перемѣнять надлежитъ.

(**) Смотри. гоурмелень; онъ διέρχουσι и προῖεσι къ συνῖεσι, ἀφαίρεσι къ διαίρεσι причислилъ.

§. 6.

Хирургія съ Медициною такъ спаяна, что все онѣ раздѣляться не могутъ (*.) Итакъ должно Доктору съ Лѣкаремъ, ежели хотяиъ больного лѣчить, единодушно въ томъ поступать, а не по разнымъ лѣченію дорогамъ бродить. (**).

(*) Смотри. у СКРИВОНІА ЛАРГА въ Сочин. 200. стр. 100. во время Герофилово и Эразистратова Медицина на три части раздѣлена была, смотри. у ЦЕЛІСА въ Предисловіи Кн. 1; тушъ же привнеси Пред. Кн. 7.

(**) Надобно желать, чтобъ пресильная и изъ недружелюбія наченшаяся распря, которая во Франціи межъ Докторами и Лѣкарями донынѣ продолжается, пресѣклась. И оба въ должности бы своей остались. Докторы, чтобъ большее прилѣжаніе прикладывали къ наукѣ дѣлъ Хирургическихъ, безъ которыхъ знанія ни при
А 2 лѣче-

4 ДОЛЖН ДОКТ. ПРИ ЛѢЧ. ХИРУРГ.

лѣченіяхъ Хирургическихъ начальствовать , ни другихъ болѣзней причины , по надлежащему , знать не могутъ. А лѣкарямъ надлежитъ остатъ отъ омаго высокоумія , по которому всѣ опаснѣйшія болѣзни , не выключая и тѣхъ , которыя во внутреннихъ тѣлесныхъ частяхъ случаются , берутся лѣчить. А обѣ сѣи поступки больнымъ часто бѣдственны и погубельны бывають. Произволенія и совѣты во все непрекословны быть могутъ , межъ знающимъ и мудрымъ докторомъ , и снисходительнымъ и въ дѣлѣ своемъ искуснымъ лѣкаремъ. Несносно Доктору часто бываетъ весьма несмысленныхъ лѣкарей безразсудная дерзость , высокоумное о дѣлахъ своихъ мечтаніе , и мерское на другаго ученіе хуленіе. Не меньшежъ досадно исправному лѣкарю , повелѣніе невѣжи , несмысленнаго , и неученаго Доктора.

§. 7.

Докторъ , начальствовать при лѣченіяхъ хирургическихъ , питающійся долженъ все знать , что къ такому пользованію попребно. Долженъ лѣкарства внутрь принимаемая , и порядокъ въ кушаньѣ и питьѣ одинъ , а другія вспоможенія , призвавъ въ совѣтъ лѣкаря учреждать. О самой дѣйствительности лѣченія , толи надобно , и не буденъ ли что со вредомъ болящаго употреблено , и какимъ способомъ употреблять , сверхъ того о способности времени и мѣста предразсуждать , и все пріуготовленіе инструментовъ и обязокъ прилѣжно свидѣтельствовать повиненъ. А кромѣ того долженъ больного ободрять , и ему совѣтовать , чѣмъ лѣкарю ввѣрился. Лѣкаряжъ , ежели надобно , въ должности его увѣщевать , и подаваніемъ совѣтовъ вспомошествовать , и завсегда съ нимъ въ трудахъ товарищемъ дружелюбно и вѣрно обходиться.

§. 8.

§. 8.

Кто въ Хирургіи желаетъ упражняться, тому Анатоміи съ крайнимъ прилѣжаніемъ учиться, и часто тѣмъ мертвыя вскрывать, и руку вскрываючи напсрживать должно. Понеже не только знаніе надлежитъ всѣхъ частей положеніе, изображеніе, величину, порядокъ, жесткость, мягкость, гладкость, неровность или переломкость, потомъ происхожденіе всякой части и опдаленіе, что все откровенно дѣлается Анатоміею (*), но также всѣхъ частей, какъ плотныхъ, такъ жидкихъ или плавучихъ, естество, перемѣны, дѣйства и припадки. Сверхъ того надлежитъ знаніе, что вещи неестественныя и обыкновенныя, къ произведенію, продолженію и искорененію болѣзней великую дѣйствительность имѣютъ.

(*) Достехвалное дѣло здѣлалъ ПАЛФИНЪ, который Анатомію въ Хирургію совокупилъ, и примѣчаніями объяснилъ.

§. 9.

Сіе предузнавши надлежитъ учиться опъ учителя сей науки учащаго, читать наилучшихъ творцовъ ниже помянутыхъ, припомъ навѣвать и лѣкарствамъ. Должно же прежде знаніе простыя лѣкарства, и ихъ собственныя силы, а послѣ вслупать въ составленія ихъ. А понеже сіи составленныя лѣкарства изъ многихъ и себѣ противныхъ будуще вещей состоятъ, то перемѣнять каждому, силы ихъ знающему, не трудно.

А 3

§. 10.

6 КАКОВЪ ЛѢКАРЬ БЫТЬ ДОЛЖЕНЪ.

§. 10.

Не однажѣ наука , но въ наукѣ упражненіе , дѣлаетѣ человѣка лѣкаремъ. И такѣ ученикѣ долженъ послѣдовать насипавленіямъ учительскимъ , которые сію должность сѣ похвалою въ великомъ городѣ , или во врачевницѣ , гдѣ многіе немощные лежатѣ , отправляютѣ. Дѣйствительной Хирургіи сперва чаще надѣ мертвыми тѣлами обучатѣся , а послѣ , въ присутствіи учительскомъ , какѣ бы при насипавникѣ , оную на живыхъ тѣлахъ испытывать можетѣ. Всегда отѣ лѣченій легкихъ , далѣ поступающѣ къ труднымъ и бѣдствіи исполненнымъ.

§. 11.

А впротчемъ , каковъ лѣкарь долженъ быть . Цельсѣ (*) его описалъ. Ибо для здравія больныхъ часто опасныя лѣкарства употреблять надобно бывашѣ , для того опѣ больныхъ благодареніе онѣ себѣ получивъ спарашѣся долженъ честными поступками , скромностію , всякимъ добронравіемъ , трудовъ и досадъ терпѣніемъ. Хотяжѣ ему не рѣдко должно быть немилосердымъ , однако долженъ онѣ опасатѣся , чтобѣ грубымъ , яростнымъ , мужиковатымъ и тщеславнымъ или горделивымъ предѣ людьми не показатѣся. Никогда въ почтеніи и въ любви у больныхъ не бывающѣ тѣ , которые себя , какѣ бы комедіанты , выхваляютѣ. Доктору , въ лѣченіи начальствующему , ежели онѣ въ дѣлѣ своемъ довольно знающѣ , лѣкарь повинувашѣся долженъ. Сѣ равномѣрною своею браніею и товарищами добросердечно обходившѣся , все-

все изъ чистой совѣсти долженъ дѣлать , а не изъ желанія какой маленькой честишки или корыстишки.

(*) Книг. 7. предислов. Лѣкаръ быть долженъ молодъ , а конечно не старъ , руки имѣть долженъ мужественны , недрогливы , и всегда непрясуція , и оными какъ правою , такъ и лѣвою проворенъ , зрѣніе острое и свѣтлое , не боязливъ , не жалостливъ , такъ что когда хочеть излѣчить взятаго больного , чтобъ не излишне , какъ надлежитъ , крику его испугавшись , спѣшилъ , или не меньше надлежащаго , рѣзалъ : но одинаково все дѣлать долженъ , будто бы никакой изъ степенія близкаго своего страха не чувствовалъ.

XX

О различной лѣкарской збруѣ .

то есть

О СНАРЯДѢ ОРУДІЙ или ИНСТРУМЕНТОВЪ , ОБВЯЗОКЪ и НАРАННЫХЪ НАКЛАДОКЪ , или НАРАНИКОВЪ.

§. 12.

Надобно также имѣть различный орудій (инструментовъ) снарядахъ , который больше къ употребленію , нежели къ величавому хвастовству здѣланъ (*). Ибо всегда лучше орудія (инструменты) немногія , да тщательно и искусно здѣланныя имѣть , нежели многіе и по комедіантски предъ глазами болящаго скарбъ такой расклавъ , ужасъ ему наводить. Также знать Лѣкаръ долженъ орудій и машинъ спросеніе , чтобъ могъ надобныя приказывать художникамъ дѣлать , а другія поправлять.

(*) иппократъ о правилахъ въ рѣчи 27 Издан. Хартер. на стр. 377. какъ во всякой наукѣ , такъ и въ Медицинѣ , стыдно безъ всякаго успѣху великое употреблять вещей множество , великое зрѣлище обшачъ , и много говорить.

§. 13

§. 13.

Изъ орудій , которыя завсегда и во всякомъ случаѣ Лѣкарь при себѣ имѣть долженъ , сѣ нужнѣйшія сунъ ; Ножечки прямые и кривые , другіе обоюдные , которыя кровопускательными ланцетами : Флебѣтоми , или Ланцетпесъ) называются , да и тѣ великіе и малые. Ножницы прямые и кривые. Спички изъ различной матеріи и величины различной , которыя дѣлаются изъ серебра , изъ желѣза , изъ свинцу , изъ киповыхъ усовъ , изъ травы воцанки. Нѣкоторыя спички , въ длину жолобокъ имѣющія , по которымъ нѣдра (сінусъ) и фиспулы разрѣзываются ; называются отъ нѣкоторыхъ путешественниками , дорожниками , или пупевождями (иппинераріа). Иглы прямые и кривые , разной величины , бришвы , клещи или щипчики , крючки , лопаточки. О другихъ орудіяхъ , къ каждому плѣсному мѣсту и къ ихъ дѣйствію потребныхъ , въ своемъ мѣстѣ объявить должно.

§. 14.

Также при себѣ Лѣкарь имѣть долженъ обвязки. Способнѣйшія всѣхъ обвязки холстяныя , изъ холстины поношенной , мягкой , однако крѣпкой , чистой и никакихъ пятенъ не имѣющей здѣланныя. Холстъ разрѣзывать надлежитъ по ниткѣ выдернутой , и смотрѣть , чтобъ , какъ возможно , морщинъ , покровки или шва на ней не было. Для чего ужъ у многихъ въ употребленіи имѣются песты нитяныя выпканыя (Звирнѣ-бѣндерѣ). А временемъ обвязки и покрѣпче надобны бывающыя.

§. 15.

§. 15.

Обвязокъ многіе роды имѣются. Многія есть ко многимъ мѣстамъ употребляемая, другія только собственно къ нѣкоторымъ мѣстамъ способны. Однѣ простыя, другія сложныя. Простыя или длинныя обвязки въ одинъ свертокъ сверченныя, манпін, или пелены, которыми разныя мѣста различными манерами обвиваются. Сложныя или составленныя обвязки дѣлаются или изъ манпін разнымъ образомъ сложенныхъ и изрѣзанныхъ, или изъ шѣхъ длинныхъ обвязокъ одна къ другой прищипныхъ. Имена имѣютъ себѣ обвязки отъ мѣстъ шѣхъ, которыя ими обвязываются (*), отъ изображенія (**), отъ дѣйства (***) , отъ изобрѣтателя (****).

(*) Наголовникъ, колапъ, кокошникъ, большой (Капиталъ мат-жумъ) по Француски (ле Грандъ гуврѣ шефъ.) Наголовникъ меньшой, Капиталъ минусъ, по фр. (ле петитъ гуврѣ шефъ.) Наголовникъ съ связкою разрѣзною подвижною (Капиціумъ кумъ винкуло сциссо суспенденте,) а по фр. (ла сервістпѣ авекъ ле скапулѣръ:) Капиціумъ у древнихъ оплечное и трудное одѣяніе нѣкоторое было, которое у насъ боспрогомъ или шнурованьемъ назвать можно. Смотри у Варрона о. Чт. Кн. въ Кн. 4. глава 30. стр. у меня 22.

(**) Ракомъ Галеновымъ (канцеръ Галени) называется холстина разрѣзанная, которою голова обвивается. Праца (фунда), по Француски (ла фронтъ) налобникъ, холстина разрѣзанная для лба, для ушей, для глазъ, для подбородка. Ястребъ. (акципитеръ по Фр. л'Эпревтеръ). Оборотъ, недоузокъ, (капиструмъ). Колосъ (спика). Перчатка (хиротека)

(***) Обвязка соединяющая или склеивающая, изгоняющая (фасція ушнѣ или глюпинансѣ, Экспеллентъ)

(****) Обвязка ГЕЛЮДОРОВА, Ястребъ МЕНЕКРАТОВЪ. Смотри у ВИДА ВИДІА Хирург. въ Кн. 3. стр. 55.

§. 16..

Самымъ простымъ обязакамъ сверченымъ, пришло различіе, изъ способовъ обвиванія, кошорая обвязка около уда въ округъ обвивается: такъ что ни къ верху ни къ низу неидетъ, но кругъ на кругъ ложится, та по Француски (ле циркулёръ) называется. Кошорая въ верхъ или внизъ такъ обвертывается, будто бы раковинка морская винтится, и двѣ прещи первого винта обнимаются, по Руски сѣкирою, по Латинѣ (асція), а по Француски (ле долоаръ) называется. А кошорую на обѣ стороны такъ обвивается, что претью часть первого круга она обнимать будетъ, та Обезьяною по Латинѣ (сима), по Француски (ле музъ), именуется. Кошораяжъ сѣ большою расстановкою такъ вьется, что круги другъ до дружки не допрогиваются, та по Француски (ле рамнантъ) слыветъ. Сія обвязка въ спарину къ обезьянѣ кажется причтена была. Иногдажъ уды не одинаковой толщины бывающъ, то обвязки при обвертываніи переворачиваются, чтобъ крѣпче держали, оныя обвязки по Француски называются (ле ранверсѣ). Такой обвязанія родъ, обвязаннымъ частямъ боль причиняетъ.

Сіи имена можно всякому видѣть у ИППОКРАТА: въ Кн. 2. въ Текст. 2. о Медической работѣ и у ГАЛЕНА въ Комментар. на сію книгу. О обвязкахъ смотр. въ мѣст. помян. у ГАЛЕНА. СОРАНА и ГЕЛЮДОРА. ГЕЙСТЕРА. ВЕРДУКА (де бандъ), у БАССІА.

§. 17.

§. 17.

Неодинаковою шириною быть должны обвязки, всякое мѣсто лучше припятивается обвязкою узкою, и которая часто около чего обвивается. Никогда надъ раною, болячкою или надъ опухолью не должно начинать обвязкою обвязывать а надъ переломленною частью сперва начинать: Послѣдній ея конецъ ниже раны или перелома пришивать надлежитъ, ибо узелъ, шовъ, или игла, которою конецъ закрѣпляется, рану и переломъ бередишь. Такъ должно обвязывать члены, и обвивать обвязками, чтобъ онѣ держали, а не гнили. Чѣмъ не хорошо прикрѣплено бываетъ выпадаетъ, а часть крѣпкозатянутая, нѣмѣетъ, сохнеть и Антоновъ огонь получаетъ. Лучше, обвязкою чаще обвивать, нежели туго затягивать. Обвязка въ два свипка свипая завсегда серединою сперва накладывается, и обѣими руками въ обѣ стороны водится. Однако иногда свипки неровную длину имѣютъ. Тѣмже порядкомъ обвязку и развивать надлежитъ, какимъ будетъ наложена; и если къ члену присохнетъ, не насильно отдирать, но теплою водою или другимъ чемъ отмачивать. Обвязками, которыя туго и плотно сверчены бываютъ, красиво часть обвивается.

§. 18.

Обвязками излѣчиваются части переломленные, вывихнутыя удерживаются, съ мѣста выпавшія укрѣпляются, опухоли придавливаются, раны срастываются, останавливается кровь, выдавливаются гной, и полугной

(саніесѣ) опѣ удовѣ уязвленныхъ отвращается воздуха и другихъ вещей, вредѣ приносящихъ, разберсживаніе.

§. 19.

Древніе при обвязаніи ранѣ употребляли шерсть хорошенько расщипанную. А теперь употребляютъ лѣкарѣ пряжу или нитки щипаныя. Сію пряжу изъ поношенной холстинки или пряпокъ всякую пряжинку руками выдергиваютъ, порядочно одну съ другою складываютъ, эгиваютъ и подушечки (пулвиллосѣ) а по Францусски (плюмасо) дѣлаютъ, различною величиною и фигурою. Сіи подушечки на раны, болячки, на коспи обнаженные и попорченныя и съ ними лѣкарства приличныя кладутъ. Подушечки же сіи разными ликворами или жидкими вещами напиваются, и напоенныя къ ранамъ и болячкамъ прикладываются. Пряжа щипаная еще прикладывается, когда гдѣ сильно и кровь печетъ, и оно с печеніе часто сею одною и припискиваніемъ удерживается. Ею же болячки мокнуція или слизлыя очищаются. Ибо она къ болячкамъ приложенная мокроту, изъ нихъ текущую, какъ бы губка грецкая въ себя поглощаетъ. Еслижъ гдѣ холстины много не имѣется, что часто въ больницахъ случается, тамъ употребляютъ ленъ или охлопки гребнемъ чисто расчесанные.

§. 20.

Если же описанныя подушечки руками будутъ ежаты, есучены, или скатаны, то дѣлаются изъ нихъ свѣшилны или кноты, по Францусски (бурдоннетъ), ко-
рыхъ

рые больше на нитку повѣшенныя въ болячки глубокия опускаются. Изъ тойже холстяной пряжи дѣлаются кнопки продолговато - круглыя , продолговатыя , гвоздю подобныя , съ одного конца , или съ обоихъ расщипанныя. Стѣ сихъ фигуру кеглю подобную , имѣющіе опмѣняются , и дѣлаются на подобіе цилиндра , или кубаря оныхъ Французы (ле межъ) называютъ (фиг. 1). Другіе кнопы дѣлаются изъ пряпокъ въ подобіе кегля сверченныхъ , у оныхъ концевъ въ нитки расщипанъ. Кнопы въ раны и болячки глубокия и въ фистулы опускаются. А понеже ни гной вонъ не выпускаютъ , ни ранамъ заросшатъ не даютъ , и край у ранъ сильно бережатъ , то оныя маленькія и мягкія и тогда только употреблять должно , когда намыреніе есть , чтобъ болячки еще не затворялись. Многіе имѣются лѣкари , которые вовсе употребляютъ кноповъ , какъ бы вредность какую , не любятъ. Дѣлаютсяжъ кнопы такіе , которые мокроты изъ болячки напившись раздуваются , и норы язвинныя и фистульныя расширяютъ , (по Нѣмецки *Quell-Meissel*). Оныя дѣлаются изъ губки грецкой , изъ кореня сушеннаго Генціане , Арисполохіе , которыя кореня припомъ нѣкоторую силу къ очищенію болячекъ имѣютъ. рѣпа сушеная довольно напрягается , и боли не дѣлаетъ.

Смотр. у ЦЕСАРЯ МАГАТА въ Кн. 1 гл. 45. стр. 42. и у БЕЛЛОСТА.

§. 21.

Изъ пряжи еще дѣлаются кисточки , по Франц.
б 3 (фоссъ)

14 ПРЯЖА, ТРЯПОЧКИ, ПЛАСТЫРИ

(фоссѣ тантѣ) которыми изъ болячки гной и полугной (саніесѣ) вынимается. Кромѣ того мячики или шарики по Франц. (Пеллотѣ,) которые на рану лѣкарь кладетѣ послѣ вырѣзанія киды. Также клубки великіе маленько плосковатые, по Франц. (гапо), которыми послѣ отрѣзанія руки или ноги мясо и кость покрывается (фиг. 3), и маленькіе плосковатые сверточкі, которые въ дырочку на черепѣ головномѣ буравомѣ проверченную вкладываются (фиг. 4.)

§. 22.

Тряпочки различно сложенныя также употребляются, и накладываются на жесткую оболонку надѣ мозгомѣ, когда черепѣ проломленѣ, или буравомѣ (препаномѣ) просверленѣ бываетѣ. Другія дѣлаются полотенца разрѣзанныя, у которыхѣ кромка по ниточкамѣ расщипана, которыя въ раны грудныя, ежели лѣкарь кнотовѣ употреблять не хочетѣ, вкладываются (фиг. 5). Тряпочками кровь изъ ранѣ вытираютѣ, когда въ какомѣ случаѣ рану надобно дѣлать, понеже онѣ способнѣе къ тому, нежели губка.

§. 23.

Пластыри къ разнымѣ потребностямѣ изъ смолы, изъ живицы, изъ воску, изъ сала, съ примѣшкою порошковѣ, изъ вещей изъ земли прозябающихѣ или произрастающихѣ, изъ животныхѣ, рудныхѣ не лѣю иногда составленные, намазываются на

на холстинѣ , на шолковой мапери и на ирхѣ , и многими манерами вырѣзывающіяся. Накладываются на тѣло обривши сперва волосы , и удерживаютъ приложенныя лѣкарства , подушечки и кнопы. Очищаютъ , и залѣчиваютъ раны и язвыны. Опухоли разрѣшаютъ , мяхчатъ , въ зрѣніе приводятъ , гной производятъ , и отъ всѣхъ шѣхъ воздухъ отворачиваютъ.

§. 24.

Къ сему же скарбу принадлежатъ сукна или суконки , (панни) дѣлающіяся въ одну рядъ вдвое и больше и различными манерами , изъ холстины , продолговатая , у древнихъ селезенками (спленія) назывались (*). Тѣми частями поврежденныя обвертываются , или сухими , виномъ , или другимъ ликворомъ намоченными , и называются Тепляками (Эпитемата). Ежели же такимъ образомъ прикладываются будучи , по должно , чтобъ ликворъ оный тепловатъ или горячъ былъ , и оной сильно изъ нихъ выжимать. Суконками или тряпками сухими обвертываются части переломленыя , вывихнутыя и другія мѣста , для предохраненія отъ воздуха и отъ другихъ вещей , чтобъ туда что не попало. А мокрыя пособивующи часпямъ возженнымъ , или другимъ припадкомъ худымъ бѣдственно страдающимъ. Толстыми и одна на другую сложенными суконками или тряпками , члены въ толщинѣ своей неровные , въ ровную полстопу приводятся , дабы чрезъ то лучше лубки приложены быть могли. Спешно одна на другую накладываемыми кровь удержи-

оживается, гной или полугной (саніесѣ) изъ глубокой раны или болячки выдавливается.

(*) Смотри у МАРЦІАЛ. въ Кн. 2. Епигр. 29, у ПЛІНІА И: Н. Кн. 29. Т. 2. стр. 514, у ПЛІНІА въ Епист. Кн. 2. Епист. 2.

§. 25.

Трубочками изъ золота, серебра, и свинцу зѣланными, прямыми, закарюченными, незыблемыми и зыблемыми вонъ изъемлется кровь, сукровица, гной изъ груди и изъ чрева, моча изъ пузыря. Должны онѣ зѣланы бысть съ загнутыми на внѣшнюю сторону краями, или съ обручикомъ какимъ, дабы со всѣмъ внутрь не могли уходить. Оныя ранамъ больше бередны бывають, нежели кноты, когда въ ранахъ оставляются. Насосами иногда помянутыя мокроты высасываются, а чаще различные ликворы въ раны и въ пазухи болячекъ впускаются.

§. 26.

Лѣкаръ долженъ еще имѣть лубочки, рѣмни или шесмы, связки, кляпики, нитки, которыя при вытягиваніи переломленныхъ и вывихнутыхъ удовъ, и при вставливаніи оныхъ же на свое мѣсто, при одержаніи опухолей, при остановленіи крови печенія, при сшиваніи ранъ Лѣкарю надобны бывають.

§. 27.

Авторовъ читать должно такихъ, которые обо-
всей Хирургіи хорошо писали; а именно: ИППОКРАТА,
Цельса,

ЦЕЛЬСА, ГАЛЕНА, ОРИБАЗІЯ, АЕТІЯ, ПАВЛА ЭГИНЕТА, АЛБУКАЗІЯ, ДЕ САЛИЦЕТО, ДЕ КАВЛІАКО, ДЕ ВИГО, ГОУРМЕЛЕНА, ПАРЕЯ, ФЕЛВУРТЦІЯ, ВЕЗАЛІЯ, ФАЛЛОПІЯ, ГВИЛЛЕМЕЯ, ГОЛЛЕРІЯ, ФАБРИЦІЯ АКВАПЕНДЕНТСТКАГО, ФАБРИЦІЯ ГИЛДАНА, А КРУЦЕ, М. А. СЕВЕРИНА, СКУЛТЕТА, ГЛАНДОРПІЯ, ДЕ МАРХЕТТИСЬ, ПЕКЦЕТТІЯ, СОЛИНГІЯ, РООНГУЗІЯ, НУККІЯ, ПУРМАННА, ВЕРДУКЦІЯ, КЛЕРИКА, ДЮНИСА, ГЕЙСТЕРА, БЕЛЛОСТІЯ, ГАРЕНЖОТА, МАРИНА, ЛЕ ДРАНА и проч.



О В О Ж Ж Е Н І И.

ДЕ ИНФЛАММАЦІОНЕ.

§. 28.

Въ Хирургіи упражняєшся желающему, весьма нужно есїь знать вожженіе. Ибо ежели внѣшнія части вожжигаются, тупѣ всегда требуется Лѣкарскаго вспоможенія. Изъ вожженія же многія вредности дѣлаются такія, которыми наибольшей части инструментами пособствовать бываєтѣ надобно. Да и раны, какъ тѣ, съ которыми Лѣкарь больныхъ получаєтѣ, такъ и которыя самъ дѣлаєтѣ, оныхъ миновати не могутѣ, которое вожженіе ежели усилится, великія бѣды причиняєтѣ. Часто оное при опухоляхъ, болячкахъ, вывихиваніяхъ и переломахъ приключается.

В

§. 29.

§. 29.

Имя сіе вожженіе по подобію тому здѣлано , которое бываетъ въ частяхъ огнемъ обожженныхъ и зардѣвшихся , а между тѣмъ въ нихъ различіе имѣется , когда мѣстѣ легко или сильно уязвлены бываютъ , и когда вредъ глубже проходитъ .

§. 30.

Вожженіе есть движеніе пріумноженное кровное въ тѣлѣ живомъ , отъ котораго сокъ въ малѣйшихъ жилкахъ бьющихся частей мягкихъ остановившійся , такъ сильно движется , что или въ движеніе придетъ , или въ гной претворится .

§. 31.

Кровь движется естественнo , и по тѣлу раздѣляется дѣйствіемъ наибольше сердечнымъ , котораго сильнѣйшимъ и скорѣйшимъ движеніемъ и кровь скорѣе и сильнѣе расходится . Однако одно сердечное дѣйствіе къ движенію кровному не довольно , но требуется путь кромѣ естественнаго онаго и жизненная сила , находящаяся какъ въ сосудахъ такъ и во всѣхъ другихъ частяхъ жилы чувствительныя , чувство и движеніе главнѣйшее имѣющихъ . (*) Если на сіе не согласишься , что многими опытами утверждается , то чуть ли можно будетъ разумѣть , для чего кровь съ большимъ спремленіемъ въ одной жилѣ бьющейся течетъ , а въ другой не такъ , и для чего въ вожженіи , наприм : отъ занозы опухоль кругомъ бываетъ ; о прочемъ ужѣ умолчу , что вожженія тяжестнѣйшія и бѣд-

и бѣдственнѣйшія бывають въ частяхъ жильночувствительныхъ , нежели въ другихъ кровью изобилующихъ.

(*) Смотрь кромѣ Сталля, Гортеровъ компенд. Мет. Трактъ .67, ч. 3, Т. 1, стр. 234.

§. 32.

Движенія сіи жизненныя при остановкѣ или за-
морѣ въ тѣлѣ живомъ , или во время недвиженія крови
въ жилахъ быющихся приумножаются , для того ,
что кровь въ сосуды нѣкоторые запертые протекаеть
не могучи, изобильнѣе другими течеть? Или что жилы
чувствительныя, какъ части страдающей, а отъ оныхъ
сердечныя въ сильнѣйшее движеніе возбуждаются? Или
вожженія происхожденіе приписаться можетъ един-
ственно оной жизненной силѣ, или могуществу есте-
ственному , (*) которое тѣло бережетъ , и которое
многія болѣзни , между которыми раны , и кости
переломленыя , излѣчиваетъ?

(*) Чтобы не было сумнительства или двоякоразумія въ сло-
вѣ семъ, я подѣ именемъ естества или натуры разумѣю комплексію,
то есть содержаніе , состояніе , или природу всѣхъ причинъ ,
которыя намъ жизнь даютъ. Причины многія мы знаемъ изъ фи-
зіологіи, которой физика, Механика, Химія и Анатомія много свѣта
подаютъ , а многіхъ еще и не знаемъ. Смори. у ЛАНЦИЗІЯ : о
сердцѣ. стр. 2.

§. 33.

Въ каждомъ вожженіи сокъ какой нибудь и гдѣ
нибудь въ части остановился. А наибольше кровь ;
Ежелижъ бы слово вожженіе къ другимъ болѣзней ро-
дамъ присвоить, и рожу (эризипеламъ), простуду (реу-

матизмумъ) расслабленность составную (арерипиземъ) къ ней причислишь захотѣли, то пасока, сукровица и другіе соки останавливаются; И первое подлиннымъ, а другое ложнымъ вожденіемъ называться (*) можетъ.

(*) Напр. отъ сукровицы или сыворотки кровной, которая сквозь трубочки, въ кожѣ находящіяся, обыкновенно проходитъ, рожа (арисипеласъ) изъ пасоки въ связкахъ или лигаментахъ членовныхъ, расслабленность членовная или составная (арерипишъ), расслабленность ножносоставная (подагра), изъ тойже самой въ пласъ накопной и въ продолженіи мышечномъ простуда (реумаписмусъ).

§. 34.

Останавливается влага (гуморъ) сперва въ жилахъ быющихъ, понеже онѣ фигуру коническую или кегельную имѣютъ, и къ концу суживаются. Однако оная влага временемъ и въ жилахъ кровевозвращательныхъ спойтъ, ежели судорогами сжаты или другими вещми приписнуты будунтъ, напряженность жилная (варицесъ), почечуй слѣпой (гемороедесъ цеце), также растѣкъ (Эдема) опѣ спѣсненія великой жилы кровевозвращательной кровной начало свое получаютъ. Не въ однѣхъ же быющихъ жилахъ, которыми кровь по тѣлу разливается, вожденія мѣсто бываетъ, но и въ другихъ гораздо меньшихъ, другой тончайшій сокъ въ себѣ имѣющихъ: ибо когда въ устья сихъ жилочекъ быющихъ изъ боку большихъ жилъ быющихъ исходящихъ, влажность, другихъ соковъ густѣйшая, войти хочетъ, а сквозь маленькія трубочки пройти не можетъ, въ нихъ останавливается, и такъ заперъ, и пріумноживъ жизненную силу воженіе дѣлаетъ. Сіе, что такъ

такъ дѣлается, уже древле Целсѣ (*) позналъ. Въ глазу сіе можно своими глазами видѣть при вожденіи плевъ роговой и прирослой.

(*) Въ Предислов. К. 1. Когда кровь въ жилы кровевозвращательныя, духу опредѣленныя, прощается, и воженіе, отъ Грековъ *Φλεγμαίνω*, называемое производитъ. И еще: Когда плавающія шлешка, въ невидимыхъ дирочкахъ останавливаясь, путь запирають.

§. 35.

И такъ воженіе дѣлается отъ запора, а запоръ дѣлаться можетъ во всякой плѣсней части, жилы быющіяся имѣющей. Также запоръ или запердѣніе имѣется въ коспи прекрѣпкой, но не прямое воженіе, какъ ниже сказано будетъ. Когдажъ многіе жилъ быющихся роды суть, и во всѣхъ хоть запоръ дѣлаться можетъ, однакожъ подлинныя и кровныя воженія мѣста кажется бывающіе въ жилахъ кровевозвращательныхъ пасочныхъ, понеже въ нихъ обычно шонкой и свѣтлой сокъ бываетъ, а тогда въ нихъ красная кровь переливается.

§. 36.

Таковымъ образомъ во всякой мягкой части, жилы быющіяся крови и пасоки исполненныя имѣющей, дѣлаться можетъ запоръ и воженіе. Сіежъ случается чаще въ жиру и въ плевъ клѣпящей. Понеже ея мягкое и рѣдкое сложеніе есть. Клеточки ея такъ здѣланы, что изъ одной въ другую проходъ бываетъ, и оное всякъ надуваючи ее видѣть можетъ. Крови движеніе въ ней гораздо коснѣйшее бываетъ, нежели

въ другихъ частяхъ, пронзительнѣйшее чувство имѣющихъ, и для того отъ остановившейся крови поспѣшъ разпятиваются, и разрываются жилы: бьющіяся, жидкость свою въ клѣточки или ячейки оныя вливающія. Кровь тамъ стоящая смѣшивается съ масломъ отъ остановки и отъ жару пропухлымъ дѣлающимся. И такъ оба соки загнивающіеся причину дѣлають, или производятъ къ вожженію.

§. 37.

Дѣлаетсяжъ запоръ и вожженіе въ самихъ жилахъ бьющихся, кровь носящихъ, ежели ихъ кончики не умѣренно сжимаются. Сіе случается, когда жилы бьющіяся отъ вещей наружныхъ, отъ опухолей разнородныхъ, (*) отъ переломовъ и вывиховъ и отъ другихъ жесткихъ и тяжестныхъ, тѣло обременяющихъ, и когда тѣломъ какъ нибудь на жесткомъ лежа, стрѣлою или другою какою вещью въ тѣло вонзенною, и отъ крови у людей раненыхъ, изъ сосудовъ выпекшей и въ нѣкоторой части стоящей пришишнута бывающъ. Жилы бьющіяся также временемъ, весьма разпятиваются, или судорогою сжимаются; а судорога дѣлается, когда вещи оспрыя или ѣдкія, холодныя, очень горячія и жжигающія къ тѣлу, а особливо къ жильночувствительнымъ его мѣстамъ, прикладываются. Рѣдко случается, чпобъ оболочки жилъ бьющихся, копорыя слово въ слово такіежъ и сосуды и покровеніе клѣпчатое имѣющія (**), такъ распухали, чпобъ текущей крови путь запирали (***).

(*). БЕРГАЛЛЕ Афорисм. 112.

(**)

(**) ГОРТЕРЬ. Комп. Тр. 19 числ. 41. стр. 76.

(***). Въ сосудѣ болшомъ т. е. въ Аортѣ или въ жилѣ бывающійся начальственной. смотр. у СТЕНТЗЕЛА о Спешномъ въ аортѣ.

§. 38.

Жилы бывущія также заслоняются во всякой ранѣ: Ибо изъ уязвленной бывшей жилы кровь течетъ, которое кровотечение чрезъ сжатіе и запертіе жилы бывшей останавливается. У осадненныхъ, ушибенныхъ, обожженныхъ сосуды такъ повреждены бывающъ, что потерявъ всю Эластическую и жизненную силу кровь производить не могутъ. Ежелижъ въ концахъ жилъ бывущихъ: запоръ дѣлается, то кровь понуждена бываетъ итти въ малыя боковыя жилочки. Сіе также отъ прошивной причины дѣлается, когда всякое въ сихъ малыхъ боковыхъ жилочкахъ возпротивленіе пропадетъ. Тогда берутъ въ себя разслаблыя ропки кровь, а оной пропустить не могутъ, то дѣлается и въ нихъ запоръ и вожженіе.

§. 39.

Также кровь густѣетъ, и дѣлаетъ запоръ и вожженіе, что происходитъ отъ причинъ себѣ прошивныхъ, какъ то признано. Поневже кровь когда или преизлишне согрѣвается, или прохалаживается, густа бываетъ, въ такомъ случаѣ она бѣлку лишнему уподобляется. Ежели: она не движется, а шотчасъ въ движеніе побуждается, что во всякой крови у совершенно здороваго или у больного изъ жилы кровосовращательной пущенной видѣть можно.

Также

Также во всякой ранѣ кровь не движется, понеже она отъ воздуха вышшняго сбѣдшися, въ кончикахъ жмѣ быющихся поврежденныхъ оспанавливаеся.

§. 40.

Да и оная кровь въ движеніе приводится отъ сильнѣйшаго и бѣдственнѣйшаго движенія, отъ котораго жаръ въ тѣлѣ живомъ приумножается. Для того, ежели горякою страждущему человѣку кровь пускаеся, то не только красная кровь очень скоро запекаеся, но на ней еще дѣлаеся бѣловатая, клейкая, крѣпкая пенка, которая родится отъ пасоки чрезъ неумѣренной жаръ згустѣвшей. Чѣмъ большій во время вожденія жаръ и сильнѣйшая горячка бываеъ, тѣмъ больше въ ней *διαθεσις* *φλογιστικῆς* т. е. (огня тѣлеснаго) бояться надлежитъ. Кромѣ того отъ жару водяныя частицы исчезаюъ, оставляя земляныя, толстыя и клейкія.

§. 41.

Кровь и пасоку въ движеніе приводитъ и водка снаружи приложенная и огонь, также и холодъ, уксусъ и другія вещи, холодными называемыя, а между всѣми тѣми, изъ свинцу приготавлиаемыя. Липаргиріумъ, бѣлила и проч.

§. 42.

Ради такой причины вредно есть и излившество крови, которое ей свободаго движенія имѣть не позволяеъ. Густа и неподвижна бываеъ кровь въ нѣ-

нѣкоторыхъ болѣзняхъ , въ цынготной , какохимической , и когда чрезъ многочастной попѣ , поносѣ , мочи испражненіе , теченіе слины и проч. нѣжность водяная иссыхаетъ , и вонѣ исходитъ , плутъ остаетъся въ крови густота , а густота иногда отъ болѣзни , иногда отъ лѣченія , иногда и отъ излишняго движенія бываетъ.

§. 43.

Однакожъ излишнимъ и бѣдственнѣйшимъ движеніемъ , которое производятъ наружныя , переніе , нѣбла движеніе , или внутреннія болѣзни на прим. лихорадка , кровь въ ропки сосудовъ пасочныхъ прогоняется . Сіежѣ дѣлается , когда ея частицы меньшіе надлежащихъ бываютъ , или внутреннимъ нѣкакимъ движеніемъ на прим. въ горячкахъ зловредныхъ , или преизлишнимъ сопреніемъ больше какъ надлежитъ испончены-бываютъ . Въ такой крови наибольшее еще и ошропа бываетъ или сомоноватая , или другая зловредная , ворсу малѣйшихъ сосудовъ сѣдающая . Для чего въ горячкахъ зловредныхъ , хотя по смерти кровь уже не движется , часто находится вожженіе.

§. 44.

Между причинами вожженія не надлежитъ пропустить и крѣпости частей плотныхъ , будетъ ли оная крѣпость жизненная (31), будетъ ли другая Эластическая , которую отъ смѣшенія стихій имѣютъ , и которая естественною именоваться можетъ.

Г

Ибо

Ибо ежели оная сила жизненная весьма приумножится, что всякому извѣстно, что во всякоѣ мышкѣ и волокнѣ невольномѣ сокращеніи, или въ судорогѣ дѣлается, и когда части весьма бывають окрѣплы, также сокровѣ движеніе останавливается. Отъ чего легко перемѣна бываетъ изъ болѣзней судорожныхъ въ болѣзни огневичныя или вожжигательныя. И такъ къ ранамъ и къ другимъ вредностямъ частей жильночувствительныхъ по большой части приключается вожженіе, а наибольше когда онѣ безмѣрно туго зашнурованы будутъ, а не опускаются, или отъ чего то дѣлается, не будетъ отвращено. И такъ вещи острыя, ржавыя, ядовитыя и другія такія вещи, будучи снаружи ли приложенныя, или внутрь данныя, части жильночувствительныя сильно уязвляють, и вожженіе дѣлають. Тѣмъ же окрѣпленыя отъ всякаго вожженія не помалу бѣдствія претерпѣвають, понеже окрѣплость оная препятствуетъ тому, чтобы скоро оное вожженіе развести было можно (*).

(*) Ипнокр. Т. г. стр. 560. въ Коакахъ. τῶν σωματικῶν τὰ γεγυμνασμένα καὶ πυκνὰ θάσσον ὑπὸ τῶν πνευματικῶν καὶ περιπνευματικῶν ἀπόλλυνται τῶν ἀγυμνάσων.

§. 45.

Ежелижъ въ жилахъ бѣющихся и въ волокнахъ частей плѣсныхъ никакой чувствительности не будетъ, и ослабѣетъ жизненная и естественная оная сила, то запоръ дѣлается, понеже меньшіе сосуды также какъ и ротки боковыхъ жилочекъ расширяются, отъ чего около поврежденной части дѣлается

ВОЖ-

вожженіе , а въ срединѣ гнилость. Ради таковой слабости часто и въ тѣхъ мѣстахъ , которыя прежде уже вожженіе имѣли , часто вновь вожженіе дѣлается.

§. 46.

Не надлежитъ пропустить и того , что часто случаются преселенія болѣзни съ мѣста на мѣсто , что называется (метастазисъ) , и многія мѣста вожжигаются , въ которыя стремленіе болѣзни и ея матерія по естеству обращается. Сіи вожженія , называемыя кришическія , прилѣжнаго требуютъ благоразсмотренія , понеже въ таковыхъ всѣ вещи подавляющія или останаавливающія (реприменція) неопребны.

§. 47.

Теперь ужъ изъ предложеній нашихъ можно разумѣть , что вожженію не одна и простая причина бываетъ , но оное по большой части изъ соединенія многихъ рождается. Понеже нѣчто быть можетъ въ тѣлѣ или въ нѣкоторой его части такое , которое одно само собою не сильно вожженіе производить , но однако къ вожженію гораздо склонною ея дѣлаетъ. Чего ради оное наибольше за причину признавается , что или прежде приключилось , или больше къ тому причины подало.

§. 48.

Вожженія примѣты есть четыре : Краснота или рѣблость и опухоль съ жаромъ и болью. Красноту
Г 2 дѣ-

дѣлаеиъ кровь, меньшіе и пасоку несущіе сосуды наполняющая. Опухоль дѣлается отъ того, что маленькія жилы бьющіяся отъ находящейся въ нихъ крови и отъ насилуванія еще припикающей напрягаются. Жаръ отъ соприенія бываеиъ. Понеже чѣмъ большее въ тѣлѣ нашеиъ дѣлается движеніе, а отъ того соприеніе, тѣмъ бо́льшій бываетъ жаръ: какъ во всемъ тѣлѣ, такъ и въ нѣкоторой его части. Отъ не-движенія холодъ. Если часть вожденная очень рѣз-на, въ той и жаръ великой естъ. Боль дѣлается отъ жилъ чувствительныхъ, которыя жилами кро-вию исполненными растягиваются. Случается также и судорожное жилъ чувствительныхъ и волоконъ въ части вожденной сведеніе. Боль (σφυγμώδης) назы-вается та, которая во всякое мгновеніе ока, ко-гда жилы бьющіяся расширяются т. е. въ систолѣ бываютъ крѣпче, понеже въ то время большая крови сила въ часть вожденную напирается чрезъ что жилы чувствительныя наибольше натягиваются.

§. 49.

Всѣ такожде, вожденіемъ страдающіе люди, горячку имѣютъ. И какъ горячки или лихорадки мно-гія тѣлу помощи бываютъ, такъ и горячка при всякомъ воженіи не опмѣнно быть должна, а безъ нея-ное быть не можетъ. Но должно знать, какого роду она: чего ради въ лѣченіи, опомъ спарашься надле-житъ, чтобъ горячку такою не дѣлать, которая въ воженія въ худѣшее состояніе не привела; не мень-шежъ наблюдать и то, чтобъ она вовсе не минова-лась

лась. Ибо когда горячкою жестокою человекъ мучится, то больной анпонецъ огонь (гангренамъ) имѣетъ; ежелижъ она гораздо умалится, и безъ опаска минуется, скирръ или болячку. Также горячка гораздо ослабая не рѣдко въ горячку медлѣнную (лѣншамъ) и въ чахотную (гекшикамъ) претворяется.

§. 50.

Къ горячкѣжъ сей, которую раненою (вуджераріамъ) или припадошною (симптоматикамъ) называюшъ, другія заключенія приключаются, ознобъ или кожи подираніе, а послѣ того жаръ, жажда, безпокойство. Горячка вмѣстѣ съ вожженіемъ проходитъ, и по большой части великимъ попомъ оканчивается. Моча припомъ густа бываетъ, и изъ ней много на дно отсѣдаетъ. Отъ вожженія опухолей, ранъ и болячекъ облегченіе дѣлается приведеніемъ ихъ въ гной или въ загнаиваніе. Ежелижъ горячка незпно безъ хорошихъ знаковъ утишился, то знакъ, что вожженіе въ другую болѣзнь претворилось. (48, 50).

§. 51.

Тяжчайшіяжъ горячкины бѣдствія суть, гдѣ оныя (48, 50.) пріумножаются, и другіе знаки худшіе приходяшъ. Ежели у больного крайнее изнеможеніе будетъ, никакого покою не будетъ, но безсонница, брѣдъ, или сонъ несклонной ночью и днемъ, въ дыханіи тяжесіи, жаръ и потъ не по всему тѣлу равный, или потъ холодный, моча бурная, желтоватая и шонкая, калъ жидкой, да и потъ

Г 3

черный.

черной , припомѣ же весьма будетъ вонючь , жилѣ чувствительныхъ протяженіе или попягота. Сіи послѣдніи случаи смерть приближающуюся значить будутъ.

§. 52.

Вожженіе различными способами оканчивается , ибо недвижущаяся мокрота или разрѣшается , или по начатіи загнаиванія въ гной претворяется , или вожженіе перерождается въ антоновъ огонь и Скиррѣ. Изъ антонова огня легкой переходъ есть въ самую мертвость (сфацелумъ) , изъ скирра въ рака. Ежели рана или чирей безверхушешный худо къ лѣченію склоняются , или не правильно и не радиво лѣчены бывають , то изъ нихъ болячка дѣлается , а изъ болячки фистула.

§. 53.

Безъ всякаго вреда вожженіе пропадаетъ , когда оно въ разрѣшеніе приходитъ. Сіе дѣлается можеть , ежели недвижущаяся и запорѣ дѣлающая мокрота , по пріумноженіи онаго жизненнаго сердечнаго и жилѣ чувствительныхъ дѣйствія , и кровію съ пылу приходящею потрясется , опять прорвется , и движима дѣлавшись съ соками въ кругѣ обходящими смѣшается. Сіе лѣченіе тупѣ дѣлается можеть , ежели мокроты нѣсколько недвижимой будетъ , вожженіе и невелико и не глубоко , ежели сосуды не порваны , ежели мокрота самая нехуда и негнила , и еще сосудовъ не сѣбѣтъ. Ежели кровь нѣсколько ,
а не

а не весьма сильно движется , также и горячка не безмѣрный жаръ имѣетъ. Сверхъ того ежели самая часть вожженная , не весьма окрѣплая и сволоклая , не слабая и безчувственная будетъ.

§. 54.

Къ загнаиванію склоняется вожженіе , ежели кровь , будучи сама собою нехуда , изъ прорванныхъ жилъ бѣющихъ ужъ истекшая , соберется. Она бо въ сосудовъ недвижима пребываючи жизненнымъ движеніемъ въ гной обращается ; а то дѣлается такъ , когда шарики оныя красноватыя въ крови содержащіяся различнымъ , вышнимъ и внутреннимъ движеніемъ , да и отъ самой теплоты прорываются , и въ бѣловатый сокъ обращаются. Гной для сей причины бѣловатъ , а густъ для того , что жаромъ сгущивается. Гной же не изъ одной мокроты недвижимой начинается , но изъ часней плотныхъ. Понеже близъ лежащія части также чрезъ загнаиваніе распаиваются , и съ гноемъ смѣшиваются.

§. 55.

А огонь антоновъ (гангрена) тутъ дѣлается , когда мокрота спящая худая бываетъ , и весь сокъ тѣлесный испорченъ , каковъ отъ ядомъ исполненной раны , отъ горячки смертосной , бываетъ. Когда стоящая кровь вовсе осядетъ , запоръ великой и глубокой будетъ , а горячка и другіе припадки очень беспокоивать будутъ. Когда причины той , изъ которой запоръ произошелъ , отвратить не
можно

можно будетъ. Если вожженіе великое и сильное , ежели оно въ мѣстахъ жильночувствительныхъ находится будетъ , и боль острая и палящая или жестокая больного мучить будетъ. Если приключатся причины нѣкоторыя какъ наружныя , такъ и внутреннія , отъ которыхъ часть вожженіемъ обдержима , тяжко удручаема будетъ. Если кровь въ преизлишнее движеніе возбуждена будетъ , ежели самая часть нѣкоторою вещію утѣсняема будетъ , ежели навѣрхъ мѣста того употребляемы будутъ вещи вязательныя , (адспрингенція) подавляющія (реприменція) холодныя (фригида) жирныя (лингвіа) боль отѣмлющія (анѣдина). Если горячка весьма будетъ усиливаться. Если мокроты изъ прорванныхъ и раненыхъ сосудовъ испекалой такъ много будетъ , что сими жизненными движеніями свариться , и въ гной обратиться ей никакъ не можно. А сие и сѣ случается , что запекая кровь или другая мокрота въ пустырѣ нѣкоторый испечетъ , и не можетъ вонъ взята быть. Понеже сокъ недвижимо стоящій , по пришествіи тѣлеснаго , припомъ же великаго жара согнивается , а гнилость въ частяхъ близъ лежащихъ , еще неповрежденныхъ , произходитъ , въ которыхъ горячка дѣлается , а изъ горячки антоновъ огонь происходитъ. Сіе и въ большихъ чирьяхъ безверхушешныхъ случается , гдѣ вредность глубоко лежаща будетъ , и гной ни самъ собою выпити не можетъ , ни ланцекомъ достать его не можно. Понеже оной гной порпится , и отъ того или антоновъ огонь , или болячка и фистула дѣлается.

§. 56.

§. 56.

Изъ сихъ и вышереченныхъ (36) причинъ разумѣнь можно , для чего ни одна часть пакъ къ Антонову огню неподвержена , какъ плева пучная , въ которой весьма часто вредность сія случается. По прорваніи бо и сѣбденіи сосудовъ мокрота съ масломъ перемѣшавшаяся порпится , гнилость распространяется ; а понеже изъ испорченной матеріи густопа опсѣдаетъ , жидкое подъ кожицею проходитъ , кожицажъ пузырьками сею ' мокротою исполненными приподымается. Спойтъ въ уязвленной части вся боль , и пропадаетъ чувство , опухоль умаляется , а цвѣтъ изъ краснаго въ блѣдной и сизой претворяется , а между тѣмъ гнилость далѣ проходитъ.

§. 57.

Изъ Антонова огня мертвость (сфацилюсъ) дѣлается , ежели членъ во все до самой кости замретъ ; и безъ всякаго чувства и движенія будетъ (*). А ниже увидимъ , что гнилость иногда безъ вожженія дѣлается.

(*) Движеніе тутъ разумѣется то , которое дѣлаютъ или дѣлали мышки мертвостію уязвленные.

§. 58.

Ежелижъ вожженное мѣсто нѣсколько поопадетъ , что завсегда почти въ желѣзахъ бываетъ , и изъ недвижимой мокроты то , что жидкое было и движимое , исчезнетъ , или чрезъ натуральные спускники

д

ис-

испражнится, и въ ничто обратится, а густое и земляное больше спечется, скипится, и со всѣмъ отвердѣетъ, то останеся опухоль жесткая и не давящаяся, безболѣзненная; пу опухоль скирромъ мы называемъ.

§ 59.

Итакъ скирръ дѣлается изъ всѣхъ соковъ, въ желѣзахъ и въ частяхъ, и во внутренностяхъ желѣзистыхъ находящихся, въ шипкахъ изъ молока, изъ слины и пасоки въ желѣзахъ сіи соки опдѣляющихъ, изъ сѣмени въ яицахъ. Ибо сіи соки жестки дѣлаются отъ различныхъ и себѣ пропивныхъ причинъ. То есть отъ недвиженія, ежели при такомъ вожженіи горячка безъ остатковъ пресѣется, или то, что чаще бываесть, дѣиеніемъ не во время и преизлишне испончится, а опухоль останеся. Также и отъ преизлишняго движенія и по приумноженіи горячки соки весьма скиваются; а то случается, когда горячія и жаръ умножающія вещи внутрь принимаются, или когда съ наружи самая часть вожженная давлена, чесана, бережена, или преизлишнимъ и сухимъ жаромъ уязвена будещъ. Тожъ случается послѣ прикладыванія вещей густящихъ, спиритуозныхъ, холодящихъ, копорыми всѣми соки больше сгущиваются. Ежели рана на части желѣзистой будещъ, то по употребленіи такихъ вещей, изъ раны не потечетъ гной хорошій, но мокрота тонкая, самую рану развѣдающая, и оная рана болячкою здѣлается.

§ 60.

§. 60.

А знаки при вожженіи надежду или опасность показывающіе , въ сихъ объявленіяхъ заключающіяся.

- 1) Возрастъ , сила , умѣренность болящаго , болѣзнь прежде того бывшая , и всего тѣла состояніе (габитъ).
- 2) Часть , которую обдержитъ вожженіе , будетъ ли она къ жизни нужная , и будетъ ли ея природа , жидночувствительная или желѣзная , или мясная . Много также знать надлежитъ , какой сокъ къ вожженной части привлекаетъ.
- 3) Величина вожженія , внутрь ли оно клонится , гораздо и скоропостижно идетъ , и сильно мучитъ , также и онаго вожженія припадки (симптома).
- 4) Причины , опасное болѣзни состояніе бываетъ , когда вожженіе отъ худоблеснаго состоянія (габита) , и отъ поврежденія соковъ , также отъ яда внутрь даннаго , или снаружи къ тѣлу приложеннаго , рождается.

§. 61.

Того ради ежели кто вожженные части лѣчить хочетъ , тому различныя употреблять надлежитъ лѣченія . Понеже не всякія лѣкарства вездѣ приличествуютъ , и которыя лѣкарства при начинаніи вожженія полезны , нѣ неприличны тамъ , гдѣ оно уже усилилось . Также вожженія небольшое стремленіе не гораздо строгаго и лѣченія требуетъ . Напротивъ

тивѣ того другаго требуютъ лѣченія мѣста чувствительныя, и копорыхъ чувство пронзительноѣе есть. Завсегда лѣкаръ долженъ всѣ силы свой впомѣ полагать, чтобѣ воженіе утолицъ и въ разрѣшеніе привести, или когда ужѣ къ разрѣшенію никакой надежды нѣтъ, чтобѣ сокъ разтворить, умягчить и гной произвести, и чтобѣ Антонова огня и скирра опасность отвратить.

§. 62.

Съ началажъ и прежде всего прогнашь надлежитъ причины, отъ копорыхъ воженіе произошло, ежели онѣ явственны. Послѣ того ствратиши излишнее крови къ части больной припеканіе, что можетъ издѣлаться крови убавленіемъ, и того крови убавленія повтореніемъ. Сіе кровопусканіе въ самой скорости учинишь надлежитъ, ежели опасность есть къ воженію. А кровь пускати надобно весьма въ отдаленномъ мѣстѣ отъ воженія. Ежелижъ мокроты или сока великое множество гдѣ нибудь ужѣ собралось, то кровь пускать должно изъ той самой части, или изъ ближайшей къ тому мѣсту, чтобѣ больное мѣсто исчезло. А понеже употребленіе показываетъ, что кровь, по отвореніи жилы крововозвращательной, и изъ дальнѣйшихъ частей течетъ, то надобно, чтобѣ оная кровь въ самое отягощенное мѣсто не приманивалась, и не шла, оную впорительно и также изъ отдаленной жилы крововозвращательной пускати. А припомѣ къ отдаленнымъ частямъ приспавляемы бышь могутъ банки, или безъ насѣ-

насѣканія , или кожу ножечкомъ насѣкаючи. Не меньшежъ того тереніемъ легонкимъ , а нежестокимъ вызывася кровь изъ мѣстъ воженныхъ , когда одно мѣсто болишь , а другое будешь тереть. Тоже самое и такъ дѣлается , ежели на отдаленныя части положены будутъ жгущія вещи , горчица (синапи) , куречья слѣпота (ранункулусъ) , огневѣца (пиретрумъ). Смопрѣшь же надлежишь , когда сими вещми кровь отъ воженныхъ частей похочется оттянуть , не привесишь бы оной въ великое движеніе , и горячки не дѣлать. Шпанскихъ мухъ не употреблять. Ибо отъ приложенія ихъ ядъ въ сокахъ прибавляется , которымъ нѣжныя сосуды вредятся и воженіе а наибольше въ благороднѣйшихъ частяхъ приумножающа

§. 63.

Надобно также проносныя давать, которыя быть должны весьма не крѣпки и антифлогистика, однако довольно сильны. Неупотреблять вещей резинозныхъ, безопаснѣйшія слабительныя изъ памариндовъ, манны, изъ ягодъ коринковыхъ, кремора шарпари, сале капарпико, магнезія альба сосставляемая. Также презрѣдно дѣйствующѣ клистеры мяхчительныя.

§. 64.

Употреблять надлежитъ вещи жарѣ утѣпляющія,
соки кислые изъ плодовъ зрѣлыхъ, пѣла изъ уксусу,
Д 3 меду,

меду, и изъ воды составленныя, сыворотку молочную сладкую, или кисловатую, ппизанъ ячменный, съ селипрою и сокомъ лимоннымъ, онаго такъ много давать надлежитъ, чтобъ больной ненасыпно его пилъ, ибо онъ и жаръ утоляетъ, и соки разжижаетъ. Селипру смѣшивать можно съ вещми земляными. Можно толочь сѣмя маковое, сѣмена холодныя называемыя, миндалы, кедровы орѣшки, съ водою, и сокъ выдавивши селипры прибавливать. Немало же помочи дѣлаетъ и содержаніе въ пищѣ; а припомъ воздержность. Весьма припомъ надобенъ покой. Великое бѣдство можетъ изъ того воспослѣдовать, ежели какое нибудь несчастіе больному случится, и больной будетъ печалиться. И такъ больному ничево такого не давать знать, которосбъ могло его оскорбить. Вредны бываютъ вѣкомнатъ и преизлишняя жаркость и холодъ. Но жаркость преизлишняя вредительнѣе есть холоду.

§. 65.

Ежелижъ вожденіе пріумножаться перестанетъ, то лѣчащему подумать о томъ надлежитъ, какъ бы опухоль разбить. И такъ ему должно горячку утолять, не весьма уменьшать, дабы тѣло не изсыхало, и сила не терялась: Вожденіе можетъ разводиться, ежели оно невелико и неглубоко, ежели опухоль не очень жестка, но равномерно мягка, широко расширившаяся, и горячка не очень сильная, и ежели больной съ начала не весьма высохнетъ. Смотри. (60).

§. 66.

А ежели къ разбитію или разрѣшенію опухоли лѣченіе

лѣченіе клонитъ надобно: будетъ, въ то время полезны вещи разжиживающія (дилюенція), отъ которыхъ новый сокъ стоящему или недвижимому прибавляется, и тогда самый движимый дѣлается. Ежели знаки покажутся созрѣнія, и кожа разслабнетъ, пѣломокроватію будетъ, которое все тогда приближающийся будетъ знаменоватъ, то употреблять надлежитъ похлебки, и воду теплую съ кореньями и травами разрѣшающими. Въ то время должно больного гораздо беречь, немногими одѣялами или немногимъ платьемъ одѣвать, но весьма лѣгонькими прикрывать, и опасаться, чтобъ на него холодъ не попалъ. Ежели же вожженіе сильно умаляться начнетъ, въ то время маленько дѣйствительнѣйшія вещи давать, въ которыхъ случаѣ не опасаться и Эссенцій разрѣшающихъ (резольвентесъ), называемыхъ.

§. 67.

Наилучшее лѣкарство есть пища. Доколь вожженіе приумножается, то кушанія или никакого не давать, или и давать да такое, которое сыпесити не дѣлаетъ, но только человека подкрѣпляетъ. Ибо всякое кушаніе вредительно, горячку причиняющее. А для питія, лучшее изъ всѣхъ пиизанъ. Кушанье должно быть изъ слабѣйшей матеріи, изъ плодовъ арбузовъ сушеныхъ, изъ черносливу, изъ яблокъ, вишенъ, и изъ другихъ прозябающихъ вещей, сокъ кислый въ себѣ имѣющихъ. Можно съ водою варить пшеницу пурецкую (ориза) называемую, овесъ облупленный, ячмень, прибавляя ягодъ коринки и соку

соку кислаго изъ яблокъ гранатныхъ. Не надобно употреблять силу умножающихъ вещей, похлебокъ, и копорыя много сытости производящъ. При убавленіи же болѣзни, дабы сила въ пѣлѣ не потерялась, пищу маленько довольнѣйшую, и вина ренскаго крѣпкаго, по нѣскольку давать можно.

§. 68.

Есть еще нѣкоторыя примѣчанія при вожженіи надобныя. Если надобно думать, что вожженіе будетъ слѣдоващъ, то какъ возможно скоро кровь пустить, буде что крайне препятствовать не будетъ. Ибо чрезъ то у вожженія сила отнимается, и такъ оное часто пропадаетъ. Если больной силенъ, а ударъ великъ будетъ, то у больного много крови пустить надобно, и не весьма бояться своего безсилія. Однако приличнѣе, кровопусканіе въ нѣсколько разъ разпредѣлить, нежели разомъ весь сокъ и силу выцедить. Способнѣйшіе же для кровопусканія дни первый и второй. А позднее кровопусканіе, и которое послѣ трехъ дней бываетъ, чутьли когда съ пользою употребляется, отъ онаго больной слабѣе дѣлается, и болѣзни рѣшеніе (резолуцію) непорядочно дѣлается.

§. 69.

Что до лѣкарствъ принадлежитъ, то молодые полнокровные весьма могутъ употреблять соки кислые изъ вещей прозябающихъ, а сухоцавымъ меланхолическимъ людямъ и старикамъ полезна селитра. Если
иная

иная вредность находится будещъ въ пѣлѣ, напри-
мѣръ Какохиміа (*). Цынга, болѣзнь блудодѣйная,
то и ихъ при лѣченіи не забывать. Ежели болѣзнь
перемѣняется, и хопя тяжелѣ, или легче будещъ
дѣлаться, то часто перемѣнять надлежитъ лѣкар-
ства, да не такъ же, чпобъ потчасъ отъ однихъ лѣ-
карствъ за другія и приниматься. Всѣмъ, а наибольше,
у которыхъ благороднѣйшія и жильночувствительныя
части вожженіемъ бывають заражены, блудодѣянїе
крайне вредительно. Ежели послѣ тяжкой и сильной
горячки, и въ самомъ ся перестати, когда здѣ-
лается *μεταστροφή* (**) нѣкоторыя части отъ себя
опухнутъ, тогда кровоупусканіе, слабительныя и
великое воздержаніе бѣдственны. Лучше въ такое время
противодѣйствующими лѣкарствами опянь увеличитъ
вожженіе, когда оное хочетъ въ разрѣшеніе приипитъ,
нежели чпобъ вторичельная опухоль здѣлалась. Еже-
лижъ мѣсто будещъ удобное къ соборищу худой ма-
терїи, то стараться надлежитъ, чпобъ она скопилась
и созрѣла.

(*) Какохиміа, есть соковъ худыхъ въ крови, приизболованъ.
Есть прерожденіе крови, сукровицы, или пасоки отъ здороваго сво-
его состоянія. У древнихъ почитается за различныя распо-
ложенія, болячешная (ульцероза), желчная (билиаза), мокротная (пи-
туитоза), меланхолическая (меланхолика), кислая (ацида), соленая
(салса) (понирика) и проч. Но именамъ симъ ради ихъ
нендобности нынѣшніе писатели ругаются; состоятъ сіе слово изъ
κακός худый или испорченный, и *χυμός* сокъ.

(**) *Μεταστροφή*, есть переселеніе болѣзни изъ одной части въ
другую; что случается у Апоплектиковъ, когда матерїя, отъ ко-
торой въ мозгу затмѣніе дѣлается, отъ него въ жильночувстви-
тельный родъ переходитъ, откуда паралисисъ, отъ *μετίσχημι*
(транспашу) переставляю.

Е

§. 70

§. 70.

Случиться можетъ, что вовремя великаго бѣдствія великое бываетъ и силъ ослабленіе, когда больной сильнымъ кровопеченіемъ обезсиленъ, возрастомъ старъ, неяденіемъ, или другою болѣзнію изнуренъ. Тогда у него буденіи небольшая горячка, однако по величинѣ его вредности не очень сильная. Въ такомъ случаѣ благоразумнаго Медика должностъ есть, силу въ больномъ приумножить, и горячку побольше зблать. Въ такомъ случаѣ непристойно: кровь пускать, промѣное давать, или кушать запрещать, да и холодильныя вещи не полезны. Давать надлежитъ вещи, силы подкрѣпляющія, ушное съ мясомъ молодымъ свареное, вино ренское хорошее, съ сахаромъ и корицею терпою. Лѣкарства первое мѣсто имѣютъ крѣпительныя (кардіака), изъ корицы, гвоздики, изъ мушкатнаго орѣха, и изъ маслъ збланныхъ изъ вещей сихъ, а особливо спиртомъ разведенныя, то есть балсамы вишне, шинктуры безоардическія и алексифармическія.

§. 71.

Разсмотрѣвшижъ сперва, что до всякаго вожженія и его лѣченія кушаніемъ и лѣкарствами принадлежитъ, приступитъ должно къ тому вожженію, которое случается на наружныхъ мѣстахъ, и къ такимъ лѣкарствамъ, которыя снаружи прикладываться могутъ. Такихъ вожжений еще имѣются два рода, которые и опмѣннаго лѣченія пребуютъ, то есть (флегмоне) опіоки, и (Абсцессъ) вередъ безверхуше-

хушешной. Нѣкоторые придаютъ еще къ симъ (Эризипеласъ) рожу ; но ономъ выше сказано (33).

О Т Ю К Ъ (ФЛЕГМОНЕ.)

§. 72.

Отѣкъ (Флегмоне) всякое возженіе называется , однакожъ часто значить , оное которое на наружныхъ тѣлесныхъ частяхъ приключается. Есть опухоль съ возженіемъ , обширная , глубокая , ровная , и кошорая наибольше въ жиру случается.

§. 73.

Разнство имѣетъ отъ рожи ; которая бываетъ невысока обширна и въ одной кожѣ. И рожа (эризипеласъ) расходится широко съ жаромъ и рдѣніемъ , толькожъ при подживаніи перваго что повреждено было ; а отѣкъ гораздо вредительнѣе возрастаетъ , глубже проходитъ и обширнѣе распухаетъ. При отѣкѣ жесточайшіе и большіе припадки бывають. Онъ не сходенъ съ чирьемъ безверхушешнымъ. Ибо ежели возженіе къ пришествію въ гной склонится , то опухоль не такъ равна бываетъ , но глубока , и на срединѣ наибольшую твердость имѣетъ.

§. 74.

Раждається отъ всѣхъ причинъ, запоры произво-
дящихъ (35 по 47). Обыкновенно прикидывается
послѣ ранъ, послѣ ударовъ или переломовъ. Иногда
дѣлается отъ горячки, и послѣ горячки отъ скопленія
болѣзненной матеріи, (46)

§. 75.

Въ семъ вожженія родъ труда и бѣдствія боль-
ше бываетъ, нежели въ рожъ и чирьъ безверхушеш-
номъ. Понеже легко изъ него дѣлается Ангионовъ
огонь. По общимъ знакамъ и по свойственности боля-
щаго (60) предуразумѣвать можно, бѣдственно или
безбѣдственно окончиться оно можетъ.

§. 76.

Всѣми силами старайся надлежитъ, вожженіе
въ раздѣленіе привести. (53) чего ради въ самой ско-
рости вспоможенія искашь должно въ тѣхъ вещахъ,
которыя выше (62 до 70) я представилъ. Ежелижъ
неотмѣнно къ такимъ вещамъ приступитъ надобно
будетъ, которыя къ вожженнымъ мѣстамъ снаружи
прикладываются, то и тѣ по времени смотря учре-
ждать надлежитъ. Скапливающихся соковъ теченіе въ
самомъ началѣ отворачивать вещи подавляющія (репри-
менція). Отворачивъ же напередъ всего, ежели возможно,
причины, иногда хорошо къ тѣлу ударомъ, или хотя
съ высоты упадетъ, зашибенному, холодное желѣзо или
другое нѣчто твердое прикладывать. Можно членъ и нип-
кою по самому больному мѣсту завязывать, но однако
не

не весьма крѣпко, чтобъ не ошѣмѣвалъ, тѣмъ самимъ не попускается оному очень распухать; а по наипаче памятовать должно, во время угрызенія змѣйнаго и другихъ ядовитыхъ животныхъ, которое неоплагаемаго лѣченія пребудетъ. Нѣкоторыя, уязвленной членъ, пленочкою изъ яйца вынутою и на солнцѣ высушенною туго обвиваютъ. Въ опаснѣйшемъ случаѣ можно употреблять тепляки (Эпиэмама) въ водѣ съ уксусомъ смѣшанной суховыжимаемая, въ которой квасцы (алуменъ), соль соколя или морская (саль маринусъ), нашатырь (саль аммоніакусъ) распущены бываютъ. Потушаютъ, также, и къ теплякамъ симъ прилагаются всѣ вещи изъ свинца прѣготовляемые, бѣлила (церусса), литаргирій (літаргиріумъ), сахаръ Сапурновъ (сахарумъ сапурни) изъ произрастающихъ или прозябающихъ изъ земли вяжущія (адстрингентіа), корень бисторте, торментилле, филипендуле, акори адультерини, трава альхимилле, сквицпи, міллефоліи, герніаріе, гедере перрестрисъ, пеніафилли, саникуле, вирге аврее; цвѣты резарумъ рубрарумъ, балауспіорумъ, гиперіци, галле, купуле glandіумъ, маликоріумъ; кора кверкусъ, фраксини: мхи разныхъ родовъ, къ которымъ сваривши съ водою и уксусомъ или съ виномъ кисловатымъ придаваться могутъ соли помянутыя. Пластыри единогласно тутъ полезными признаются, защитительные не весьма крѣпкіе, (десфенсива минорисъ Эффикаціе) и потому чуть ли къ меньшей вредности полезны. Къ нимъ примѣшиваются можетъ камфора.

Е 3

6. 77.

§. 77.

Сижъ всѣ пластыри для того прикладывать
сверхъ должно, чтобъ или жаръ, или холодъ мѣста
поврежденнаго не бередилъ. И онѣ полезны только въ
самомъ началѣ, и доколѣ еще членъ со всѣмъ не рас-
пухъ. А ежели ужъ сокъ скопится, то онѣ вре-
дительны. Тогда легче опухоль или въ разрѣшеніе
привести, или къ созрѣнію довести и отворить.
Обоему случаю сему дѣлаться не попускаютъ вещи
угнетающія или подавляющія, понеже онѣ въ такомъ
случаѣ то дѣлаютъ, что мѣсто затвердѣваетъ,
и запоръ неразрѣшимъ дѣлается. Ежелижъ въ же-
лѣзѣхъ вожженіе безмѣрно со вредомъ, и такъ уси-
лился, что Антонова огня опасаться надобно, то
такія вещи около опухоли на пѣло прикладывать а
не на самую опухоль накладывать. Тожъ самое при
лѣченіяхъ отѣковъ и чирьевъ безверхушешныхъ дѣ-
лать можно. Наипачежъ оныхъ не употреблять при
вожженіи, отъ раны ядъ въ себѣ имѣющей, произ-
ходящемъ. А еще больше при опухоляхъ отъ горячки
зловредной чрезъ метастазу дѣлавшихся. Лѣкарства
сіи почаще перемѣнять надлежитъ. Понеже буде
долго лежать будутъ, то сила ихъ бесплодна дѣ-
лается. При такомъ лѣченіи пристойнѣе и надобнѣе
кровь пускать и слабительныя давать, нежели подав-
ляющія или угнетающія лѣкарствы употреблять.

§. 78.

Удъ или членъ вожженный держать и класть
такъ, чтобъ никакая вещь вредить ему не могла,
такъ же

также чѣмъ ни двигатся не могъ ни висѣть. При безпокойствѣ вожженныхъ часши не такъ успѣшно излѣчиваются. Ежели тепляки приложены будутъ, а гораздо мокры, то онѣ весьма вредны быть могутъ, да и теплоша въ нихъ умѣренная быть должна.

§. 79.

Едѣжъ вожженіе умалится, а однако оно въ удѣ или числѣ еще будетъ (65), то лѣкарю спараться должно оное въ разрѣшеніе привести. Кромѣ вещей, выше (66 по 70) мною показанныхъ, прикладывая можно лѣкарства, нераздѣлимыхъ опухоли встѣнчающія, кошорыя и называются разрѣшающія (резольвенція) или разбивающія (дискупіенція). Ежели вожженіе будетъ невелико и неглубоко; то пособствовать могутъ вещи спиритуозныя, а изъ оныхъ, спиртъ винной камфарной, въ него прибавлять можно Эссенцію шафранную. Также мѣшечки изъ вещей разбивающихъ или разрѣшающихъ, или сухіе или въ горячемъ винѣ обмоченыя и выжатыя. А отъ сильнѣйшаго вожженія помоществуютъ тепляки, кошорыхъ сочиненія и смѣшенія различныя бываютъ. Бываютъ и изъ земли произрастающихъ быль, межъ которыми почти первыми почитаются (корень ангелицы, арисолохія, бріонія, императорія, иреосъ флоренцинскій, трава абротани, абсинтія, агримонія, бстоница, мабрана, маррубія, менте, органи, пулегія, рорисъ марини, руте, сабиня, салвія, скордія, Серпилля, танацетта, цвѣтки самбуцы, хаомилла, лавендула).

§. 80

§. 80.

Но сіе дѣло такого благоразсмотрѣнія потребу-
етъ; ежели мѣсто вожженіемъ зараженное, крѣпко
и жестко здѣлается, то сіи тепляки должно съ
водою варить, и къ нимъ прибавлять нѣчто изъ вещей
умячательныхъ, ибо то неопмѣнно надобно, когда
тѣло очень окрѣплое будетъ. Ежелижъ опухоль надле-
жащаго мягче будетъ, а однакожъ вожженіе велико, и
въ тѣлѣ флегмою изобилующемъ, тамъ умячатель-
ныхъ вещей не надобно, а надобны вещи вязательныя
и крѣпительныя (76). Для того, прежде прикла-
дыванія тепляковъ, можно мѣсто больное обмыть
виномъ простымъ, спиртомъ маприкальнымъ, или
спиртомъ камфарнымъ. Тепляки варить можно изъ
вина ренскаго крѣпкаго, или къ нимъ прибавлять
уксусъ, селистру, нашатырь. Сіи послѣдніе т. е.
селистра и нашатырь и отъ гнилости предохраняютъ;
а сила ихъ еще гораздо дѣйствительнѣе бываетъ, ежели
кожу, не прикладывая ихъ, по легоньку надрѣжешь.
Это надобно бываетъ тогда, когда вожженіе ужъ
къ Аншонову огню склоняется, и мѣсто надлежа-
щаго мягче здѣлается.

§. 81.

Ежели вожженіе уменьшаться начнетъ, опухоль
значно упадетъ, и будетъ ни жестка, ни мягка, также
и цвѣтъ на натуральной будетъ походитъ (66),
тогда больше употребляешь крѣпительныя вещи, ко-
торыя волокна разслабленныхъ безсилію пособству-
ютъ

ютъ. Ежелижъ по излеченіи вожженія, въ членѣ нѣ-
которая слабость останется, то прилично на томъ
членѣ тереніе употребить, а тереть оной членъ
какимъ нибудь спиртомъ. Очень приличенъ спиртъ
српилли, лавендуле, юниперы, формикарумъ, и изъ
сочиненныхъ маприкалисъ. А въ другой разъ класть
можно пластыри, между которыми наилучшіе, нер-
винумъ и оксикроцеумъ. А когда и въ покоѣ себя
содержать уже не весьма нужно (78), полезно членъ
къ своему употребленію пріучать, иногда безсильнымъ
членамъ пріизрядно пособствуетъ обвязка, которою
водокна умѣренно скрѣпляются.

§. 82.

Ежелижъ вожженіе по величинѣ вредности не
такъ велико будетъ, то пристойно мѣсто оное поти-
рать, и на оное класть густую припарку изъ вещей раз-
рѣшающихъ и мяхчительныхъ, или пластыри мях-
чительныя, и гноепроизводныя (дигеренція), междъ
которыми діахилона композиумъ первымъ почитает-
ся. О сихъ ниже объявишь надлежитъ, гдѣ объ Антю-
новѣ огнѣ рѣчь будетъ.

§. 83.

Къ вожженнымъ частямъ прикладываемыя масла
ѣнашыя (олеа деспиласта) масши, опіашы, вредъ
дѣлаютъ. Если къ большой ранѣ вожженіе приклю-
чится, гной производить надлежитъ; ежели же рана
будетъ на части животночувствительной, то оную
разрѣзать, такъ чтобъ довольно велика дѣлалась,
ж бсзб

безъ чего воженіе излѣчено быть не можетъ. Если оный переломленной или вывихнутой кости, оное здѣлается, то прежде легче не будетъ, доколѣ оной не вправишь. Лѣкарства должно прикладывать гораздо скоро, понеже холодъ и воздухъ много вредить могутъ часпямъ воженнымъ.

ЧИРЕИ БЕЗВЕРХУШЕШНЫЙ. АБСЦЕССУСЪ.

§. 84.

Гдѣжъ весьма долго задерживается матерія, она въ гной претворяется (54). А будущее въ гной претвореніе уразумѣть можно изъ того; ежели воженіе не такъ сильное будетъ, какъ бываеиъ, ежели оное къ Аншонову огню склоняиъся будешъ; ежели горячка, хопъ бы убавилась, съ болью, съ жаромъ и со всѣми припадками продолжаться будешъ; и ежели всѣ оныя вспомошествованія, прежде предсказанныя (61 до 81) ничего не успѣютъ. Если во время умаленія горячки оный мочи ничего не будетъ на дно оседать. Если опухоль круглая и глубокая съсамаго начѣла съжосткосиью и краснотиью будешъ возрастать. Если больной тяжелину въ опухоли будетъ чувствовать. Также ежели боль съжаждою, бессонницею, и другими припадками умножатиъся будешъ.

§. 85.

§. 85.

При начинаніи жгноя опять будто кожу по-
одирать у больного будеть, однако пріозыбанію та-
кому время неизвѣстно. Верхушка самая на опухоли
мягка дѣлается, и румянецъ въ бѣлой цвѣтъ пре-
творяется начнетъ. А гдѣ ужъ въ опухоли гной
есть, то оная при давленіи отъ перста на низъ
подается, и обжекая въ округъ недавимыя мѣста,
въ верхъ приподымаетъ, въ ту пору также по нѣ-
скольку не больно бываетъ, а тягость пріумножается.
Ибо какъ долго соку великая часть въ сосудахъ бу-
детъ еще содержаться, опухоль жостка и упруга
бываетъ, а какъ скоро оный изъ сосудовъ выпечетъ
и въ мѣсто соберется, то вожженіе легче спанетъ,
и опухоль мягче дѣлается.

§. 86.

Однако жъ иногда въ попаенномъ вовсе загня-
ваніи, и ежели глубоко гной опускается, тутъ ничего
такихъ знаковъ усмотрѣть бываетъ не возможно.
Однако больной имѣвши горячку, жажду, бессон-
ницу и другіе припадки чувствуетъ внутри нѣ-
которыя покалыванія, и мѣсто оное чешется, а
на послѣдокъ сизоватымъ или бѣловатымъ дѣлается.

§. 87.

Сей вожженія родъ, кромѣ того что ежели
очень велико будеть, и на часъ нѣкоторой благо-
родной дѣлается, не гораздо бѣдственъ бываетъ.

Однако великое и долгое время загнаиваніе, понеже худая матерія съ другими пѣлесными соками смѣшивается, часпю какоюмѣю, чахотку и горячку чахотную по себѣ оставляющѣ; а по самое случается и отъ того, ежели изъ чирья безверхушешнаго гной не въ надлежащее время выпускается, или ежели самое загнаиваніе удерживается. Сіе дѣлается, отъ приложенія вещей угнетающихъ, спиритуозныхъ, и когда во время лѣченія мѣсто болѣе крѣпче надлежащаго обвязками стягивается, и суконками придавливается, очемъ ниже, описываячи раны, объявлю.

§. 88.

Иногда чирей безверхушешной проходитъ, такимъ образомъ, ежели въ уринѣ нѣчто гнойное, густое и бѣлое нанизъ отсыдающѣ; однако сіе гораздо рѣдко случается, какъ-то всѣмъ вѣдомо.

§. 89.

Когда ужъ опухоль такъ возрастетъ, что въ ней гной будетъ, тогда не должно употреблять вещей подавляющихъ (реприментесъ), разбивающихъ (дискутентесъ) и спиритуозныхъ, ибо таковыя вещи опухоли скирромъ дѣлаютъ. Ежели лѣкарь не совершенно знающѣ, что опухоль раздѣлится, то съ начала прикладывать можетъ вещи обѣ силы въ себѣ имѣющія, и раздѣляющія, и смягчающія. Въ таковомъ намѣреніи бывши, смѣшавъ вмѣстѣ раздѣшающія и смягчительныя вещи, и дѣлающъ припарку густую, или прикладывать вышепомянутыя пластыри смягчительныя.

§. 90.

§. 90.

Когдажѣ отѣ сихъ вещей опухоль не раздѣлится, то надобно ее въ созрѣніе привести. Ежелижѣ, по величинѣ опухоли не очень сильное будетѣ вожженіе и горячка небольшая, что гораздо часто приключается, то силу больше приумножить. И такѣ горячку возбуждать должно, въ которомѣ случаѣ почти ничего лучше нѣтъ, какѣ никакихъ лѣкарствъ не давать. Ненадобно кровь пускать, слабительное употреблять, и всѣ вещи такія, которыя жарѣ уполяютѣ. Дѣлать тѣлесныя движенія, мѣсто вожженное переть, ѣсть довольно, пить поболѣ, да еще и шагого, которое бодрость придаетѣ.

§. 91.

На опухоль прикладывать должно вещи гной производящія, да такія, въ которыхъ нѣкая опмѣнность заключается. Ибо есть нѣкоторыя вещи, которыя только мяхчатѣ, волонка разслабляютѣ, и испарину изъ кожи удерживаютѣ. Изъ таковыхъ первыми почищаются корень аліеа, малва, лиліорумѣ алборумѣ, трава аліеа, малва, бранце урсине, мелилоти, меркуріалисѣ, паріетаріе, вербасци, ѣмя лини, фену греци, псилліи, сесами, и всякая мука. Кромѣ сихъ масла не крѣпкія лиліорумѣ алборумѣ, вербасци, лини, жирѣ и масло коровье, желтки яишныя, толькожѣ сіи всѣ не должны быть съ ржавчиною, но свѣжіе. Изъ нихъ дѣлаются густыя припарки. А приномѣ весьма дѣйствительно есть лѣкарство составляемое изъ муки крупичатой,

той изъ хлѣба блага крупичатаго, изъ сѣмяни лнянаго, вмѣстѣ сплоскиши онсе сварить и положить масла лилій бѣлыхъ. И густыя припарки вредъ дѣлаютъ, ежели онѣ будутъ мокры и холодны. Мяхчатъ также пластыри, де мелилопо, малактикумъ, де аммоніако, дѣахилонъ симплексъ, которые пластыри для мяхченія опухолей очень способны.

§. 92.

Другой родъ лѣкарствъ имѣется, который со-зрѣнію пособствуетъ, гноя стекающагося внутреннее движеніе пріумножая, и приводя, чтобъ оной распотился. Такія вещи или съ самыми умахчипельными мѣшать, или на верхушку опухоли класть можно, а сверхъ ихъ мяхчипельныя накладывать. И такъ къ произведенію и сваренію гноя наивышше пособствуютъ, лукъ печеный, чеснокъ, винныя ягоды или фиги, мыло, медъ, растворъ или дѣсго хлѣбное, хлѣбъ домашній жеваный и слиною разжиженный, гумми аммоніакумъ, галбанумъ, сагапенумъ, бделіумъ, которыя дѣйствительнѣйшими почищаются, (*) будучи въ уксусѣ распушены и съ другими смѣшаны. А изъ сочиненныхъ вещей дѣйствительнѣйшимъ признаваеся пластырь дѣахилонъ композитумъ.

(*) Ежели смолы размѣшиваются съ желткомъ яишнымъ, ради мяхченія жесткихъ частей, то онѣ дѣйствительнѣе бывають.

§. 93.

Но сіи лѣкарства приличны при небольшомъ вожденіи, и ежели горячка небольшая или посредственная

оптвенная будетъ. Ежелижъ обоихъ приключеній большее стремленіе, и кровь худая будетъ, какова въ горячкахъ зловредныхъ обыкновенно случается, то послѣдняго рода лѣкарствъ и всякихъ пластырей не употреблять, но только мяхчительныя вещи тушъ полезны; къ нимъ прибавлять можно уксусъ, для отвращенія гнилости. Въ кругъ опухоли класъ надлежащъ, (76, 77.) примѣчаючи. (78)

§. 94.

Ежели опухоль здѣлается твердою, а вожженіе и горячка вовсе пропадутъ, что случается въ такое время, когда какой лѣкаръ холодительныя (рефригеранція) подавляющія (реприменція) и спиритуозныя (спиритуоза) на верхъ будетъ класъ, или ежели вонъ испражняющими (эвакуантибусъ) весь жаръ и движеніе переломитъ, тогда первый родъ лѣкарствъ къ сваренію гноя больше способенъ: Но такое лѣченіе часто долго продолжается. На послѣдокъ изъ таковыхъ абсцессовъ то есть чирьевъ безверхушешныхъ и таковымъ способомъ преодоленныхъ гной происходитъ по большой части блѣдный, сизый, на сыворотку похожій и дрожжеватый.

§. 95.

Что гной созрѣлъ, то по примѣтамъ (84, 85, 86.) можно узнать. Онъ, ежели не глубоко будетъ, самъ собою отворяется, или чрезъ приложеніе прижигательныхъ вещей, или ланцетомъ вонъ выскасится.

§. 96.

§. 96.

Завсегда лучше созрѣнія дожидаться, нежели недозрѣлые прорѣзывать; созрѣніемъ кожа тонка дѣлается, и весь гной въ чирѣ въ одно мѣсто скапливается. Ежелижъ недозрѣлые отворяюща, то гной обыкновенно больше съ кровью смѣшанъ, понокъ и жидокъ бываетъ, а негустъ, бѣловатъ, слизокъ, ровенъ и одинаковъ, и который наилучшимъ почитается. Когда край разрѣзанной раны пухнуть, и возженіе имѣть будетъ, тушъ болячка останется, и оная гораздо трудная, и не иначе какъ только чрезъ прикладываніе другихъ вещей въ созрѣніе приводящихъ, и гной производящихъ, залѣчивается. Ибо въ то время воздухъ ежели въ рану попадаетъ, устья сосудовъ перерванныхъ сжимаются, опчего оныя влажность съ большею болью испускаютъ. Однакожъ это не завсегда бываетъ. Ибо временемъ для опасности большаго заложенія, требуется и изъ недозрѣлой опухоли гной выпускать. Что особливо въ чирьяхъ безверхушешныхъ близъ задняго прохода случающихся, часто дѣлать нужда бываетъ. Толькожъ не одна поропость въ разрѣзаніи вредъ дѣлаетъ. Вредитъ слово въ слово и гной созрѣлый а невыпущенный. Понеже и онъ долго тамъ будучи претворяется въ полугной (саніемъ) тонкой, синеватый, острый, который близкія и здоровыя части пробѣдая пазушитъ. Отъ того то бываютъ болячки (ульcera) и Фистулы, а понеже матерія сія будучи зловредна, ежели усилятся, то часто въ кровь вмѣшиваясь, и поршитъ всего тѣла восходяще.

§. 97.

§. 97.

Гдѣ Лѣкаръ вознамѣрится абсцессъ то есть чирей безверхушешный отворить лѣкарствами прижигательными или сѣбдающими, въ такомъ случаѣ весьма способенъ лаписъ инферналисъ или лаписъкаустикусъ хирургорумъ, а бупирумъ аншимоніи то есть (масло антимониальное) не такъ ужѣ полезно. Оно отъ теплоты жидко дѣлается, и расплывается. Меркуріусъ сублиматусъ (сүлема) вовсе ненадобна. Ежелижъ что изъ сихъ приложено будетъ, то мѣсто оное пластыремъ покрыть, въ которомъ бы пластырь на срединѣ дѣла вырѣзана была. И такъ на кожу въ дырку пластырьную кладется лѣкарство прижигающее, которое, накрывши другимъ пластыремъ, суконками и обвязкою привязать. И доколь еще не будутъ приложены, ни лѣкарство, ни обвязки, кожу помочить надобно, и такъ между тѣмъ чрезъ нѣсколько часовъ лѣкарство прижигающее кожу сѣбсѣть.

§. 98.

Скорѣйшее же и достовѣрнѣйшее лѣчение есть, когда опухоль разрѣзываютъ ножечкомъ обоюдоострейнымъ большенкимъ. Когда ножечкомъ надобно то будетъ зѣлать, тогда одною рукою опухоль маленько попридавить, и гной къверху податься принудить, чтобы чрезъ то его ближе можно достать. На большомъ чирѣ безверхушешномъ и разрѣзъ большій надобенъ. А ножечкъ такъ впускать въ чирей безверхушешный; сперва концомъ ножечковымъ впрямъ болящую часть проколотъ, а послѣ воспредѣль
3
вверхъ

вверхъ поддѣвъ и прорѣзавъ вонъ вынуть. Временѣ бываетъ еще и не со всѣмъ жиръ тонкъ, въ такомъ случаѣ глубже прорѣзывать должно. Однакожь остерегаться надобно, чтобъ великой жилы быющая или жилы крововозвращательной не перерѣзаны (*). Въ такомъ случаѣ меньше опасности бываетъ, ежели гной буденъ зрѣлый, ибо онъ межъ кожей и сосудами находится буденъ. Не такъ хорошо, опухоль не на верхушкѣ, но на нижней части прорѣзывать, что нѣкоторые для того велятъ дѣлать, чтобъ гною выходъ былъ. Однако и сие прорѣзываніе несозрѣлое быть можетъ (96).

(*) Смотри Примѣръ у ГАЛЕНА о Показан. Анаст. Кн. 8. гл. 13.

§. 99.

Когда гнойность или загноеніе (суппураціо) прорвется, или прорѣзана буденъ, гной выдавить должно. А припомъ всячески отомъ спараться, чтобъ оной опухоли крѣпко не давить, въ разрѣзъ не класть жесткихъ кноповъ (20), и крѣпко не прижимать, но умѣренно. Понеже отъ того опухоль шверда бываетъ, и краѣ мозолишы.

§. 100.

Прочее, что къ очищенію чирья безверхушешнаго (абсцесса), къ наполненію его и къ заживленію прилично, о томъ ниже покажется, (см: о ранахъ). А припомъ шутъ лѣкарства кровечистительныя потребны. Все лѣченіе производитъ такъ: Смотрѣнь на соспояніе здравія, на лѣта, на жишє и на другія болѣзани,

болѣзни , которыми больной немоществуетъ. Вредительны быть могутъ вещи тѣ , которыя отъ порченія соковъ даются , ежели кровь въ движеніе крайнее приведутъ. Также со всѣмъ ненадобны съ начала проносныя , понеже гною дѣлаться препятствуютъ , оныя попросны тогда , какъ уже придетъ до заживленія. Надобна тутъ воздержность. Ибо ежели сырость (крудитася) выплѣтъ имѣется , которая въ гною можетъ быть видима , оную очень легко узнаютъ искусный лѣкарь (*).

(*) Ежели больной виномъ или другимъ сильнѣйшимъ напиткомъ упился , или неумѣреннo сердился и беспокоился , новое возжжение дѣлается , край у раны приыхаютъ , гной тонкой дѣлается , острый и ѣдкій. Ежели мѣса оожрется , гной будетъ тлѣущий и на возри походить.

§. 101.

Ежели послѣ выпущенія гноя , жесткость останется , то еще наверхъ прикладывать умягчательныя , и гной производящія вещи надобно , изъ пластырей діакрионъ композиумъ.



ВЕРЕДЪ. или ЧИРЕЙ, фурункулусъ,

§. 102.

Вередъ (фурункулусъ) есть нѣкоторый родъ чирья безверхушешнаго (абсцесса), который отъ того дѣлается , когда нѣсколько крови изъ прорвавшейся

какой нибудь маленькой жилы бьющейся скопится , и понеже въ разрѣшеніе припишъ и движимою здѣлаться силы имѣть не будетъ , въ гной претворяется. Ибо , ежели многія жилы бьющіяся прорываются , тамъ больше и гноя скапливается , и дѣлается чирей безверхушешный (абсцессъ). А изъ вереда немного выходитъ.

§. 103.

Его примѣты таковы : Опухоль небольшая воспренькая , гораздо жесікая , съ вожженіемъ и по величинѣ опухоли прекрайне болящая. Ибо вередъ величиною въ полъяща рѣдко случается , а больше шого никогда не бываетъ. Всегда жестокъ бываетъ , и съ болью вырастаетъ. На послѣдокъ самая опухоли верхушечка побѣлѣетъ , и здѣлается прыщикъ , изъ котораго , какъ прорвется , немножко гною , съ кровью смѣшаннаго , выходитъ. Никакой опасности въ немъ нѣтъ , хотя никакъ лѣченъ не будетъ. Ежели же опухоль на частяхъ жильночувствительныхъ здѣлается , или , ежели много шаковыхъ у одного человека случится , то должно болѣзнь облегчать. Вередъ не отъ кожи , но отъ внутреннихъ частей начинается , и самъ собою вспухаетъ , отъ попорченія крови , которая или густа или клѣйка будучи , болѣзнь кажется производитъ.

§. 104.

Ежели для нестерпимости боли вередъ надобно будетъ лѣчить , то производить оное умягчательными вещами , чтобъ поскорѣ созрѣлъ , и гной выпелъ.

Здѣсь

Здѣсь не надобно употреблять ножечка, ибо гной коѣу прорываетъ, и самъ собою отворяется. Можно сверху прикладывать вещи умягчательныя и гной производящія (91, 92). Гной выдавивши сверху можно класъ пластырь дѣхилонъ композишумъ, которыми жесткость, почти всегда остающаяся, разводится, и сколько бы матеріи въ сосудахъ ни ослабало, онъ выпягивается. А другихъ лѣкарствъ тутъ ненадобно.



ВОЛДЫРИ или ПРЫЩИ.

В А Р И.

§. 105.

Волдыри или прыщи (вари) съ вередями почти схожи, которыхъ мѣсто есть въ желѣзахъ жирныхъ, или тучныхъ МОРГАГНОВЫХЪ. Дѣлаются на лицѣ также, какъ кажется, отъ крови густой, клейкой и нечистой. Когда женщины въ то время, какъ на плашѣ носятъ, употребляютъ пищу, въ которой худыя соки находятся, а иногда и отъ того кожа перхается, что не наблюдая чистоты, салными руками за лице хватаютъ.

§. 106.

Противъ такой скорби, а навпаче ежели кровь не такъ нечиста, какъ клейка, пособствуютъ банки съ насѣчкою кожною на спинѣ наставляемая, также

полезны воды минеральныя. А вредительны, да и гораздо, косметическія (*) вещи, и сверхъ другихъ, изъ ртути приготовляемыя.

(*) Косметическія (косметика) лѣкарствы наружныя, извѣстныя употребляемыя, кожу убѣляющія, смягчающія, для приданія красоты или пригожества; какъ то олеумъ шартари, лѣкъ виргинисъ, распущенная сулема, сбра, камфора и проч. отъ слова коsmeo украшаю.

ВЕРЕДЪ МНОГОГОЛОВНЫЙ.

карбункулусъ.

§. 107.

Презвѣльное бѣдство дѣлаетъ вередъ многоголовный *авраа* или Карбункулъ, онъ буди по бы зловредный или смертоносный вередъ. Понеже въ кругъ опухоли пресильное воженіе бываетъ, которая не такъ къ загноенію какъ къ Аншонову огню склонна бываетъ; дѣлается по большой части отъ зловредной и моровой горячки. Его примѣны таковы, опухоль очень жестка, багрова и синевата, которая не много поднимается, но къ нижнему мясу буди по бы пригвождена. Боль престолая бываетъ, и какова отъ прижигательныхъ вещей обыкновенно случается.

§. 108.

Сухая и жесткая опухоль, когда будетъ дѣчена прикладываніемъ смягчительныхъ вещей, то не такъ, какъ вередъ, въ гной обращается; но, какъ придетъ

Аншо-

Ангионовъ огонь , гнить начнётся. И ежели благополучно дѣло будетъ дѣлаться , то Ангионовъ огонь не будетъ разпространяться , но то , что уже повредилось , отъ целаго то есть отъ здороваго отдѣлится , гноимъ между гнилымъ и здоровымъ дѣлающимся.

§. 109.

Вередъ многоголовный (Карбункулъ) завсегда свѣдѣтельствомъ быть можетъ великой и зловредной болѣзни , и крайне опасность въ себѣ заключаетъ. Однакожъ тошнѣ сноснѣе , который поднимается , краснѣетъ , и на мясныхъ частяхъ случается. А около котораго великое вожженіе бываетъ , и оное будно пронзными корнями ползетъ ; который чернѣйшій и сизѣйшій цвѣтъ имѣетъ ; которой въ верхъ не поднимается , но къ нижнимъ частямъ будно бы прибитый продолжается , или который не пришедши въ совершенство опять умалается , который части жильночувствительныя , членосоставленія и жилы сухія (пендинесъ) занимаетъ , таковой опасноснѣ смертнѣю показывается. А при томъ больной взбѣсится можетъ , ежели много ихъ , хотя бы хорошихъ , на одномъ человѣкѣ случилось , понеже онъ отъ прекрайней болѣзни покою не будетъ имѣть.

§. 110.

Отъ вередовъ многоголовныхъ (карбункуловъ) помощь находится въ вещахъ мягчительныхъ , которыми гнои производится , и испорченное отъ здороваго отдѣляется. И для того весьма хорошо при-
клад-

кладывать припарки густыя мучныя съ молокомъ варенныя, примѣшивать къ тому можно масло, медъ, винныя ягоды жирныя, и другія симъ подобныя (91, 92).

§. III.

Есть же и такіе люди, которые желая нѣсколько поспѣшить или поскорѣе здѣлать, незорѣлой карбункулъ безъ замедленія вырѣзываютъ или прижигаютъ, и къ тому, огонь или лѣкарства събѣдающія и вонь выбѣдающія, употребляютъ. Но таковымъ способомъ поврежденное вовсе не исцеляется, только возженіе, на краяхъ новой болячки дѣлающееся, бѣдственнѣе бываетъ (96).

§. IIII.

Кажется больше прилично, желѣзо раскаленное издалика прикладывать къ вереду многоголовному (карбункулу), ежели оный къ низу будто пригвожденъ будетъ, чтобъ онъ отъ того больше къ верху поднялся. Ибо Ишпанскія мухи (кантаридесъ) не такъ съ пользою дѣйствуютъ (62). Ежели же все испорченное, то есть згнилое со всѣхъ сторонъ отъ живаго тѣла отдѣлено будетъ, то болячку залѣчивашь тѣло наполняющими. (смотри: ниже о ранахъ).

грудъ

Г Р У Д Н И Ц А. МАММАРУМЪ ІНФЛАММАЦІО.

§. 113.

Также инымъ способомъ лѣчить должно желѣзы, когда онѣ сѣ вожженіемъ распухнутъ. Къ нимъ подающія вещи (реприменція) наибольше ненадобны, ибо и однѣхъ разбивающихъ (дискуціентесъ) терпѣть не могутъ. Ежели оныхъ опухоль въ разрѣшеніе обратишь желается, надобно многія вещи мягчительныя употреблять, или оныхъ немалую часть съ другими вещьми смѣшивать.

§. 114.

Иногда шишки вожженіе получаютъ, что чаще у тѣхъ случается, которые сами своего младенца грудью кормить не хотѣвъ, или онаго отъ груди отнимаютъ. Тутъ всѣми силами стараться надлежитъ, у нихъ молоко въ шишкахъ нагрузное удержать, и въ кровь обратишь. (87)

§. 115.

Безбѣдственное и весьма полезное лѣкарство есть, обвязкою пугонко топчасъ шишки обвязать и къверху приподнять. Ибо такимъ способомъ, и приложеніемъ такой повязки, влажности молошной въ шишки скапливаться не попускается да и вовсе пшеніе оное отвращается. Повяскажъ не такъ уже полезна бываетъ въ то время, когда шишки только
И комъ

комѣ нагрузнутѣ , и очень крѣпки здѣлаются. Ибо легко можетѣ здѣлаться , что отѣ весьма пугаго обвязыванія жестокость и вожженіе въ питкахъ больше приключится. Въ такомѣ случаѣ весьма изрядно , ежели молоко имѣетѣ выходѣ свой , и самовольно изѣ шипекѣ печетѣ , шупѣ онѣ мягки дѣлаются и опадаютѣ. Можно на груди класѣ и обвязкою обвязывать пластырь смѣшанный изѣ ровныхъ частей пластыря де спермате цети и діафоретици Минсихпи смѣшанный , или другой , чаще въ употребленіи бывающій пластырь филіи захаріе. Но ничто бѣльшей прибыли принестѣ неможетѣ , какѣ воздержаніе ; и ежели воду теплую , или ушное весьма нежирное да и то весьма жидкое , вмѣсто питья употреблять будетѣ. У роженицѣ отѣ беременности разрѣшившихся весьма дѣйствительно быть можетѣ слабительное составленное изѣ лѣкарствъ вовсе безвредныхъ и неострыхъ , а особливо еккопротика (*) называемыхъ. Изѣ сихъ полезнѣйшими почитаются , манна , пассуле , креморѣ шартари , рабарбарумѣ. А шѣмѣ женщинамѣ , которыя младенца грудью опкормили , и опкормленнаго опнятѣ отѣ груди на мѣрны , маленько силнѣйшія лѣкарства давать можно.

(*) Еккопротика тѣжѣ самыя лѣкарства значатѣ , что и Камарктика то есть проносныя , но только легчайшія отѣ слова еккопротѣ , поносѣ дѣлаю , на низѣ произвожу.

§. 116.

Вредѣ можетѣ приносить пища и питіе крѣпкое или сильное , горячее и кровь въ крайнее движеніе

ніе приводящее, которое пучитъ, и въ которомъ съ излишествомъ сытоспи имѣется, каковы обычно бываютъ похлѣбки. Болѣзнь еще больше причиняетъ на нѣзъ неиспражненіе, ежели и у роженицы крови остано- вляясь. А сіи женскія очищенія лѣкарствами производитъ горячими я думаю не безъ опасности, наибольше же, ко- гда жаръ и пульсъ скорый горячку надходящую или при- ближающуюся будитъ значить, о чемъ всякъ извѣ- стенъ, что горячка отъ горячихъ вещей загорається. Въ такомъ случаѣ изъ внутрь принимаемыхъ лѣкарствъ полезны лѣкарства силу имѣющія горячку въ умѣ- ренность приводитъ, и вовсе ее искоренитъ. А при томъ вредны съ наружи употребляемая спиртъ винной съ камфорою, и другія (59, 77), между пѣломъ повязка надлежащаго крѣпче стягивающая.

§. 117.

Часто же случается, что у женщинъ грудью кормящихъ отъ задержаннаго въ пищкахъ молока, пищки распухаютъ, и возженіе получаютъ. А сіе бываетъ, когда не чаянно чего испугается, или озябнетъ, или чемъ нибудь самыя пищки досадитъ; то же самое здѣлаться можетъ и отъ пластыря у пѣхъ женщинъ, у которыхъ пѣло ничего терпѣть не можетъ. Тутъ прилѣжное рассматрѣніе употреблятъ лѣкаръ долженъ, такое ли возженіе есть; которое въ разрѣшеніе можетъ притыпить. Ибо ежели опу- холь не очень жестка, ровна и красна, какова въ болѣзни рожа называемой бываетъ, довольно къ пищкамъ одни сухіе порошки присыпать, которые отъ рожи пособст- вуютъ (смотри. ниже о рожѣ), и ихъ отъ стужи беречь.

И 2

§. 118.

§. 118.

А буде вожженіе уже усилилось, глубоко прошло, и опухоль жеспка и желваковапа будетѣ, шупѣ все это наблюдать должно, что выше я показалъ (93). Давать можно лѣкарства въ умѣренность приводящія (темперанція) и разжиживающія (дилюенція). Можно давать щеняпамѣ или другой женщинѣ молоко вонѣ высасывать. А припомѣ хорошо полегоньку шипьку мяконькимѣ фланелемѣ попираѣ. Ежели же молоко уже вовсе пропало, и опухоль къ загноенію клонится (59, 84, 85, 93), въ созрѣніе приводиѣ, примѣчая все, что выше мы показали (сб90, до 101).

СВИНАЯ ЗАУШИЦА.

то есть

ВОЖЖЕНІЕ ЖЕЛѢЗЪ ОКОЛОУШНЫХЪ.
(ПАРОТИДУМЪ ИНФЛАММАЦІО.)

§. 119

Желѣзы околоушныя отѣ многихъ причинѣ распухающѣ, отѣ скопленія худой матеріи, будучи въ коростѣ или въ блудодѣйной болѣзни, также и отѣ чирья шакого, копорый предки наши для сходства съ пчельнымѣ сотомѣ хѣріонъ назвали (*), и ежели мокрота ршутью разбиѣ будучи шуда скопится. Въ горячкахъ и въ самомѣ моровомѣ повѣпріи часто въ желѣзахъ околоушныхъ метάσασις бывастѣ (46).

Слу-

Случаются также можеть, когда въ спускникѣ, или въ протокѣ сся желѣзы СТЕНОНОМЪ найденномъ, нѣчто засорится, и слинѣ выходѣ помѣшается.

(*) ЦЕЛСЪ въ Книг. 5 гл. 28. ПАВЕЛЪ въ Кн. 3 гл. 3 стр. 16. ТРАЛЛІАНЪ въ Книг. 1 гл. 9 стр. 5.

§. 120.

Какъ же сіи причины, такъ и лѣченія способы много межъ собою разнствія имѣютъ. Какъ возможно не допускать матеріи тамъ скапливаться, и опасаться надлежитъ, чтобъ не прорывались. Ибо ради мокроты въ нихъ находящейся, гной хорошей не бываетъ, но острый и совокупныя части разбѣдающій, отъ чего дѣлаются болячки съ трудностью излѣчиваемыя. Ежели же острой, тяжкой и зловердой болѣзни матерія шуда обратится, то лучше опухоль отворить, нежели подавляющими (реприментібусъ) лѣчить (46, 77.). Однакожъ сіи желѣзы невсѣ въ гной приходятъ, но часню или опять опадаютъ (*), или желчнымъ нанизъ испражненіемъ, или густою мочою въ разрѣшеніе приходятъ (**).

(*) Смѣтр. у ИППОКРАТА о повѣтріи въ Кн. 1 въ част. 1 стр. 653.

(**) Въ прежде помянутомъ мѣспѣ. Част. 2 стр. 667.

§. 121.

Въ другихъ болѣзняхъ помощи ожидать надлежитъ наибольше отъ излѣченія оныхъ болѣзней. Въ коросѣ и при худыхъ болячкахъ надобно проносныя (кастиарктика) давать, въ которыхъ прибавлять меркуріумъ дулцемъ, и давать лѣкарства кровь и пасоку

И 3

очища-

очищающія. Во время насморга , и ежели слинный протокъ засорился , пособствують сверхъ оныхъ , которыя самую болѣзнь и горячку излѣчиваютъ , вещи жевательныя , и изъ нихъ бедринецъ бѣлый (пѣмпи-нелла альба). Также можно полегоньку пощупывать и почесывать больное мѣсто. Во всѣхъ же сихъ случаяхъ опухоль тепло содержать надобно , и наверхъ при-кладывать пластырь дѣфорепикумъ, смѣшивая съ пла-стыремъ де мелилото. И въ семъ лѣченіи опасаться надлежитъ , чинобъ не здѣлался скирръ (58 , 59 , 93).

§. 122.

Ежелижъ лѣченіе такое не благополучно окажется , и опухоль вся къ загноенію будещъ клониться (84 , 85), то можно наверхъ прикладывать припарки гу-стыя и пластыри (91) , а напоследокъ опухоль оп-ворить (96 , 98 , 99 , 100), а болячку залѣчить. А понеже сія болячка очень и завсегда мокнетъ , съ трудностью залѣчивается. Когдажъ сіе случится , то надобно пряжу маленько пополице сложивъ спи-рипомъ виннымъ намочить , выжать и къ болячкѣ приложить , и по приложеніи обвязкою попужъ за-тянуть , и ес , буде какой другой нужды не случится , до шести дней не опнимать и не развязывать. Чрезъ сіи дни бытъ покойну , и ничего такого не кушать , которое бы надобно жевать (*) , а употреблять боль-ному похлебки , кашицы и симъ подобныя кушанья , доколѣ чирей зарастетъ.

(*) Ле дранъ Прим. Т. 1 Пр. 2.

бубонъ

БУБОНЪ или ПАХОВИКЪ.

б у б о.

§. 123.

бываютъ также опухоли подъ пазухами и въ пахахъ, и изъ оныхъ послѣднѣя паховиками или бубонами называютъ. Сія опухоль великое сходство имѣетъ съ опухолью шюю, которую производятъ сальникъ и кишки, когда изъ брюха выходятъ. И понеже никакая ошибка бблшей опасности не приноситъ, и оба сѣи рода съ вожженіемъ случаются, то съ крайнею прилбжностію различность ихъ знать надлежитъ. Ибо оный родъ килы, который надъ сосудами голенными дблается, и который называется килою голенною (гернїа крурарисъ), а наипаче, ежели не сальникъ, да только кишка выйдетъ, сверхъ чаянїя не весьма искусному паховикомъ или бубономъ покажется. Ибо паховая кила (бубонокеле) ближе къ срамному уду бываеетъ, нежели бубонъ. Салнишная кила (эпиплокеле) по большой часпти мягче, и отъ персповъ больше удаляется, нежели кишешная кила и бубонъ, и такъ межъ сими бблшее сходство имѣется: однакожъ у килы голенной опухоль круглая, а у бубона продолговатая. Ежели перспомъ подавишь и то и другое увбчье, то больше оппрядываетъ кишка, хотя бы роздувшись была, нежели бубонъ. Бубонъ гораздо жеце. Килу когда давишь, ежели вожженїя шупъ не будетъ, опухоль въ брюхо уходитъ, а бубонъ не уходитъ, онъ послѣ давленїя больше дблается,

жеце

скрозь холщину процѣвженныя, къ которымъ можно прибавлять по нѣскольку капелекъ (бальзами Перувиани). Ежели же будетъ больно, и мочиться трудно, отъ того будетъ разумѣться, что въ стволѣ воженіе имѣется: въ ту пору балсамъ не надобенъ, а лучше употребить селистру (нипрумъ).

§. 125.

Однакожъ, когда уже паховикъ по есть бубонъ расхodiлся сирѣчь усилился, оный въ разрѣшеніе приводить дѣло есть не безопасное; ибо чрезъ приведеніе въ гной много худого и яда исполненнаго сока выпекать можеть. А по самое здѣланъ можно, чтобъ разошлось, ежели горячка не возпрепятствуетъ, чрезъ ношеніе пластыря мягчипелнаго и испарину производящаго, а припомъ чрезъ даваніе проносныхъ нѣсколько сильныхъ, а особливо изъ меркуріа дульцисъ называемаго. А послѣ какъ опухоль упадетъ, то надобно давать лѣкарства сильнѣйшія, кровь очищающія, и которыми болѣзнь прелюбодѣйную вылѣчиваютъ. Пластырь Вигоновъ, де раницъ кумъ меркурію, безъ прибавленія почти вчешверо меркурія, не много дѣйствителенъ кажется.

§. 126.

Весьма хорошо, ежели гной можно произвести (сб 90 до 99), и по долгомъ гноя произведеніи, копорымъ соки очищаются, чирей залѣчить (*) (100, 101). Не надобно тутъ пропустить оныхъ лѣкарствъ (125).

(*) Однакожъ есть иѣкоторая тутъ разность; ежели бубонъ вскорѣ болѣе истреблено сошлѣ, или послѣ удержанной гонорей, дѣ-


дается, оный бываетъ будто бы крипической, и онымъ ядовитыхъ соковъ наибольшая часть изъ тѣла выходитъ. Ежелижъ отъ застѣлой болѣзни происходитъ, отъ того ни легкости не бываетъ, да и не безъ трудности излѣчивается.

§. 127.

Когда моровой болѣзни матерія въ бубонъ скопится, тогда примѣчать надобно то, что (46, 69, 77) мы приказали. Къ мягчительнымъ густымъ припаркамъ (91, 92) ежели боль сильная будетъ безпокоить, придавать по мѣленьку шафрана и Оеріаки. Чирей безверхушешный (абсцессусъ) созрѣлый, ножечкомъ опшорить и болячку очистить должно.

§. 128.

У ребятъ часто пахи тверды бываютъ, и распухаютъ отъ приизобилія пасоки и хорошаго сока. Называютъ такоу случаю по нѣмецки *die Wachs-Beulen*, а по руски будто бы восковые пухлики. Отъ такихъ случаевъ пособствуютъ, воздержность, тѣла движеніе, проносное, питія теплыя наснойныя съ травами разбивательными (дискутенилибусъ).



ШУЛЯТЪ ВОЖЖЕНІЕ.

ТЕСТИКУЛОРУМЪ ИНФЛАММАЦІО.

§. 129.

На шулятахъ или ятрахъ вожженіе дѣлается отъ разныхъ причинъ, отъ нечистаго прелюбодѣянія

янїя , и послѣ удержанной ядовитой гонореи , отъ удару , и ежели всѣю какою нибудь придавлены будутъ. Сїе возженїе , и ради жестокой боли , и для природы самыхъ страждущихъ частей , не безбѣдственно есть ; понеже яицо , скирръ (59) , а мошонка нуляпная и ся внутренняя клѣпчатая оболочка антоновъ огонь получаютъ (36). Ежели отъ задержанной матерїи такое приключенїе здѣлается , то сперва начнешь пухнуть яичко надбрюшное.

§. 130.

Въ этомъ случаѣ , и хотъ гонорея не очень давно удержана , то случается , что ее опять возобновить можно (124). Ежели же не удастся такъ , какъ хочется , то двухъ случаевъ смотрѣть надлежитъ , первое , чтобъ въ опухоли гной не здѣлался , а второе , чтобъ злоключенїе противное другое не родилось , и жесткость и скирръ не остался. И такъ ежели возженїе велико будетъ , то тотчасъ кровь изъ руки пустишь (62) , и все то , употреблять , что (сб 63 до 68) мы показали.

§. 131.

Съ наружи къ возженному мѣсту прикладывають припарки густыя , но только оныя немокрыя быть должны. Благо хлѣба мякишъ , смѣшавъ съ травною беленою (гіосциами) , прибавивши немношко шафрану , варить съ водою рѣчною до тѣхъ поръ , пока не здѣлается густою припаркою , можно къ тому прибавлять по малому числу и масла какого ни будь мяг-

чипельного, вербасци, Лиліорумѣ алборумѣ, алтее, гіосціамид. Также муку изъ сѣмени лняного, бово-ваго, при заливая помаленьку муки изъ сѣмени кмин-наго, можно сѣ водою варить, доколѣ густою и су-ховатю припаркою здѣлаются; въ оную припарку по нѣскольку и масла прибавляется. Ежели къ жест-кому яйцу вещи мягчительныя потребны, а мошонка шуляпная будетъ рдѣться, то мошонку шуляпную, прежде прикладыванія густыхъ припарокъ, можно обмывать виномъ крѣпкимъ кислватымъ, или водою нѣмренойзвесною, въ которыхъ ужъ варены крѣ-пительныя (рсоранція) и разбивапельныя (дискуціен-ція) вещи изъ земли прозябающія (76, 79).

§. 132.

Ежели же все сіе употребишь да вообще, ибо на послѣдокъ гной здѣлается, и гораздо умножится, то другимъ способомъ пособствовать тому не можно, какъ только опухоль прорѣзать (98, 99), гной выпу-стить и болячку очистить. А ежели вожженіе прой-детъ, а послѣ того опухоль жестка останеся, то должно очень долго мягчительныя вещи сѣ верьху наложя носить, и изъ таковыхъ, развѣ кожа пласты-рей не можетъ перпѣть, полезенъ пластырь изъ ров-ныхъ частей пластыря діакли композити и діафоре-пици Минсихти составленный. Надобножъ еще при-томъ, мошонку шуляпную подвязкою подвязать, чтобъ оною мошонка шуляпная и яйца подняты были; которая подвязка зуспензоріумъ ш. е. поцескою или подвѣскою, называется.

§. 133

§. 133.

Когдажъ яицо все испоршится , и онаго зберечь не возможно , должно вырѣзатьъ . Однакожъ стараться надлежитъ , сперва сосуды сперматическіе завязать .
Смотри ниже о саркокелѣ , ш. е. о мясной килѣ .

§. 134.

Если вожженіе на мошонкѣ шуляпной еще будетъ , и оно скоро вдаль расходится (36 , 129 ,) и въ Антоновъ огонь перераждается , отъ онаго не рѣдко вся мошонка шуляпная портится , отъ сего порока избавляться можно крѣпительными (76 , 79 , 131) . А когда уже мошонка шуляпная вся почернѣетъ , тогда всѣ почернѣлое , вырѣзатьъ . Однакожъ смотрѣть надлежитъ , чтобъ изъ перерѣзанной жилы бьющейся теченіе крови не учинилось , чего для завсегда лучше згорѣлыя плъна ножечкомъ надрѣзывать и лѣкарствами прочь отдѣлять ; того ради къ растворительнымъ (дигерентibus) и гной производящимъ вещамъ придавать можно вещи гноющія (септика) и изъ сихъ унгвендумъ БУРТЗІИ ; да и то примѣчать надлежитъ , что ниже объ Антоновомъ огнѣ покажемъ . Не рѣдко случается , что вся мошонка шуляпная опваливается , которая прикладываніемъ гной добрый пріуготовляющихъ и балсамическихъ вещей вновь вырастетъ .

§. 135.

Случается также , что МИГДАЛИНЫ и ЯЗЫЧОКЪ вожженіе получаютъ . Если такое зло сильно уси-
лился ,
1 3

лился, то съ начала потребны (62, 63, 64). Поло-
скасть горло водою съ вещьми подавляющими свареною,
наприм: съ корнемъ сигилли саломонисъ, биспорисъ,
порментилле, съ травою пироле, прунелле, гиссопи,
салвіе, органи, съ цвѣтомъ розарумъ, самбуци ба-
лаустіорумъ, маликоріумъ. Тутъ же примѣшивать
надобно нитрумъ, лапидемъ прунелле, рообъ діану-
кумъ, или діаморонъ.

§. 136.

Когдажъ вожженіе къ загноенію клонится (84,
85), то съ водою и молокомъ варить можно мягчи-
тельные вещи. Корень алтеа, малве, праву паріе-
таріе, меркуріадисъ, малве, цвѣтки малве, вербасци,
сѣмена фену греци, льни. Изъ обоихъ сихъ родовъ
можно сочинять декоктъ и разными количествами смѣ-
шивать; какъ случай того требовать будетъ.

§. 137.

Ежелижъ въ гортанѣ или въ зѣніяхъ будетъ
горѣть, и отъ того болящей будетъ мучиться, оное
облегчаютъ сѣмена цидоніорумъ и псилли, съ водою
попупниковою исполченныя, изъ того сулой (креморъ)
дѣлается, которымъ зѣнія и мажутъ. Къ меду ро-
зовому можно прибавлять рообъ діаморонъ и ни-
трумъ, и онымъ зѣнія помазывать. А помазывать
кисточкою, или спичкою пряжею обверченною и въ
лѣкарство обмоченною; ею же и не опхаркиваемую
густую мокроту, въ зѣніяхъ спавшую, вытирать
надлежитъ; ибо лучше употреблять кисточку, когда
опа-

опасность есть, чтобы вожжение не дѣлалось, нежели ликворы насосами въ зѣянїя съ сѣплениемъ впускать, отъ чего не мало худобы дѣлается. Тѣжъ самыя ликворы къ язычку, для помазыванїя лошкою гораздо можно прикладывають. Харкопину лучше разбивають эссенція пимпинелле албе, оной по нѣскольکو капелекъ на кусочекъ сахару накапавши въ роту держають; толькожъ сѣ лѣкарство при легкихъ вожженїяхъ полезно, а при великихъ худо, припомъ шбю должно закрывають. Соль теплую или горячую, и цвѣты самбуковые или дереводозные, въ мѣшечкахъ съ наружи къ шбѣ прикладывають можно. А гдѣ опасное вожжение во внутреннихъ частяхъ уже дѣлается, и оно наружу вызвать надобно, то полезны мнѣ кажутся пластыри и густыя припарки смягчительныя. Немало еще пособствуетъ, когда человѣкъ голову повыше будеть держають.

§. 138.

Великое вожжение во время жабы (инѣ АНГИНА) опасно бываетъ, когда отъ онаго зѣянїя (фауцесъ) и дыханїе захватывается. Однакожъ въ томъ случаѣ требуется, да и надобно изъ части болѣзненной, или изъ ближайшей къ больному мѣсту кровь пустить. Но такого вспоможенїя прежде не дѣлать, покуда не усмотрится, что уже въ другомъ ни въ чемъ помочи нѣтъ. Тогда надъ зѣянїями и надъ миндалинами кожу ножечкомъ прорѣзать, да нѣсколько и глубоко, дабы тѣмъ много крови вышло. Однакожъ сперва крови пустить довольно должно изъ иной крове-

ВОЗ-

возвращательной жилы. Вожженнымъ зіаніямъ скорѣе легче становится , ежели кровь пускается изъ жилы кровезовращательной яремной , ибо то гораздо способнѣе , нежели что пускаютъ изъ жилъ кровезовращательныхъ подъ языкомъ (смотри выше о кровепусканіи) (62 , 68). А ежели думается , что больному должно умереть , то такому отважною дорогою , то есть , прорѣзаніемъ горла дыхательнаго помогать (смотри ниже о прорѣзываніи каналовоздушномъ).

§. 139.

Когдажъ въ мигдалинахъ гной здѣлается и опухоль созрѣетъ , а сама собою прорвется не можетъ , прорѣзать надобно. Къ тому способенъ обоюдноостренной ножикъ , карпією до самаго конца обвернутый , или инструментъ , *Фаруууотомон* называемый , да и тѣхъ инструментовъ разные образцы имѣются (*). Чирей очищаетъ медъ розовый (мель розарумъ) , съ онымъ смѣшивать можно помаленьку эссенцію янтарной (сукцини) , и бедринцовой (пимпинелле) . Также полезенъ бедринецъ (пимпинелла) съ сахаромъ. Отъ худо лѣченнаго вожженія нерѣдко мигдалины скиррозными дѣлаются. Ежели оныя гораздо великую опухоль будутъ имѣть , и оная опухоль будетъ давить трубу Евстахіеву , то больные крѣпки бывають на ухо.

(*) Смотри у ВИДЕМАННА въ Диссертациі о Мигдалинахъ. у ГА-РЕНЖОТА о Инструментахъ. Том. 1. стр. 371.

НОГТОЋДИЦА

ПАРОНИХІА

§. 140.

Особенной также предосторожности требуетъ оной чирьевъ безверхушешныхъ родъ , который на концахъ у перстовъ дѣлается , и у праотцевъ нашихъ паронихіа или редува (*), а у новѣйшихъ варварскимъ именемъ панариціумъ ш. е. ногтоѣдицею или заусеницею называемый. Оной причиняетъ великое вожженіе , преострую боль , и претяжкую горячку , а не рѣдко и Англонова огня опасность.

(*) редува , собственно значить то , когда кожа съ боку , или отъ корня ногтя отскакиваетъ. Оное по руски называется заусеницею.

§. 141.

Дѣлается такая болѣзнь , когда сокъ нѣсколько въ концѣ перста скопится , и будетъ спясть , будетъ ли кровь , или масло то , которымъ внутрь сухія жилы помазываются. Ибо въ ногтоѣдицѣ не всегда гной , но часто ихоръ (*) тонкой и оспрой находится. Не рѣдко она дѣлается отъ поколотья иглою , или отъ занозы. Однакожъ часто не такъ отъ кожи , какъ отъ внутреннѣйшихъ частей начинается. А то дѣлается отъ того , когда перстъ въ теплой водѣ размягчится и разгорится , потѣе часъ и въ холодную воду обмоченъ будетъ. Толькожъ примѣ-

К

ЧЕНО

чено, что къ тому способенъ и щолокъ изъ золы, для чищенія копловъ или кострюлекъ поваренныхъ, и другой посуды употребляемый.

(*) Икорь, часто значитъ сыворотку кровную, то есть сукровицу, а иногда сокъ острый елейный и водяной, изъ чирьевъ истекающий

§. 142.

Сей родъ вожженія пресильную боль причиняетъ, для того, что мѣсто, на которомъ случается, жилами чувствительными изобильно. Оно часто не съ большою опухолью, толькожъ завсегда съ великимъ стремленіемъ вожженія бываетъ.

§. 143.

Это зло не въ одномъ мѣстѣ дѣлается, 1) временемъ опухоль дѣлается въ оболочкѣ сальной, подъ кожу, которая въ томъ мѣстѣ и много чувствительности имѣетъ, и у работныхъ людей еще бываетъ, который родъ ногтоѣдицы наилучшимъ почитается. 2) Маленько похуже ногтоѣдица, когда мокрота подъ ногтемъ дѣлается. 3) Гораздо труднѣйшая ногтоѣдица, когда мокрота подъ перепонкою наkostenною будетъ. 4) Всѣхъ худышая, ежели она мокрота будетъ стояишь въ объятіи ономъ, которымъ сухія жилы мышцъ персты движущихъ, высочайшаго (сублимисъ) и глубокаго (профунди) объемлются. Да и вожженіе то, которое сіи послѣднія ногтоѣдицы производятъ, опасное и весьма больное бываетъ. А при томъ другое мѣсто быть можетъ, ежели матерія подъ объятіемъ онымъ на плевъ наkostenной сподѣть будетъ.

§. 144.

§. 144.

Первый же родъ сея болѣзни опухоль имѣетъ высоковатую , съ нѣкоторою красноюю а боль нѣсколько стерпимую. Въ другомъ и третьемъ родѣ мѣсто не пухнетъ , и не краснѣется , и цвѣтомъ слово въ слово какъ кожа бываетъ , напрошивъ того боль бываетъ большая , которая скорѣе приумножается , у болящаго вовсе сонъ отнимаетъ , и крайнюю горячку наноситъ , отъ которой и брѣженіе родится. А изъ четвертаго рода опухоль дѣлается такая , которая съ крайнею опасностію по всей рукѣ расходится , что больше распухаетъ рука , нежели персты и то мѣсто , гдѣ начало болѣзни здѣлалось. Съ самаго начала въ семъ родѣ тотчасъ болящій чувствуетъ боль въ томъ мѣстѣ , гдѣ отъ мыщелка внутренняго кости плечевой , локотной и отъ связки межкостной производится мышца , изгибающая персты , превознесенная или прободенная.

§. 145.

Ногтобдица подъ кожею бывающая , очень скоро излѣчивается. Ежелижъ подъ ногтемъ она начнется , ноготь долой сходитъ. А ежели злая матерія на кости будетъ , оная вовсе сбѣдается , и все поврежденное почти всегда отнимать принуждены бываютъ. А четвертому роду ногтобдицъ ежели не въ самой скорости пособлено будетъ , то весьма скоро опасаться надобно Антонова огня , который обыкновенно жъ по всему плечу расходится.

§ 146.

Сѣе вожженіе рѣдко разбивается, развѣ только что въ самомъ началѣ, когда еще не вовсе вкоренился. Къ сему весьма способна вода, какъ возможно сперить, горячая, въ которую перенѣ опустить и долго въ ней держать. Другіе гораздо способнѣйшимъ быть думаютъ спиртъ винный съ камфарою. Прикладывать также можно пластырь сапоналумъ барбенге, смѣшавъ съ шафраномъ и камфарою, или густую припарку изъ чеснока (аллію), изъ конскаго чеснока (скордіа), изъ белены (гіосциамъ) къ онымъ съ молокомъ сваря, примѣшивая шафрану и ѳеріаки.

§ 147.

Что же сими вещьми не разрѣшится, оное на ружу вызвать должно. Въ первомъ родѣ мокроту въ гной превратить можно, а здѣлать то свободно могутъ припарки густыя, смягчительныя и пластырь діаклонъ композиумъ. Послѣ того кожу надъгноемъ разрѣзать, и по разрѣзаніи рану чисту здѣлать и заживить. Къ сему лѣченію способны вещи, къ мѣспамъ жильночувствительнымъ приличныя, эссенція балсамика Спаліева съ балсамомъ Арцет (смотри о ранахъ).

§ 148.

А гдѣ опухоль подъ ногтемъ здѣлается, и оную должно прорѣзать, чтобъ гноя не вышло.

Ноготь

Ноготь слезитъ, въ такомъ случаѣ на него кладутъ воскъ, чтобъ вновь распушій ноготь, не былъ чѣмъ нибудь досажденъ.

§. 149.

Въ прѣтѣмъ родѣ ногтобдицы для выпущенія гноя надобно и недозрѣлую ея прорѣзывать. А мѣсто такимъ образомъ прорѣзывается: Перстъ на доску или на другде нѣчто жесткое положить такъ, чтобъ мѣсто больное къ лѣкарю оборотилось, тогда ножечкомъ въ самое больное мѣсто до самой кости проколотъ, и до самага конца перстъ разрѣзать, и сколько бы ни нашлось тамъ матеріи, выдавить. Ежели же опухоль подѣ членосопавленія надобно отворять, то должно съ боку прорѣзывать, ибо беречь надобно сухую жилу мышки гибдательной. А что хорошо разрѣзано, оное попому узнать можно, ежели боль ушолится. Вожденіе въ ранѣ разрѣзанной не такъ сильно бываетъ опѣ самага крови теченія, которое удерживать не надлежитъ, но дасть течь, покуда сама собою не осипановится. Ежели же мало ея течь будетъ, то надобно изъ ноги или изъ другой руки кровь пускать. Рану наполнить корпією или сухою, или въ водѣ къ ранамъ употребляемой нѣсколько съ есріакою смѣшанной помочивъ. Такимъ образомъ и въ томъ случаѣ прорѣзывать кажется надобно, когда между обѣятемъ и надкостіемъ опухоль здѣлается.

К 3

§. 150

§. 150.

Гдѣ надкостіе повредится, то и кость порпится. Отъ кости рѣдко чешуйка или слойкъ отплывається, доколѣ оное, что испортилось, не высохнетъ, или высохлое чрезъ прикладываніе лѣкарствъ помаленьку не оидѣлился. Чаще же случается, что весь составъ для того, что гниль по всему ему разошлась, вынимать нужда бываетъ. А какъ долго испорченное со всѣмъ вонъ не выдетъ, то надобно, чтобъ разрѣзанное мѣсто отворено было, (смотри ниже о болѣзняхъ костныхъ).

§. 151.

Въ послѣднемъ родѣ ногтобдицы требуется, чтобъ обвятіе жилъ сухихъ, перстыгибающихъ, въ которомъ матерія стойтъ, разрѣзано было. И ежели сіе здѣлано не будетъ, то оная матерія съ большею вредностію умножится, и по всему обвятію разольется, чѣмъ самимъ и обвятіе жильночувствительное и самая жила сухая угнѣщается, и гораздо напрягается (44. 83). И сіе приключеніе великое вожденіе, ежели не весьма дѣйствительное лѣченіе употреблено будетъ, и Антоновъ огонь въ плечѣ произведетъ.

§. 152.

Того ради потчасъ ножезомъ прямымъ концѣмъ у перста, и самую опухоль, которая тамъ весьма невеличка, отворить должно, а послѣ въ разрѣзанную рану вложитъ спичку съ жолобкомъ, и по той спичкѣ об-

объятіе рѣзати до пѣхъ мѣстѣ, пока не дойдетъ до самаго гнѣзда гноеваспой матеріи. и ежели нужда будетъ ипробовать, до самаго запястья, и до той связки, которая въ запястьѣ на косточкахъ запястныхъ прикрѣплена, и называется кольцеобразною. А понеже часто гной и подъ тою связкою скапливается, когда боль долго продолжается, то оной связки не перерѣзывать, ибо, ежели она перерѣзана будетъ, то жилы сухія, которыя она обхватываетъ, вонъ изъ поднес выскакиваютъ. Того ради подъ связкою въ объятіе продѣть надлежитъ спичку, и по другую сторону повыше связки оную спичку маленько наклоня къ кожѣ, приписнуть, и въ томъ мѣстѣ кожи противъ коньчика спичкина прорѣзать, и выходъ матеріи дѣлать. Часто же надъ мышкою четырехугольную, которая въ низъ ладоню руку обращаетъ (пронаторъ квадрупс) называемою, гдѣ довольно жиру находится, много гною бываетъ, и томъ весь вонъ выпустить надобно. А чтобъ лучше спичка туда продѣта быть могла, то у больного руку и персты, сколько возможно, должно выгнуть. И какъ гной выпущенъ будетъ, то болячку очистить надобно. И чтобъ прежде времени краѣ не срослись, хорошо подъ связку тряпочку или снурочекъ продѣть, и ее лѣкарствами къ очищенію раны способными намазывать.

§. 153.

Ежели все сіе не пользуется, и вожженіе не ушояется, то нѣтъ того лучше, что повыше запястной связки, самую мышку въ томъ мѣстѣ перерѣзать, гдѣ она сухою жилою дѣлается. Этимъ способъ

собѣ помѣщенію больше полезнымъ кажется , нежели связку кольцообразную перерѣзывать , она если бѣкою матерією повреждена не будетъ , всегда ее не прогнать . Если же оная связка перерѣзана будетъ , то должно болящему всегда персты скорченные имѣть , доколѣ оная по прежнему не сроснется . А припомѣ какое бы лѣченіе въ томъ случаѣ ни употреблено , однако мало , или никакого дѣйствія въ томъ перстѣ не бываетъ , который болѣлъ , да и всю рукою часто не много владѣющъ , а должна она быть некорчимою .

§ 154.

Разрѣзавши обѣяше оное должно попустить крови течь , отъ чего меньшее вожженіе будетъ . Если же кровь сильно и опасно будетъ печь , то не лѣкарствами удерживать , но жилы бьющіяся завязать должно . (смотри о кровотеченіи изъ ранъ) .

§ 155.

По завязаніи оныхъ жилъ бьющихся , и по придавленіи частей жильночувствительныхъ часто мясо высоко нарастаетъ , оное лѣкарствами по малехонку сходящими и прижигающими можетъ опровержено быть . Лучше же всего и полезнѣе мяшишко ножницами вырѣзать , рану разширить , и такимъ порядкомъ , что уже вмѣсто сволоклось , разслабить , а рану такъ лѣчить , какъ лѣчатъ части жильночувствительныя . Руку обвязывать должно обвязкою такою , которая осматривать концовъ въ себѣ имѣетъ .

Смотр. у ГЛАНДОРФА о Ногтобдицѣ , у ГАРЕНЖОТА Оперцій . Т. 3. Г. 8 стр. 283.

РОЖА

Р О Ж А

ЕРИЗИПЕЛАСЬ.

§. 156.

Не надобно пропустить лѣченія и рожи. Она есть будтобы нѣкоторый неподлинный родъ вожженія, который на кожѣ дѣлается тогда, когда мокрота сквозь кожу выходитъ, обыкши въ малѣйшихъ трубочкахъ останавливается, и опухоль съ горячкою производишь.

§. 157.

Примѣты у рожи такія имѣются, опухоль ровная, обширная почти безъ всякой вышины, изъ бѣла и изсиня лоснящаяся, красноватая, или изкрасна и изъ бѣдна смѣшенная, а временемъ, когда многіе люди худого сложенія оною больны бывають, изъ красна черноватая. Членъ, на которомъ рожа есть, не такъ болитъ какъ свербитъ. Приключается небольшая и горячка, которая какъ съ гораздо немалымъ ознобомъ начинается, такъ потомъ и мочою, изъ которой много илу или гущи на дно опадаетъ, оканчивается. Рожа наипаче бываетъ на ногахъ и на рукахъ, а временемъ и на головѣ, на шбѣ, на лицѣ, на вѣкахъ и на другихъ мѣстахъ. Не рѣдко случается послѣ ранъ и язвинъ. Дѣлается также опѣ metasches, когда изъ горячки, или изъ другой болѣзни матерія, на какое мѣсто соберется (46). Всегда съ мѣста на мѣсто переходитъ; когда первое начнетъ подживать, то на другомъ здоровомъ мѣстѣ дѣлается (73).

Л

§. 158.

§. 158.

И сей недугъ нѣкоторую разность въ себѣ имѣетъ. Ибо часто небольшой свербежъ, отъ не-
движимой и оспрой мокроты въ кожѣ находящейся,
подлинное воженіе причиняетъ, и называется *ερυσί-
τελας* *Φλεγμονώδες*. Ежели же большее воженіе бу-
детъ, нежели краснота, опухоль мягкая, горячка не-
великая, оную *ερυσίτελας* *οιδηματώδες* называютъ. А
Σκίζώδες называется, когда опухоль великую жес-
кость въ себѣ имѣетъ. Сверхъ того приключаться
можетъ и отъ худаго лѣченія..

§. 159.

Рожѣ дѣлается отъ какого нибудь тяжкаго ос-
корбленія, а особливо отъ испужанія и отъ гнѣва,
отъ неумѣреннаго движенія, чесанія, отъ огненнаго
или солнечнаго зноя, и отъ всего того, что испа-
рину въ кожѣ удержашь можетъ. А къ тому склон-
ными бывъ признаны люди худаго сложенія; под-
часъ оная изъ тойже самой причины опять приходишъ..

§. 160.

Мѣсто се въ кожѣ и въ кожныхъ наималѣйшихъ
трубочкахъ или скважинкахъ, которыми пончайшій
паръ и попъ изъ тѣла выходитъ. Понеже когда онъ
въ сихъ скважинкахъ отъ какихъ нибудь причинъ, отъ
которыхъ и запоры дѣлаются, какъ мы выше показали
(35, 37, до 47,) оспанавливается, и стоитъ, то
опухоль дѣлается, возбуждаются жизненные подвиги,
и горячка приключается. Сокъ же, который изъ
елеа

еся оболочки тучной и изъ остатковъ всѣхъ тѣл-
сныхъ соковъ произшедшимъ, кажется отъ движенія
и теплоты, гораздо, острѣмъ, палящимъ, напо-
слѣдокъ же и гнилымъ дѣлается. Ибо уже извѣстно,
что слей ржавымъ и наилучшая пасока соленою бы-
ваетъ, и такъ отъ разныхъ и себѣ самимъ против-
ныхъ причинъ гнилымъ, соленымъ и лепучимъ въ
тѣлѣ человѣческомъ хотъ вовсе здоровомъ дѣлается
(смотри объ Анпоновомъ огнѣ). Чего ради сѣя вла-
жность никогда такъ, какъ кровь, отъ вожженія не
сваривается, и въ хорошій гной не обращается, но
если не разобьется, то въ полугной претворяется,
который кожу сѣждаетъ, и худыя болячки производитъ.

§. 161.

Если рожа случится безъ вожженія, то не
столько опасности въ ней будетъ. Однако рожа та
опаснѣе, которая дѣлается на головѣ, на вѣкахъ,
и на лицѣ. А самая опасная быть можетъ, которая
сѣ худую горячкою начинается, и въ ошѣкъ претво-
ряется (*). (снеси сюда бо.)

(*) Смотри у Превосх. ГОФФМ. въ Медиц. Рад. Систем. въ Т.
4, ч. 1, Разд. 1. Гл. 8.

§. 162.

И такъ должно рожѣ не давать усиливаться.
Надобно больному давать, когда горячка великая
будетъ, лѣкарства, жаръ уполяющія (64), а изъ
оныхъ особливо порошки поглощающія (абсорбен-
тесъ) безоардкунъ сѣ нѣкоторою частячкою се-
лиры. Сверхъ же сихъ и разжиживающія, ппизаны. А

А 2

когда

когда болѣзнь въ склоненіе придетъ , тогда похлебочки теплыя , ликворы безоардическіе алексифармическіе очень полезны. Припомже очень надобно воздержаніе и покой. Вредительны холодъ , а больше жаръ. Ежели пошъ случится , то больной долженъ одѣяломъ одѣться , чтобъ пошъ по всему шѣлу разошелся.

§. 163.

Ежели же до лѣкарствъ на ружныхъ дойдетъ , то и употребленіе и разумъ велитъ отъ рожи такія вещи съ пользою употреблять , которыя тонкую , острую , въ скважинкахъ кожныхъ стоящую мокроту сильно разбиваютъ , плотныя чаши по маленьку жимаю , и скверную оную испарину пьютъ и поглощаютъ. Итакъ полезны порошки сухіе , мукъ пшенишная Турецкая , бобовая , люпинная съ порошокъ солодкового кореня , коры средней самбуковой , цвѣты самбуковы , нѣсколько съ камфорою смѣшанные.

§. 164.

А гдѣ рожа будетъ гораздо раздута , или Флегмоноидесъ будетъ , шѣло же мягко , дрябло , влажно и жирно , то тушъ потребны сильнѣйшія крѣпительныя. Къ онымъ примѣшивать можно болѣмъ Арменамъ , церуссамъ , плюмбумъ устумъ. Кипомужъ угодно сочиненіе Минсихтowo. Потѣмъ порошки по проше-ствіи шести часовъ перемѣнять должно , да и оныя должны быть ни холодны , ни гораздо жарки.

§. 165.

§. 165.

А недугъ ссй съ великою горячкою случающійся , шакимъ порядкомъ не лѣчипся. Должно лучше потерпѣиь , чпобѣ кожа съ верьху ослизла и прыщеваша здѣлалась , нежели матерію вредъ причиняющую прикладываніемъ подавляющихъ вещей , во внутреннія часпи вгонять. Понеже по излеченіи горячки , и болѣзни сшой пособить можно.

§. 166.

Къ рожѣ кажется причисленъ быть можетъ рѣдкослучающійся оный болѣзни родъ , который у старинныхъ нашихъ предковъ Ζωστήρ , Зона , т. е. опояскою , или ἑρπύς т. е. лепучимъ огнемъ , названъ. Понеже отъ пупа до самыхъ колѣнъ кожа прыщами синеватыми усыпана бываеѣ , краснѣеѣ , и много изрыпа случается , имѣеѣ припום и горячку , да вскорѣ и великую , съ брѣдомъ и другими припадками , и бѣдствіе причиняеѣ , а наипаче , когда отъ неразумія пользующаго челоѣка раздраженъ будеѣ. Ибо тупъ прикладываніемъ вещей наружныхъ силиться не надлежиѣ , но горячку лечиѣ должно ; когда горячка уполиѣся , шо и сія рожа излѣчипся.

Смотри у СКРИБОНІА ЛАРГА въ Ксмп. 53 , стр. 44 , и въ Коммент. РОДІЕВОМЪ стр. 122 , у ПЛІНІЯ К. Н. въ Книг. 26 , въ Гл. 11 , Т. 1 , стр. 409 , и Примѣры у ЮАН. ЛАНГІА въ Кн. 1 , Вл. 32 , у ТУЛПІЯ въ прим. въ Кн. 3 , въ Гл. 44 , у ГОФФМАНА въ гл. 1.

§. 167.

Во всякой рожѣ почти всегда кровепусканіе вредно , развѣ полнокровіе , великая горячка и съ ними

совкупленное вожженіе того потребуютъ. Да и на низъ слабиль не другими какими вещьми, только что клистерами мягчительными. Также и попу великаго не возбуждать, для чего опасаться всѣхъ горячихъ вещей и наружнаго жара, да, и опъ тѣхъ, которыя прикладываются вещи, ежели гораздо разгорячены будутъ, жаркость и свербежъ прибавляется, и вожженіе приключается; толькожъ и холоду беречься должно, которымъ ежели больное мѣсто досажено будетъ, то опасность дѣлается, чтобъ худая матерія внутрь скрыться принужденная, не пала на гораздо нужнѣйшую часть внутреннюю. Также не употребляя и кушанья такого, которое внутри легко портится, похлебного и жаръ дѣлающаго (46. до 67). Однакожъ вредить временемъ можетъ и излишняя воздержность (70). Пластыри жирные, влажные или мокрые прикладываемые язвы дѣлаютъ, которыя не безпрудности заживаютъ, понеже чтобъ испариною острой оной мокротъ (160) вонъ выходить препятствуютъ. Не пособствуетъ и спиртъ винный съ камфорою, ибо онымъ фистулы преизлишно сжимаются.

§. 168.

Ежели горячка пройдетъ и все вожженіе, а послѣ того опухоль жесткая оспанется, что часто примѣчено, ежели рожа спиритомъ горючимъ лѣчена бываетъ, то жесткость размягчить можно пластыремъ де мелиорю, также дефенсиво вириди; или смѣшавъ по равной части пластыря послѣдняго, или лавина димидисъ, и диѳорезици. Понеже болячки,

до-

доколь жесткость сими мягчипельными преодольна: не будетъ, никогда или рѣдко заживають (смотримъ болячкахъ). Да и болячки эти не заживають безъ того, ежели въ покой чловѣкъ не будетъ себя содержать, и не будетъ обвязано обвязкою умѣренно сжимательною. На берцахъ къ тому весьма полезны шпильки или голенищи, шнурами стягиваемыя.

~~~~~

## АНТОНОВЪ ОГОНЬ и МЕРТВОСТЬ или УМЕРЛОСТЬ

Г А Н Г Р Е Н А

и  
СФАЦЕЛУСЪ

§. 169.

Вожженіе, ежели неблагополучно оканчивается, то въ γαγγραινα: т. е. въ Антоновъ огонь обращается. Ибо и говорятъ, что всякая часть плотная мягкая симъ спржадетъ, ежели въ ней жизненное соковъ окруженіе пропадать и смереть (\*), а при томъ гниль (\*\*), уже приближаітся начненію (55). А гдѣ удѣ совершенно и до самой кости уже безъ чувства и движенія будетъ, и умретъ, оный случай σφακελος: т. е. мерпвостью, умерлостью, умерпвіемъ называется (57).

(\*) Часть тѣлесная до толѣ, говорится, живеть, какъ долго сонъ въ сосудахъ своихъ дѣйствомъ сердечнымъ и частей плотныхъ (31)  
дм-

движутся, и жизненное окружное шеченіе совершаютъ. А ежели сѣ движеніе вовсе перестанетъ, то часть ужѣ умерла.

(\*) Гніютъ тѣла, какъ прозябающія, такъ животныя, ежели движеніемъ внутреннимъ при вспоможеніи теплоты наружной превращаются въ распаяніе смердящее, которое дѣйствіемъ огня производитъ изъ себя соль летучую очень тонкую, и масло вонючее или елей вонючей. Изъ етой соли и масла испонченныхъ и одно съ другимъ смѣшанныхъ производится соль летучая. На землю садится, и бываетъ масломъ другимъ толстымъ смольнымъ. Соки же тѣлесные, а изъ нихъ особливо кровь изъ жилы кровевозвращательной пущенная, отъ жару въ гнилое распаяніе и превонное преострое превращаются, а отъ большого жару, ежели не гораздо много будетъ мокроты отстойной, то высыхаютъ, и дѣлаются матерією плошною. Тожъ самое и съ блкомъ лишнимъ, съ сокомъ животнымъ неострымъ дѣлается, какъ то въ народѣ заподлинно извѣстно. Въ тѣлѣ живомъ гніютъ соки отъ многихъ и себѣ самымъ противнымъ причинѣ. А то случается (1.) отъ недвиженія. Когда кровь будетъ долго задерживаться въ сблочкѣ сальной или шучной, и подъ кожей въ отеки флегмоне, *ἐκχυμώσει* въ Аневризмѣ ложной, въ уболахъ, (все значить, побои, синево, растѣки). Когда ежели оная кровь будетъ стоять въ впадинѣ какой нибудь подъ черепомъ головнымъ, въ груди, въ брюхѣ и проч. такъ и гной гнетъ въ чирѣ безверхушешномъ, и въ другихъ мѣстахъ; когда оной прорвется, жиръ въ чаеносоставленіяхъ. Мозгъ костный въ костяхъ, которое примѣчается въ *ἐξοσώσετ* т. е. костяной дичѣ худой, въ гнилости внутренней костяной, и *παίδας Τροχάκη*, пасока въ водяной чрезной болѣзни, сыворотка или сукровица въ рождѣ (160) въ водяной болѣзни всепѣальной (аназарка) которая обычно скрозъ кожу вонъ выходитъ, а испарина будетъ удержана. 2. Гнилость или гниль дѣлается отъ великой неповоротливости, которая медлливую вредность производитъ наприкладъ: Въ цынготной болѣзни здѣлавшейся, отъ продолженія въ сидѣніи жизни, въ Антоновомъ огнѣ у старыхъ людей, 3. Отъ неумѣреннаго движенія, и жару, которымъ соки такимъ же образомъ истончаются, разрушаются, летучими бывають и острыми. Сѣ можно примѣнить въ горячкахъ или огневицахъ, во время сильнѣйшаго тѣлеснаго движенія, на воздухъ жаркомъ. Хотя же съ начала въ огневицѣ соки къ движению нудятся (40), однако оная запеклость или сгустѣніе, отъ *διαθεσιν* *Φλογιστικῆν* производящая

шедшая, движеніемъ внутренностнымъ въ разрѣшеніе приходитъ, и дѣлается исполненіе крайнее, и ежели сія жидкость силою жизненною вонъ не изгонится, то дѣлается гниль. (4) Отъ задержанія испраженія сукровицы, мочи, калу. (5) Отъ недостатка новаго сока питательнаго, и хорошаго сока, которой къ крови примѣшиваться долженъ, во время долговременнаго неяденія, и въ недостаткѣ питья, когда жилочки сокъ питательный несущія запоръ будутъ имѣть, напримѣръ у дѣтей, у которыхъ твердѣютъ желѣзы брыжеешныя, дѣлается рахитисъ (Аглинская болѣзнь) *παθαζωσμανη* т. е. гниль внутрекостная, также когда и протокъ грудной раною раздранъ будетъ. (6) Межъ причинами гнилости въ тѣлѣ дѣлающейся считается и то, когда сокъ питательный несваренный и съ кровью несмѣшенный, опять сырой изъ тѣла вонъ выходитъ другими дорогами, во время поноса несварено-бѣсвеннаго (инъ целѣака), во время жажды поноса и мочи неуполимой (инъ діабете), во время поноса у чахотныхъ людей. Чтожъ до того принадлежитъ, что въ тѣлѣ съ наружи жажду, поносъ и мочу неуполимую *διαφεσις* причиняетъ, чтобъ соки загнивались, то изъ нихъ первѣйшія суть рзличныя ядовъ роды, а наипаче оной, которой дѣлается отъ ужальнѣя лхицина и змѣинова, также сокровенная или недовѣдомаѣ оная моровыхъ и повѣтреныхъ болѣзней причина. Гниль причиняютъ также и соли лѣшучія, когда оныя внутрь принимаемы и снаружи прикладываны будутъ, мылы съ солью дѣланныя, вещи ржавыя, и все такое, что ржавѣтъ. Ежели же гниль по нѣскольку уже дѣлается, то оная начнетъ проникать сквозь ближайшія мѣста, когда не будетъ удержана, да еще ослабивши къ житію надобную силу всѣ соки, напоследокъ зловредствомъ своимъ пронзетъ, и испортитъ. А что оное уже дѣйствительно дѣлалось, то сочный щелокъ, моча испускаемая гнилая, смердящая, пѣнистая, острая, тѣмная, также и калъ весьма смраднъ и несносно смердящій покажетъ.

## §. 170.

Антонова огня (гангрены) главнѣйшее мѣсто есть въ жиру и въ оболочкѣ клѣпчатой (36, 36). Толькожъ и то извѣстно, что Антоновъ огонь не только въ оболочкѣ клѣпчатой, но во всѣхъ единственно мышкахъ, и въ мышечныхъ волокнахъ, въ плевахъ и въ другихъ частяхъ бываетъ. Сія оболочка клѣпчатая, ежели сѣдена будетъ, и згніетъ.

М

не

не можетъ съ изнова рождаться, который случай причиною бываетъ, что ежели она вовсе Антоновымъ огнемъ испорчена будетъ, хоть мышки въ совершенной цѣлости оспанутся, и все то имѣть будутъ, что движеніе производить можетъ, никакого движенія въ части оной не бываетъ.

## §. 171.

А когда сей порокъ и начатки свой имѣтъ, и до погибельнаго случая приводить, ещежъ и когда особеннымъ способомъ его лѣчить должно во время увеличиванія, особеннымъ образомъ во время оспановленія, особеннымъ во время уже къ здоровью склоненія, то надлежитъ собственныя знаки, которые такія времена надаютъ, или погибель будутъ значить, протолковать.

## §. 172.

И потчасъ изъ преждеобъявленныхъ признаковъ (55) узнать можно, когда вожженіе къ Антонову огню склоняется будетъ. Понеже гдѣ Антоновъ огонь начинается, то боль и жаръ на мѣстѣ вожженномъ по перемѣнкамъ будутъ дѣлаться, и больной о благополучіи своемъ будетъ радоваться, и будетъ думать, будто бы онъ въ лучшемъ состояніи находится. Но это самое за подозрительное и бѣдства яреисполненное почитается; облегченіе не происходитъ отъ чего другаго, только что сосуды съ жилами чувствительными отъ стоявшей мокроты распянуты бывши уже прорвались. Понеже всякъ знаетъ, что больно тогда бываетъ, когда жилы чувствительныя напрягаются (48), да и то хорошаго прознаменованія не имѣетъ, когда моча худа и сыра  
будетъ



будетъ , немощной въ сильномъ жару жаждетъ , а силою ослабѣваетъ.

§. 173.

Гдѣжъ уже зло сіе въ совершенство пришло , и Антоновъ огонь вовсе дѣлался , то нѣкоторая слабость и нечувствительность въ членѣ ономъ окажется , такъ что когда пощупашь оное мѣсто , и хотя иглою уколешь , или урѣжешь , то или немножко , или вовсе никакой болѣзни чувствовать не будетъ. А опухоль , которая жестка была и упруга , уже мягкою и уступчивою дѣлается , такъ , что давленія перстомъ слѣдъ на ней останется , и кожа надутая будетъ напряглая , блѣдная , синеватая , черноватая , и прыщами изнаполнится , которые различною мокротою , кровавою , блѣдною , желтою , тонкою , оспрою , вонючею , полны дѣлаются. Около же того мѣсто будетъ болѣть , и возженіе будетъ имѣть , а ядъ оный глубже и ширѣ будетъ распространяться. Понеже прыщи на мѣсто оное , которое блѣдное дѣлается , и синѣетъ , блѣдность и синеватость на то мѣсто , которое возженіе имѣетъ , возженіе на цѣлое переходятъ. На послѣдокъ на прыщеватомъ и поврежденномъ мѣстѣ струпъ оказывается , который изъ недвижимыхъ и гнилыхъ мокротъ съ перелованными и умершими сосудцами и волокнами срастается.

§. 174.

А опухоль мягка бываетъ отъ того , что сокъ не жилами бысцимися къ кожѣ приходишь , но изъ нихъ перерванныхъ подъ кожей въ пукъ , да уже гнилой и извѣденый выпекаетъ , который сокъ самъ будучи весьма испонченъ кожу надуваетъ , и дуло-

вату дѣлаетъ. А оттого что онъ помалу въ прегнусную саню претворяется, сверхъ же того что сокъ испонченный скважинками кожными проходитъ, и подъ кожицею скапливается, прыщи дѣлаются шаковымъ же сокомъ наполненные.

## §. 175.

Если же все сіе усилился, весь удъ гнилость до самой кости прохватилъ, и все мясо испорчено будетъ, то весь оной удъ мертвъ будетъ (169).

## §. 176.

Между же тѣмъ и когда удъ помаленьку умираетъ, наибольше сила теряется, и больной говоря въ рѣчахъ забывается, или когда и въ памяти будетъ, чрезъ бормотаніе на силу мнѣніе свое изобразилъ въ состояніи бываетъ, приключаются безпорядочныя дрожанія или ознобы, пульсъ слабой стхли-хизовъ, то есть червеобразному пресмыканію подобнымъ жилу быющуюся поднимающей (\*). Моча бываетъ густа, черна и вонюча, и на низѣ испражненіе жидкое черное крови черной подобное жирное, несносно вонючее; все то представляетъ, что больной при кончинѣ находится, и оный больной въ поту холодномъ а часто въ потяготахъ и пруженіяхъ неумѣренныхъ умираетъ.

(\*) Смѣтр. у ГАЛЕНА о Предзнаменованіи или предбудущихъ знаніи изъ пульсовъ въ книг. 2. въ глав. 9. том. 8. стр. 270.

## §. 177.

Сила же вся теряется для того, что кровь и весь сокъ такъ вострепещутся, что она въ малѣйшія жилы быющіяся, какъ корки головногомозгной, такъ и всего тѣла, протекаеть не можетъ. Я ужё выше  
(40)

(40) объявилъ, что во всякой сильной горячкѣ оное крови διαθεσι φλογισμῷ бываетъ, то есть соки клейкіе и тягучіе должны быть. Сія ссѣдка или згустѣніе также дрожь производитъ, какъ, по всякая сырая матерія, къ испражненію неспособная, отъ которой силы безпокоятся. Но сіи непостоянныя и безвременныя ознобы или дрожи распознавать надлежитъ отъ той, которая въ горячкахъ послѣ сваренія матеріи случается въ то время, въ которое естество болѣзненную матерію преодолеваетъ. Толькожъ оной ознобъ скоро перестаетъ, какъ только что шло согрѣвается (\*). А пульсъ какъ надлежитъ порядоченъ быть, и жила бѣющая по наспоющему подниматься для того не можетъ, понеже обезсилившееся сердце не весьма довольно сжимается, и не поворотливой и принужденной крови изъ жилы кровесвозвращательной дуплястой мало въ сердце втекаетъ. Отъ тойже причины и сердце бѣется.

(\*) О сокѣ ономъ смертоносномъ смотри у ИППОКРАТА въ Кн. в Епид. Част. 3 о больномъ ꙗ Критонѣ, Линд. Т. 1 стр. 680 и на другихъ мѣстахъ. Объ ознобѣ критическомъ. Епидем. 3 Частъ 3 больной 12 на мѣст. помян. стр. 738, о дѣвицѣ въ Лариссѣ, которая, какъ начала дрожать, то потъ превеликой теплотой по всему телу выступилъ.

#### §. 178.

Однакожъ великія различности въ себѣ имѣетъ Антоновъ огонь, отъ многихъ бо причинъ и дѣлается. Ибо все сіе, что я уже представилъ, такъ случается, ежели человекъ очень силенъ будетъ, великое горячки стремленіе будетъ, и ежели злоключеніе отъ кожи начинаяся пресмыкаячись и пронзаючи до самыхъ костей доходитъ. Можетъ же случиться, что возженіе и Антоновъ огонь въ нѣкоторой части

М 3

и въ

и въ нупри здѣлается. Что же если кость переломилась, и обломки нехорошо вправлены будутъ, то также великое вожденіе дѣлается и Антоновъ огонь, копорой начинается отъ перепонки надкостной, и отъ того по большой части слѣдуетъ человѣку и бѣда. А сего вожденія и Антонова огня, если переломъ случится на бедрѣ у человѣка плотнаго и жирнаго, недругіе какіе признаки бывають, какъ только боль и горячка. Понеже кожа не прежде краснѣть начинаетъ, какъ при послѣдкахъ, когда уже все мясо испорчено будетъ, и до крайности дойдетъ.

## §. 179.

Также по роду злключенія и въ порядкѣ лѣченія много разнствія имѣетъ Антоновъ огонь, который не отъ приумноженія силы человѣческой, но отъ слабости весьма у малосильныхъ дѣлается. А сіе случается у стариковъ, и у пѣхъ, у которыхъ соки другими и долговременными болѣзнями худымъ содержаніемъ въ кушаньѣ и питъѣ (\*), приизлишнимъ блудобъянїемъ, испорчены бывають, у таковыхъ испорченныхъ, безильныхъ и некошныхъ людей часто отъ малѣйшей причины, отъ гнѣва, испужанія, отъ простуды, злключеніе дѣлается. И таковое злключеніе начинается по большой части отъ конечныхъ или послѣднихъ членовъ и отъ перстовъ ногныхъ. Больному будетъ казаться, что онъ въ совершенномъ здоровѣ, и почти ничего не будетъ чувствовать, кромѣ необыкновенной слабости, а на послѣдокъ синеватое покажется пятно, которое попишошеньку возрастаетъ. Оное будетъ не чувствительно, и весь удъ безъ знашной опухоли и вожденія; одна-  
кожъ

кожѣ въ близки находящаяся кожа, заключеніемъ зараженная быть имѣющая, маленько рдѣетъ, и мягче въ себѣ бываетъ натуральнаго. А между тѣмъ зло- вредность протяжно ползетъ, и на силу чрезъ нѣ- сколько недѣль изъ плесны до берца доходитъ. Гдѣ же мѣста мясистыя захватитъ, которыя больше гнипы могутъ, скорѣе распространяется. Гнилая болячка (улкусъ) съ начала мокра бываетъ, послѣ черна и суха, а сокъ изъ нее текущій смрадно и мертвечиною во- няетъ. Спичка или ножечекъ въ нее безъ всякой бо- лѣзни вонзены бывають. На послѣдокъ весь удѣ че- ренъ и сухъ дѣлается, мясо жестко, легко рас- пиричиво или ломко, и на копченое похоже; больной ни маленько о боли не жалуется, только что о сла- бости, и часто обомлѣваетъ. Однако иногда ктому приключающаяся небольшая горячка дѣлается, чтобъ зло- вредность скорѣе ползла, или бы остановилась послѣ произведенія гноя между мѣстомъ живымъ и мертвымъ.

(\*) Секале корнуіумъ ржаная спорынья или рожъ рогатая у насъ претяжкія и смертоносныя въ жилахъ чувствительныхъ помя- тоты или пруженія причиняетъ, у французовъ протяжный антоновъ огонь дѣлается смотр. въ Исп. Корол. Акад. наукъ 1710 стр. 80.

#### §. 180.

Ежели же отъ морозу згущаются соки въ ка- кой нибудь части у человѣка живаго, то дѣлаются опухоли, сперва бѣловатыя, а послѣ того поп- часъ красноватыя, не такъ большыя, какъ нестер- пимо свербящія. Сіи опухоли такъ болящія назы- ваются та хімеѣла (перііонесъ), то есть озноблен- ныя, отмороженныя, отмержалыя, на которыхъ ежели кожа раздѣляется и заскоблется, изъ того худыя

бо-

болячки бывающѣ. Если же весь сокъ въ удѣ нѣко-  
поромъ отъ холоду згустѣетъ , а послѣдъ незапно  
приложеніемъ чего нибудь жаркаго растаявъ , движе-  
ніемъ внутреннимъ въ разрѣшеніе придетъ , то удѣ  
здѣлается красноватъ , гнилъ , черенъ , и родится под-  
линная мертвосошъ (сфацилусъ). О ожогѣ смотри ниже.

## §. 181.

Если же большая жила быющая завязана и при-  
давлена бываетъ , а того , что теченію кровному  
въ ней препятствуетъ , отврапить невозможно , то съ  
жаромъ вся движенія возможность пропадетъ , и удѣ  
помаленьку и протяжною гниlostію умираетъ. А  
что мертвымъ здѣлается , оное не пухнетъ , но сухо  
и скорчено бываетъ. Если же къ уду другія хотя  
маленькія жилы быющія кровь будучъ приносятъ ,  
оной удѣ не умираетъ , но понокъ дѣлается , и мало-  
силенъ (смотри ниже о Аневризмѣ).

## §. 182.

Когда придавлена , завязана и запоръ имѣть бу-  
детъ большая жила крововозвращательная , то удѣ  
отъ самой своей конечной или послѣдней части очень  
будетъ пухнуть , опухоль будетъ жесткая , не усту-  
пчивая , кожа весьма напрягая , великими прыщами  
крововатымъ сокомъ налитыми изнаполненная , и боль-  
ной тяжестъ уда съ крайнею болью чувствовать бу-  
детъ. Ибо придавивши кровеносныя жилы кровезо-  
вращательныя , всѣ жилы крововозвращательныя па-  
сочныя напрягаются , и часть пухлою дѣлаются , что  
самое и въ отѣкѣ случается , которому сія опухоль  
почти во всемъ подобна. Послѣ того кожа отъ  
лежащей подъ нею оболочки тучной растягивается , и  
гораздо

гораздо надувается , для того опухоль мягка бываетъ , и на ней перстнаго давленія слѣдъ или знакъ остается ; а изъ кожи , ежели ее прорѣжешь , духъ съ звукомъ выходитъ , который всеконечно изъ испорченныхъ и гнилыхъ соковъ родится.

## §. 183.

Ежели же весь удъ крѣпко давится , что случается можетъ отъ шугой обвязки или отъ лубковъ крѣпко затянутыхъ , шугъ нестерпимый дѣлается свербѣжъ въ завязаной части , опухоль во всемъ подобная той , о которой я теперь объявилъ , и послѣ того пропадаетъ боль и все чувство , и удъ въ томъ мѣстѣ , которое затянуто было , дѣлается черенъ , сухъ , и будто въ дыму выкопченный.

## §. 184.

Но ежели послѣ цынготной болѣзни Антоновъ огонь прикинется , то оной по большой части съ концовъ или отъ конечностей начинается. Черно на кожѣ дѣлается , которой черноты почти и чувствовать не можно , но она широко расходитъ , и глубоко проникаетъ , удъ сухъ становится , черенъ и не много смраденъ. Ибо духъ смрадный имѣющъ соли съ кровью цынготныхъ людей смѣшавшися.

## §. 185.

Весьма погибеленъ бываетъ потъ Антоновъ огонь , который случается отъ ужалѣній ехиднина , змѣина и другихъ животныхъ ядъ въ себѣ имѣющихъ. Понеже потчасъ послѣ угрызенія , происходитъ во всемъ тѣлѣ слабость и безчувствіе (сикопе) и жилъ чувствительныхъ еудороги или пруженія , дыха-

Н

ніе

нѣ трудное и по всему тѣлу, все, чему надобно быть бѣлу, дѣлается желто. Опухоль велика бываетъ, и великое вожженіе, которое въ непродолжительномъ времени въ Антоновъ огонь претворяется, очень скоро по тѣлу расходится, и смертію оканчивается. А ежели живочувствительное мѣсто ужально будетъ, то скоро больной бѣситься начинаетъ.

## §. 186.

Ежели же великая жила чувствительная будетъ перерѣзана, или хребтнокоспной мозгъ переломленными позвонками давится, то дѣлается въ удѣ гнилость; ибо жизненное соковъ движеніе останавливается. Сія гниль никакой болѣзни не причиняетъ, изънутри начинается, и болящаго убиваетъ. Часъ, къ которой жилы чувствительныя повреждены принадлежатъ, разслабляю дѣлаются.

## §. 187.

И такъ изъ сихъ предложенныхъ знаковъ, и выше показанныхъ (55) знать можно, какія причины бываютъ, отъ которыхъ Антоновъ огонь дѣлается. А какъ причины разныя случаются, такъ разное и лѣченіе къ тому требуется. Понеже весьма опасенъ оный родъ Антонова огня, который отъ великой силы дѣлается, и гдѣ горячка сильная бываетъ тяжкая, великая и острая боль отъ того, который отъ слабости силъ, отъ испорченныхъ соковъ почти безъ чувствованія болѣзни дѣлается. И такъ Антоновъ огонь бываетъ, гдѣ великой запоръ есть, или гдѣ нѣчто такое послѣ вожженія приключается, которое запоръ пріумножаетъ. Межъ такими причинами могутъ числиться и тѣ, которыми жилы болятъся



ся, и жилы кровсвозвращательныя давятся. Чего ради Антоновъ огонь случается въ сальникѣ и въ кишкахѣ, когда онѣ гдѣ нибудь изъ брюха выходятъ, и кила дѣлается. Ради такой причины Антоновъ огонь и къ ранамъ осадненнымъ или ушибеннымъ обочто приключается, и къ другимъ мѣстамъ чаще жильночувствительныхъ (44), ежели волокна не разслабляются, или раны больше не разшириваются. И (парафимовисъ) неоплупа, то есть (плѣшку конечною плошью невозможностьъ закрывать), ежели не будетъ отъвращена, Антоновъ огонь уду дѣшородному причиняетъ. А пришомъ нѣсколько скорое крови движеніе пріумножаетъ запоръ въ вожженныхъ частяхъ (40, 43), хотъ оно отъ внутреннихъ причинъ, отъ теренія, отъ шѣлеснаго движенія, отъ неумѣреннаго аноя и отъ наружныхъ причинъ дѣлается. Запоръ также часто случается, когда соки холодомъ (180) и прикладываніемъ холодныхъ вещей (39, 41, 55,) шакоже отъ превалишняго аноя (40) къ движенію понуждены бывають.

## §. 188.

Антоновъ огонь также дѣлаетъ всякой сокъ изъ своихъ сосудовъ изтекшій и въ нѣкоторой части стоящій (169 \*), худой сокъ въ водяной болѣзни и цынгошной, гной въ чирьѣ безверхушечномъ. Также ядъ, которой отъ ужалнія и отъ стрѣлы ядомъ напоенной по всему шѣлу расходится, да и топъ, который повѣтріе моровыхъ и зловредныхъ горячекъ въ шѣло приноситъ, соки такъ порипитъ, что въ короткое время гнить начинаютъ (169 \*\*). А что приключается въ то время, когда великая жила быо-

Н а

цающаяся

щаяся (181), жила крововозвращательная (182), жила чувствительная и станова жила (186) повреждена бывашъ, уже я объявилъ.

#### §. 189.

Никакого Антонова огня маловажнымъ и неопаснымъ почитать не надлежитъ, развѣ только паккой, который отъ причины нѣкоторой здѣлается, которую легко отворотить можно. Понеже всегда онъ къ мерзости и къ самой смерти склоняется. Но какъ великую надежду пакъ великую бѣду предсказываютъ оныя причины, которыя при частяхъ возженныхъ мною объявлены (60). Всѣхъ же бѣдъ спивеннѣйшимъ почитается Антоновъ огонь тотъ, который внутри начинается (178), и который отъ нѣкоторой въ сокахъ худобы (184, 185), и отъ недостатка жизненной силы (179) рождается, или, при которомъ что нибудь изъ сихъ приключится, откуда бы онъ ни произошелъ. Понеже люди водяною болѣзнію или сухопжою или цынгою страдающие, отъ Антонова огня много претерпѣваютъ. Припомъ Антоновомъ огнѣ, который отъ сильнаго возженія рождается (172, 173), чѣмъ сильныя быются жилы быющіяся, чѣмъ поспѣшнѣе расходится злоключеніе, чѣмъ большіе приключаются припадки, тѣмъ большую бѣду прознаменуетъ. А припомъ прорѣзавши прыщи (173) узнать можно, чего надѣяться и чего бояться должно. Понеже ежели сокъ будетъ выходить свѣтлый и блѣдный, то надежда есть; ежели же потъ же сокъ будетъ кровавый, желтоватый, то худо будетъ значить, а хуже всѣхъ сокъ, ежели синеватъ, черноватъ, и въ которомъ великой смрадъ будетъ. Который же Антоновъ огонь отъ поврежденія спановой

новой жилы , также отъ перерѣзанія великихъ жилъ чувствительныхъ , жилъ быющихъ и жилъ кровсвозвращательныхъ дѣлается , потъ весьма трудно , а больше никакимъ образомъ не излѣчивается ; также смерти предназначеніе бываетъ , когда около болячки все сухо и черно дѣлается (присов. шутъ 176).

## §. 190.

Мертвость же (сфацилусъ) иногда на мѣстахъ мясистыхъ дѣлается , на примѣрѣ , на ягодицахъ и на бедрахъ. Ежели сіе приключится , и ежели не весьма глубоко , и не до самой кости зловерность пройдесть , и не отъ худой причины начало свое будеть имѣть , то иногда чрезъ прилѣжное стараніе излѣчивается , и мертвое отъ живаго отдѣляется. А гдѣ цѣлый удъ замретъ , оное мѣсто никакимъ способомъ излѣчимо быть не можетъ. Остается только бѣдственная и единственная помощь , оное мертвое отрѣзать , чпобъ осталая тѣлесная часть цѣлая не пропала. Гдѣ же мертвостью великіе сосуды одержимы бываютъ , она мертвость гораздо скорѣе подаль разпространяется.

## §. 191.

Ежели же великое и сильное вожженіе , отъ великаго запора произшедшее , къ Антюнову огню будеть склоняться (55, 172, 173), то съ первоначалія слово въ слово такъ лѣчитъ надлежитъ , какъ выше (61, 62, 63, 64, 69) я предспавилъ. А припомъ и кровь надобно еще пускаиъ , ежели пульсъ сильный , ровный , скорый и крѣпкій , моча красная , пѣнистая , вонючая , языкъ сухой , разтрѣскавшійся , а сверхъ того юношескія будеть лѣтъ , которос все значить ,

Н 3

что

что у чловѣка имѣется излишество силы. Слабленіе на низѣ производить маленько сильнѣшими слабительными, которыя можно варить изъ мягчительныхъ вещей съ сѣнною и креморомъ таршаря въ сывороткѣ молошной, и оныя еще да и часто внутрь клистерами впускать. Также полезны декокты анпифлогистическіе то есть легонько слабящіе (апоземата *ἀντιφλογιστικά*) (63), ибо разумъ училъ, и опытами утверждено, что люди полнокровные, безъ трудностей могутъ терпѣть кровепусканіе, и не поодиожды, а мокротнымъ людямъ слабительныя полезнѣе бывающъ. И другихъ лѣкарствъ принимать не должны кромѣ тѣхъ, которыя жаръ ушояютъ (64, 69). Однакожъ и тутъ есть нѣкоторое различіе. Полнокровнымъ всево лучше полезны вещи кислыя, сухощавымъ селитра съ поглощательными вещами (абсорбентibus), а сильно мокротнымъ, декокты изъ вещей разрѣшительныхъ (резольвентibus), изъ травъ руша, скордіи, веронице, салвіе, суммипапибусъ центауріи минорисъ, изъ цвѣтовъ лавендуле, розарумъ рубрарумъ, изъ корней сассапарилле, скорзонере, къ которымъ трава ацетоза примѣшана быть можетъ. Также пищу и питье пѣже самыя, какъ я выше приказалъ (67), употреблять должно.

#### §. 192.

Съ наружи прикладывать должно вещи такія, которыя запоръ разбиваютъ, испаринѣ вонъ выходить пособствуютъ (79, 80), и которыя не допускаютъ, чтобъ гнилое глубже проходило, и жилами кровесовращательными поглощенное съ кровью смѣшивалось. Для такой причины не надобно употреблять никакихъ вещей подавляющихъ (реприментесъ)

шесѣ) (76), но весьма приличны жидкія припарки, которыя тѣлоспи пропиваясь, и умягчая сокъ испорченный на ружу производящѣ. Да и оное вышеомянутое примѣчаніе весьма нужно есть (80). Понеже больше нужны бывающѣ вещи мягчительныя, когда будещѣ шѣло плающее, мѣсто жильночувствительное, и великая будещѣ часпи напрягосѣ, для чего и въ сихъ случаяхъ припарки густыя другихъ припарокъ жидкихъ полезнѣйше бывающѣ. А гдѣ опухоль будещѣ мягкая приномѣ же шѣло полноватое и мокротное, шамѣ спириты и соля къ припаркамъ примѣшиванъ должно.

#### §. 193.

О всякомѣ дѣкарсивѣ родѣ, которые въ Антоновомѣ огнѣ ни похваляемы, сіе памятовать надлежитѣ: Травы торкія, и которыя между оными первыми почтпаются, шрава абсинтіи, рупк, скорди, алларіе, аброшани, жардуи бенедикти, ценнаурія минорисѣ, салате, матрикаріе, менпе, ежели къ нимѣ во время припариванія жарѣ прикинется, онѣ то дѣлающѣ, что мѣсто наченяес огнемѣ Антоновымѣ спрадапѣ, отдохнетѣ; такимѣ способомъ не допускаящѣ, чтобѣ сокъ недвижимо стоящій въ скороспи загнивался, и чтобѣ зловредность глубже проникала. А шравы мягчительныя и льняная мука хотя и мотутѣ тѣль умножать, однакожѣ пособствующѣ въ отѣленіи тѣлаго и мертваго мѣста, и не допускающѣ кожѣ и другимѣ часпямъ и испорченнымъ сокамъ въ жесткой и все подавляющій спруцѣ скинапѣся. Кромѣ этого еще ими соки изнутри на ружу вызывающѣся. Ничто дѣйствительнѣе тѣлоспи не удерживающѣ, какѣ соль и спиритъ самой чистой (алкоголѣ). Соль же всякая

кая, ежели ея въ припарки жидкой переложить, то она дѣлаетъ соки густыми и недвижимыми; а то особливо производятъ, витріолумъ (купоросъ), алуменъ (квасцы), саль коммунисъ прѣспая соль, и изъ прозябающихъ вещей галле (чернильные орѣшки). Наилучшая же есть саль аммоніакусъ (нашапырь), ибо оная лучше скрозъ мѣсто болное проникаетъ. А испорченное что бы ни было, ежели оно скоро съ превеликимъ смрадомъ пріумножается, дѣйствительнѣе удерживаетъ нипрумъ (селифра). Ктому же весьма способенъ укусъ крѣпкой, онъ также не попускаетъ гнилости вдаль разпространяться, а соки не такъ вредительно въ движеніе приводитъ и густитъ. Вино также можно употреблять съ уксусомъ и съ нашапыремъ смѣшанное, и съ горькими травами вареное.

## §. 194.

Еще же и то всѣмъ извѣстно, что алкоголь, то есть спириты такъ называемые химическою наукою дѣланные, также отъ гнилости тѣло свободаютъ. Но ежели они одни, да и тѣ сильные, къ частямъ Антоновымъ огнемъ спраждающимъ приложены будутъ, то не пользу но еще вредъ дѣлаютъ живымъ и непопорченнымъ частямъ. понеже сосуды маленькія сжимаютъ, и такъ дѣлаютъ, что оныя легко могутъ перерываться. А сіе ежели дѣлается, то гнѣющихъ частей полугной скорѣе струпомъ (173) жескимъ дѣлается, и ежели оной струпъ не будетъ смягченъ и вовсе снятъ, то жизненное соковъ движеніе въ части еще живой испровергаетъ, устья у сосудовъ запираетъ, и такимъ образомъ все раздѣленіе и загнаиваніе удерживаетъ. И потому спириты  
горя-

горячіе разжиживаніе, и съ вареными въ водѣ смѣшивашь надлежитъ. Смолы, а между прочими алоэ (сабуръ) и мирра (мирра) противъ гнилости также дѣйствительны, ежели въ уксусѣ разпущены, и къ другимъ вещамъ прибавлены будутъ. Однакожь припомъ кажется и движеніе шѣмъ проіавляеть, пошому и кажутся не такъ къ разбиванію гнилости способными, какъ къ отдѣленію сгруппа замерлаго отъ живой части, или къ возбужденію большаго движенія. Целлоковъ оспрыхъ и мыла при Антоновомъ огнѣ, отъ сильнаго движенія здѣлавшемся, и при начинаніи сего движенія упошребляють, я думаю, не надлежитъ. Безъ великаго вреда упошребляемы бытъ не могутъ перешина (перпенсинъ) и другіе бальсамы, которые для зберженія шруповъ отъ гнилости, а не для соблюденія и возобновленія движенія жизненныхъ соковъ изъисканы, понеже они всю вонь и испарину въ концѣ удерживаютъ.

## §. 195.

И такъ лѣкаръ, который эпитъ лѣкарствъ силу совершенно знаетъ, а припомъ и больнаго натуру, и знаетъ, мокротной ли больше или сухой человекъ больной, вильныя ли жилы чувствительныя или слабы, со всѣмъ ли онъ въ силѣ, или силу уже потерялъ, знаетъ же, откуда болѣзнь началась, можетъ, куда Антоновъ огонь еще не здѣлался, оной предупредить. Ему не прудно будетъ изъ многихъ родовъ лѣкарствъ и припарки сочинять, толькожь оныя почаще перемѣнять. Понеже нѣкоторыя лѣкарства въ приумноженіи болѣзни, а другія въ склоненіи приличны бываютъ, и часто отъ разныхъ перемѣнъ, что обыкновенно случается, новое нѣчто выдумывать

О

вать

вашь надобно, и новымъ способомъ въ лѣченіи поступать должно бываетъ. Того ради благоразумному лѣкарю не надлежитъ завсѣгда поставлять сочиненія, отъ весьма великихъ Авторовъ представленные, которыя сочиненія они, какъ по велико ни поставляли, и какъ кому вылѣчивать удавалось, и будто бы шата была и вещь, но помощи искать, какъ въ томъ, чего опыты въ леченіи ихъ научили, такъ въ разсужденіи и въ добродѣтеляхъ лѣкарственныхъ уже изслѣдованныхъ. Однакожъ весьма часто пользу приносятъ жидкія припарки, когда травы оныя горкія въ равныхъ частяхъ воды съ уксусомъ, или въ винѣ сварены будутъ, а къ тому и нашатырь, и если мѣсто весьма дебелое будетъ, спиритъ нѣкоторый приданъ будетъ, или когда скордѣумъ, абстѣшумъ, рута, въ суднѣ закупореномъ называсемомъ кукурбитѣ [пыква] съ спиритомъ горячимъ сварены будутъ, и процедя къ оному спириту уксусъ и нашатырь прибавленъ будетъ,

#### §. 196.

Но все сіе теплое изгоряча прикладывавать надобно, понеже теплота весьма способствуетъ, а холодъ всякой вреденъ. Также когда переменять надобно припарку, или когда припарка прѣсохнетъ, то опять смачивать должно, не допускать воздуху на мѣсто больное попадать (47), да и то примѣчать надобно, что (38) приказано. А что бы въ припаркѣ жаръ долѣ держался, то на нихъ надобно накладывать сверху пригрѣвающія покрывки, однакожъ оными уда не опягощать. При томъ также и кожа, если гнѣючи будетъ напрягаться, и не будетъ попускать лѣкарствамъ внутрь проходить, то прежде  
при-



прикладыванія лѣкарствъ должно кожу понадрѣ-  
затьъ (80).

## §. 197.

Послѣ употребленія сихъ припарокъ нѣрѣдко  
возрастающій Антоновъ огонь останавливается. Есте-  
ли же онъ остановился, и опухоль къ природной  
жесткости и цвѣту склонится (66), тогда давать  
надлежитъ больному лѣкарства въ разрѣшеніе при-  
водящія, похлѣбки изъ травъ скордіи, салвіе, веро-  
никъ, изъ кореньевъ цихоріи, сассапариле, также де-  
вещи оживотворяющія, или бодрость дающія (аналеп-  
тика) и понѣскольку хорошаго вина. А чего въ  
какія времена, и поскольку давать можно, оное по-  
тому разсуждать должно, горячка больше ли умножи-  
лась, или уменьшалась, или со всѣмъ прошла.

## §. 198.

Если же Антоновъ огонь до того дойдетъ,  
что на гнилой и ползущей болячкѣ сухой и къ нѣ-  
какому вреду склонной или худой и смрадной струпъ  
здѣлается, то лѣкарю должно намѣреніе свое къ  
тому склонять, чтобы чрезъ произведеніе гноя  
между мѣстомъ живымъ и мертвымъ, въ отдѣленіе  
оной струпа пришелъ. Когда же гною произвести  
не можно, ежели мѣсто безъ всякаго вожженія, то  
вожженіе умножить, и больше къ гною склонить на-  
добно. И въ такомъ случаѣ вредно быть можетъ  
кровопусканіе, даваніе слабительныхъ и прощія вещи,  
которыя вовсе горячку утоляютъ, и силу жизнен-  
ную въ слабость приводятъ. А силу надобно под-  
крѣплять лѣкарствами (крѣпительными) аналептиче-  
скими, и маленькую горячку или причинять, или пер-  
цѣть, ежели она есть.

## §. 199.

Послѣ того, чтобъ испорченному соку выходѣ здѣлать, и что бы лѣкарства лучше проницать могли, то до самаго шѣла здороваго разрѣзать на мѣлкя части надобно струи. А разрѣзывать надобно не только впрямь и гораздо, но и еще въ другорядъ поперегъ. Поперечно же надобно разрѣзывать конечности мышечныя (апоневрозы), напримѣръ, мышцы двуголовной на плечѣ, мышечкы прямыхъ чревныхъ, повязку широкую бедерную, чтобъ чрезъ то сихъ жельмочувствительныхъ плевъ напряженіе могло быть опущено, и разрѣзы довольно расширены. Но крайне остерегаться надлежитъ, чтобъ не перерѣзать великихъ жилъ крововозвращательныхъ, жилъ быющихъ и жилъ чувствительныхъ, подъ жиромъ скрытыхъ.

## §. 200.

Съ наружи не должно употреблять подавляющихъ и сушащихъ вещей. Но желасмаго пособія искать въ вещахъ смягчительныхъ, и въ шѣхъ, которыми гнилос излѣчивается. И пакъ прикладываютъ на разрѣзанной струи припарки густыя изъ вещей смягчительныхъ (91) съ прибавленіемъ горькихъ (193), и оныя припарки варятъ съ молокомъ. А ежели струи весьма гнилы будутъ, то можно познать по нестерпимой смрадности, то въ припарку можно или уксусъ или спиртъ прибавлять. Но въ такомъ случаѣ очень благоспѣшно бываетъ сіе, струи разрѣзать, и прежде прикладыванія густой припарки, припарить оный уксусомъ или спиритомъ, да и въ уксусъ и спиртъ прибавлять нашатырю. Поневже всегда лѣкарства такіа должно употреблять, которыя повреждаемое ошпанав-

оспанавливаютъ, а особливо такія, которыя исподволь по дѣлаютъ, чѣмъ по сгущеніи соковъ матерія сильно не задерживалась, и въ тѣмъ прѣшвореніе не оспанавливалось (193, 194).

#### §. 201.

А что Антоновъ огонь остановился, и тѣмъ между мѣстомъ мертвымъ и живымъ дѣлался, оно окажется спрутъ, который понижѣ дѣлается, и сѣдѣжится, а край у болячки около спрута прежде пухлые, будутъ краснѣться и гноемъ смочены; въ то время надобно еще спрутъ понадрѣзать, и въ разрѣзанные и широко расширенные разрѣзы класть сѣкнотами масти для произведенія сѣку низу гноя, и для очищенія язвы приличныя. Къ тому весьма полезнымъ признается унгвеніумъ базиликумъ, и къ оному примѣшивать унгвеніумъ Эгипціакумъ, или другое Фелицисъ Вурціи, также Меркурій въ крѣпкой водкѣ разпущенный и водою папушниковою разжиженный, или ликворъ беллестіи полезенъ, въ который кисточку или спичку счипаную корпѣю оберченную обмакивая, на спрутъ и на то мѣсто, которое межъ поврежденнымъ и безвреднымъ имѣется, прикладывать. Еще же и тряпочку можно въ это помачивать, и на мертвое мѣсто прикладывать, а сверхъ тряпочки припаркою густою припаривать: до такихъ же вещей, которыя сильно ядятъ, и прижигаютъ, не надобно скоро касаться, понеже такими вещами живое мѣсто прижигается, и на немъ вновь спрутъ дѣлается, который слово въ слово также въ разрѣшеніе приводитъ должно. Не надобно еще спрутъ какъ вырѣзывать, такъ и насильно отъ

живаго отрывать : ибо отъ вырѣзыванія новое топчась дожженіе можетъ дѣлаться. Однакожъ когда струи размягчятся, и въ разрѣшеніе придетъ, и часи нѣкоторыя мертвыя будутъ висѣть, оныя ножницами можно отрѣзывать. Тутъ не полезны ни спириты ни балсамы такіе, которые заскорблосе сушатъ : Но всякому употребленіе покажетъ, въ чемъ помощи искать, въ сей или въ другой вещи, и какъ долго при какомъ лѣченіи оставаться. Понеже по переменамъ приключающимся смотря, въ лѣченіи поступать надлежитъ. Вредителенъ бываетъ холодъ, и для того, ежели онъ вреденъ, то въ той горницѣ, въ которой больной лѣчится, огонь безперерывно быть долженъ. Однакожъ неумѣренный жаръ чловѣка и къ горячкѣ и къ большому вреду подверженъ дѣлаетъ, и для того не мало пользы принесетъ то, ежели воздухъ въ горницѣ умѣренный и чистый будетъ.

## §. 202.

Ежели же болячка уже больше къ загнаиванію будетъ склонна, и самый струи будетъ шатаваться : то никакихъ другихъ лѣкарствъ больше не прикладывать, какъ только такіа, которыя оный умягчаютъ въ разрѣшеніе приводятъ. Суть же въ гной приводящія (дигеренція) масть изъ меду, терпентину съ желткомъ яишнымъ смѣшанная, то есть унгвеншумъ дигестивумъ, и изъ другихъ извѣстныхъ составленій, унгвеншумъ базиликумъ и унгвеншумъ авреумъ. Кромѣ того еще прикладывать можно свѣжую праву щевель съ масломъ коровьимъ свѣжимъ несоленнымъ сполченую, муку всякую и вещи мягчительныя съ молокомъ вареныя, покуда припаркою густою дѣлаются

ся. Напоследокъ ежели сими вещьми спрутъ отъ здороваго отдѣмися, то болячку очистишь и зажи-  
вить надобно (смотри ниже о ранахъ пришибенныхъ).

§. 203.

А припомѣ превеликая помощь бываетъ хворому отъ содержанія въ пищѣ и питіи, и всячески стараться, чтобъ у больного сила не потерялась, и сохранена была; для чего всего того беречься должно, что въ безсиліе и слабость можетъ привести. А въ пищу и питье содержаніе недругое какое быть должно, какъ только такое, какое выздоравливающимъ изъ тяжкой болѣзни примично. Больного не надобно ни излѣтис кормить, ни голодомъ морить. А ежели въ силѣ больной находится будещь, то во время заживленія болячки можно давать некрѣпкія проносныя, что самое почти и нужно бываетъ, ежели болячка будещь гораздо мокрощна.

§. 204.

Но ежели отъ старости, или отъ другой слабости, Антоновъ огонь здѣлается, шущь всѣ вещи, которыя въ другихъ случаяхъ, убавливая нѣчто, пользу приносятъ, смертоносны бывають. Помеже въ такомъ случаѣ (179) кровь пускашь, на нѣзъ слабишь, и силу уже безсильную отнимать, будещь значить человека убивать. Надлежитъ больному давать вещи, хорошій сокъ въ себѣ имѣющія, и къ пропитанію шѣла способныя, похлѣбки горячія, съ пряными зельями, съ мушкатнымъ цвѣтомъ, или съ мушкатнымъ орѣхомъ сваренныя, похлѣбки студеныя изъ ногъ, вино сладкое, да и то горячее, пряношью, корицею или гвоздикою приправленное, а  
изъ

маѢ лѢкарствѢ крѢпительныя (кардіака), Балзамы вишне, саль волашилищѢ олеозусѢ сальви, и предѢ прѣшными корицу и масло коришневое. НюхашѢ также даватѢ вещи, которыя прѣшнымѢ благовоніемѢ силу возобновляющѢ.

## §. 205.

А наипаче противѢ сего Аншонова огня отѢ малосилія происшедшаго крайне похваляющѢ новыя практики кортицемѢ нерувіамѢ даватѢ. Понеже многими примѢрами доказывающѢ, что ею одною иногда опчаянный огонь АншоновѢ уничтоженѢ и удержанѢ бывалѢ (\*).

(\*) О ней особливый ТрактатѢ написалѢ ДУГЛАСѢ. Смотри. Преславн. ВАТЕРА вѢ Диссертаці. о дѣйствительности удивительной Хинкины называемой КортекѢ ПерувианскѢ въ удержаніи Аншонова огня вѢ Витеберг. 1734 изданной; и смотри. та МедикусѢ ЭссайсѢ вол. 2, Артик. 34, стр. 383, вол. 3, примѢч. 5, стр. 35, и Артик. 6, стр. 43, вол. 4, ПримѢч. 16, стр. 47: даватѢ можно корки чрезѢ четыре часа каждыя, по полузолотнику Ѣ двумя драхмами конфекта алкермесѢ, и сѢ сиропомѢ гвоздишнымѢ. ОбъявляющѢ, будто нѣкоторой больной послѢ принятія двенадцати унцовѢ т: е. обѢ золотниковѢ корки выздоровѢлѢ на мѣстѢ, прежде показ. вол. 3 стр. 42.

## §. 206.

СѢ наружижѢ кѢ больному мѣсту обращатѢ и понуждатѢ надлежитѢ кровное стремленіе. И такѢ удѢ почаще надлежитѢ почесывать или попирашѢ, и на немѢ приспавливать баночки, и прикладывать Шпанскія мухи. А на больномѢ мѣстѢ имѢшѢ можно пластырь смягчительный, да и оный можно накапливать острымѢ перегнаннымѢ масломѢ. ПредѢ прѣшными пользу дѢлающѢ масло гвоздишное и коришневое сѢ сиропомѢ виннымѢ смѢшанное. Оными мѣста между поврежденнымѢ и невреднымѢ находящіяся, и самыя

самый струнѣ , напередѣ разрѣзанный , помазываютѣ , и послѣ того припарку густую смягчительную накладываютъ.

Смотр. у преслави. ГОФМАННА въ Диссертациі о Мертвостн тѣлесной (de Sfaцело) отъ внутренней причины начевшейся благополучно избѣченной, въ Галѣ 1717 году изданной.

#### §. 207.

Если жестокой и пронзительной морозъ уды прижигаетѣ (180), то онѣ соки всѣ въ движеніе приводятѣ , и ихѣ фигуру перемѣняютѣ , а волокна сжимаютѣ и скорчиваютѣ , въ которыхъ на послѣдокъ жизненное движеніе останавливается. Когдажѣ конечныя части такѣ пріозябаютѣ и замерзаютѣ , то большее крови стремленіе бываетѣ въ голову, въ мозгъ, въ которомъ сосуды распягиваются и прорываются, отъ чего нечувствительный глубокой сонъ , а на послѣдокъ и смертоносная апоплексія дѣлаться можетѣ.

#### §. 208.

Для того лѣкаръ тотчасѣ стараться долженѣ ознобленнымъ членамъ пособлять , и оныя въ живую теплоту приводить , а сіе можетѣ дѣлаться прикладываніемъ нѣкоторыхъ вещей , нѣсколько побольше жару въ себѣ имѣющихъ. Ибо чрезъ употребленіе познано , что если морозомъ сдавленные соки отъ великаго жара скоро распаяваютѣ , то они распаявши, сосуды разрываютѣ , и такимъ образомъ въ удѣ неизлѣчимый вредъ и смерть производятѣ. Теплота нѣсколько большая бываетѣ въ то время , какъ уды замерзаютѣ , въ самой холоднѣйшей водѣ , только , чтобъ незамерзлая была , и въ снѣгѣ , нежели въ лдяномъ холодѣ ; чего ради ознобленные члены не бесполезно въ воду холодную ставятѣ , или снѣгомъ

гомъ и другими морозными вещьми прикрываютъ , отъ чего ссѣдшіеся и сгущенные соки полегоньку да такъ въ разрѣшеніе приходятъ , что по прежнему движеніе жизненное исправлять могутъ . Да и покосѣ гораздо напавливать не надлежитъ , въ которыхъ болящій лѣчится . Пристойно еще члены , когда отъ ознобу освобождаются , тереть , и такимъ образомъ кожу раздушую и ослабую укрѣплять . Больному пить вино хорошее теплое или пиво крѣпкое грѣное , а при томъ оныя пия и пряностями снабждать надобно . Къ симъ силу и бодрость возстановляющимъ и оживотворяющимъ вещамъ , прибавливать можно алексифармацескія т. е. потовыя излѣтка , которыхъ дѣйствіе очень къ здоровію служитъ , когда потъ по всему тѣлу произведутъ , ради того и болящій воздерживаться и одѣялами одѣваться долженъ .

#### §. 209.

Ознобныя же опухоли (перітоэсѣ) тогда дѣлаются , когда морозъ не крѣпко члены ознобитъ , и вредность будетъ въ кожѣ только состоять . Въ то время больные умѣренную боль , несносный свербѣжъ , и какъ горитъ , чувствуютъ ; тожъ самое случается и съ тѣми , у которыхъ прежде нѣкоторые члены озноблены бывали , опять потчасъ озябаютъ . А при томъ такіе члены всегда сильно болятъ въ то время , когда погоды переменяются , да и неровны бываютъ . Понеже у эпитхъ людей не кровь отъ мороза сгущивается , но другая влажность , въ небольшихъ трубочкахъ содержащаяся , пасока , и сыворотка или сукровица , сквозь кожу вонъ исходящая . Отъ того пупырь дѣлаются , ежели вредность такая поглубже



глубже пронзетъ, а послѣ того болячки, копорыя не безъ затрудненія залѣчиваются.

## §. 210.

Отъ такого зла избавляться можно такъ; напередъ сего ознобленный членъ во время зимней спужи нефтью, или скипидаромъ смѣшавъ съ масломъ изъ сѣмяни рѣпного давленымъ мазать. Подобное сему масло хорошо и на бумажкѣ намазавши къ мѣсту такому прикладывать. Ежели же морозъ уже оное мѣсто приварилъ, и пупыря повскакали, на по *ευπόρισον*. (лѣкарство легко приготовляемое и подручное) рѣпу мерзлую спертую или скребеную прикладывать. Сверхъ того рѣпу смѣшивать можно съ масломъ лнянымъ, или съ другимъ какимъ мягчительнымъ, и съ масломъ коровьимъ, несоленнымъ такъ, будто бы оное масью. здѣлалось: а когда болячки здѣлаются, то оныя лѣчены, бывають, какъ я вскорѣ объ ожогѣ объявлю.

## §. 211.

Ежели такъ крѣпко озноблено будетъ, что члени ознобленной излѣчить не возможно, оную отрѣзать надобно. Не надлежитъ пропустить и того примѣчанія, что временемъ пресильный и пронзительный морозъ нѣкоторую вредность и костямъ дѣлаетъ; а наибольше, гдѣ оныя близъ членосоставленіевъ нодреваты бывають. И сказываютъ, что сѣи кости трудно вылѣчить, доколѣ морозомъ въ кости поврежденное, прочь не будетъ опнято. (\*)

(\*) Оное многократно примѣчено было въ Швеціи послѣ возвращенія арміи изъ Норвегіи, и послѣ полученнаго нещастія тамъ въ 1717 году. Понеже великое число солдатъ померзли, а больше того безъ рукъ и безъ ногъ остались. Смотри. у Лавр. РОБЕРГЪ въ Диссерт. Хирург. о Опухоляхъ ознобленныхъ (де періонибус) въ uppsala

салти 1722 изданной. Тушѣ прибавлена и таблица, на которой кости морозомъ сожженные и поврежденные напечатаны.

### §. 212.

Антонова огня отъ придавленія и отъ раздраженія жилъ бьющихся (181) жилъ крововозвращательныхъ (182), и жилъ чувствительныхъ (186) приключаящагося, или никакъ лѣчить не возможно, или и лѣчить да не иначе какъ только то опиять, что жизненному соковъ движенію препятствуетъ. Ежели же Антоновъ огонь случится въ членѣ лубками и связками туго запрянутомъ, и онѣй будто сухъ здѣляется (183), такой членъ временемъ, ежели же не вовсе замретъ, выздоравливаетъ, когда въ гной приводящею или растворяющею мастью (дигеренте унгвенго) будешь мазать, и припомъ руками полегоньку будешь попирашь, а послѣ употребивъ тушъ самую мазь почаще и подолъ будешь тереть \*. И ежели членъ отъ такого случая уже вовсе замретъ, не тотчасъ за хирургию оную бѣдственную хвататься, чѣмъ членъ ошрѣзать, понеже часто мертвое отъ живаго добровольно отдѣляется. Также и кость, которая бываетъ обнажена и повреждена, по большой части отъ здороваго мѣста подалѣ отпадаетъ.

(\*) Можно видѣть особенный примѣръ такой въ Комм. А. Наукъ К. 1702. стр. 270.

### §. 213.

Ежели цынготная болѣзнь (скорбутъ) такъ усилится, что въ членахъ Антоновъ огонь здѣляется, то лѣкарства къ выздоравливанію мало помощи приносятъ, ежели не будетъ употреблено приличное содержаніе въ кушаньѣ и питьѣ, попому смотря и въ лѣченіи поступать надлежитъ лѣчащему. Однако же  
и въ

и въ сей болѣзни имѣется нѣкоторое разнство. Понже ежели цынготною болѣзною страждущій, человекъ и горячку будетъ имѣть, отъ чего и жажда дѣлается, и духъ изъ рта смрадный пойдетъ, припомъ ежели болячки будутъ нечистыя и черноватыя, и въ оныхъ мясо испорченное будетъ и смердящее, ежели мочиться будетъ мочою густою и вонючею, то пристойны въ такихъ случаяхъ похлѣбки изъ цыплятъ съ кореньями огородными, въ которыя можно приливать и соку кислаго лимоннаго, или изъ травъ свѣжихъ, изъ щевелю проспаго, или изъ щевелю заячьего. Также не худо давать (64) много пить пшизану, смѣшаннаго съ такимъ же сокомъ кислымъ плодовъ зрѣлыхъ, сочныхъ и тучныхъ или съ медомъ пшпейнымъ. Припомъ ежели человекъ нѣсколько въ силѣ будетъ, декоктъ тамариндной (63) почаще давать. А гдѣ будетъ цынготная болѣзнь безъ горячки, болячка же будетъ мерзкая и блѣдноватая, въ такомъ случаѣ, декокты изъ кохлеаріи, наспурціи и фумаріи, трифоліо фибрино, и изъ другихъ травъ Скорбутическими или цынготными называемыхъ, полезнѣйшими бывають. Но ничто здоровѣйшимъ, и ничто такъ нужнымъ не признавается, какъ перемѣна воздуха. Понже потъ воздухъ крайне больному вредителенъ, отъ котораго больной занемогъ. Также снаружи въ жидкія и въ густыя припарки можно примѣшивать оныя травы, и извѣскивать такіе способы, чрезъ которые бы къ больному мѣсту соки приманивать. Жидкія припарки гораздо лучше изъ вина варить. (65) Антоновомъ огнѣ отъ укусу ядовитаго животнаго здѣлаемся (185), смотр. ниже въ главѣ о ранахъ отъ яда произшедшихъ.

## §. 214.

. Ежели же мертвость (сфацелусъ) будеть въ мѣстахъ мясистыхъ (190), а члена отрѣзать не можно, по временемъ поврежденное можно искоренить насильствомъ. Понеже въ томъ нужды нѣтъ, во все ли безопасная оная помочь будеть, которая за единственную почитается. Большая же надежда тутъ бываетъ, гдѣ вредъ не отъ весьма великой причины дѣлается. И такъ надрѣзать надлежитъ все то, что межъ цѣлымъ и поврежденнымъ находится, да и самой спрутъ даже до живаго, а въ разрѣзныя щели класъ лѣкарство такое, которое гнилое мясо еще можетъ сбѣдать и выбѣдать. Межъ такими лѣкарствами весьма хвалятъ крѣпкой щолокъ, дѣланный изъ извести съ папашомъ въ землѣ сплавленныхъ. Также употребить можно спиритумъ салисъ аммоніаціи съ известью немореною, ликворемъ беллоспіи (201), буспирумъ антимоніи. Въ древнія времена врачи мѣсто болное желѣзомъ прижигали поединожды и больше, отъ котораго такъ дѣйствительнаго дѣйства, мѣсто поврежденное, вовсе присушивается. А когда мертвость остановится, то должно очистить, напитать, и въ здоровое состояніе привести.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## О Ж О Г А.

## А Д У С Т А

## §. 215.

Какъ невеликое различіе есть межъ ожогою и воженіемъ, и какъ одинаковое и лѣченіе въ нихъ обоихъ

обоихъ употребляется , то кажется не неприлично будетъ объ ожогѣ теперь объявить. А живое шло ожимають , огонь , молнія , порохъ зажженный , всякой металлъ раскаленный и расплавленный , извесь въ дою зажженная , всякая жидкость кипячая и расплавленная , вода , слей , масло коровье , сало , воскъ , смола и симъ подобныя. Всѣ же сии шла , какъ жидкія , такъ плотныя , чѣмъ больше будутъ разгорячены , и чѣмъ больше плотны будутъ и густы , а жидкія чѣмъ больше клейки и грубы , шѣмъ сильныя и скорые шло ожимають. Также и въ помѣ много различія есть , когда членомъ къ огню или къ шѣламъ раскаленнымъ близко припронесъ , и когда такому несчастію долго , или не долго оный членъ подверженъ будетъ.

## §. 216.

Но и въ ожогахъ великая опмѣна бываетъ. По неже ежели ожжено слегка , то часть краснѣетъ , и не такъ болитъ , какъ очень чешется , да и кожа не оплупливается , хотя перешъ будешь. И такимъ образомъ обоженные части , съ частями вожженіе имѣющимъ разнствія не имѣють , и оба сии случая одинакимъ способомъ вылѣчить можно.

## §. 217.

Въ помѣ больше худобы заключается , ежели на удѣ будетъ опухоль нестерпимая и палящая боль , а кожа будетъ шероховата , да и пупырья великіе повскачють. Сей видъ ожоги съ большимъ трудомъ излѣчивается , и безъ приведенія въ гной не залѣчивается.

## §. 218.

Ожога вреднѣе бываетъ , когда и кожа и жиръ сухи

сухи будутъ, и болящій напряженіе ихъ чувствовать будетъ, когда прыщики черноватые будутъ и подъ ними язвина черная или сизая, а кожа почти безчувственна будетъ. Сіи приключенія такого лѣченія пребудутъ, какое при Антоновомъ огнѣ потребно. Понесже испорченное онѣ цѣлаго отдѣлишь долженствуешь.

## §. 219.

Ежели членъ такъ будетъ обожженъ, что хотя до самой кости его прорѣжешь, а въ немъ никакой чувствительности не будетъ, то будетъ значить, что онъ уже замеръ.

## §. 220.

Однакожъ между ожогами такими нѣкоторое также различіе есть. Ежели обожжено будетъ раскаленнымъ и расплавленнымъ металломъ, или огнемъ и молніею, то все спекается и спрутъ бываетъ сухой, сморщенный и растянутый. Ежели же обожжется водою или другимъ какимъ кипяткомъ, то обожженное мѣсто больше будетъ мокнуть, и ссадинъ будетъ будто возгревающая.

## §. 221.

Мѣста жгучувствительныя, плесы и жилы чувствительныя великія, будучи сожжены, за превеликую болью немалое и бѣдство въ себѣ заключаютъ. Въ желѣзахъ много мокроты внутрь себя имѣющихъ худыя болячки бываютъ. Ребятки, спарики и худое тѣлесное расположеніе имѣющіе люди, не безъ трудности въ здорově приводятся. Ежели глазъ обварится, и особливо оболонка роговая, то зрѣніе теряется. Когда все тѣло хотя не гораздо сильно обожжено будетъ, однакъ шумъ большой много бѣдства

обдѣства вытерѣть долженъ, понеже вся зонная испарина пресѣкается. Гдѣ жиръ или пухъ выжженъ будетъ, оной никогда вновь не вырастаетъ (170), и струнъ бываетъ жолобоватымъ и непригожѣмъ.

## §. 222.

Отъ перваго вида ожоги (216) и хотя нѣсколько обожжена, а цѣла, и кожа только будетъ краснѣть и свербѣть, пользу дѣлаетъ то: Издалека обожженную часть противъ огня сжавить, или въ горячую воду опускать, чрезъ что дѣлается, что соки начавшіеся сплываться, раздѣляются. Благополучный успѣхъ дѣлаютъ вещи подавляющія (76, 77) уксусъ гораздо крѣпкой, чернила и купоросъ въ водѣ разпущенный, и уксусъ съ липаргиріемъ вареный, также соль съ уксусомъ, или съ виномъ крѣпкимъ, или и съ спиртомъ виннымъ. Всего же лучше, водою раннюю [аква вулнераріа] примачивать, или шряпочку оною намочивши прикладывать. Ежели такой примочки не случится, то и спиртъ крѣпкой разведши слабенько съ просую водою на верхъ прикладывать можно; понеже спирты горючіе крѣпкіе кожу и ея сосуды плотно дѣлаютъ, и свлакиваютъ (194). А ежели уже кожа изнаполнится прыщиками небольшими, то прикладывать должно припарки густыя умягчательныя, съ водою вареныя, и на оныя спиртомъ горячимъ понемножку накапливать можно. Ежели вредность небольшая будетъ, и на части маленькой, въ такомъ случаѣ не требуется лѣкарствъ внутрь принимать.

## §. 223.

А гдѣ будутъ прыщи великіе и гораздо худыя, или кожа сухая и сволоченая (217), шунъ не ошмѣнно  
р должно

должно гной произвести. Къ тому способны масти. И межъ извѣстными сочиненіями похваляется мастъ пишательная (унгвендумъ нутритумъ), которая дѣлается изъ уксусу съ липартирісми варенаго, куда и масло или елей прибавляется. Гсиъ и другая композиція, оиъ изобрѣтателя имя имѣющая, мастъ барбешпина (унгвендумъ барбешпе). Также лукъ съ масломъ коровиымъ несоленымъ жареный, или, сполченный съ солью и съ мыломъ Венеціанскимъ, и ето съ масломъ какимъ къ тому удобнымъ, напримѣръ, рѣпнымъ, лилій бѣлымъ; и съ жиромъ или съ саломъ сварить, и прикладывать можно. А сверхъ масей, какими больное мѣсто намазано, или которое на пряпочкѣ приложено бываеиъ, накладываиъ густыя припарки смягчительныя. Если все сплошь гниетъ, да и еще большей порчи опасаться надобно, то прибавить такихъ вещей, которыя оиъ гнилости избавляюиъ (193, до 196, 200, ). Всѣми же сими стараться надлежииъ, чпобъ гной произвести, испортившееся и мерзвое оиъ здороваго отдѣлать и боль уменьшитъ.

## §. 224.

Если же пла огненная сильная и пронзительная гораздо глубоко пройденъ (218), то надлежииъ спараніе имѣиъ, чпобъ струпъ оппалъ, и болячка чиспа дѣлалась, кчему такія же вспомошествованія употреблены быть могуиъ, какія (198 до 201) предписаны.

## §. 225.

Гдѣ язвины очищенные будутъ залѣчиваться, туиъ потребны вещи такія, которыя плоть насыщаюиъ, и язвину наполняюиъ, а которыя сушаиъ и подавляюиъ, оныхъ не употреблять. И для того всѣми сими

лами.



лами стараться надлежитъ, ради пригожства, а наибольшее на лицѣ, чѣмъ спрутъ, какъ возможно, поднялся, и чѣмъ поврежденный членъ такое здоровье, какое быть можетъ, получилъ. А язвы насыпаютъ, или въ полную приводятъ балсамы, и предъ другими мирра съ бѣлкомъ яичнымъ распущенная.

## §. 226.

Когда персты бывають обожжены, то они временемъ за пѣмъ, что одна на всѣхъ будетъ язвѣна, вмѣстѣ сроспаются, ежели приспойною обвязкою не будутъ обвязаны. А обвязка пупъ приспойна только та, которая фигуурою на перчатку походитъ; также она лѣнта, которою часто кругомъ обвивая персты обвязываютъ: понеже сей обвязки безъ великаго досажденія на часѣи больныя положитъ не возможно. Ежели персты вмѣсто сроспуться, оны надлежитъ ножечкомъ другъ отъ дружки отдѣлать. А припюмъ часто персты отъ худого снрупа кривы бывають, и тогда порокъ будетъ соспоятъ или въ сухихъ жилахъ, или въ кожѣ, въ такомъ случаѣ отвѣдать должно вещей мягчительныхъ. И такъ надобно, какъ можно больному перить, персты згибать и распягивать, да и по излеченіи, должно ихъ въ теплую воду, или въ масло опускашь, и масломъ или мастью, почаще помазывать. Такжежъ самое лѣчение употребить призабченыхъ жолобоватиною мѣстахъ, и при соспавахъ, ежели оны отъ вреда сему подобнаго недвижимо останутся.

## §. 227.

Ежели къ ожогъ сильное вожженіе прикинется, то около той болячки прикладывать можно подавляющія (76, 78), и врознь разбывающія (79, 80, 81).



ключеніи толь много бѣдства будетъ , что лѣкарствами онаго преодолѣть не возможно. Да и такое дѣйство не всегда , и не при всякомъ нещастіи , дѣлать надлежитъ. Понеже когда Антоновъ огонь , или зловредная болячка и кожные поврежденія , такъ усиляхся , что всѣ въ тѣлѣ соки уже испортятся ; когда болящій уже въ безсиліе придетъ ( 176 ) , или , когда отъ долговременной болѣзни онъ худою сухоткою (табе) будетъ спрадать , то и сіе руководствіе въ здорье привестъ его не можеть , только смерть ускоритъ. Однако же иногда кажется лучше , и сумнительное или обоюдное лѣченіе апробовать , нежели никакого.

#### §. 231.

Ежели же членъ отрѣзывать случилось , то всегда отъ здороваго мѣста нѣсколько отрѣзывать надлежитъ. Нѣкоторые изъ старинныхъ незнавшие сосудовъ кровеносныхъ припискивать , и боявшіеся , чтобъ больной въ самомъ дѣйствіи кровью не изошелъ , нѣсколько больного мѣста оставляли , и оное послѣ отрѣзанія уда сильно прижигали , которую поступку какъ бѣдственною или погибельною , такъ и звѣрообразною почесть можно.

Смотри о разныхъ способахъ , какъ члены отнимать , въ Комментар. Акад. Наукъ Корол. 1732 года стр. 283.

#### §. 232.

Перстъ отнимается и такъ : кладутъ его подъ долото рѣзиками употребляемое , и по долоту молоткомъ деревяннымъ бьютъ. Отрѣзываютъ также клещами (\*) или ножичкомъ , которыми составъ вырѣзывается ; что изъ всего есть лучшее. А вырѣзывать такимъ способомъ должно : Велѣтъ другому

человѣку кожу на перстѣ, сколько возможно, назадъ оптянуть. Понеже лучше, чтобѣ она нѣсколько при помѣ лѣченіи излишняя осталась, дабы послѣ отрѣзанія косица обнаженная сѣю совершенно закрыта быть могла. Надлежитѣ же ножемѣ перерѣзать все до самой кости, такѣ, чтобѣ не надѣ самую здоровую костью и не надѣ хрящевую ея головкою оное здѣлалось, но лучше нѣсколько отѣ кости, которой надобно быть опнятой, вырѣзать. Рѣзать начинать сверху перста, а перстѣ оный сперва согнуть надлежитѣ, когда же до середины членосоставленія ножечкомѣ перерѣзано будетѣ, тогда при томже самомѣ рѣзаніи перстѣ протянуть, и остальную часть перерѣзать.

(\*) ГАРЕНЖОТЪ о бѣ инструментахъ томѣ 2. стр. 237.

§. 233.

Ежели перстѣ весь опнять надобно будетѣ, то кожу и все прочее, между косицами пясными имѣющееся, прежде разрѣзать должно. Кожу, сколько возможно, беречь, и для того разрѣзывать надлежитѣ ближе къ персту испорченному, а не къ цѣлому. Противѣ членосоставленій нѣкоторыхъ перстовѣ бывающѣ косточки, зерну чечевичному подобныя, отѣ чего и названы косичками чечевицѣ подобными (осса сесамоида). Оныя также вырѣзывать должно, а не оставлять. А понеже перерѣзанныя мышечныя сухія жилы, влагающими своими, которыми онѣ обѣмлются, туго запыгиваются (143), отѣ чего можетѣ произойти великое вожженіе, то неопымѣнно надобно, обѣяшіе сухой жилы ножницами нѣсколько понадрѣзать.

§. 233

## §. 234.

Въ печеніи крови при томъ случаѣ никакой опасности нѣтъ, понеже оное печеніе пособствуетъ отъ вожденія. Однакожъ ежели лѣкаръ будеть печенія крови бояться, то довольно къ тому крови остановленію силы имѣетъ спиртъ самый чистый винный (алкоголь вини), жилы бьющіяся суконками или тряпками съ боку придавить надобно, чѣмъ уста ихъ заперлися. А ежели нужда возпребуетъ, то ихъ можно захватить и завязать. Прочее, въ народъ для удержанія кровнаго печенія употребляемое, все вредно; (смотри о печеніи крови въ ранахъ).

## §. 235.

На чело или верхушку кости неповрежденной кожу натягиваютъ, чѣмъ оною кость со всѣхъ сторонъ по большей части закрылась, а остальное незакрытое (липаментисъ) или подушечками (пульвиллисъ) закрывается: на это кладутъ суконку (паннумъ) во много рядовъ сложенную, и нѣсколько плотную, а сверхъ этой накладываютъ (спленія) повязки холстяныя, длинныя вдвое, втрое и вчетверо сложенныя, которыми рану на подобіе липеры Россійской Х крестъ на крестъ, смыкаютъ. Поверхъ же сихъ обвязываютъ обвязкою, въ перстъ ширину имѣющею. Оною обвязывать начинаютъ отъ запястья, и приходятъ до раны, и оную рану крестъ на крестъ перекрываютъ, и наложенную пряжу и повязки (спленія) связываютъ; а наконецъ обвязка или повойникъ по рукѣ до самаго плеча приходитъ. Понесъ оною обнимается придавка (спленіумъ) полагаемая на жилу бьющуюся плечевую, для удержанія кровопеченія къ ранѣ, и для отвращенія самаго  
ВОЖ-

вожженія, руку подвязать надлежитъ утиральникомъ такимъ, который на завязочкахъ многихъ на шбю вѣшивается, чтобъ рука такимъ способомъ безъ трудности на шбѣ висѣть могла.

## §. 236.

Ежели руку т. е. ручную кисть надобно отрѣзать, то перерѣзывать кость локотную и лучевую на два перста попережные отступивъ отъ состава, а на самой пясти или запястьѣ никогда рѣзать не надлежитъ. Ежели же Антоновъ огонь уже выше руки пройдетъ, отрѣзывать должно по срединѣ локтя.

## § 237.

А напередъ всего, должно, весь припасъ къ дѣйствию сему надлежащій, порядочно расположенный, подъ руками имѣть. Не отменно же потребны къ тому: 1) Обвязка завертышная (фасція тортилисъ), которая дѣлается а) изъ тесмы свиткомъ скатаной; она кладется надъ жилою бьющеюся плечевою, б) изъ спленія, т. е. изъ повязки холстинной длинной вдвое или втрое и больше сложенной, которою и рука и оная повязка обнимается, γ) изъ шнура или изъ пояса плешаго, которымъ дважды около руки и около оной повязки не туго обводяшъ, а послѣ того завязываютъ, δ) изъ карпузной или изъ много склеенной бумаги (Палле) или изъ толстой кожи, надъ которою завертывается е) кляпъ. А понеже такимъ обвязаніемъ не одна жила бьющаяся придавливается, но весь удъ крѣпко затягивается, то Петить (\*) машину выдумалъ такую, которая нынѣ называется писками или пресомъ (поркуляръ); но оная машина послѣ его отъ другихъ многими способами перемѣнена и исправлена.

(\*) смотр.

(\*) Смотри. въ Комментар. К. А. Н. 1718 году стр. 252. Въ оной машинѣ кажется желательное состояніе то изобрѣтеніе, чѣмъ она не шаталась. Понеже она первая наложена бывши на удѣ всегда шаталась, и хотя излетка къ ней припрогивались, то со всѣмъ наклонилась, что не можетъ безъ бѣды учиниться. Оную переправилъ МОРАНДЪ. Смотри. у ГАРЕНЖОТА десѣ Инстр. Том. 2. гл. 11. стр. 351. Но эта машина очень тяжела. Смотри. другія фигуры у Пресл. ГЕЙСТЕРА въ Наставл. Хирург. въ част. 1. въ кн. 1. въ гл. 2. на табл. 5. фиг. 6. и на табл. 6. фиг. 1. Къ симъ я еще придаю иную машину (фиг. 7.), которую у насъ Лѣкаръ въ дѣлѣ своемъ знающій и искусный Мих. Арн. ГАГЕМЕЙЕРЪ заѣмалъ, которая предѣ другими конечно способѣе, и для придавленія жилъ быющихъ пристойнѣею мнѣ показалась.

§. 238.

Кромѣ оной обвязки или машины (237) надобно 2) ремень, или другая повязка, которою пошуже кругомъ обвязывался то мѣсто, гдѣ пѣло перерѣзано надобно будетъ. Понеже опѣ краю ея только на одну линію опустивъ кожа въ кругъ разрѣзывается. 3) Ножъ большой серповидный (\*). 4) Ножикъ обоудный, или другой прямой, которыми пѣло и плевры между двѣмя костями находящіяся, перерѣзываются (\*\*). 5) Холстина съ одного краю на три до половины разодранная, которою при пиленіи пилою, мясо перерѣзанное прикрывается. 6) Пилочка. 7) Щипцы плотныя, которыми жилы быющіяся захватить и повышянуть можно для завязыванія. По Французски Валетъ а Папинъ (\*\*\*.) 8) Иглы кривыя съ нипками навоощеными, для завязыванія пѣхже самихъ жилъ быющихъ (\*\*\*\*).

(\*) А понеже такое великое желѣзо больно испужать можетъ, то гдѣ пѣло не гораздо толстое будетъ, какъ наприкладъ на плечѣ, вмѣсто оного употребить можно ножикъ оскребательный, или ножикъ прямой нѣсколько великоватый, каковъ нарисованъ у ГЕЙСТЕРА на пом. мѣст. Таб. 13. фиг. 1.

(\*\*) ГАРЕНЖОТЪ на пом. мѣст. стр. 195. не похваляетъ но-

С

жикъ

## 138 ОТНЯТ. ОТРѢЗ. ОТНИМ. ЧЛЕНОВЪ, УДОВЪ

жика обоюдоуостраго, для того, что имъ легко можно край перерѣзанныхъ сосудовъ размочалить.

(\*\*\*) Смотр. у ГАРЕНЖОТА въ Том. 2. стр. 22 г.

(\*\*\*\*) Старинные Лѣкари употребляли инструменты желѣзные въ огнѣ раскаленные, которыми жилы бьющіяся прижигали. Не надобно пущѣ и катышковъ купоросныхъ, которые обверчены будучи пряжею къ концамъ перерѣзанныхъ жилъ бьющихся прикладываются, ни порошковъ, ни ликворовъ, крѣпкихъ къ остановленію крови служащихъ. Ежели жилы бьющіяся порядочно будутъ завязаны, и ихъ завязанные концы нѣсколько потуже, сверху щипанною пряжею будутъ придавлены, тутъ больше останется безопасности, да и рана отъ повторенія не будетъ бередиться.

А нынѣ въ обычай пришло, не употреблять ни желѣза калената, ни купоросу, ни порошковъ, ни ликворовъ, ни зашиваній, только самое простое употреблять, то есть, дѣлать изъ корпѣи пестрики въ перстѣ мизинца толщиной, въ полъ сустава длиною, и омыя воценою ниткою накрѣпко обматывать, и прикладывать къ концамъ перерѣзанныхъ жилъ бьющихся, оными весьма благополучно кроветеченіе удерживается, а называютъ ихъ Французскимъ именемъ Томпонами, а по Россійски можно бы называть по моему мнѣнію пыжами; которые опыты многократно съ желаемымъ благополучнымъ успѣхомъ дѣланы въ Санктпетербургской Адмиралшейской гошпитали, и всегда уже безъ сомнѣнія дѣлаются.

### §. 239.

Къ завязанію же отрѣзаннаго лактя потребны:

- 1) двѣ подушечки (пулвилли), которыми чело у ко-стей пилою отпиленныхъ, закрыть надобно.
- 2) Три суконочки (панникули) небольшія плотныя, которыми наложитъ надобно на концы ниткою завязанные жилы бьющихся.
- 3) Пряжи или корпѣи (линаменторумъ) горсть, или клубокъ (гломусъ) красиво, и искусно дѣланный (юнь гато) смотр. фиг. 3.
- 4) Покрышка (паннусъ) четвероугольная изъ холста проспанаго, у которой углы прямо одинъ прошивъ другого наискось разрѣзаны, какъ Мальтійской Крестъ (Малтезеръ-Крейцъ).
- 5) Покрышка (паннусъ) изъ холстины въ нѣсколько разъ сложенной, плоская, четвероугольная



угольная, такъ великая, что можно было бы чело уда отрѣзаннаго закрыть. 6) Повязки (спленіа) при продолговатыхъ, которыя на верхъ отрѣзаннаго уда крестѣ на крестѣ кладутся. 7) Тесма или повойникъ (габена) въ одинъ свитокъ свитый. 8) Упиральникъ, которымъ руку на шѣѣ подвязать надлежитъ (235).

§. 240.

Сіе все порядочно расположивши, надобно, какъ возможно, больного уговаривать, чтобъ онъ не печалился, и ежели чего онъ будетъ бояться, въ томъ его порядочными разговорами ободрять, и нѣсколько хорошаго вина дать, послѣ его на стулъ или на скамейку невысокую такъ посадить, чтобъ помощники, которыхъ довольно число припомъ быть должно, могли его держа и ворочая не допустили. На жилу быющую плечевую, которой ударъ въ верху плеча да еще на внутренней сторонѣ чувствуется, наложитъ надобно псесму свиткомъ свернутую (237 а), которой свитокъ и плечо обнимается кругомъ повязкою β). По этой повязкѣ повязывается поясъ γ) котораго серіодка сперва съ наружной стороны плеча накладывается, а послѣ обѣими руками и по обѣ стороны протягивается до внутренней стороны, и тутъ съ стороны на сторону завернувшись, около руки обертывается. И когда тамъ концы вмѣстѣ сойдутся, оныя на внешней сторонѣ завязываютъ, однакожъ узелъ не противъ самой жилы быющей быть долженъ, но нѣсколько съ боку. А межъ повязкою и поясомъ съ стороны кладется кожа, или бумага толсто и крѣпко склеенная (δ), а сверхъ етой продѣвается палочка или кляпикъ (ε), который кляпъ помощникъ завертываетъ, и рукою держа, или вмѣсто ской об-

вязки завертышной , накладывающѣ пресѣ или писки ( 237 ). Другой помощникъ кожу , сколько ему возможно , назадъ оптягиваетъ , и плечо держитъ , а лѣкарь ту часть , которую рѣзать хочетъ , завязываетъ ремнемъ или обвязкою ( 238 , 2 ) , чтобъ кожа нѣсколько потуже сжалась. Между шѣмъ руку умѣренно выпянутъ надлежитъ. Лѣкарь отъ внутренней стороны ставъ сперва ножомъ прямымъ или серповиднымъ ( 238 ) кругомъ кожу и жиръ прямо перерѣзываетъ , и приказываетъ тому помощнику , который плечо держитъ , кожу больше , и сколько возможно , назадъ оптягивать. Послѣ того опять не подалеку отъ кожи остановясь , повторяетъ свое рѣзаніе , и перерѣзываетъ все шѣло до самой кости , и отъ кости ножикомъ , отрѣзывая и оскребая плеву надкостную къ той сторонѣ , которая повреждена , и которую отнять надлежитъ , отворачиваетъ , и кость обнажаетъ. Тутъ остается межъ двумя костями мясо , которое ножечкомъ обоюднымъ , или прямымъ ( 238 , 4 ) , перерѣзаетъ , и кость съ сей внутренней стороны обнажитъ надлежитъ.

(\*) Вторично лѣкарь рѣжетъ для того , чтобъ кожа подлиннѣе оспадала , которою чело отрѣзаннаго уда по большой бы части закрылось , отъ чего оное мѣсто скорѣе залѣчивается.

#### §. 241.

Сіе все здѣлавши въ рану продѣвается холстина ( 238 , 5 ) шѣмъ мѣстомъ , гдѣ она разрѣзана , шѣмъ мясо перерѣзанное прикрывается. Послѣ того кость пилкою ( 238 , 6 ) такъ пиливъ надобно ; начать пиливъ сперва лучевую кость , понеже она пополице , а послѣ вмѣстѣ обѣ кости , чтобъ обѣ кости въ одно время перепилены были. Когда же пилка къ концу будещъ

будетъ приходитъ , тогда слуга руку держащій долженъ оную нѣсколько наклонить.

§. 242.

И такимъ порядкомъ отрѣзавши руку , отнять должно прочь и холстину (238, 5) и ремень или обвязку (238, 2). Обвязку завертышнюю , пресѣ или писки (237) не множко поослабить , чтобъ кровь изъ жилъ бьющихся выпрыснула ; и показала бы , копорыя мѣста завязать надлежитъ. Тутъ иглою весьма кривою сѣ нипкою навощеною не подалеку отъ жилы бьющейся въ самое мясо такъ глубоко захватываютъ , чтобъ оною нипкою не только жилу бьющуюся , но нѣсколько и мяса захватить , и такъ крѣпче будетъ держаться ; и когда узломъ запрягивается , жилы бьющейся не оторветъ. Нипку дважды продѣваютъ такъ будто бы чепыреугольною фигурою здѣлалась , и всю жилу бьющуюся обхватила ; понеже концы вмѣсто должно свести и запрянувъ завязать. Опасаться же надлежитъ , чтобъ во время просавыванія иглы жилу бьющуюся внутри не поколотъ , и для того иглу согнутою спороною къ жилѣ бьющейся оборотить а не горбоватою. А что жила бьющаяся хорошо будетъ завязана , оное потому узнать можно , ежели послѣ ослабленія обвязки , ничего крови изъ нее не будетъ просядать.

§. 243.

И что бы жилы бьющіяся лучше можно было завязать , то нѣкоторые лѣкари оными плоскими клещами (238, 7) ихъ захватываютъ , и къ себѣ прищипываютъ. Но не безопасное ссѣ дѣло , нипку узломъ завернувши , надъ клещами на жилу бьющуюся прищипнутою и сбавленную накладывать и ее одну безъ захватыванія мяса завязывать. Понеже

когда нипку крѣпко попянешь, то жила бьющаяся можетъ оторваться; а ежели слабо завязано будетъ, то опасность въ томъ, чтобъ стремленіе взволнованной крови оной не развязало и нипки не збросило.

## §. 244.

Ежели жилы бьющейся хорошо завязать не можно, и кровь изъ нее бѣдственно будетъ печь, путь послѣднее убѣжище въ томъ, что ее покрѣпче придавить. И такъ на жилу бьющуюся накладывать и приписывать надобно гораздо много пряжи и суконокъ, и все оное служителямъ по переѣмамъ при томъ въ надзираніи стоящимъ, приказывать такъ приписывать, чтобъ всякую минуточку ровно, а ни пуже ни слабже приписывано не было. Надобно же чтобъ оная пряжа не порядочно склочена была, а не подушками (19) здѣланная и сложенная, и оную такъ надобно прикладывать, чтобъ жилу бьющуюся съ боку больше придавливала. Понеже успѣя въ жилахъ бьющихся запираются, и самую кровью въ нихъ остановиться принужденною, и запекающеюся, изъ которой будто бы крышка на нихъ дѣлается. (\*)

(\*) Смотри въ Комментар. К. А. Н. 1731. стр. 122. тамъ ПЕТИТЬ знатный лѣкарь, машину нарисовалъ на томъ мѣстѣ, на которомъ жилу бьющуюся голенную послѣ отрѣзанія бедра, уже купоросомъ сбѣденную, и которой уже въ другой разъ завязать было не возможно, такъ придавилъ, что ею одною стремленіе напирательной крови удержано и больной въ дѣлности сохраненъ. Эта машина не только чело перерѣзаннаго уда, но и въверху въ паху жилу бьющуюся придавливаетъ, и вмѣсто обвязки завертывной употреблена быть можетъ; см. Фиг. 7. и 8. Тутъ можно упомянуть пожеланіе Автора представленія о средствахъ, какъ кровь удерживать, на мѣст. пом. 1732 года стр. 535. 1735. года стр. 591.

## §. 245.

На послѣдокъ, когда руку завязать надобно будетъ, то ее нѣсколько наклонить и согнуть должно,  
а ко-

а кожу напнать , чтобъ ею мясо покрылось. На жилы быющіяся такъ завязанныя накладываются небольшія сукопочки или платочки въ нѣсколько разъ свернутыя ( 239, 2 ) въ спираль чистомъ помоченныя. На чело къ костямъ прикладываютъ подушечки сухія (выше. пом. 1). а сверхъ ихъ пряжу сухую (\*) ( выше. пом. : 3 ) и сіе все обнимаютъ покрывкою холстиною въ нѣсколько разъ сложенною четырехугольною ( выше. пом. 4 ) ( \*\* ), которую такъ хорошо расположить должно , чтобъ все порядочно обхватила , и самый членъ туго обняла ( \*\*\* ). На эту сверху накладывается сложная холстина толстая четырехугольная ( 239, 5 ) , и послѣ того еще сверхъ этой при оныя продолговатыя повязки (спленія) ( выше. пом. 6 ). Обвязку же такъ накладывать должно : Концомъ ея обхватить нижнюю часть уда отрѣзаннаго ( \*\*\*\* ), послѣ того винтомъ идучи , зайти въ верхъ за самый локоть. Этою обвязкою , которая такимъ образомъ нѣсколько разъ на челѣ отрѣзаннаго члена обертывается , и за локоть приходитъ рана , крестъ на крестъ обертывается , и приложенная пряжа сильныя прикрѣпляется. Наконецъ оною нанизъ полого проходя и обратно пересѣкая клетка на клетку къверху приходя поворачиваютъ къ плечу , на которомъ плечѣ холстину въ нѣсколько рядовъ сложенную на жилу быющуюся наложенную обнимаютъ.

(\*) Пряжу почти всегда посыпаютъ порошкомъ такимъ , который силу имѣетъ кровь остановить , что мнѣ излишнимъ дѣломъ почитается. Тутъ кажется оное надобно бываетъ , гдѣ бедру отрѣзываютъ , понеже много крови и изъ небольшихъ жилъ быющихся вытекаетъ. (Смотр. о теченіи крови при ранахъ.)

(\*\*) Нѣкоторые вмѣсто такой толсто сложенной холстины употребляютъ пластырь , такимъ же образомъ дѣланный , или пузыря коровій разможенный , и оный прикладываютъ.

(\*\*\*)

(\*\*\*) Ещё же и то извѣстно, что ХЕСЕЛДЕНЬ славный между Аглинскими Лѣкарями Лѣкаръ, вмѣсто сей сложенной холстины накладывалъ калпакъ валеный, или стеганный, (ѣне тестрикте Шлафмицъ.)

(\*\*\*\*) Понеже такимъ образомъ не только лучше и съ боку припискиваются жилы быющіяся, но и препятствуется, чтобъ жиръ не весьма раздувался, что весьма часто и обыкновенно случается.

§. 246.

Такимъ порядкомъ удъ завязанный помощнику, наложивъ руку на него, надобно чрезъ нѣсколько часовъ придавливать. А удъ такъ положить надобно, чтобъ больше къ верьху торчалъ, а не къ низу свѣшивался. Ежели у Лѣкаря останется опасность о теченіи крови, то должно ему оставить на мѣстѣ своемъ обвязку завертышную (237), но расслабленную, которую потчасъ опять можетъ слуга прикрѣпить, ежели нужда потребуетъ. Болнаго лѣчить такъ надлежитъ, какъ бы тяжело раненаго, и ежели по величинѣ раны нѣсколько теченіе крови окажется, то кровь пусшитъ надобно.

§. 247.

Завязанный такъ удъ, ежели кровь съ устремленіемъ не будетъ течь, ежели вожденіе не приключится, или другое нѣчто не понудитъ, до трехъ или чотырехъ дней не развязывать. Когда же обвязку развязать надобно будетъ, тогда смотрѣть надлежитъ, чтобъ кровь опять не потекла. Того ради при себѣ имѣть должно, и напередъ на удъ положить, какъ надлежитъ, обвязку завертышную, или пресъ (237). Для тойже опасности и пряжу приложенную ради удержанія теченія кровнаго на своемъ мѣстѣ оставить должно, а насильно снимать никогда не надлежитъ. А впрощемъ такъ поступать должно, какъ

какъ ниже въ главѣ о ранахъ показано будетъ. Отъ нижней и взшарошенной кости почти всегда нѣсколько оплупливается. У молодыхъ людей, у которыхъ кости гораздо сочны бываютъ, и когда онѣ довольно мясомъ покрыты бываютъ, иногда и такъ рана залѣчивается, что отъ кости никакой скорлупки не отдѣляется. Я ниже сего покажу, что къ костямъ почти всѣхъ лѣкарствъ мокрыхъ и жирныхъ употреблять непристойно. Къ нимъ прикладываять можно олибанумъ, масликъ, элми, оныя исперши и на мяконькую подушечку насыпавши прикладываютъ, а послѣ другія лѣкарства къ лѣченію тѣла пристойныя свѣрхъ употребляютъ. При семъ лѣченіи и оной длинной обвязки не надобно (245), но надобна короткая, копорою удъ обвязывается.

§. 248.

Когда ногу надобно будетъ отрѣзывать, въ томъ случаѣ другое нѣчто примѣчать должно. Обвязка завершынная, или что здѣсь безопаснѣйшимъ быть кажется, пресъ или тиски (237) кладется подъ колѣнкомъ, или въ верьху бедра близъ паха, гдѣ жила бьющаяся голенная на низъ опускается. Когда къ подколѣнку прикладывается, по ногѣ наклоненной и согнутой быть должно, а въ то время когда будутъ мясо и кости перерѣзывать, надобно ее протянуть. Лѣкарю стоять межъ ногами у больного. Понеже такимъ образомъ дудка ножная лучше пилою пересѣкается. Мясо надобно перерѣзывать ножемъ серповиднымъ пониже бугорка кости берцовой. Понеже когда будутъ перерѣзаны сухія жилы мышекъ, порпняческой, испонченной, полжильно-чувствительной, полуплевной, тогда великое здѣлается

Т

вож-

вожженіе , боль и загноеніе , которыя всѣ ранѣ заживать не дадутъ. А ежели кость ниже будетъ рѣзана , то опасность въ томъ зависить , чтобъ не перерѣзать жилы бывшей той , которая скрозь заднюю сторону берцовой кости къ мозгу ся проходитъ. Понеже временемъ изъ этой кровь весьма бѣдственно течетъ , да и почти удержать ее не возможно , зашѣмъ что жила бывшая въ кости держащаяся ни сама собою зажаться не можетъ , ни завязать ее не возможно (\*). Когда же надобно будетъ , мясо рѣзать , то конецъ ножа серповиднаго приписать къ углу внутреннему голенному. А пилю , такъ дѣйствовать должно ; Прежде надрѣзать берцо , а послѣ сѣ берцомъ и суру (\*\*) или дудку. А понеже сія дудка въ этомъ мѣстѣ всѣхъ мѣстѣ тонѣ , то ее прежде берца перерѣзать надлежитъ. Тутъ много и жилъ бывшихъ завязывать должно , того ради и чело на отрѣзанномъ членѣ ослабивши обвязку завершешную , сѣ прилѣжаніемъ должно обпереть , чтобъ концы жилъ бывшихъ видѣть было можно. Ногу также наклонить надлежитъ , и послѣ того такимъ же прѣуготовленіемъ (239 , 245) обвязать. Но понеже обвязка на колѣно и на рану въ верхъ и въ низъ будетъ переноситься , то и тутъ рану рукою придержать и удъ къ верху поставитъ въ паху согнувши.

(\*) Смотр. Примѣч. ПЕТИТОВО въ Комментар. К. А. Н. 1732 года стр. 539. Онъ представляетъ , что кровь изъ этой жилы бывшей текущую также удержать свободно можно , когда къ ней положутся и надъ нею прикрѣплена будетъ пряжа.

(\*\*) Эта кость отъ Целса такъ называется въ Кн. 8. на выш. томъ мѣстѣ.

#### §. 249.

И плечо не иного прѣразсмотрѣнія требуетъ ,  
когда.



когда оно отрѣзано надобно бываеѣ. Ежели плечо до середины повреждено уже будѣѣ, то жилу быющую подѣ пазухою придавливать можно. Однакожѣ лучше пожѣ самое дѣлаѣ не множко понѣже мѣспа выше показаннаго (240). Обвязкою, которая длинна должна быѣѣ, такѣ обвязываютѣ, что ся свертокѣ завсегда по груди на другое рамо, а сѣ онаго по-верхѣ лопатокѣ обводится, и опѣѣ на конецѣ отрѣзаннаго плеча заворачиваетѣся, и опѣѣ этого конца кѣ ранѣ приводиѣся, и оную рану часто по грудямѣ и по лопашкамѣ кругомѣ обнимая со всѣмѣ закрываетѣ.

§. 250.

Превеликая бѣда опѣ кроветеченѣ случаетѣся, во время опниманѣ бедры, и сего не покушатѣся дѣлаѣ никогда, разѣѣ только на нижней бедерной части, понѣже здѣлаѣся можетѣ, что больной вѣ самомѣ дѣйствиѣ умретѣ. Завязка заверпышная (237) туѣѣ прикладываетѣся вѣ самомѣ верху кѣ бедрѣ (248). Туѣѣ не только завязывать надлежитѣ быющѣя жилы, но кромѣ того и лѣкарства прикладывать надобно, которыя гораздо кровь удерживаютѣ (245 \*), смотрѣѣ ниже о теченѣ крови изѣ ранѣ. Обвязкою, которая нѣсколько широка и длинна быѣѣ должна, по самому краю отрѣзанной бедры прижды обернувши винтомѣ кѣ верху пойпѣѣ, и послѣѣ лоно охватѣѣ, и опшуду нѣсколько разѣ кѣ ранѣ заворотивши такимѣ же способомѣ ее (245) закрыть.

§. 251.

Ле ДРАНѣ, Французской славный лѣкарѣ, самымѣ дѣломѣ апробовавѣ, что руку всю, ежели она со всѣмѣ будѣѣ испорчена, и пилою ее оппилиѣ будѣѣ не возможно, можно опнять вѣ плечѣ, связку

## 248 ОТНЯТ. ОТРѢЗ. ОТНИМ. ЧЛЕНОВѢ, УДОВѢ

вѢ соспавѢ перерѣзавши. Иглою превеликою кривою, сѢ нипкою воценою вдвое или втрое вмѣсто ссученою, прокалываютъ кожу и мясо подѢ пазухою, и такѢ сѢ одной споронѢ на другую спорону продѣваютъ, чтобѢ какѢ возможно близко подѢ костью межѢ ею, и межѢ сосудами подѢ пазухою внизѢ идущими, прошла. Но припомѢ крайне надлежитѢ опасаться, чтобѢ сосудовъ сихѢ иглою не повредить. А что это хорошо здѣлано, оное пошому можно будещѢ узнать, ежели жила быющаяся, по всей рукѢ биться перестанетѢ. Тогда сперва кожу прорѣзываютъ, и отлупляютъ потомѢ мышку делѢ подобную, на палецѢ шириною отѢ членосоставленія, перерѣзываютъ, и надрѣзавъ связку, плечо, нѣсколько вѢ то время приподнятое, изѢ соспава вынимаютъ. ТутѢ останется только вѢ низу мясо перерѣзать, а перерѣзать должно ниже того мѣста, гдѢ завязано. НапоследокѢ еще меньшею иглою сѢ нипкою прокалываютъ мясо, и завязываютъ жилы быющіяся, на палецѢ распоянѣмѢ выше нипки шой, которую прежде наложили, и которую тутѢ развязать надобно. ВѢ впадину неглубоковпадную, которая, сколько возможно, оставленымѢ мясомѢ закрывается, и на рану накладываютъ пряжу, которою пряжею и суконками и обвязкою крестѢ на крестѢ на рану полагаемою и кровь удерживается. Сіе лѣкарское дѣйствіе опасно и бѣдственно, и не всякому неискусному лѣкарю смѣло хвататься за оное надлежитѢ.

(\*) Смотр. у ле ДРАНА Примѣч. 41. Том. 1. стр. 315. у ГАРЕНЖОТА дежѢ ОперационѢ Том. 3. стр. 455. Сам. ШАРПѢ инѢ те Третапизе онѢ те операционѢ офѢ Зургери стр. 221. Исторію представилѢ о человекѢ вѢ мѣлницѢ работавшемѢ, которому колесомѢ руку сѢ лошакою вонѢ выдернуло, и онѢ мѣла оторвало: однакожѢ онѢ

онъ вылъченъ : ибо кровь почти тогда остановилась , когда человекъ вовсе безсиленъ дѣлался. Преславный Мужъ Лія Фрид. ГЕЙСТЕРЪ въ свидѣтельство представляетъ , что у женщины целая рука зторѣла , безъ прикладыванія обвязки , или тому подобной машины , только зъязавши вышепоказаннымъ способомъ сосуды подъ назухою , была отрѣзана. Но только кость не изъ состава вырѣзана , да пилюю отпилена была. Смотр. въ Диссерт. о новомъ способѣ , какъ отрѣзывать руку , въ Гелмстадѣ 1739 году изданной.

§. 252.

Другой способъ представили было , какъ ноги отрѣзывать , два лѣкари одинъ Пётр. Андр. ВЕРДУИНЪ , и другой САБОУРИНЪ , но понеже оный способъ пресвеликими бѣдспвіями и опасностями изнаполненъ , и крайне боленъ , для того нынѣ почти вовсе не въ употребленіи.

(\*) См. Нувелль Методъ пурѣ ампуше ле мамбрѣ парѣ. П. АВЕРАЮНЪ , а Амс. 1687. года Смотр. у руишія въ Еписпол. 14. и Разсужденіе І. САЦМАННА въ Диссерт. о новомъ способѣ , какъ отрѣзывать члены. 1722 года въ Аргентор.

§. 253.

Когда у молодыхъ людей членъ какой будетъ отрѣзанъ , тогда ихъ или немного кормишь , или почаще кровь пускашь надлежишь.

-----

## СКИРРЪ и РАКЪ

### скиррусь и канцеръ

§. 254.

Я выше (58, 59) помянулъ , что изъ вожденія иногда скирръ дѣлается. Скирръ есть опухоль жесткая , безъ вожденія , и , ежели другой какой вредности къ тому не приключится ; небольшая. Мѣсто оной завсегдашнее и почти особенное есть желѣза ,

или другая часть, железнае существо имѣющая. Временемъ и жиръ отъ сильно задержанной матеріи жесточеесть, и по переводу знаменованія имени говорящъ, что въ немъ скирръ дѣлался.

## §. 254.

Въ Скирръ опухоль бываетъ отъ крѣпко задержанной матеріи. Однакожъ иногда случиться можетъ, что нѣкоторая часть бываетъ потонѣ и поменьше того, какъ бы натурально ей быть надлежало; а однакожъ она жесточка и скиррозна, на примѣръ: когда чрезъ незапное опускѣніе сосуды кровеносные сплюскиваются, и чрезъ сближеніе срастаются, что самымъ дѣломъ въ кишкахъ послѣ сильного теченія крови дѣлается, опрѣмѣчено. А впрочемъ опухоль сама собою жестка бываетъ отъ принужденной и засохлой такъ матеріи, а жесточе отъ сосудовъ пухнувшихъ. Боли въ ней никакой нѣтъ для того, что жилы чувствительныя поюже матерією подавляемы бываютъ.

## §. 256.

Въ желѣзахъ дѣлаются скирры отъ всякой причины такой, отъ которой въ нихъ запоры рождаются, то есть; Когда отъ разныхъ и себѣ противныхъ причинъ соки въ движеніе приводятся (39 до 42); когда сосуды разпириваются (45), или когда узки дѣлаются (37, 44), и когда отъ такихъ случаевъ вожженіе рождается, а будещъ лѣчено подавляющими, холодными, сушащими, разбивающими и соки въ движеніе приводящими вещами. Понеже отъ прикладыванія таковыхъ вещей, изъ влажныхъ частей искореняются части водяныя и движимыя, вмѣсто соединяются и свариваются части толстыя и земляныя,

КОШО-

которыя съ фистулами тѣми и срастаются, въ которыхъ онѣ бывають. Въ чирьяхъ безверхушешныхъ то есть въ абсцессахъ и въ ранахъ, скирры бывають, ежели прикладываемыми вещьми такими, которыя у фисшулъ устья запирають, гной удержится. Ибо всякому извѣстно, ежели гдѣ въ опухоли гной дѣлается, или рана пришибенная бываетъ, то отъ сего загнаиванія всесовершенной помощи ожидать надлежитъ. Когда гной вонъ выпити не можеть, то и онъ съ сосудами срастается.

§. 257.

И такъ очень нерѣдко скирры въ питькахъ бывають, понеже никакая влажность или сочность такъ легко не створаживается, какъ молоко. Ибо молоко вещь есть изъ всѣхъ влажностей несмѣшенное, и еще въ животную натуру непревращенное, но сырое, и ежели отъ кушанья прозябающихъ вещей начало свое будетъ имѣть, скоро скисающая. Да и самыя питьки многѣмъ озлобленіямъ подвержены (114). Хотя не такъ скоро, однакожъ гораздо часто случается створаживаться слинѣ, сѣмени, возгрямъ и другимъ влажностямъ. У которыхъ людей во всѣхъ всегѣлесныхъ сокахъ погрѣшность или нехорошество будетъ, каково обычно бывають у спраждующихъ рахитомъ то есть Аглинскою, Ипохондріею то есть вздошною, и скорбуитомъ т. е. цынгошною болѣзнию, и притомъ у тѣхъ мужчинъ, у которыхъ почечуи кровотечной остановленъ будетъ, и у женщинъ, у которыхъ мѣсячина не бываетъ, часто отъ вреда внутри вѣдлавшагося скирры бывають. Также не мало шому причиною бываетъ, худая пища и пише, наприкладъ когда ребятъ,

или

или людсѣ щедушныхъ всякими огородными овощами, травами, солонинами, лѣпѣшками, блинами или чѣмъ нибудъ такимъ, копорыя всѣ вещи къ сваренію крѣпки и великую кислотъ въ желудкѣ дѣлаютъ. Когда такія и другія кушанья въ посудѣ мѣдной, неполуженой, варятся, когда пить дають полпиво кислое. И когда такіе нѣжные и безсильные люди ни въ какомъ движеніи или прудолюбіи не упражняются, но въ скукѣ и сокрушеніи повседневномъ перзаются и исцасаютъ. Понѣже ради шаковой причины у мальчиковъ въ сиротскихъ домахъ содержащихся, и въ монастыряхъ у дѣвушкѣ монахинь, копорыя съ принужденія цѣломудренность свою перпятъ (\*), скирры почасту бываютъ.

(\*) Смотри объ этомъ у ФОРЕСТА Примѣч. въ Кн. 17. Прим. 26. стр. 129.

#### §. 258.

Бываютъ же скирры у челоѣка внутри, и во всѣхъ частяхъ внутренностныхъ, къ лѣченію оныхъ, ежели какой сыскапся можетъ способъ, онаго онѣ Докторы прѣбовать надлежитъ. А лѣкаръ лѣченіе можетъ на себя взять скирровъ на вѣкахъ, въ желѣзѣ слезной, въ желѣзахъ Мейбоміевыхъ, въ мясѣ, которое въ купкѣ внутренномъ глазомъ лежитъ, въ губахъ, языкѣ, въ желѣзахъ околоушныхъ, челюстныхъ, подъязышныхъ, въ желѣзѣ щитовидной; въ которой основаніе подзобковъ или волей (спрумарумъ), въ пипькахъ, въ яицахъ, подъ пазухами, въ пахахъ, въ машкѣ, и всѣхъ, гдѣ великія или малыя желѣзы находятся. Оболочка жирная и клетчатая на всѣхъ пѣлесныхъ частяхъ жесткою бываетъ.

#### §. 259.

§. 259.

Ежели скирръ на внѣшней нѣкоторой части находящійся не отъ внезапной причины здѣлается , но самъ отъ себя , и отъ наченъшейся внутри нѣкакой погрѣшности произойдетъ , тутъ опасаться надобно того , не страждутъ ли и внутренностныя части такоюжъ вредностью. Такого скирра ни лѣкарствами легко вылѣчить , ни вырѣзывать безопасно не возможно ; понеже Опухоль и послѣ залѣченія , или на прежнемъ мѣстѣ или на другомъ , отпрыгается.

§. 260.

Однакожъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ , большее бѣдствіе завсегда случается. Ибо ежели въ шипъкахъ скирръ раздраженъ , оной безъ всего въ рака претворяется ; у женщины наримѣръ , которая въ тѣлѣ своемъ со всѣмъ здорова будетъ , опухоль ничемъ не будетъ проргана , однакожъ она по большой части въ то время отпрыгается , когда обычно по лѣпамъ ее мѣсячина или пламяное оспанавливается. На языкѣ и на губахъ также великой страхъ есть , понеже эти части и много сочности въ себѣ имѣютъ , и почти въ безпрестанномъ движеніи находятся.

§. 261.

Въ другихъ же тѣлесныхъ мѣстахъ , на примѣръ въ желѣзахъ околоушныхъ (паротидиусъ), въ миндалинахъ (тонсиллисъ) , въ желѣзахъ челюстныхъ , въ желѣзахъ щитовидныхъ (эпирондидисъ) , часто опухоль великая вырастаетъ , и крѣпка гораздо бываетъ безъ всякой другой болѣзни , какъ только что собственная желѣзы должность повредится. Однакожъ излишняя величина и безобразіе наноситъ и мерзкость (\*).

У

▲

А припомъ такой скирръ когда презлишне разширяется, и закаливается, напоследокъ совокупныя съ нимъ части давитъ, которыя вожженіе получивши и болячками здѣлавшись съ скирромъ временемъ срастающіяся. Припомъ повреждающіяся и должностныя сихъ совокупныхъ частей. Когда скирръ великія жилы бющіяся пригнетаетъ, то шѣмъ дѣлаетъ сухошку (Апрофію), ежели жилы крововозвращательныя, дѣлаетъ опухоли растѣклыя, и вожженіе, ежели жилы чувствительныя, то дѣлаетъ нечувствительность и слабость съ апрофією (\*\*).

(\*) Смотр. такіа великіа опухоли нарисованныя у ВЕРДУИНА въ Примѣчаніяхъ Хирургическихъ.

(\*\*) Апрофіа болѣзнь называется, когда все шѣло, или нѣкоторая часть, отъ бствы не шучитъ, но по маленку невидимо шкѣтъ, и изсыхаетъ.

#### §. 262.

Какъ же долго въ скиррѣ совершенной сосудовъ запоръ бываетъ, и сосуды съ задержанною и засушенною матерією въ одно будто срослые бываютъ, но цѣлы, а соки въ нихъ хорошіе бываютъ и безъ оспрошы, оной скирръ хорошимъ (бенитнусъ) назывался, который будто бы вещь посторонняя, и чувства лишенная, къ другимъ вещамъ жизнь въ себѣ имѣющимъ придерживается. Ежели же соки отъ какой ни будь притины въ сосудахъ, около скирра лежащихъ, взволнуются, то сіи сосуды напоследокъ прорываются. А соки безъ поврежденія въ нихъ пребывшіе, уже отъ сего движенія и сопренія воскипавъ, отъ горячести гнилыми дѣлаются и острыми, которые ближайшія мѣста еще здоровыя, пробдая пазушистыми дѣлаются. И такимъ порядкомъ напоследокъ скирръ въ зловерный и въ подлинный ракъ превращается.

#### §. 263.



§. 263.

Имѣются же причины такія , которыми скирръ раздраживается , а раздраживается всѣми тѣми , которыя его очень бередятъ . Между такими счищаются , частіи больной проганіе (\*), давленіе и чесаніе , и почти всякое лѣкарство прикладывается , а наибольше , ежели оно будетъ острое , тѣдкое , жирное , ржавое , смольное , спиритуозное , или водяное и мягчительное . Всѣ вещи горячія внутрь употребляемыя , и самое кушанье или питье шакое , а межъ кушаньями и питьемъ крѣпкое и нехорошее соки въ себѣ имѣющее , пряныя вещи , солоности , ренское и горѣлка ; сверхъ того скирромъ страдающие , и съ нимъ до старости достигнуть желающие люди , должны перестать сильно сердиться или въ мысляхъ своихъ беспокоиться , роскоши любодѣйныя и желаніе оныхъ и все мучительное оставить .

(\*) Никакое движеніе въ пяткахъ опухолей и скирровъ такъ сильно дѣлать не можетъ , какъ то , въ которомъ плеча много къверху поднимаются , понеже мышца грудная лежитъ подъ мышкою .

§. 264.

А что скирръ зловреднымъ дѣлался , оное по нѣкоторымъ примѣчаніямъ узнать можно . Съ начала въ немъ боль будетъ сносная , а больше свербѣтъ , и около того мѣста будто нѣкоторое покалываніе будетъ чувствоваться . Онаа боль со дня на день будетъ больше умножаться , и дѣлается колющею , пронизательною , бьющеюся , острою , горящею и на конецъ почти нестерпимою , которою челоуѣкъ будетъ беспокоиться , и крайне мучиться . Между тѣмъ большая жестокость и шероховость будутъ усиливаться ; въ цвѣтѣ сперва опмѣны не будетъ , но вскорѣ

красенъ , сизъ , и черноватъ здѣлается , и жилы крововозвращательныя , будучи также сизоваты , подлѣ опухоли гораздо напрягнутся , и будто бы перекривятся. А послѣ всего того сокъ худой (\*) покрывашку , скирръ покрывающую , и начинаніе свое отъ оболочки желѣзной имѣющую , также и верхнюю кожу сбѣсѣтъ , изъ язвыны сокъ потечетъ гнилостной , смрадной , и здѣлается изъ того подлинное *кажигма* , то есть открытой ракъ.

(\*) Въ ракѣ потаенномъ или подспудномъ часто внутри опухоли находится душло преострою и вонючею мокротою исполненное. Смотр. у ДЕЙДЕРА о Опухоляхъ , гл. 6. стр. 103. и у Г. ГАРРИСА въ Диссерт. 10. стр. 168.

#### §. 265.

А когда уже зло до того дойдетъ , то все начнетъ рдѣтъ , изъ язвыны потечетъ саніасъ , т. е. кровяной сокъ , самъ собою вонючій , и такъ острый , что онъ и кожу и приложенную къ той язвинѣ пряжу будетъ сбѣдать (\*). Понеже во всякомъ ракѣ мокрота изъ гнилости , какова обычно случается у людей сфацеломъ (мертвостію страдавшихъ) умершихъ , и изъ бѣдности , какова изъ худыхъ язвинъ выходитъ , будто бы смѣшанная бываетъ , отъ чего вредность и въ гниль части приводя и сбѣдая , далѣ распространяется , и такъ неизлѣчимою признавается. Тоюжъ самую мокротою и оная нижняя покрывашка , опухоль обѣмлющая , сбѣдается , сосуды пасоконосныя твердѣютъ , съ которыми сія зловерность глубже въ тѣло въ низу лежащее проходитъ , и будто глубокіе корни распускаетъ (\*\*). Сея ради причины , когда зловерность въ шипкахъ приключится , желѣзы подъ пазухою находящіяся распухаютъ ; и понеже опухолью своєю сосуды придавливаютъ , то и въ пле-

чѣ

ѣ опухоль и боль преострую съ онѣмѣніемъ причиняющѣ. Край у язвыны и ближайшая кожа распухлая и жесткая бываетъ , и цвѣтъ имѣетъ изкрасна черноватой , и какъ язва будетъ продолжаться, такъ и вонь злосмрадная со дня на день будетъ пріумножаться , также гнилое мясо будетъ ростъ , гораздо пухнуть и подѣматься. боль пресильная и преострая больнаго денно и ночно будетъ обезпокоивать. Горячка лѣгонькая здѣлается , которая и въ то самое время , когда думалось бы, что умолла , однако опять подѣмается , и больнаго разжигаетъ , тѣло испорченеаетъ , и въ самую чахлость приводитъ. А на послѣдокъ такой челоѣкъ , которому часто случается долгое время бѣдный животъ свой мучить , лишившись всякаго чувства , часто обомлѣваетъ , а иногда пружится , наконецъ умираетъ. При такомъ случаѣ челоѣкъ и отъ кровеисеченія животъ свой теряетъ , ежели оное , изъ какой, нибудъ жилы бьющейся , или изъ жилы кровевозвращательной нѣсколько великой ; и острою мокротою избѣденной , сильное будетъ спремленіе имѣть , и онаго удержать будетъ не возможно

(\*) Злосмраднѣйшая она вонь , которую испорченной сокъ изъ себя испускаетъ , такъ сильно въ носъ тѣмъ , которые около больнаго присматрѣ имѣютъ , вперлется , что иногда ничемъ вымытъ и разбить бываетъ не возможно ; смотрѣ у Г. ГАРРИСА въ вышепоказ. мѣст. Онъ въ примѣрѣ приводитъ одного дѣктора , у котораго послѣ смерти жены его отъ рака въ раны претворившагося умершей , ядовитый запахъ завсегда въ ноздрѣ такъ чувствителенъ былъ , что послѣ и онъ исчезши умеръ. Не меньшаго же примѣчанія и то достоено , что онъ же о нѣкоторомъ лѣкарѣ представляетъ , который при выѣзвачіи подспуднаго рака , нашедъ въ шпикѣ пузырѣкъ , полонъ прозрачнаго сока , осмѣлился оный опкушать , но вкусъ сего вросстраго и пресмраднаго сока такъ въ языкъ впился , что на послѣдокъ и онъ отъ непреодолимой мерзкости въ роту изсохъ и умеръ.

(\*\*) Сѣ многими доводами доказываетъ ГЕНДРОНЪ де Канцеръ.

## §. 266.

Чего же изъ всѣхъ сихъ надѣяться, и опасаться должно, оное знать весьма не трудно. Скирръ, который свѣжій и еще незастарѣлый, и не отъ худой причины здѣлавшійся, не весьма великой и не шероховатой, и гдѣ жилы еще не распухли, и который движимъ и безъ боли въ тѣлѣ здоровомъ случится, иногда лѣкарствами разбивается. Скирръ несмертельный или добрый, бываетъ тошъ, ежели котораго никакъ не прогаютъ, и тошъ, котораго ни лѣченіемъ, ни другимъ чѣмъ (262, 263), не дражняшъ, и онъ до самой смерти безъ вреда сносенъ быть можетъ (смотри. 261). Какъ добрый скирръ, котораго лѣкарствами лѣчатъ, и терпѣть не можно, такъ и всякой зловерный не всегда ножемъ вырѣзывать надобно: однако же хощя и вырѣзываются, то не всегда оное безъ опасности проходитъ. Понеже всегда опасаться должно, чтобъ жилы чувствительной, или большой жилы бьющейся, или жилы крово-возвращательной не перерѣзать, когда опухоль въ глубину кореня свой углубила, и къ подверженнымъ частямъ крѣпко придерживается, когда начало свое будетъ имѣть отъ погрѣшности въ тѣлѣ находящейся, или тѣло оное, въ которомъ онъ будетъ, худаго сложенія, и въ силѣ отъ старости или отъ другой причины ослабнѣе, и гдѣ ракъ въ шияхъ будетъ, и когда желѣза подъ пазухою уже распухла (\*), тутъ ни вырѣзываніе не пособствуетъ, да и шъ, которые инструментомъ покушаются зло искоренить, по большой части поспоряе челоука убиваютъ. Также хощя бы съ начала лѣченіе гораздо щастливо само въ себѣ показалось, однако зло оное опять отпрыгается.

Гдѣ

Гдѣ сжали единожды безъ всякаго благополучнаго успѣха будещѣ рѣзано , то уже изъ того никакой подлинной надежды не бываещѣ. При всякомъ скиррѣ и ракъ совершенной надежной помочи желашъ сущее дѣло естѣ.

(\*) Женщины скиррѣ или ракъ въ питахъ имѣющія , сжали припомѣ и плашяе не порядочное будущѣ имѣтъ , или , сжали лѣтъ гноеватое изъ дѣтородныхъ частей съ мѣсячною кровью будещѣ выходить , оныя часто или скиррѣ или ракъ откровенной въ жашахъ имѣющѣ , что самое боль , около сей части чувствуемая , будещѣ значашъ.

§. 267.

И такъ , гдѣ надежда естѣ (266) , что скиррѣ , въ внѣшнихъ шѣлсныхъ частяхъ находящійся , можно искоренить , то на опухоль прикладывать надобно вещи нѣсколько умягчательныя , задержанную матерію въ движеніе приводящія , но припомѣ и гнилости препятствующія. Понеже и въ сихъ лѣченіяхъ накрѣпко наблюдать оное надлежитъ , что выше , о разбиіи опухолей въ желѣзахъ (113) , я приказалъ. Между умягчательными находяща первыми , пластыри изъ смолъ зѣланные , и изъ вовсе достовѣрныхъ составленій эмпластрумъ , малакшикумъ и діакхилонъ , какъ простой [симплексъ] , такъ сложной [компози-тумъ] съ примѣшаніемъ пластыря діафоретикумъ , Минзихпи называемаго , также гумми галбани , сага-пени , опопонацисъ , которыя смолы можно съ желѣ-комъ лишнымъ растирать , и на больное мѣсто при-кладывать. Но сіи смолы хорошо , гораздо толсто на ирху намазывать , и съ оною ирхою на опухоль накладывать ; а пластыри руками на всю величину опухоли растягивая наверхъ прикладывать , да и еще сверхъ того согрѣвательною покрывшкою прикрывать.

И сже-

И ежели болѣзнь будетъ свѣжая, не надобно обѣгать и густыхъ припарокъ (131); однакожъ оныя не должны быть мокры. Изъ сихъ почти всѣхъ полезнѣйшею признавается припарка, приготовляемая изъ фигъ, то есть изъ винныхъ ягодъ, мясистыхъ толченыхъ и прижареныхъ, такъ что будто бы кашею здѣлались. Пособствуютъ паръ отъ укуса кремнями раскаленными въ него упущенными нагрѣтого, когда надъ тѣмъ паромъ мѣсто болное, будетъ, часто наспавливано. Также легкое попираніе иногда много пособствуетъ, а наибольше когда другими вещьми прикладываемыми нѣсколько опухоль уже въ другое состояніе приведена будетъ. Многіе крайне похваляютъ пластырь Вигоновъ съ ртутью [эмпластрумъ Вигонісъ кумъ меркуріо], о которомъ выше (125) я объявилъ. А почти всего лучше мазью Неаполитанскою [унівенпо неаполитано] опухоль мазать, или прикладывать бляшку серебряную, ртутью натертую, или напоенную. Ртуть можетъ пособъ дѣлать, ежели порокъ отъ Французской болѣзни начало свое имѣтъ будетъ, но рѣдко пособствуетъ въ шишкахъ, ежели отъ другой причины онѣ затвердѣютъ. Ежели же пожелаемъ его употреблять, то надлежитъ съ самаго начала дать хорошее проносное, чтобъ ртуть не обрапилась къ слиннымъ желѣзамъ, и не произвела поплѣвки. Да и такимъ лѣченіемъ способомъ, который многіе при скиррѣ употребляли, весьма рѣдко его вылѣчивали, какъ то опытами познано: Внутрь давать должно лѣкарства въ разныя разбивательныя [дискутенція] изъ рад. сарсапарилле, бардане, хине, грамисѣ, и изъ оныхъ, которые именемъ кореньевъ разжористельныхъ или разрывныхъ [радикумъ аперіэнціумъ] называются. Вредъ дѣлаютъ

лѣкарства

лѣкарствы проносныя [кашаркпики], понеже чело-  
вѣка очень изсушаютъ, и въ разрѣшеніе приводящія  
[резолвенція], понеже соки въ претѣлишинее движеніе  
возбуждаютъ.

§. 268.

А гдѣ всѣ сіи средства въ опухоли никакой пе-  
ремѣны не дѣлаютъ, и оная опухоль ни упадетъ,  
ни мягче не дѣлается, шупъ приниматься надлежитъ  
за лѣченіе ножикомъ производимое. Сперва опухоль  
по срединѣ одною черпою, или впрямь, или и дру-  
гою поперѣгъ разрѣзатьъ должно до самой оболочки  
той, въ которой скиррѣ заключенъ, раздвигая по ма-  
леньку кожу. Тогда опухоль или ножницами ГЕЛВЕ-  
ЦІЕВЫМИ (\*), или двумя нитками крестѣ на крестѣ  
иглою подъ нее продѣпными, или, что всего почти  
наилучшее есть, перстами, приподнимается, и отъ  
здороваго мѣста перстомъ отлупляется, и цѣлая съ  
покрышкою своею вонъ высовывается. Ибо ежели  
такъ вылупляючи вонъ опухоль вынимается, то ко-  
ренья или затвердѣлыя жилы чувствительныя, и со-  
суды пасочныя лучше вонъ вытягиваются, и не такъ  
гораздо опасаться должно кроветеченія. Понеже кровь  
изъ перерѣзанныхъ сосудовъ съ большимъ стремле-  
ніемъ хлынетъ, нежели изъ перерванныхъ или разо-  
данныхъ. Рану наполнишь должно пряжею сухою,  
и сверхъ наложить суконки, а потомъ обвяскою об-  
вязать. И теченія крови, ежели оное съ крайнимъ  
стремленіемъ происходитъ будетъ, вскорѣ не удержи-  
вать, понеже оное теченіе пособствуетъ отъ вож-  
женія, какъ я выше объявилъ. Тупъ рѣдко надобенъ  
бываютъ лѣкарствы сильныя, которыми кровь оста-  
навливается (смотри о печеніи крови изъ ранъ).

Ф

Ежели

Ежели же когда оболочки вынуть будетъ не возможно, то оную поразрѣзавъ нѣсколько надобно и присыпать, да и сверхъ приложить вещи прижигательныя, а сверхъ шого гной производящія (смотри. ѡ язвинахъ и фистулахъ): Ибо ежели ся нѣсколько надъ язвиною останется, то все оное въ гной обратишь должно, чтобъ гнилое мясо не выросло, и порокъ оный опять не опрыгнулъ.

(\*) Смотри. въ его Епистол. къ РЕГИСЬ ѡ матурѣ и лѣченіи рака стр. 153.

#### §. 269.

А ежели скиррѣ зловерднымъ здѣлается (260, 262, до 265), и ракъ поппенный или опкрытый въ шипкѣ будетъ, шакъвый случай другимъ способомъ лѣчатъ. Понеже такіе пороки также рѣдко инструментами вылѣчиваются, а наибольше, ежели въ шѣлѣ нѣсколько будетъ такого, которое лѣченію ихъ, какъ я выше предсказалъ (266), препятствіе будетъ дѣлать. Ежели язва еще подъ кожею (264), а опухоль будетъ жестока, но подвижна, шакую иногда шѣмже способомъ изъ мяса и изъ кожи персями, или ножиковымъ черенкомъ вылупись, подъ корень подрѣзашъ, и безъ поврежденія оболочки вонъ вынуть можно (268). Ежели же верхняя кожа уже не въ своемъ цѣлѣшуде будетъ, но изъ цѣлѣша своего измѣнишся, а въ низу опухоль будетъ подвижна, оная слово въ слово шакъ какъ и другія отъ мяса и отъ другихъ съ нею совокупныхъ частей ощѣлишся можешъ, однакожъ шакъ, чтобъ и все, сколько въ кожѣ ни будетъ находиться поврежденнаго, ножницами или ножечкомъ вырѣзашъ.

#### §. 270.



§. 270.

Гдѣжъ ракъ цѣлую пищку охватиѣ , оную всю вырѣзывать должно , и отъ мышки грудной такъ отдѣляѣ , чѣю лучше нѣсколько отъ мышки спой отрѣзать , нежели , чѣобъ нѣсколько поврежденнаго оставиѣ . Когда же пищку рѣжуѣ , то лѣкаръ воспремѣ ножиковымъ съ низу къ верьху проводиѣ долженъ . Кровь при этомъ случаѣ нѣсколько сильнѣйшими лѣкарствами , послѣ завязанія и послѣ при- давленія жилъ быющихъ , останавлиѣ и рану залѣчиваѣ должно . Въ самомъ лѣченіи и по прошествіи воженія , внутрь даѣтъ лѣкарства къ очищенію крови и другихъ соковъ , способныя , и промежъ таковыми употребляѣ легкія проносныя . И больной челоѣкъ долженъ пищу употребляѣ , не какую бы онъ хотѣлъ и поскольку , но здоровую и умѣренно , отъуждаяся всѣхъ ѣспѣвъ острыхъ . Пиѣ надлежитъ даѣтъ , пизанъ изъ сарсапариллы и другихъ кровочистительныхъ . При копоромъ содержаніи въ кушаньѣ и пиѣ и въ воздержности послѣ лѣченія долгое время оспаться больному должно , ибо завсегда надобно опасаться , чѣобъ злоуредность сія впредъ не отпрыгнулась .

(\*) ДЕЙДЕРЪ опытами искусяся , чѣо много пособствуѣтъ кушанье одно молодное и хлѣбъ бѣлый .

§. 271.

Ежели ракъ на которой губѣ случится , то оныя не мѣшкаѣ завсегда такъ вырѣзывать должно , чѣобъ нѣкоторую частицу и отъ здороваго мѣста отрѣзать . А понеже сего безъ отрѣзанія губы учиниѣ не можно , то край одинъ къ другому приводиѣ , и сшиваѣ должно , продѣвъ и такъ оставивъ иглы (смотри ниже о ранахъ губныхъ) .

Ф а .

§. 272.

## §. 272.

А гдѣ таковой ядѣ на какомъ бы ни будь мѣстѣ глубоко пронзешѣ, или подлинное опчаяніе, или великая опасностѣ въ немъ находишьсѣ будешѣ, и человѣка чрезѣ рѣзаніе здоровымъ здѣлать нельзя, то благоразумнаго лѣкаря дѣло, до такого человѣка, котораго вылѣчишь не можешѣ, не касаться. Того ради другаго способа искашь надлежитѣ, а имянно: употреблять вещи легкія, копорыя болѣзни будио ласкаельствуютъ оную продолжаютъ. И въ такомъ намѣреніи лѣченіе заключить въ кушаньѣ и питьѣ, а къ тому приказатѣ, чинобъ больной всего того остерегалсѣ, что не полезно, и что я выше предложилъ (257, 263). Также всякое мясо, весьма сочное или жирное, какъ то свиное, вредительно. Ежели человѣкъ будешѣ полнокровенъ, то помаленьку и кровь пускать и слабительное давать, толькожѣ самое некрѣпкое, напимѣрѣ, ревень, шамаринды, креморѣ тартари, меркуріумѣ дульцемѣ, пилуласѣ бехери, а крѣпкихъ нипроносныхъ, ни слабительныхъ не употребляй (\*).

Понеже всего того съ крайнимъ спараніемъ удалятьсѣ, что соки въ движеніе привести можешѣ. Въ питьѣ употреблять надобно и полезно ппизанѣ. Не подалеку отъ больнаго мѣста можно источничекъ здѣлать.

(\*) Сколь вредны проносныя; смотр. у ДЕИДЕРА на мѣстѣ помануш. стр. 116.

## §. 273.

Какъ долго подѣ кожей оное зло будешѣ крытъсѣ, то почти всѣ вещи сверху прикладываемыя, нендобны. Мѣсто больное отъ спужи и отъ другихъ досажденій, съ наружи случающихся, беречь надлежитѣ. И почти всего лучшимъ признаваешсѣ то,

что.

что болѣное мѣсто свинцовымъ листкомъ , но тоненькимъ и не тяжѣлымъ прикрывать. Ежели же боль нестерпимая приключится , то на болячку временемъ прикладывать можно праву бѣлену ( гербамъ гіосціами ) и цвѣтъ маковой ( папаверисъ флоресъ ) , въ воскъ обмоченой , или пластырь Сатурнинумъ Минзихти ; понеже вещи жирныя и смольныя шупъ не по недугу.

§. 274.

А гдѣ ужѣ язвина распоролась , то также мало лѣкарства найтись можно такого , которое бы безъ вреда прикладывать было можно. Ибо , ежели крѣпко поступлено будетъ , то зло оное раздраживается , и больше вырастаетъ. И такъ медикъ доволенъ быть долженъ лѣкарствами лѣгкими , такими , которыя язву очищаютъ , и не попускаютъ оной весьма разширяться , и нарастать. Къ тому удобна почти всего лучше аква фагаденика гораздо жидкая , которая гнилое мясо хорошо удерживаетъ , и язва гораздо расплываться не попускаетъ. Ежели же язвина будетъ гораздо испорченная и съ смрадомъ , то въ оную воду примѣшать немножко можно эссенція сукцинъ ( эссенція янтарной ) , однакожъ она сочинена быть должна неостра или неѣдка , и безъ соли , или примѣшать можно аква вульнераріамъ. Послѣ того также корпю сухую прикладывать , чтобъ смердячіе соки поглощала , и оную бережно перемѣнять должно. Ежели боль безпокойство причиняетъ будетъ , то съ креморомъ изъ сѣмянъ цидонныхъ съ водою попутниковою збланнымъ , смѣшивать надобно свинецъ жженой , и шпѣмъ болячку мазать. Также полезное сочиненіе есть , состоящее изъ пѣны серебряной въ уксусъ мореной и изъ масла розоваго , кото-

Ф 3

рой

рой составъ въ народѣ обычно называется унгвеншумъ или линименшумъ нушришумъ. Изъ пластырей, въ которыхъ бы сила такая была, почти всѣхъ лучший есть Минзихповъ. Когда язвина перевязывается, всякими способами не допускать къ ней воздушного дохновенія, понеже отъ онаго язва сильной вредъ получаетъ.

~~~~~

ГЛАЗОБОЛЬ, ГЛАЗА БОЛЯТЪ.

ОФТАЛМІА.

§. 275.

Глаза боль претерпѣваютъ отъ разныхъ и претерпѣвающихъ припадковъ, изъ которыхъ большая часть до вожженій различныхъ принадлежитъ, или отъ оныхъ вожженій дѣлается. Ибо ежели глазныя пленны будутъ вожженіе въ себѣ имѣть, она я болѣзнь офталмѣа или липпипудо поестъ глазоболью, или глазогноюшью называется, которой болѣзни какъ многіе роды, многія причины, такъ и времена различныя бываютъ, въ которыхъ всѣхъ разпознаній главнѣйшая причина къ лѣченію зависить. Понеже глазоболь много нераздѣльности имѣетъ съ вожженіемъ, того ради и лѣченія способъ въ разпознаніи наибольше полагать должно. Сверхъ того еще разность въ томъ есть, внѣшнія ли оболочки боль въ себѣ имѣютъ, или другія пленны внутри глаза находящіяся, вожженіемъ страдаютъ.

(*) Не все согласны межъ собою Авторы въ числѣ и именахъ сихъ внѣшнихъ оболочекъ. Многіе подъ именемъ оболочки прирослой, аднаше, совокупительной конъюнктивѣ и блонной альбугинѣе, всѣ

заклѣ-

заключаютъ. ПОРТЕРФИЕЛДЪ. инъ Медикаль эссе Вол. III. примѣч. XII. стр. 161. оболочку бѣлошную на дѣлѣ раздѣляетъ, изъ нихъ внутренней начинаніе производятъ отъ плевы накосной ямоглазной, которая посредствомъ, какъ то всѣмъ извѣстно, жесткая мозгоголовная плева съ плевами глазными совокупляется, а другую отъ плевы внутри вѣки покрывающей производятъ. А сверхъ этихъ еще придаютъ протяженіе мышечное или кожу (Апостарозе orb Сурно), которая будучи на вѣхъ этихъ и на пленѣ роговой прирослою бываетъ, а то доказываетъ изъ пупырьевъ на пленѣ роговой часто случающихся. О тойже пленѣ, которая отъ сухихъ жилъ мышечныхъ происходитъ, и подъ пленю прирослою лежитъ, ни малѣхонько не упоминается. Я бы думалъ, что сіи оболочки очень хорошо можно раздѣлить на внутреннюю, которая протяжено-мышечною и бѣлошною (апостарозика эти альбугинеа) называться можетъ, и отъ жилъ сухихъ мышечныхъ происходитъ, на прирослою, которая по нѣскольку отъ плевы накосной ямоглазной, по нѣскольку отъ оболочки вѣки изънутри оболочающей, происходитъ, и поверху себя расплывается, и на кожу, то есть на плену внѣшнюю тонѣхонькую, которою всѣ плены, и самая роговая, окрываются. А что межъ этими плевочками тонѣхонькое и клѣтчатое сплещеніе, для примѣра жилы быющія и жилы кровезаврацавательныя всеродныя есть, оное показываетъ каждое вожденіе, и самая хемосисъ; ш. е. плены бѣлой опухоль. Не единожды въ оболочкѣ роговой, а наипаче будучи чирьеватой, мнѣ видѣть случалось, жилы быющія красною кровью весьма изнаполненныя. И для того кажется мнѣ за достойное дѣло признавать можно, таковыя части нѣсколько поозстоятельнѣе пораздѣлить.

§. 276.

Τάρχις называется, когда оболочка прирослая нѣсколько красновата, безъ опухоли и боли, который родъ болѣзни часто дѣлается отъ случаевъ, съ наружи глазъ вредящихъ, отъ солнечнаго зноя, отъ дыму, отъ пыли (*). Когдажъ не только оболочка прирослая, но и протяженомышечная или бѣлошная, которая отъ мышекъ глаза движущихъ происходитъ, очень вожена будетъ, и сіи оболочки такъ распухнутъ, что уже на роговую будутъ подвигаться. таковая болѣзнь χύμωσις называется (**). Но эта болѣзнь бываетъ съ великимъ воженіемъ, презлою болью,

болью, и ночною безсонницею, припомъ голова гораздо болитъ, горитъ, и въ ней великая тяжестъ чувствуется. И сіе злоключеніе иногда приключается отъ нечаянной и наружной причины, а не рѣдко послѣ горячекъ и другихъ болѣзней, когда болѣзненная матерія въ глаза бросится, и тамъ бѣдственное вожженіе произведетъ.

(*) Началомъ вожженія называется отъ ГАЛЕНА въ книг. 6. Эпид. Иппокр. Комм. 5. въ Текст. 3. Т. 9. стр. 515. смотр. у ПАВЛА ЭГИНЕТА кн. 3. гл. 22.

(**) Смотр. у ПАВЛА ЭГИНЕТА въ помнущ. мѣст.

§. 277.

Слипоглазъ или гноятся глаза [липпипудо] собственно такъ болѣзнь называемая, или глазоболь мокрая [офтальмія гумида] есть шотъ случай, когда изъ краснаго ш. с. вожженного глаза, слеза сильная, свѣтлая, горячая и острая печетъ, которая и плену роговую чирьеватою дѣлаетъ, а временемъ и щѣки, по которымъ печетъ, свѣдаетъ. Голова горитъ, боль отъ висковъ до глазъ проспирающаяся превеликая бываетъ, съ прежестюкимъ свербежемъ, глазъ ни какого свѣта перпѣть не въ состояніи. А припомъ иногда на вѣкахъ и на частяхъ въ округъ глаза лежащихъ приключается опухоль, каковъ въ случаѣ рожии обычно бываетъ, часто же вся кожа шероховатѣетъ и прыщевѣетъ. Въ то время мокрота съ слезою смѣшивается, и дѣлается гуще, отъ того и вѣки одно съ другимъ слѣпливаются. На послѣдокъ все засыхаетъ, и съ наружи на вѣкахъ струпъ заскорбллой будетъ торчать, который на конецъ ссохшисъ съ кожи слазитъ.

§. 278.

Zuzoφθαλμία сухой слипоглазъ или глазо-
боль

боль сухая , или гнойность глазная сухая [липпитудо арида] (*) называется , когда глаза ни пухнутъ , ни пекутъ , но только краснѣютъ , и съ болью нѣкакою небольшою и съ свербежомъ тяжести бывають , и вѣки безъ всякой жесткости ночью премножесивомъ мокроты вмѣсто спаиваються . Такое приключеніе часто у тѣхъ случается , которые въ лѣтнее время весьма въ жаркіе дни на солнцѣ лежатъ , или по пыльнымъ дорогамъ ходятъ .

(*) Слова сіи у ЦЕЛСА въ кн. 6 въ гл. 6 §. 29 , смотр. у ПАВЛА въ кн. 3 гл. 22 , у АЕЦІА въ кн. 7 гл. 75 и 77 , стр. 136 издан. въ Алд. на Гр. языкѣ .

§. 279.

Σκληροφθαλμία называется , гдѣ глазъ и вѣки еще настоящаго , и не безъ досады движутся , и опворяются . При томъ болятъ и краснѣютъ , а мокроты изъ нихъ ничего не бѣжитъ , только чпо въ куткахъ и на хрящикахъ вѣковыхъ прицепившіяся гнойки или лимы маленькія , сухія и заскорблыя . Да и вѣки открываться или отворачиваться не могутъ . Сія глазная болѣзнь дѣлается часто въ горячкахъ , а иногда и послѣ того , ежели на глазъ много спиритуозныхъ вещей прикладывано , и когда желѣза слезная скирромъ будепъ заражена (*) .

(*) Смотри у АЕЦІА на помян. мѣст. въ гл. 74 и 77 .

§. 280.

Ψωροφθαλμία именуется болѣзнь , когда глаза негладки или шероховаты бывають , а это наибольшее въ куткахъ и на вѣкахъ случается . Кутки бывають красны , и весьма свербятъ . Понеже мочь по немножку течетъ соленая , острая , которая всѣ части бѣстъ . А происходитъ сія болѣзнь отъ
X
того

того, когда слёзы отъ нѣкоторыхъ причинъ холоднооспыми здѣлаются.

(*) АЕЦІЙ въ мѣст. помян. гл. 76, 77.

§. 281.

Гдѣжѣ вожженіе и во внутреннихъ глазныхъ плевахъ, а особливо въ лигосоставной, будещѣ, та болѣзнь отѣкомъ [флегмоне] называется. Сіе зло хуже прежнихъ, тутѣ голова горитѣ, и боль бываещѣ почти нестерпимая съ горячкою, ночью безсонницею и брѣденіемъ. Это безмѣрное вожженіе, а наибольше, когда здѣлается отъ внезапной причины, то часто съ такимъ стремленіемъ выбрасывается, что глаза изъ мѣста своего выучиваются; а понеже глаза вонъ вылазятѣ, для того Греки сію болѣзнь проптоми (*) называютѣ.

(*) ЦЕЛСЪ въ К. 6 гл. 6 числ. 8; у ПАВЛА же въ Кн. 3 въ гл. 23 стр. 36. Египетомъ, онъ проптоми поставилъ, или причислалъ къ родамъ стафиломы.

§. 282.

Припомѣ еще немалая разность естѣ межѣ глазною болью оспрою [офтальміа акупа] называемою, которая бываещѣ съ вожженіемъ, и по крайней мѣрѣ чрезъ мѣсяцъ или два продолжается, а больше скорее проходитѣ, и межѣ слюпоглазомъ долгимъ [липтишудо лонга] зовомою. Понеже первая болѣзнь тогда здѣлается, когда худая матерія изъ тѣла въ глаза бросится, и въ немъ вожженіе произведетѣ, или ежели отъ другихъ да припомѣ не запно приключившихся причинъ по случится. А въ долговременномъ слюпоглазѣ никогда глаза не сохаютѣ, но безпрестанно влажношью тонкою мокнутѣ, которая почти изъ
ничего

ничего различныя вожженія причиняетъ , и часпо всю жизнь человѣческую бѣдственною дѣлаетъ.

§. 283.

Кромѣ всего сего , ежели въ жидкихъ пѣлесныхъ частяхъ нѣкоторой порокъ будетъ , то иногда болѣзнь слюпоглазная долговременною дѣлается. Понеже часто глаза болятъ у нѣхъ , которые цынготною или французскою болѣзнию бывають заражены (*). Иногда глазная болѣзнь на многихъ нападетъ и повѣтреною бываетъ , а временемъ періодическою , т. е. извѣстно временною , которая въ извѣстное время приходитъ.

(*) Безъ всякаго ужъ сумнишельства удостовѣрено , что глаза болѣли отъ удержанной въ скоромъ времени , гонорей ядовитой (гоноррей вурленге). Понеже въ то время мокроты гораздо много , густой , желтоватой , на тной всемъ похожей , какая изъ спинолы мочейспускательна обыкновенно шечетъ , съ великимъ стремленіемъ показывалось , и изъ глаза текло. О томъ же свидѣтельствуетъ Сш. I ВЕСЪ. въ Ч. 2 к. 4 , въ арх. до стр. 187.

§. 284.

Изъ преждеченныхъ всѣхъ явственно есть , что глаза вожженіе имѣють , когда красная кровь въ маленькія жилы бьющіяся , къ другимъ тончайшимъ и прозрачнѣйшимъ влажностямъ усироенныя , перѣливается (34). А то дѣлается отъ разныхъ , и себѣ самимъ проотивныхъ причинъ. Снаружи иногда ударомъ глазъ такъ повреждается , что его плевы , будучи тонкія и жильночувствительныя , загораются. Тому же глазу , да при томъ и союзнымъ частямъ , раны причиняются ; временемъ отъ паденія , а другимъ временемъ и отъ рукъ лѣкарскихъ. Также когда черепъ головной проломленъ будетъ , и онаго вышняя и внутренняя перепонка повреждена будетъ ,

и загорится, въ ту пору шакже и въ глазу возже-
нiе окажется, понеже плева прирослая отъ перепон-
ки накосной ямоглазной начинается, а перепонка
накоспная ямоглазная съ перепонкою накоспною
жесткою слово въ слово, какъ бы съ перепонкою
накоспною наружною, соединяется. Припомъ всѣ
проницательныя вещи, огонь, наружной и наносной
жаръ, дымъ, глаза вредятъ, и возженiе производятъ.
Ребята возгрявые и невысмаркивающiеся, часто сли-
поглазными бывають. Временемъ же въ самомъ ро-
жденiи ручищами бабушкиными глаза сильно поврежде-
ны бывають.

§. 285.

Имѣютсяжъ и другiя причины, которыя глаза
болѣть заставляють. А изъ нихъ главнѣйшими мо-
гутъ признаваться когда насморгъ или потъ безвре-
мянно удержаны будуть, и когда на горячую голо-
ву холодъ навѣстъ. Или, когда погода неровная
бываетъ, и безвременно перемѣнная, и оною нечув-
ствительная испарина остановится. Когда короста,
свербѣжъ, или плоть въ волосахъ случающiяся, так-
же прыщики, и другiе на кожѣ бывающiе, со всѣмъ
съ тѣла агоняются, то не рѣдко худая матерiя въ
глаза бросается, и дѣлается въ нихъ боль слипоглаз-
ная. Временемъ же язвинами свѣдены бывають же-
лѣзы Мейбомiевы, а такое нещасiе случается у лежав-
шихъ въ воспѣ. Понеже когда въ глазахъ будуть
воспины, а вѣки одно съ другимъ гноемъ склеившiя-
ся, будуть разниманы, да припомъ отъ неразумiя
доктора или лѣкаря лѣчащихъ, вкладывая разныя лѣ-
карства будуть движимы, то язвины въ нихъ оста-
нутся, и долговременная болѣзнь слипоглазная здѣ-
лается, кошорой у нѣкошорыхъ людей никакимъ спо-
собомъ

собомъ вылѣчить бываеиъ невозможно ; и такъ это , которое самособою будио бы ничто казалось , по болъшой части оиъ глушоспи лѣчащаго случается. Сей болѣзни подвержены бываюиъ люди полные и кровью изобильные , у которыхъ почечуй прежде текалъ , или плотяное т. е. кровь мѣсячинная оспановишя , у которыхъ испражненіе на низъ не порядочно бываеиъ , и у которыхъ въ головѣ великая боль , или чрезъ долгое время великая слабосиъ будеиъ. А гдѣ глазъ или часио , или чрезъ долгое время , уже такою болѣзнию будеиъ сирадатиъ , то оная болѣзнь хосиа бы чрезъ нѣкакой способъ и вылѣчена была , однако отъ маленькаго припадка часио оиъ дѣлаеиъ , понеже глазныя плены гораздо ослаблы бываюиъ.

(*) Чрезъ часиое прилѣжное примѣчаніе усмоирио , что глазъ , воспои изнаполненные , весьма безопасны бываюиъ , когда вѣки одно съ другимъ слѣпаиваюиъ. Понеже такииъ способомъ ни свѣтъ , ни воздухъ въ ниъ не попадаюиъ , которме оба наиболъше въ плевочкахъ глазныхъ жилищечувствительныхъ обыкновенно воужене причиняюиъ. И такъ лѣчение то не только напрасныиъ , но и крайне вредныиъ почеиъ можно , когда вѣки мажуиъ , или паряиъ , и волокна слабыи дѣлаюиъ , или когда разниаая вѣки , многиа лѣкарства въ кушкы глазныя кладуиъ , что уже воспа здѣлаась , а лѣкарстваи пачкаюиъ. Ни когда то помочи не здѣлаеиъ , что глазъ въ движеніе приводиъ , ибо такія вещи воспу гораздо вредительнѣйшею дѣлаюиъ. Ибо въ воспѣ такой ежели безъ лѣкарствъ пробудеиъ , то послѣ окончанія загнаиванія , безъ всякаго вреда сами собою сходяиъ. Ежели же воспа злая будеиъ , и худыиъ сокомъ исполненная , ей сей не могу думать , чтооъ вѣчно могло найшисъ такое , чемъ бы злосиъ оную отвраиъ было можно.

§. 286.

Неболъшая слипоглазная болѣзнь и плевочки наружной воужене въ отлѣкъ (281) претворяиъся можеиъ , ежели въ глазъ будуиъ кладены лѣкарства холодиащи (*), подавляющія , также и водошныя , котормы вещи всѣ и нѣжнѣйшия влажноспи нудяиъ , и жилищечувствительныя оболочки сильно озлобляюиъ.

х 3

(*) я

(*) Я видѣлъ отіокъ, и отъ того отіока внутри прорывнійся чвонъ выѣзшій глазъ послѣ того, какъ глупецъ у человека небольшою глазню болязнью спржадущаго, къ глазу мяхишъ изъ бѣлаго жѣба, съ водою прехододною смѣшалъ, чрезъ нѣсколко дней прикладывалъ.

§. 287.

Когда же здѣлается слипоглазная болѣзнь, по по непреложнымъ признакамъ узнать можно, какъ она окончатся, изъ нихъ нѣкоторыя приключенія ко всякой слипоглазной болѣзни служатъ обще, а нѣкоторыя собственно къ нѣкоторымъ. Между общими приключеніями кто не знаетъ, что всякое вожженіе, глубоко пронзающее, и внутреннія глазныя плевы обовладѣвающее, какъ въ отіокѣ случается, ужъ я объявилъ (281), бѣдственнѣйшее бываешъ, нежели то, которое въ наружныхъ частяхъ состоитъ, и при которомъ невеликая боль причиняется. Болѣзняя же опасность тушъ бываетъ, и страхъ ослѣпотси, когда съ главною болѣзнію и великая горячка случится, или по приключеніи горячки глазная болѣзнь больше здѣлается. По большой бо части чрезъ горячку (*), также и чрезъ поносъ (**), глазная болѣзнь въ разрѣшеніе приходитъ. Ибо испражненіе на низъ сильными лѣкарствами производимое, бѣдственно и на плевъ роговой язвыны возгреватъя причиняетъ. Ежели же напередъ слипоглазной болѣзни боль въ головѣ сильная или чрезъ долгое время безперерывно случится, то часто слѣпыми люди дѣлаются (***). Ежели въ одномъ глазѣ будетъ глазная болѣзнь, или одинъ глазъ будетъ болѣть, оная боль въ одномъ глазѣ больше будетъ, нежели когда оба болятъ. Не рѣдко же случается, что когда глазъ одинъ отъ причины да еще незадной заболитъ, въ то время и другой покраснѣетъ. Глаза больныя у
людей

людей взрослыхъ и у людей хорошее зѣла сложеніе имѣющихъ, скорѣе выздоравливаютъ, нежели у младенцевъ, у стариковъ, и другими немощми страдающихъ.

(*) ИПОКР. Коак. Пренот. §. 130. Т. 1. Издан. Лид. стр. 541, тамъ смотри у ДУРЕТА на Коак. Ки. 2. стр. 129.

(**) ИПОКРАТЪ Раздѣлен. 6. Афор. 15. пері криѣиу при конѣ показаннаго изданія, стр. 447, въ Коакахъ стр. 542, тамъ смотри у ДУРЕТА стр. 130.

(***) Въ Коакахъ изд. Лид. стр. 542, у ДУРЕТА въ томъ же мѣстѣ стр. 130.

§. 288.

Между же оными приключеніями, которыя не отменно роду слюпоглазной болѣзни собственными признаются, оныя уже отъ опѣка (281) (флегмоне) и отъ опухоли на бѣлой глазной плевѣ [хемосисѣ] называемыхъ, познано, что отъ нихъ часто свѣта помраченіе дѣлается. Опѣкъ, иногда пропадаетъ, какъ дѣлается Ипопѣонъ, и ежели неускоритъ какое вспоможеніе съ крайнею отвагою предпріять, то глазъ со всѣмъ въ гной обращается, и прескается, (смотри о ипопѣи) *ЭпѣоФѣалміа* (278) почти безъ всякаго бѣдства случается, *СхлѣпѣоФѣалміа* (279) въ Липоновъ огонь, подпѣкъ и къ черной водѣ склоняется, и временемъ вѣчную темноту въ глазу причиняетъ.

§. 289.

Во время мокрой глазной болѣзни (277) горячая, тонкая, соленая слеза свѣдаетъ плену роговую, отъ чего великая бѣда въ оныхъ язвинкахъ бываетъ; а гдѣ мокрота съ слезою мѣшатся начнешь, путь нѣжѣ долговременнаго немощесіюванія, нѣжѣ язвинъ гораздо опасаться не надлежитъ, понеже достовѣрное почитъ увѣреніе естъ, въ томъ, ежели мокрота густа и мягка быть начнешь, и ея средствомъ вѣки

одно

одно съ другимъ сроснутся , да припомъ , когда вѣки и съ ними совокупная кожа гораздо распухнутъ , отъ сгруппа съ наружи на глазу нарастающаго (277). Не безъ крайняго бѣдства бываетъ глазная болѣзнь французско-болѣзненная и цынготная (283) , а особливо , ежели въ ямѣ глазной какая нибудь кость попорчена будетъ . Долговременная слипоглазная болѣзнь (282, 285) , ежели усилишся , то съ трудностью вылѣчена бываетъ

§. 290.

Сии болѣзни какъ отъ различныхъ причинъ дѣлаются , такъ и различнаго лѣченія требуютъ . Ибо нѣкопорое лѣченіе въ каждой слипоглазной болѣзни бываетъ надобное и общее . Понеже кто бы глазною болѣзнию ни страдалъ , то ему бытъ надобно въ темномъ мѣстѣ , чтобъ къ нему никакой свѣтъ не доходилъ , и емубъ не надобно было глазъ ничпо употреблять . Не надобно глазъ слипающихся завязывать , а особливо , въ ту пору , когда мокрота тонкая и ѣдкая , или густая въ глаза течь будетъ . Понеже опасно , чибъ вѣки одно съ другимъ не срослось , или на глазахъ не прикрѣпли . Еще же ѣдкая мокрота , ежели не будетъ вытекать , то плесву роговую сѣбствъ , и язвыны на ней здѣлаетъ . Но гдѣ какое нибудь дѣйство хирургическое будетъ здѣлано , то кажется гораздо лучше глазъ завязывать , тожъ самое и на здоровомъ глазу здѣлать запотребное признавается , понеже больной глазъ , чрезъ движеніе и чувство глаза здороваго въ тожъ самое дѣйство приводится . Воздуха и вѣтровъ вѣяніе , которое всякому вожженію вредительно , также глаза вожженіемъ страдающіе въ движеніе завсегда приводитъ .
Во

Во всякой слюпоглазной болѣзни , какъ воспррой шакъ долговременной , убѣгать надобно такихъ причинъ , которыя слѣзы въ глазахъ дѣлаютъ , и бѣкїя лѣкарства не другимъ какимъ образомъ глазамъ вредятъ , только что слѣзы въ глазахъ производятъ. И для того младенческое частое плаканіе завсегда преспятствуетъ глазамъ больнымъ выздоравливать , у нихъ всѣ глазныя болѣзни претрудно лѣчатъ. Пришомъ недовольно на одну только глазную болѣзнь прилѣжно смотрѣть , но пришомъ и на соспоянїе всего тѣла человѣческаго , и къ тому какъ все лѣченїе свое , такъ и содержанїе въ кушаньѣ и пипьѣ склонятъ , въ чемъ великая помочъ зависитъ. Въ оспрой или огневой , и мокротной глазной болѣзни , и которая съ рожею на вѣкахъ случается , ежели горячка приключится , то весьма много пользы можетъ дѣлать лѣчащїй человѣкъ , ежели будетъ знать при горячкѣ употребить то , чемъ сырые , тонкіе , острые и бѣкїе соки могутъ въ растворенїе припить , и свареными густыми и мягкими дѣлаться. Неиспращенїе на низъ завсегда болѣзнь продолжительною дѣлаетъ , однако оно производитъ ни когда не надлежитъ лѣкарствами сильными (287) , но очень легкими (63) , а еще и того лучше только слабительными.

§. 291.

Ежели же каждой видъ глазной болѣзни разсудить пожелаемъ , то Тараксисъ [начало вожженїа въ глазу] (276) часто само собою и скоро проходитъ , только чтобъ больной отъ свѣта и отъ другихъ вещей глазъ въ движенїе приводящихъ повоздержался. Ежели сей вредъ произойдетъ отъ причины внутри дѣлавшейся , то очень прилично глазное лѣкарство зачасую

Ц

упом.

употребляемое. Оно въ себѣ имѣетъ немного випріоли калцинати и туце препараты, которые по одиначкамъ прутъ, послѣ вмѣстѣ смѣшиваютъ, и водою феникуловою или розовою наливаютъ. Если сіе зло приключится отъ худого непогодья и отъ удержанія поту, или отъ насморгу, въ такомъ случаѣ гораздо полезно больному по ушрамъ попѣть. Однакожъ опасаться должно, сего предпріятія чрезъ даваніе горячихъ лѣкарствъ и въ суровости.

§. 292.

Снаружи когда глазъ сильно зашибенъ будетъ; то потчасъ кровь изъ руки пушитъ надлежитъ, и отъвратитъ къ глазу припеченіе соковъ. Въ такомъ случаѣ также надобно прикладывать на глазъ лѣкарства умѣренно подавляющія. Надобно бѣлокъ яичной съ водою розовою или феникуловою въ судно влить, и прибавитъ нѣсколько туце препараты и сахара сапурни, и оное все прутикомъ или лопаточкою разболтавъ и смѣшавъ. Когда же все вмѣстѣ смѣшано будетъ, то въ ономъ суконочку или тряпочку обмачивать, и къ глазу прикладывать. Когда же суконочка высохнетъ, то оную опять намочивать надобно. Сія вещь прохладеніемъ своимъ возженіе удерживаетъ, ежели же возженіе въ глазу уже вовсе здѣлается, то спой вещи не надобно употреблять, понеже возженіе оное вѣтромъ превратитъ можетъ (286). Въ семъ случаѣ гораздо полезнѣйшимъ почтется можетъ то; въ винѣ хорошемъ красномъ сварить травы полынь, иссопъ, руту, маеранъ, и въ ономъ декоктѣ обмакивая губку или кисточку глазъ припаривать. Ненадобно чуждаться и воды ранной [аква вулнерарія] назы-

называемой съ водою феникуловою смѣшанной, въ кошорой малѣхонько должно быть спирта, да припомѣ нехудо и то, ежели съ водою холодною осьмую, или хопя и десятую часть, спирта крѣпкаго, смѣшавъ, къ глазу будешь прикладывавать. Всѣхъ вещей спиритуозныхъ гораздо опасаться надлежитъ, понеже глазъ жесткимъ и екиррознымъ дѣлаютъ. А гдѣ глазъ уже покажется окрѣплымъ, то помаленьку прибавлять вещей мягчительныхъ. Но всячески остерегаться должно, чѣмъбъ чрезъ такія приварки внутри глаза гной не дѣлать. Въ ночное время къ глазу прикладывавать можно яблоки варенныя или гнилыя, теплыя, и въ оныя камфоры съ сахаромъ сперши по немножку прибавлять.

§. 293.

Ежели въ плевѣ прирослой нѣсколько крови разшедшейся будеть, то нѣтъ ничего лучше, какъ оное мѣсто или молокомъ женскимъ, или кровью теплою голубиною, помазывать, а кровь можно изъ перьевъ у живой пѣтлички выщипнутыхъ получать.

Цельсъ въ Кн. 6, гл. 6. §. 39. Павелъ въ Кн. 3, гл. 22, стр. 33.

§. 294.

Когда глазъ отъ дыму, или отъ другаго чего бѣлаго поврежденъ будеть, то можно и молоко теплое къ тому употребить, и онымъ наливая въ чашечку, или въ сосудецъ къ тому удобной, (ле бассень окулеръ) (*) глазъ промывать. Въ молоко понемножку и шафрану примѣшивавать. Или перышко въ смѣсану изъ сѣмени зидоннаго выдавленную глазъ помазывать. Сими лѣкарствами весьма изрядно уполяются въ глазу кроющіяся осприя мокроты. Нѣкоторые понѣскольку гранъ камфоры съ мигдалами сперши, и съ водою смѣшавши въ глазъ пускаютъ. Глазъ днемъ припа-

ривать припаркою изъ правъ умягчительныхъ зѣбланною, а на ночь яблочки вареные прикладывать.

(*) Гаренжонъ объ испр. въ Тит. 14, Арх. 4, стр. 432.

§. 295.

Больше труда бываетъ при болѣзни глазной мокротной (277), однако и въ оной много различности имѣется. Понеже когда порокъ будетъ незастарѣлой, и его большее стремленіе будетъ съ горячкою, и слѣзы ипить будутъ соленыя и горячія, а съ слезами вѣки будутъ пухнуть, то надлежитъ и оное, мною (287, 290) представленное, памятовать, что и горячку за лѣкарство почитать должно. Ибо чупьли надобны другія лѣкарства, кромѣ покоя и воздержности. Мы знаемъ, что когда горячка уменьшился, и когда вожженіе на наружныхъ частяхъ будетъ, понеже на вѣкахъ опухоль зѣблается, да и самая кожа, когда попрыщевѣетъ, будетъ рѣбъ, то уже мокрота мягкою зѣблалась. Оной мокроты чѣмъ больше будетъ щечъ, и чѣмъ она больше будетъ густа, чѣмъ больше вѣки будутъ заплывать, тѣмъ больше вожженія будетъ теряться (289). Въ семъ случаѣ если еще что надобно сверхъ воздержности и другого, внутрь отъ горячки употребляемого, зѣблатъ, то начать надлежитъ, сперва припаривать глазъ припаркою изъ правъ мягчительныхъ, чтобъ на наружныя части вызвать вожженіе. Толькожъ преизлишняя мокрость, туитъ весьма вредительна. Также и вѣковъ, хотя бы сами съ собою слипались, не разнимать, и ничего въ глазъ не класъ.

§. 296.

Больше опасности бываетъ въ той мокротной глазной болѣзни, копорая, со временемъ не созрѣваетъ,

ваетъ , такъ какъ первая , и при которой горячки не бываетъ. Ибо мокрота , хотя не много но только острая печь будетъ , и которая печь будетъ долго , по оная мокрота испючивъ плесу роговую. Отъ чего на ней дѣлаются болячки весьма худыя , отъ которыхъ глаза во всю жизнь человѣческую бываютъ пуманны. Ежели сему пороку пожелается пособить , по надлежитъ всѣми силами стараться , отвратить худой мокроты въ глазъ печеніе. И такъ у людей сильныхъ , и полнокровныхъ , и жилы кровезовращательныя налипыя имѣющихъ , надлежитъ въ отдаленной части по есть изъ ноги кровь пускить. Или , ежели малосиліе или что другое тому препятствовать будетъ , однакожъ множество крови больного будетъ изнурять , по на спинѣ и на другихъ мѣстахъ , насѣкая прежде насѣчкою кожу , банки ставитъ. Или банки безъ насѣчки на цѣлую кожу спавитъ и присасывать должно , чтобъ долго держаться могли. Также хорошо ноги въ воду теплую спавитъ и переть , припомъ слабительныя давать , толькожъ изъ лѣкарствъ довольно сильныхъ. А гдѣ какая нибудь въ тѣлѣ погрѣшность будетъ , гдѣ короста внутри удержана , плоть или перхотъ остановлена , или гдѣ болячка худая и долговременная залѣчена , по надлежитъ внутрь лѣкарства давать соки очищающія , и которыя могутъ дѣлать , чтобъ погрѣшности кожныя на ружу опять вышли. Для того также пристойно кожу , которая уже прежде повреждена была , сукномъ жесткимъ переть. Но припомъ опасаться надлежитъ , чтобъ отъ такихъ поступковъ , преизлишне мокроты не поднялися , который случай мокроту въ глазу также горячею и вредительною причиняетъ.

§. 297.

Превеликая же помочь отъ этой глазной болѣзни бываетъ въ Шпанскихъ мухахъ, когда онѣ съ пластыремъ смѣшанныя къ кожѣ прикладываются. Однакожъ мало пособствуютъ, ежели небольшіе пластырьки къ запялку прикладываются, а пузыри прорѣзанные по испущеніи мокроты засыхаютъ. Гораздо пристойнѣйшее пластырю есть мѣсто между лопатками, на которомъ мѣстѣ тоже пластырь да больше и сильнѣе положить можно. Поневже чрезъ нѣсколько большую боль, которою кожа такъ шьется, худой матеріи печеніе отъ глаза отвращается, а припомъ и болячекъ подъ кожицею такимъ образомъ здѣланныхъ скоро заживлять не надлежитъ, но прикладывая вещи жирныя и смягчительныя долго, и временемъ чрезъ мѣсяцъ держать, и гной, сколько возможно, производить надлежитъ. Ежели же бы случилось, что сіи болячки и заскорбли, однако очень легко можно здѣлать, въ масъ какую нибудь нѣсколько шпанскихъ мухъ вмѣшать, и оною мѣсто прежне намазать. Когда отъ такихъ средствъ вредность облегченіе получишь, а глазъ еще невовсе здоровъ будетъ, то очень не худо временемъ, опять тожъ самое повторить, и покуда еще прежняя язвина незалѣчена, шпанскія мухи къ икрѣ ножной приложитъ, и на ней также гной произвести.

§. 298.

Однако же случается иногда, что глазная слепная болѣзнь и такимъ лѣченіямъ не повинуется, но печеніе мокроты ѣдкой безперерывно продолжается, въ такомъ случаѣ нѣсколько суровѣйшаго лѣченія требуется. То есть приступитъ должно до онаго вѣковъ *ζιτι*, (стрекотанья)

танья) который хирургическаго дѣйствія родъ ИППО-
КРАТЪ (*) предложилъ, а въ наши времена чрезъ многіе
вѣки или слѣды забытый, Іо. Оома де ВОЛОЛГУЗІЙ
возобновилъ (**). Тутъ вѣки спрекочутъ до крови пуч-
комъ здѣланнымъ изъ остей, изъ колосовъ [секались]
ярицыныхъ надерганныхъ. Понеже на хребтѣ у ости
оной премножество имѣется снаружы зазубренокъ,
отъ чего она и шероховата. Таковыя ости въ пучокъ
нипкою связываютъ, и тѣмъ внутреннюю оболочку
вѣковъ на наружу заворачившихся до крови спреко-
чутъ. Кровь такимъ образомъ изъ сосудовъ крове-
носныхъ разцарапанныхъ текущую, которая отъ
воздуха по большей части будетъ ссаживаться, теплою
водою вымывать надлежитъ, и послѣ того глазъ остро-
рожно губкою въ водѣ теплой обмачивая и выжимая
припаривать должно. Ежели къ ночѣ лѣкаръ глазъ
хотѣлъ бы завязать, то надобно, чтобъ онъ нѣчто
положилъ межъ вѣками, дабы онѣ съ глазомъ не
слѣпливались. Къ тому почти за способнѣйшее по-
чищаются сѣмена горминовы; ибо оныя будучи глад-
ки можно промежъ вѣками положить, и сверхъ то-
го приложивши свареное, или гнилое яблоко глазъ
завязать. Сіе вѣковъ спрекопанье (ξύσις) часто и до
тѣхъ поръ повторятъ, только по нѣсколькимъ дней про-
пуская, доколь вожженіе не минуется, и мокрота густая
и мягкая не здѣлается. А сего скорое событіе бу-
детъ предзнаменовать кровь изъ раскребенныхъ вѣ-
ковъ текущая, когда оная кровь не тотчасъ будетъ
ссядаться.

(*) Въ Книжечкѣ о зрѣніи. Напеч. въ Амст. Т. 2. стр. 353.

(**) Смори у БУРКАРДА ДАВ. МАУРЦІА οφθαλμοξύσις
не древнюю, или Воолгузано-Иппократическую, въ Тубингѣ, 1726 года
напечатанную, и тую диссертацию о Скарификаціи глазъ, въ Липсѣ въ
1728

1728 году изданную, также въ Программѣ, которою въ 1735 году я вскры-
ше трупа человѣческаго назначилъ, и въ которой сіе дѣйствіе хирур-
гическое отъ нѣкоторыхъ уничтоженное, въ употребленіи быть достой-
нымъ я представилъ, и по исследованіи сего, какого оной Хирургъ за-
гражденія достоинъ, показалъ.

§. 299.

Иногда послѣ опущеннаго вожженія оспаю-
тся на бѣлкѣ глазномъ жилки крововозвращатель-
ныя полнокровныя и будто бородавочныя или
напряглыя, которыя, понеже до плены роговой
также доходятъ, оную плену бередишь, да еще,
если на ней худыя язвинки будутъ, то сіи жилоч-
ки крововозвращательныя будто бы ихъ кормятъ и
большими дѣлаютъ. А это наибольше случается въ по-
время, когда на глазъ прикладываютъ бывають вещи
охлаждающія и подавляющія (286, 292). Весьма по-
лезно шупъ подъ сіи жилочки крововозвращательныя
или иглою или крючкомъ острымъ малѣхонько кон-
чикомъ внутрь закорюченнымъ поддѣть; и приподняв-
ши маленькимъ ланцетомъ перерѣзать, и попустить
крови течь, пока сама остановится; а въ то время
къ глазу губку въ теплой водѣ обмакивая и выжимая
прикладывать. Сіе хирургическое дѣйствіе нѣкоторые
[Флеботоміау окули] ш. е. кровепусканіемъ глазнымъ
называютъ.

§. 300.

Если же такая крайне досадная глазная бо-
лѣзнь какъ нибудь излѣчена будетъ, и теченіе мокро-
ты вовсе перестанетъ, то послѣдніе остатки боля-
чекъ глазныя лѣкарства [коллірія] выше (291) мною
предложенныя, или другое составляемое изъ нѣ-
сколькихъ гранъ лапидисъ дивини съ водою розовою
залѣчатъ. Также очень нехудо мякишъ изъ ябло-
ка

яблока гранатова, съ полынемъ въ винѣ хорошемъ варить, и въ помѣ губку обмакивая и выжимая къ глазу прикладывать. О лѣченіи чирьевъ глазныхъ ниже мы скажемъ.

§. 301.

Глаза *EuroΦθαλμία* спраждущія также лѣчатъ припаркою изъ правы мелилопи, малве, изъ цвѣтовъ вербасци, хамомила, изъ сѣмени лини, съ полынемъ и рупою, которыя припарки такимъ же образомъ, какъ я теперь сказалъ (300) употреблять. А внутрь надобно давать легко слабительныя вещи, и соки разжиживающія; ппизаны, съ спрушками оленья рога, похлѣбки, ухъ, молоко, миндалы и маковое сѣмя съ водою толченное, воды минеральныя п. с. рудныя Селтеранскія, или сама собою однѣ или съ молокомъ.

§. 302.

Отъ болѣзни глазной *σκληροΦθαλμία* называемой (279, 288) почти никакихъ полезныхъ случаевъ не находится, понеже она и отъ шпанскихъ мухъ и отъ *ξυσίς* (298) очень хуже дѣлается. Ея бояться надобно, когда она съ горячкою бываетъ, и когда съ скирромъ въ желѣзѣ слезной. Ибо ежели съ горячкою случится, то страхъ Антонова огня, а ежели съ скирромъ въ желѣзѣ слезной, то страхъ рака открытаго. Отъ обоихъ же сихъ пороковъ зрѣніе теряется, и глазъ пропадаетъ, а сверхъ того иногда сія болѣзнь и смерть прежде времени дѣлаетъ. Ежели горячка будетъ и великое воженіе, то въ такомъ случаѣ пособствовать внутренними лѣкарствами, и ежели злоключеніе сіе крайне мучить будетъ, то должно гораздо много крови пускать изъ жилы бьющейся

щейся висошной, а на глазъ прикладывать вещи мягчительныя и въ разрѣшеніе приводящія.

§. 303.

Гдѣжѣ желѣза уже жестка здѣлалась, и почти скиррозна, и для того, что никакая влажность въ глазъ не проходитъ, глазъ болитъ, и туманенъ, оному помоществовать надлежитъ слабительными и мягчительными лѣкарствами. Къ такому случаю полезнымъ признается, у древнихъ въ частомъ употребленіи бывшая эзипумъ, то есть грязь на шерсти у скотины налиплая (*). Полезны также корень лигнорумъ альборумъ, и права заячій щавель ацетозелла называемая, съ масломъ коровьимъ несоленымъ сполченныя, прикладывать. Внутри все подавать должно, что я теперь въ *ζυροφθαλμία* представилъ (301). Если же болѣзнь будетъ застарѣлая, и желѣза будетъ вовсе твердая, то и лѣчение будетъ напрасное.

(*) Смори у Діоскорида въ кн. 2 гл. 84, у Плинія въ кн. 29, гл. 2, стр. 492.

§. 304.

Ψυροφθαλμία (280) также лѣчится какъ *ζυροφθαλμία* (301). Внутри употреблять надлежитъ вещи слабительныя, и соки жидящія, а снаружи въ глазъ пускать выше въ (301) мною предложенное.

§. 305.

Если Флеумотъ въ глазу будетъ, и припадки будутъ мучить, то заранѣе хватайся надлежитъ съ нѣкоторою онягаю за лѣчение. Весьма полезно не упуская времени кровь пустить изъ жилы крове-возвращательной яремной, а въ другой разъ изъ ноги, на низъ производить лѣкарствами къ тому приличными (63), однакожъ довольно сильными, также кли-
спе-

сперями ; банки на затылкѣ и на спинѣ , насѣкая кожу , спавить , ноги часто въ теплую воду спавить , и тереть , вѣки разѣ и другой и больше ножечкомъ изчеркивать . и на нихъ прикладывать лѣкарства разнѣ разгоняющія , которыя отъ вожденія служатъ , и которыя въ особенныя времена сея болѣзни прикладывать должно . Ежели человекъ будетъ больной и слабѣющей , такому можно съ пользою и испанскія мухи прикладывать . Глаза весьма прилѣжно отъ воздуха и отъ всякаго свѣта беречь должно . Однакожъ часто всѣми сими воспрепятствовать быти не возможно , чтобъ глазъ , какъ гной въ немъ заблася , не треснулъ .

§. 306.

Весьма трудно бываетъ лѣчить глазную болѣзнь хроническою заблывшуюся (283) , а наипаче ту , которая отъ восны останется (285) . Ежели какая ни будь нечисть по всему нѣбу разсыплется , то въ такомъ случаѣ прежде всего эту нечисть приспойными лѣкарствами уврачевать надлежитъ . Почти при всякомъ такомъ злѣ полезны бывающъ декокны сассапарилле , хине , парреире браве , семинисъ фенікули . Припомъ на низъ производить лѣкарствами нѣсколько сильнѣйшими , къ чему способными признавающихся пилуле де сукцино Крапонисъ , или меркуріусъ дулцисъ и резина іалаппе смѣшанныя съ експрактомъ панжанаго Кролла . Въ пищу употреблять кушанье легкое и клейкое ; всежъ острое и кислое , также бодрость въ нѣбѣ производящее , не употреблять . При сей болѣзни надлежитъ дѣлать на плечахъ или на раменахъ или въ затылкѣ язвыны , отъ насъ источниками [фонікули] называемыя . Но никакого дѣй-

свищельнѣйшаго способа не находится, какъ то ежели ссучишь вѣспѣ нѣсколько нитокъ самыхъ чистыхъ кужелныхъ, и прорѣзавъ кожу въ запылкѣ продѣнешь. Сии нити въ язвинѣ оставленныя по дважды въ день проволакивать такъ, чпобъ всегда новая часть нитокъ задняя въ язвину вошла. Понеже нитки такъ продѣтыя кусаютъ, и бередятъ язвину и великое загнаиваніе производятъ. Такое дѣйствіе лѣкари сепумъ или сетацеумъ: по Россійски же заволокою называютъ, о кошоромъ дѣйствіи также и о источникѣ увидишь ниже. Ежели сими дѣйствіями облегченіе въ болѣзни дѣлается, то при концѣ употреблять надлежитъ глазное лѣкарство [колліріумъ] состоящее изъ нѣсколькихъ гранъ лапидисъ дивини и кроци мепаллорумъ. Глазной Медикъ Французской, С. VVECB, употреблялъ другое, которое самъ составилъ, и водою глазобольною красною, аква офталмика рубра, по Французски же [бружь] назвалъ, которое лѣкарство для разсыпанія оспашковъ я наиспособнѣйшимъ признаваю.

§. 307.

Ежели жѣлѣзы Мейбоміевы чирьеваты будутъ, и для того хрящики вѣковые будутъ краснѣть, и нѣсколько свербѣть, и будутъ тяжелы, и ночью отъ мокроты слипаться, что, какъ примѣчено, случается послѣ воспиной болѣзни, то все лѣченіе бываетъ напрасное, доколь чирышки не будутъ хорошо очищены. А то можешь дѣлаться, когда искусненько (лапиде infernali) или другимъ лѣкарствомъ прижигательнымъ, оныя будутъ помазываны. И чпобъ въ такомъ случаѣ сими лѣкарствами глазъ не попортишь, то сперва глазъ другою вещью помазать надлежитъ.

лежитъ. Полезна естъ маслъ Воолгузіева (унгвен-тумъ Воолгузіи). Оная составляется изъ яри вен-ціанской (флоре эрисъ) мышой и весьма мѣлко сперт-шой съ масломъ коровымъ несоленнымъ , или съ са-ломъ негустымъ смѣшанной. Ибо и сія маслъ къ излѣченію язвинъ способна.

§. 308.

Глазной болѣзни , которая бываесть отъ цын-готной или отъ французской болѣзни , лѣчитъ не бываесть способно , доколѣ порокъ въ сокахъ находя-щійся , и по всему тѣлу распространившійся , не будесть очищенъ. Толькожъ чрезъ частое примѣчаніе усмо-трѣно , что такимъ глазнымъ болѣзнямъ и отъ са-ливаціи той помочи не бываесть , которая ршущю про-изводится ; но часто случается , что когда оная саливація здѣлается , глазъ вожденіе имѣющій лопа-есть , или гораздо бѣдая мокрота плену роговую сбѣдаесть , и на ней сгруппя , зрѣніе глазное поврежда-ющіе , оставляесть. И тутъ не надлежитъ дѣлать зуси (298). Ежели зло здѣлается отъ удержанія гонореи , и оное будесть незастарѣлое , то все то употребить-должно , что вредную матерію внутрь вогнашь , и ядовитого гноя теченіе изъ дѣшродностей про-известъ можесть (124). Межъ таковыми вещьми счи-таются частыя произведенія нанизъ , шеренія , бани и припарки теплыя и смягчительныя къ дѣшрод-ностямъ прикладываемыя. Къ глазу прикладываесть можно тряпочки въ водѣ ранной (инъ аква вульнера-рія) съ водою феникуловою и попушниковою смѣшан-ной помачивая и выжимая. Также пособствуесть глазное лѣкарство (коллиріумъ) щущю въ себѣ имѣ-ющее , и которос злую матерію въ глазъ текущую

лонѣскольку удерживашь. Ежели мокрота острая, и глазъ бѣсть будешь, оную выжимками изъ сѣмянъ пидоннаго помазывать, или молокомъ шеплымъ вымывать. Такоужь лѣченіе потребно и въ главноѣ болѣзни, отъ цынги произшедшей.



ПОРОКИ ГЛАЗНЫЕ

отъ

ВОЖЖЕНІЯ ЗДѢЛАНШЕЯ,
ЯЗВИНЫ ПЛЕНА РОГОВОЙ.

§. 309.

Въ глазахъ бывають другихъ родовъ болѣзни, которыя почти всегда отъ вожженія дѣлаются, и когда ужь вожженіе со всѣмъ минуется, онѣ остаются, и пребудуть особливаго лѣченія. Отъ мокротной глазной болѣзни (277), ежели соленая и горячая слеза, или острая и бѣдая мокрота, печетъ, то въ пленѣ роговой чирышки дѣлаются, которые также побольше распалзываются, и самое зрѣніе портятъ. Обыкновенно же они почти всегда дѣлаются, когда къ глазамъ мокнущимъ прикладываютъ бывають вещи подавляющія, или пушащія, холодныя, спиритозныя, и глазныя лѣкарства (Коллирія) водяныя, холодныя, или острыя. Но какимъ бы образомъ глаза лѣчены ни были, хотя они завязываны и придавливаны будучь, хотя не закрываны, но такъ просто на холодной воздухъ и на великой свѣтѣ выставлены будучь, также хотя сильныя проносныя даваны будучь, то худая матерія острѣйшею дѣлается, которая роговую плену сжигаетъ и сбѣдаетъ. А что
на

на ней чирышки дѣлаются, оное попому узнать можно, ежели на ней нѣчто изъ чернова обло начнешь дѣлаться.

§. 310.

Также на роговой пленѣ чирышки бывають изъ прыщиковъ такихъ, какіе отъ ожоги случаются (228). Сія прыщики, которыхъ *Фликтайназ* называютъ, приподнявъ кожу (275*) плены роговой, а чаще приконцѣ оной, гдѣ плена прирослая кончится, бывають. Когдажъ прыщики прошкнутъся, то внутри ихъ находится язвинка цвѣтомъ съ мокротою своею сходствующая (*). Гдѣ какъ скоро сей порокъ примѣненъ будетъ, то должно поспѣшь и въ самомъ началѣ прыщикъ иглою, или инструментомъ (228. фиг. 6.) отворить, и мокроту въ немъ находящуюся выпустить, а чирышки свѣжіе легкими лѣкарствами довольствоваться. Весьма способна къ сему масть составляемая изъ пущи такой, которую часто раскаливая въ вино опускають и замаривають, а послѣ мѣлѣхонько трутъ, и съ саломъ какимъ нибудь смѣшиваютъ. Нѣсколько трубъ прибавить можно камеди, ш. с. [гумми арабии.]

(*) Смотри у АЛЕЦІА въ кн. 7 гл. 31 стр. 12г. Издан. Адамъ.

§. 311.

Язвинѣ таковыхъ много родовъ имѣется, которыхъ древніе предки наши различныя и имена подавали (*). Особеннаго рассмотрѣнія достойна язвинка оная, которую они *азуерсу* назвали. Сія по болѣшой часи изъ прыщика дѣлается (310) такого, которой въ нѣкакой часи конечной роговой плены, гдѣ она съ пленою прирослою спаивается, раждается, а язвина въ кружкѣ, гдѣ внутри ягодковая плева на плесу матерую наспилается, разпалывается (**).

Язвина

Язвина сія ежели поглубже опустится , и плену роговую сбѣспѣ , то повредишь волокна движеніе збѣниці дѣлающія , отъ которыхъ въ влажности водяной волнующихся , безперерывное прясеніе производитъ.

(*) Чирышекъ неглубокой и отъ ядовитой мокроты кожу , которою плена роговая покрывается , сбѣдающей збѣлавшейся , у древнихъ называется *αχλὺς* , то есть мракъ , туманъ. Сммотри у АЕЦІА въ кн. 7 въ гл. 27 стр. 127 изд. Алди. въ Коллекш. Г. СТЕФАНА стр. 308; Также смотри въ Книгѣ ГАЛЕНУ приписанной именуемой Медикъ въ Глав. 16: но сей авторъ это приключеніе кажется къ струпьямъ относитъ. у ИППОКРАТА въ Коакахъ Издан. Линд. Том. 1. стр. 578. та *αχλὺς* δεια. Также называются врачности отъ слабостей внутри наченъшихся , производящія , смотри у ДУРЕТА стр. 482. Отъ сего язвыны немного разнствя имѣетъ то *νεφέλιον* , смотр. у ГАЛЕНА въ Дефин. Т. 2 стр. 269. Издан. Хартер. и въ Медикъ на показ. мѣст. также у АЕЦІА въ показ. мѣст. Водруш есть язвина пустая , чистая и круглая. Кѣлшма есть обширная , не глубокая. Еукаума , или епикума [сн дѣ также АЕЦІЙ раздѣляетъ] язвина называлась нечистая , смрадная , и будто бы обожженная. Смотр. у ГАЛЕНА , АЕЦІА , ПАВЛА , сс. II

(**) Такъ описывается отъ ГАЛЕНА въ Медикъ на показ. мѣст. и отъ АЕЦІА на пом. мѣст. въ Гл. 28 издан. Алди. стр. 127. у Г. СТЕФАНА въ Гл. 26 стр. 303. Другое описаніе имѣютъ Авторъ Дефиниц. на показ. мѣст. стр. 265. и ЕРОЦИАНЪ въ Дикш. Т. 2 Хартер. стр. 113.

§. 312.

Сихъ язвинъ лѣченіе напрасное бываетъ , ежели сперва вожденіе не будетъ уполено , и солёныя и горючія слезы припомъ ѣдкой мокроты теченіе не будетъ удержано. И такъ никакого новаго лѣченія въ нихъ не требуется , только все то дѣлать надлежитъ , что бы злую матерію , которая въ глазахъ склонилась , употребивъ общія вспомоцствованія , отврапитъ , и чтобъ самой сокъ , ежели будетъ излишно или гораздо остръ , изъ глаза иечь , съ обѣихъ сторонъ стараться , чтобъ збѣлался умѣреннѣйшимъ

нѣйшимъ. Къ тому дѣйствиельными признаваюся кровопусканія, баночная кровь, и частое нѣтъ въ воду теплую спавленіе, переніе (296), испанскія мухи (297), припомъ давать и лѣкарства кровечиснипсельныя (296, 306). Но мнѣ кажется нѣтъ способнѣйшей помочи отъ этихъ язвинъ, кромѣ того какъ въковъ ξυσιν (298), то есть начеркиваніе оное, ежели не будетъ испорчено всего тѣла состояніе (283, 308), на глазу дѣлать да и нѣсколько разъ подновлять. Понемѣ симъ дѣйствіемъ: вѣдая мокрота отъ глазныхъ пленъ отворачивается, и въ вѣки приводится. Припомъ также надобно бываетъ кровопусканіе изъ глазъ [флеботомія: окули], ежели полнокровные сосуды изъ плесы приростой къ язвинамъ, приходятъ (299).

§. 313.

Но гдѣ уже вожденіе попушено и глаза начинаютъ подсыхать, то почти завсегда язвины добровольно заживаютъ. Однакожъ много имъ помочи придается, когда мазь Воолгузіеву (307) въ глазъ пускаютъ (*).

(*) Я думаю, что подлинно лучше, когда коллирія, то есть лѣкарства къ глазамъ пристойныя, съ мастью, а не съ водою дѣлаются. Понемѣ всякъ знаетъ, что вещи мокры и холодныя при всякомъ воженіи вредны, а еще больше всего, ежели и язвины тѣ, которыя лѣчить должно, мокры и гнойны будутъ. Изъ сего разумѣется, сколь вредны, оныхъ водныхъ глазныхъ лѣкарствъ сочиненія, которыя къ глазамъ больнымъ, безъ всякаго разбору, прикладываются. Гдѣ жъ мазь какую бы нибудъ въ глазъ впускали, надлежало, оное такимъ образомъ свободно дѣлать можно, пузырь мастью наполнить, и ниткою завязать, а послѣ нижнюю у него часть иглою проколоть. Когда же пузырь лѣкарства полный къ глазу приложится, и перстами подавится, то оное лѣкарство въ дырочку выдавится, и въ глазъ попадетъ.

III

§. 314.

§. 314.

Для очищенія же язвинъ скарденныхъ другія лѣкарственныя сочиненія надобны. Очень изрядна маснь красная [унгвенгумъ рубрумъ] называемая, копорая въ себѣ имѣетъ воскъ бѣлой чистой съ масломъ коровинымъ несоленнымъ расплennyй, съ нѣкоторою частицею ртути преципиации рубри. Или язвыны помазывать можно такою кисточкою, чпо живописцы употребляютъ обмакивая въ водѣ, въ которой камень божественный (лаписъ дивинусъ) распущенъ, или въ водѣ зеленой Гаршманновой [аква виридисъ Гаршманни] называемой. И сіе должно дѣлать полгоньку, и не часто, чпобъ новое вожженіе и новая слеза отъ такихъ бѣдкихъ вещей не дѣлалась.

§. 315.

Есть еще нѣкоторый язвинъ родъ, которыхъ Греки αἰγίδα или αἰγίδα, называютъ. Дѣлается отъ того, ежели густая да и многая мокрота съ глазами лѣкарствами въ глазъ пусканными спаяется, и на плевую роговую уязвленную осядетъ. Сія язвина прежде того излѣчиться не можетъ, ежели не размягчитъ, и какимъ нибудь желѣзцомъ или ножечковымъ черенкомъ, соръ не вычиститъ.

(*) Αἰγίς межъ нечистотами плены роговой отъ иппократа объявляется въ Пржедсказ. К. 2 §. 28 Т. 1. Линд. стр. 508 и въ Коакахъ на поманут. мѣстѣ. стр. 541, въ другихъ иппократовыхъ изданіяхъ имѣется. въ показан. м. αἰγίδες, ЛИНДЕНІЙ пишетъ αἰγιάδας. Αἰγιάδες плевы, или бѣловатыя струпы въ глазахъ значить. Смотр. въ Этимологиѣ великомъ стр. 28 и у Г. СТЕФАНА въ Тез. Греч. L. шутже смотр. и Диссерт. мою о фистулѣ слезной. Ибо αἰγίλοψ опшуду имя свое имѣетъ, что глазъ гноеватую влажность, которая изъ потекъ слезныхъ выходитъ, запакощенъ.

§. 316.

§. 316.

Плену или оболочку роговую временемъ не только язвыны портятъ, но и худые соки ее смягчають и одупловашою дѣлають, отъ чего зрѣніе также умаливается. Въ такомъ случаѣ къ масти изъ пущи здѣланной прибавить можно жиру яхиднина. Полезны еще пупъ куренія изъ олибану, мастихе и бензое, однакожъ и оныя въ глазъ толькобъ издадека доходили.



СТРУПЬЯ ПЛЕНЫ РОГОВОЙ ЦИКАТРИЦЕСЬ КОРНЕЮ.

§. 317.

Послѣ язвынъ надобно быть струпьямъ, которые, ежели случатся на пленѣ роговой, а она будеть свѣтлѣе, то зрѣніе пускнѣйшимъ дѣлають, а когда толстые бывають, то и вовсе зрѣніе портятъ. Чего ради стараться надлежитъ, ежели котораго струпа вовсе искоренишь не возможно, то попонѣ здѣлать. Толькожъ по вѣдомо, что невысокіе или неглубокіе и гладкіе струпья, ежели у младенцевъ случатся, помаленьку, со временемъ, попонѣ дѣлаются сами собою, чего у взрослыхъ никакимъ искусствомъ здѣлать не можно. Такое лѣченіе бываетъ долговременно и сумнительно или обманчиво, и неможно за него прежде приняться, доколь все воуженіе утолщено не будеть.

§. 318.

Ежели струпъ будеть свѣжій и непотертый, оный въ разрѣшеніе приводить, и вовсе искореняетъ
Ш 2 ЛБ.

лѣкарство изъ меду соспавляющесея. Сѣ медомъ можно муравьѣ много спереть, и сѣ нимъ или на солнцѣ или на сковородѣ сжарить.

§. 319.

Цара́ла ψις (*) или *Лерима* (***) есть струпъ желстой или досыщійся, который послѣ восны, или послѣ язвинъ впуканыхъ, остается. Такого никогда искоренить не можно, случася же иногда, а особливо у младенцевъ, что онъ понѣ дѣлается. А сіе по большой части для того бываетъ, ежели сверхъ густоты такая причина внутри будетъ, отъ которой, меншія плевочки, изъ которыхъ плева роговая соспавлена, одна отъ другой отдѣляясь. Гдѣ сіе примѣчено будетъ, то въ мѣсто, которое подъ низомъ пустое, иглою или прямою, или небольшою кривою, или инымъ, который особливо къ тому способенъ, инструментомъ фиг. 9. проколошь. Такимъ образомъ проколовши слодкъ плевочки приподнять, и сколь возможно будетъ отъ низу отзести. А въ глазъ пускашь и на струпъ прикладывать медъ сѣ муравьемъ жареной (318); при этомъ можно кисточкою помазывать, обмакивая въ водѣ сѣ камнемъ божественнымъ смѣшанной, или въ водѣ Гаршманновой, и послѣ сверху медъ прикладывать. Все сіе сѣ такою умѣренностію дѣлать должно, чтобъ новаго вожженія не произвешъ. Толькожъ не должно сихъ лѣкарствъ топчасъ отбрасывать, ежели они топчасъ не пособятъ. Ибо хотя только не множокъ отъ нихъ помочи будетъ, то можно надѣясь съ временемъ совершеннаго облегченія.

(*) Галенъ въ Толков. иппокр. Язык. Т. 2 стр. 99.

(***) Топъ же въ Деф. на пок. м. стр. 269 въ Медикѣ. стр. 592. АЕЦІИ на томъ ж. стр. 130. въ Код. СТЕФАНОВЫХЪ стр. 305.

НО

Н О Г О Т Ь

§ 320.

"Оиѣ", или унгвисъ. Ногошь, есть болѣзнь, которая кажется ошъ фигуры имя себѣ получила. Ибо сжали гной между маленькими пазухами, роговую плесень составляющими, сконипся, онаѣ болѣзнь ногошь, или ногошей подобіе въ себѣ показываесть (*). Онаѣ дѣлается отъ внезапной причины, и ежели глазь гораздо зашибеъ будещѣ. Она обычно бываеъ съ пресильнымъ воуженіемъ, при которомъ все же то и надобно, что отъ воуженія служиъ можеъ (305). Между такими способностями за полезное признаваеъся, кровь изъ жилы быющей на вискахъ пустить. Сіе хирургическое дѣйствіе въ самой скорости дѣлать, и гной изъ мѣста, гдѣ собрался, вонъ вывести надлежиъ. И такъ онымъ инструментомъ, въ которомъ теперь при истонченіи струпа я обьявилъ, или иглою, копорою подтѣкъ лѣчащѣ, прямо въ мѣсто приподнявшееся и внутри пустое проколотъ. Когдажъ до гноя доидеъ, то не мыжко иглу надобно наклонить и гной выпустить. И чѣмъ гной безъ препящивія вытекъ, надобно больному на брюхо оборотясь лежать. Ибо опасаться надобно, чѣмъ язва глубже и до внутреннихъ частей глазныхъ не прошла. Тутъ также надобны припарки отъ воуженія пособствующія. А прочее лѣченіе такоежъ быть должно, какое я въ другихъ воуженіяхъ (295, до 300) въ язвахъ (312, до 315), и въ струпахъ (318, 319) представилъ.

(*) Въ сихъ словахъ или именахъ превеликое недоразумѣніе имѣеъся, понеже оныя у многихъ авторовъ различной разумъ въ себѣ со-

Ш 3.

держатъ.

держанъ. Да и самые старинные писатели, на которыхъ надобно утверждаться, между собою несогласны. ЦЕЛСЬ въ Книг. 7. гл. 7. ч. 4. Греческое *πτερυγιον*, которое слово плешочку жильно-чувствительную, на плесу роговую нарастающую значить, и онъ дѣйствіе хирургическое описывая, унговъ ноготь или ногтемъ называетъ, которому послѣдовалъ и АГИНЕТИНЪ переводчикъ. Можетъ быть надлежалобъ читать унтула, копыто, что и ВООЛГУЗІЙ, кажется мнѣ, думаетъ. Понеже тѣмъ *πτερυγιον* почти тожде дѣлать есть, какъ на копытахъ у скотовъ. НАВЕЛЪ въ кн. 3. гл. 22. Изд. Гр. стр. 34. въ Колл. СТЕФАНОВЫХЪ стр. 436. *ὑπόπυον* такъ описываетъ, чтобъ оба порока и тѣ *ὑπόπυον* и *τοῦ ὀνύχα* могло въ себѣ заключать. Также неясная дефиниція иппіева и въ книгѣ ГАЛЕНУ приписанной, Медикомъ названной въ гл. 16, Т. 2, стр. 392. да и та также, которая подъ пишущомъ *πυώσεως* охватывается въ ГАЛЕНОВЫХЪ дефиниц. на помян. м. Но въ К. 14 способъ лѣченія въ Гл. 19. Т. 10. 343. ГАЛЕНЪ тѣмъ *ὑπόπυον* такъ описываетъ, что нимало съ ногтемъ и снѣжкомъ, смѣшиваться не можетъ. Понеже въ томъ мѣстѣ онъ приравняетъ къ подпѣку или каптѣ (μετὰ τῆ ὑποχύματος), и показываетъ, что былъ нѣкто глазной медикъ Юспъ именемъ, который при лѣченіи Иппіа, голову приподнималъ, и гнѣй на низъ сдвигивалъ. Но сѣ въ Иппіи такъомъ быть могло, гдѣ гной въ водной влажнѣсти плавающий, тяжель, и негораздо великъ, то опуститься можетъ въ то мѣсто, которое подъ зѣницей, а не въ ногтѣ, гдѣ гной бываеиъ межъ слоями плесы роговой. Ещежъ ГАЛЕНЪ представляетъ, что тѣмъ *ὑπόπυον* чрезъ дѣйство хирургическое и раздѣывая плесу роговую вылѣчивать можно. Но никто лучше тѣмъ *ὑπόπυον καὶ τοῦ ὀνύχα*, кажется АЕЦІА не раздѣлялъ, въ Издан. Греческомъ въ Кн. 7 гл. 30 стр. 127 и въ Г. СТЕФАНОВЫХЪ Коллекц. Тетраб. 2, рѣч. 3 гл. 28 стр. 309, который оба сѣи рода въ имени *πυώσεως* заключаетъ. Надлежитъ же да и должно прочитатъ самой писемъ Греческѣй, который здѣсь безъ всякаго сумнишества представляю, по-неже АЕЦІЕВУ книгу труднѣе другихъ найтись можно. *Αἱ γινόμεναι ἐν τοῖς ἔλκεσι πυώσεις, διαφόρῃ προσηγορίας τετυχηκασιν. Ονύχια μὲν γὰρ λέγεται ὅταν ἀπὸ βαθυτέρῃ ἑλκὸς το πύον ἀπὸρρέεν, καὶ μεταξύ τῶν χιτῶνον παρεμπέσον καὶ σχηματίζεν τῷ κύκλῳ τῆς ἰγῆως, ὁμοί*

μοί αν ονυχος ἀποτομῇ Φαντασίαν ἀποτελέσει, Πλείονος
 δε σισάντος πυρ. καὶ το ὕμισυ τε μέλανος ἀπολαβόντος.
 ἢ καὶ δι ὅλα τε κερατοειδῆς διαυγασμένα, υποπυον εἶναι
 λέγομεν τὸν ὀφθαλμόν, γίνεται δε ταῦτα καὶ χωρὶς
 ελκωσεος κεφαλαλγίας προηγησαμένης, ἢ ὀφθαλμίας,
 συμβαίνει δε καὶ Φλεγμονῆς προγεγεννημένης, διὰ τὴν
 πλείονα πλήρωσιν τῶν ὑγρῶν. ῥηγνυμένων τινῶν αγγείων.
 καὶ τῇ ἐξ αὐτῶν προχεόμενῃ αἵματος πυομένῃ. И такъ
 ὄνυξ ноговь называется то, гдѣ гной между слоями плевы ро-
 говой будеть стоять. Πτερύγιον есть плевочка на плевѣ роговой
 нарастающая; а понеже она на распростертое крыло фигуροю похо-
 дить, для того такъ и названа. А υποπυον есть то, когда гной
 стойтъ подѣ плевою роговою, гдѣ натурально бываешь влажность
 водяная, и по большой части дѣлается изъ крови внутри глаза изъ
 жилочекъ кровевозвращательныхъ вытеклой, и въ гной обратившейся.
 Другое же есть τὸ ὑπωπυον, которое значить подтѣкъ подѣ
 глазомъ здѣлавшійся, и когда кровь подѣ глаза подтѣклая, будеть сине-
 вата, то будеть видѣ τῇ εκχυμωματος, к чему сие также при-
 числили ГАЛЕНЪ о Сочинен. лѣкар. смотря по мѣстамъ. К. 5
 на пом. м. Т. 18, стр. 457 и ПАВЕЛЪ въ Кн. 4 гл. 30 въ Код-
 Греч. стр. 66, въ СТЕПАНОВЫХЪ Коллект. стр. 517. Обѣ немъ
 ИΠΠΟΚΡΑΤῆ упомянулъ пишучи о болѣзняхъ внутреннихъ въ Т. 2
 стр. 211. Но всѣ Изданія ИΠΠΟΚΡΑΤΟΥ въ семъ мѣстѣ неис-
 правны, развѣ только выразишь одно изданіе ХАРТЕРІЕВО. Т. 7
 стр. 647, понеже онѣ исправно написалъ: τὰ ὑπὸ τῆς ὀφθαλ-
 μὸς ὑπώπια ὡχρὰ. Ибо въ издан. АЛДІЕВОМЪ стр. 84 МЕР-
 КУРІАЛИСОВОМЪ въ Классѣ 3 стр. 63 и ФОЕЗІЕВОМЪ въ част. 5
 стр. 98. писано ὑπόπια. А ЛИНДЕНІИ справедливо написалъ τὰ
 υπωπια, но не знаю для чего пропустилъ, слова: υπο τῆς ὀφ-
 θαλμὸς. Однакожъ ФОЕЗІЙ погрѣшность свою кажется поправилъ
 въ Экономіи на стр. 642.

ИПО-

ИПОПІОНЪ

ГИПОПІОНЪ

§. 321.

Ипопіонъ (320) обыкновенно бываетъ съ жестокою горячкою, непрерывною, доколѣ глазъ или самъ не преснетъ, или лѣкарь не прорѣжетъ, и гной не выдетъ. Боль тутъ нестерпимая. Дѣлается, отъ которой безсонница и бредъ рождаются. Тутъ всѣ тѣжѣ причины бываютъ, которыя случаются въ отѣкѣ глазномъ (281). Ибо, какъ я выше объявилъ (288), ипопіонъ изъ отѣка дѣлается. Однакожѣ часто, причиною бываетъ дѣйство хирургическое при подѣлкѣ, или катарактѣ, ежели небольшая жилочка бьющаяся, или жилка кровезовращательная, въ оболочкѣ ликтосставной иглою или разрѣжется, или раздерется, изъ которыхъ кровь течетъ, а особливо много, то по нуждѣ она въ гной претворяется.

§. 322.

Ежели же крови не много выпечетъ, да и тутъ еще сквозь пленочку, сквозную, видѣть можно, то не надлежитъ потчасъ за ножикъ хвататься, но гораздо лучше сперва лѣкарствами опыждать. Ибо она въ кровь почти завсегда разбивается. Отъ того пособствуетъ кровопусканіе, довольно изъ жилы кровезовращательной яремной. Сверхъ того употребить припарку, которую сперва изъ вещей подавляющихъ (76, 292), а послѣ изъ разбивающихъ (79, 292) составлять. И въ семъ случаѣ какъ великой жаръ такъ и преизлишняя спужа вредъ дѣлать могутъ.

§. 323.

§. 323.

Ежели же такими способами кровь не разобьется, и ежели горячка съ болью еще будуще прибавливаться, то заранѣе за дѣйствительнѣйшее лѣченіе приниматься надлежитъ. Больнаго на особенномъ противъ хирурга сіпулъ посадить, въ покоѣ свѣпломъ отворотя отъ свѣту, а лѣкарю противъ больнаго нѣсколько повыше сѣсть; сзади помощникъ голову больнаго долженъ взять, и держать, чѣмъ не шаталась. Тогда взять обоюдный и долгоконечный и тонкой ножичекъ или ланцетъ. И чѣмъ кончикомъ, во время прорѣзыванія плены роговой, внутри чего не повредить, и новаго бѣдствія не здѣлать, на кончикъ положить пластырь, и онымъ обвернуть, который пластырь не допустить ланцету глубже надлежащаго проникнуть (*). Ножечкомъ же въ нижнюю часть такъ прямо пустить, чѣмъ не повредить внутри райка волокъ, отъ плены ликовосставной до самаго послѣдняго рубежа плены роговой протягающихся, и чѣмъ не пронуть плены роговой серѣдочки, съ боку зѣницы находящагося. Послѣ того надобно больному напередъ наклоня голову остаться. Ежели гной за густотою хорошо вонъ не поидетъ, то впусая ланцетъ въ топъ же разрѣзъ, поширѣ раночку здѣлать. Выпустивши гной, къ ранкѣ приложитъ мазь изъ туціи примѣшавши немножко балсама де Меха. А больше способнѣйшимъ бываетъ къ заживленію ранки бѣлокъ лишній. И что бы глазъ завязанъ будучи, съ вѣками не слѣплялся, надобно на лоскутокъ ипоненькаго пузыря мазь намазывать, и оный межъ вѣками класть (**). Сіе лѣченіе ежели во время предпріято будуще,

Щ

по

по попнась боль и горячку утоляеиъ, и глазу зрѣнїе даруеиъ. Ежели оиъ какой нибудь причины много крови въ глазъ напечениъ, и надежды не будеиъ оную разѣиъ, и чпюбъ она попрежнему въ жилочки вобралась, не мѣшкавъ, и доколѣ еще боль и вожженїе не здѣлается, такое хирургическое дѣйсвиѣ учиниши и кровь выуспиши надлежитъ (***).

(*) ВООАГУЗИ употреблялъ иглу проегранную, или прѣугольную. Смо при фигуру въ Диссертац. моей о фистулѣ слезной и у пр славнаго ГНЙСТЕРА въ хирургїи Т. 1, табл. 18 фиг. 13. больше къ сему способенъ ножичекъ обоудный.

(**) Надобно, чпюбъ пузырь былъ весьма поикой и выглаженной, и ковиъ бываеиъ въ книжкахъ золотоковныхъ, у кующихъ листовое золото.

(***) Смотр. примѣръ въ Іст. К. А. Н. 1702 года стр. 16.

XX

П Т Е Р И Г І У М Ъ

и

П А Н Н И К У Л У С Ъ.

§. 324.

Сѣ наружи нѣкоторыя зловедности на глазу нарастаюиъ, копорыя какъ до плены роговой дойдѣиъ, то оную портяиъ, и зрѣнїе глазное уменьшаюиъ. Изъ такихъ вредовъ числа есѣ пперигіумъ плевочка тоненѣкая, жильночувствительная, цвѣтомъ оиъ плены роговой не гораздо разнствующаяся, также нѣсколько прозрачная. Начинается по большой части оиъ части носдревой и оиъ мяса слезнаго, а оиъ стороны висошной не такъ часто, вырастаюиъ же доходитъ до плены роговой, и оную закрываеиъ.

§. 325.

§. 325.

Толщина большая бываетъ въ панникулѣ или въ паниѣ п. с. въ суконцѣ или въ сукнѣ, оно гораздо толсто, и многіе сосуды имѣетъ кровью красною начинены. А имя свое кажется получило отъ того, что почти со всѣмъ на сукно красное походитъ.

§. 326.

Оба сіи порока отъ соковъ родятся пѣхъ, которые изъ пробденыхъ глазныхъ плевъ текутъ, а отъ различныхъ съ наружи случающихся причинъ вырастаютъ. Ибо почти всегдашнюю причиною признается то, ежели въ глаза огонь или другое нѣчто острое попадетъ, или, когда онѣ болятъ, глазными лѣкарствами, бѣлками, оспрыми, и порошковатыми лѣчены бывають.

§. 327.

Сіи плены крѣпко на глазѣ держатся, и ежели застарѣются, то лѣкарствами не разбиваются, а ножичкомъ съ крайнею трудностью отпупливаются. Однакожъ сперва лѣкарствами отвѣдать надлежитъ, не какими другими, только пѣми, которыя при исполненіи спруповъ я представилъ (319). Ежели же сіи пороки лѣкарствами не излѣчатся, то оныя чрезъ операцію ножичкомъ надобно снять. Однакожъ къ такому дѣйствию спѣшить не надлежитъ, понеже дѣло сіе въ самомъ лѣченіи мучительное нѣчто въ себѣ имѣетъ, и рѣдко къ излѣченію и къ подаванію прежняго зрѣнія довольную поможь дѣлаетъ. Послѣ сего дѣйствія приключается великое вожденіе, для чего никогда сія хирургія совершенно не бываетъ безопасна, ежели глазная болѣзнь прежде не будетъ со всѣмъ излѣчена. Прищомъ и дѣлать операцію должно весною

или среди осени , когда уже лѣтній жаръ несиленъ будетъ , а холоды еще не начнутся.

§. 328.

КогдажѢ положено будетъ онаго лѣченія отвѣдать , то лѣкаръ за нѣсколько дней передъ тѣмъ прилѣжно на глазъ лѣчимой посматривать долженъ , а больному приказать въ то время глазъ туда и сюда поворачивать. Смотрѣть же надлежитъ , во время сего поворачиванія въ панникулѢ или птеригіи гдѢ нибудь не покажется морщинка , которая дастъ знать , что въ томъ мѣстѣ порокъ оной къ глазу не крѣпко держится. Ибо тамъ въ самомъ лѣченіи сперва плевочки захватывать надлежитъ.

§. 329.

Ежели же нарослое вырѣзать надобно , то больного на кровати навзничъ положивъ , и помощникамъ держать. Тогда иглою кривою съ ниткою навощеною въ оную панна и птеригія морщинку продѣлать. А продѣвши иглу положить , и взявъ за концы нитки , и такъ плевочку поднимать , глазъ же неподвижно держа въ должно инструментомъ , зеркаломъ глазнымъ (спекулумъ окули) называемымъ , и шпатель инструментъ другой пособщикъ наложивъ долженъ ; понеже инструментъ такъ названной помѣху дѣлать можетъ , то кажется лучше , ежели пособщикъ отведетъ верхнее вѣко , а лѣкаръ нижнее , между же тѣмъ больного увѣщевать должно , чтобъ глаза не двигалъ и не ворочалъ. Послѣ того должно плевочку приподнимать или ниткою , или крючкомъ острымъ , или другимъ вымышленнымъ , который *азахуопдіон* (Пашль д' Аранье) воолгузіи называютъ (*). Надобно же сіе съ умѣренностію дѣлать

ласть , дабы чего отъ глаза не отрѣзать. И для того лучше , нѣсколько плесочки оставить , что можетъ лѣкарствами искоренено быть , нежели плесочки глазныя повредить , которыя очень трудно лѣчить. Припомъ осперегаться должно , чтобъ изъ купка глазного мяса не вырѣзать , и чтобъ онаго , когда вырѣзываемое нѣсколько сильно птянуто бываетъ , съ тѣмъ вкупѣ не вытянуть. Ежели же вырѣзано или вытащено будетъ , то окажется въ купкѣ диро-чка , которою послѣ того завсегда мокрота будетъ печь , который порокъ *ῥοῦα* называется (**).

(*) Смotr. у ГЕЙСТЕРА Таб. 15 фиг. 30.

(**) Смotr. у ЦЕЛСА К. 7 гл. 7 §. 4 , у ТРАЛЛИАНА К. 2 г. 7.

§. 330.

Послѣ вырѣзанія панникула , или птеригіа , крови обыкновенно много печетъ , а наипаче когда панникулъ вырѣзанъ будетъ. Оной крови вовсе удерживать не надлежитъ , но только глазъ водою теплою вымывать и парить. Ежели же страхъ будетъ великаго вожженія , что почти завсегда случается , къ отвращенію того все спараніе лѣкарю приложить должно , и всякое вспомоцествованіе , которое наипаче отъ вожженія служитъ , дѣлать (292, 305). При великомъ такомъ несчастіи и *ῥοῦα* бываетъ не только надобно , но и для облегченія вожженія полезно. На ночь глазъ завязывать надобно , да такъ чтобъ межъ глазомъ и вѣкомъ нѣчто положено было , дабы вѣко съ глазомъ струпомъ не срослось. Съ начала приспойны бываютъ зѣрна Горминовы (298) , а послѣ того мазь Воолгузѣва (307). А чтобъ плена роговая еще прозрачнѣе была , полезно лѣкарство глазное (Коллиріумъ) съ крокомъ металлорумъ. Сахаръ въ стальномъ суднѣ тертый также полезенъ.

Щ 3

АНКИ-

АНКИЛОБЛЕФАРУМЪ.

§. 331.

Вѣки иногда одно съ другимъ не только гноемъ спаиваются, но и струпомъ срастаются, такъ что глаза отворить невозможно, такой порокъ Греки *αγκυλοβλεφαρον* называютъ. При которомъ и то случается, что вѣки съ бѣлкомъ глазнымъ, или съ плевою роговою, слипаются. Дѣлается отъ того, когда глаза долго, и безъ отдоху, въ глазной болѣзни бывающъ завязаны, или язвыны какъ на коньчикахъ у вѣкъ, такъ на внутренней ихъ оболочкѣ, да и на самомъ глазу не радиво были лѣчены.

(*) г. бартишъ въ *офтальмопедіи* въ ч. 2 гл. 7 стр. 185 упоминаетъ человека, которому се отъ ожоги приключилась. Вѣки чрезъ три года бывши срослыя на послѣдокъ разведены, и одинъ глазъ вылѣченъ.

§. 332.

Ежели вѣки во время глазной болѣзни и во время рожи (277), также въ воспѣ (285), однимъ гноемъ спаиваются, какъ я выше упомянулъ, то вредно быть можетъ скорое оныхъ отвореніе, ежели же отъ ранъ или отъ язвыны струпомъ сроснутъ, то должно ихъ не опуская времени развести. Это, что между вѣками и глазомъ кладется, иногда дѣлать можно спичкою, ежели вѣки не весьма крѣпко одно съ другимъ свяжешся, Еще можно отвѣдать, шелковищу мастью изъ пущи составленную намазавши, иглою кривою, тупою, или поворопя ушками, пѣмже способомъ продѣть. Это свободно дѣлать можно отъ ноздревой части, понеже въ большемъ и внутреннемъ кушкѣ почти всегда есть оспалая дырочка, и вѣки обыкновенно нѣсколько межъ собою не сходятся.

Оная

Оная игла вонѣ выпягивается ниткою за нею тяну-
щеюся, къ вискамѣ. Къ ниткѣ этой привязываютъ
съ низу шмапокъ свинцу, который такъ привѣшенъ
будучи и попихоньку шапачишь, нитку покрѣпче
выпягиваетъ— отъ чего вѣки наослѣдокъ одну отъ
другаго отдѣляются (*).

(*) смотри у Фабриція, ГИЛДАНА, Примѣч. въ Сопт. 3,
Примѣч. 7 стр. 502.

§. 333.

А гдѣ такимъ способомъ глаза отворить бу-
детъ не можно, то всунувъ надобно спичку неболь-
шую, въ длину яболобокъ имѣющую, по которому
ножечкѣ тоненькой и нѣсколько серповидной, и
тѣмъ вѣки разрѣзать и раздѣлить. Тожѣ самое ма-
ленькими ножницами закорюченными здѣлать можно.
Послѣжѣ сего лѣкарство приспособное приложить.
Весьма хороша масъ изъ туции, а къ ней нѣсколь-
ко бѣлсама де меха прибавить. И покуда глазъ бу-
детъ завязыванъ, чтобъ вѣки раненыя съ плесою ро-
говою, или съ бѣлкомъ глазнымъ, не слѣплялись, въ
глазъ должно класъ пузырь (323), тсюже масъю
намазанный; а межъ вѣками класъ можно маленькія
нишяныя свершочки, доколѣ ихъ болячки не окончатся.

§. 334.

Гжели же вѣко въ которомъ нибудь мѣстѣ съ
бѣлкомъ глазнымъ, или съ плесою роговою, сцепи-
лось, то также раздѣлить надобно. Сие очень хоро-
шо дѣлается маленькимъ ножечкомъ кривымъ, концѣмъ
тупой, а на концѣ булабочку имѣющимъ (*). Онымъ
полегоньку межъ глазомъ и вѣками такъ подрѣзывать
должно, чтобъ ни отъ вѣка, ни отъ глаза, ничего
не отрѣзать, и сжелибъ то понадобилось, то луч-
ше

ше отъ бѣлка глазного нежели отъ вѣка верхняго , понеже по оному меньшіе дукты слезные въ глазъ проходятъ. Ежели же вѣко верхнее съ плесвою роговою срослось , то сверхъ всего оную беречь. И такъ вѣко отдѣливши , лѣченіе пожъ самое употребить , которое я теперь представилъ. Смотрѣть же должно завсегда , чѣтобъ вѣки межъ собою опять не срослись , и чѣтобъ на глазъ не прилипли.

(*) Смотр. у ГЕЙСТЕРА таб. 15 фиг. 25.



Р А Н Ы.

Ву л н е р а.

§. 335.

Въ числѣ случающихся человѣку вредностей , суть раны. А раны то , гдѣ нѣчто части плохія а некрѣпкія , такъ ранишь , что изъ сосудовъ кровь , или другой сокъ будетъ печь.

§. 336.

Межъ раною и язвиною различіе есть. Рана завсегда склонна бываетъ къ излѣченію , а язва не сколько въ лѣченіи затрудненія дѣлаетъ. Понеже въ язвинѣ ропки перерѣзанныхъ сосудовъ такъ испорчены , что изъ нихъ доброй и къ ростѣнію свѣжаго мяса способный сокъ печь не можетъ , но тонкой , густой , или испорченной полугной , и иной сокъ. Чего ради всякая рана , легко язвиною здѣлаться можетъ. И язва залѣчиться не можетъ , ежели не получитъ такого состоянія какъ рана.

(*) У древнихъ Авторовъ , у ГОМЕРА въ Іліад. к. 11 стих. 311 , у ИППОКРАТА , τὸ ἔλκος хотя значить дѣльнаго разрушеніе ,
и такъ

и такъ значить рану вулнусъ, и язвину улкусъ. Однако новое различіе полагають между то трайма и то ёлмоу.

§. 337.

На всѣхъ частяхъ тѣлесныхъ, исключивши кости и хрящи, раны бывають.

§. 338.

Раны дѣлаются отъ всѣхъ вещей жесткихъ, которыя или тѣло раняють, или движенію тѣлесному сопротивляются.

Однакожъ рану надавить можетъ вещь и не весьма жесткая, напримѣръ, чипка напянушая. Также бывають раны, отъ излишняго жиленія, когда въ самой нутри тѣла рвутся плевы, или сосуды, или и то, когда плева такъ подступитъ, что сосуды перервутся.

§. 339.

Понеже къ множеству тѣлесныхъ частей жилы быющіяся, кровь въ оныя части раздѣляющіяся, принадлежатъ, то чуть не каждая рана кровава бываетъ.

Однакожъ рана можетъ быть безъ крови напри- мѣръ, когда плена роговая будетъ порѣзана, ежели одна только жила чувствительная, или сухая жила будетъ перерѣзана. Не весьма кровавы бывають и у младенцовъ.

§. 340.

Ежели рана будетъ несвѣжая и кровавая, да ужегносаваая, то она за чирей безверхушешной опворенный, или за язвину признаваться можетъ.

§. 341.

Раны какъ въ родѣ своемъ бывають различны, такъ и лѣчатся особенно. Понеже особливая рана
б
есть,

есть, которая только разрублена, и отъ копья или стрѣлы острой и разсѣкающей приключится, особенная же, которая еще пришибена, и отъ стрѣлы или отъ пѣла нѣкотораго тупаго, тяжелаго, сильно движимаго, или гораздо опирывающаго, будетъ придавлена. Особенныя еще раны дѣлаютъ нѣкоторыя вещи, которыя сѣкучи ранятъ, но при томъ части пѣлесныя и раздраютъ, какъ то стекло и шпага тупая; такія раны отъ ушибеныхъ немного отличны, и лечить ихъ пѣмже порядкомъ надобно.

§. 342.

При томъ раны одна отъ другой особенныя и великія разнствія въ себѣ имѣютъ. Нѣчто же и въ натурѣ части раненой имѣется. Итакъ иная рана есть на мышкѣ, иная на желѣзѣ, иная на жилѣ чувствительной, или на сухой жилѣ и на конченіи мышечномъ, иная, гдѣ конецъ шпажный великую и внутри сокровенную жилу быющую, жилу крововозвращательную и жилу чувствительную повредитъ. Немало въ себѣ заключаетъ и мѣсто. Ибо особливо надлежитъ разсуждать о ранѣ на головѣ, особливо о ранѣ на груди, на брюхѣ, на рукахъ и на ногахъ, на соснавахъ. Да при томъ раны и образомъ своимъ межъ собою разнствуютъ. Понеже рана бываетъ или великая, или шонкая, или уская, или на верхней части, или глубокая, и еще очень глубокая, и въ самое нутро проходитъ. Иногда рана бываетъ какъ линѣйка, прямая, иногда же кривая, наискось и круглая. Временемъ изъ раны бываетъ нѣчто вырублено, отчеркнуто, отперто, или изъ нее мясо по нѣскольку отрѣзанное виситъ. Также иногда въ рану нѣчто вошкнутое бываетъ.

§. 343.

§. 343.

Раны одна отъ другой отъмѣны, какъ для копей и пѣлъ, отъ которыхъ онѣ дѣлаются, такъ и для самаго раненія, и великаго или небольшого спремленія. Ну теперь я оставляю то, что о разсѣченныхъ и разшибенныхъ ранахъ предложилъ (341). Еще бываютъ раны порубкою, а другія колошьемъ, еще однѣ пробиваются пулями, параномъ и порохомъ, другія ядовитыя, и отъ ядовитыхъ животныхъ и отъ укусу обшесныхъ случающіяся.

§. 344.

Также иная рана есть, когда она свѣжа и кровава, иная, которая уже застарѣла, или худобѣсна, или дѣсна не была.

§. 345.

Притомъ бываютъ при ранахъ и другіе случаи обшественные, по которымъ и раны между собою различіе имѣютъ. Теченіе крови [сангвинисъ профузю], опухоль [шуморъ], рожа [эризипеласъ], опшѣкъ [флегмоне], анпоновъ огонь [гангрена], раздутость [эдема], надутость [эмфизема], жаръ или горячка [фебрисъ], боль [долоръ], жилъ чувствительныхъ напряженіе [нерворумъ диспенціо], расслабленіе [имбесиллитасъ], обомлѣніе [синкопе], блеваніе [вомитусъ], на низъ испражненіе [десціо]. Не рѣдко и другая вредность приключается, гдѣ кость съ раною или переломленная, или съ мѣста вывихнутая бываетъ.

§. 346.

А знаки раны простой разрѣзанной или порубленной, и которою не повреждена другая часть, только кожа, жиръ и мясо, сіи сунъ: по полученіи раны съ

начала ничего въ ней не будетъ видно : И потчасѣ край у раны межѣ себя маленько разширяется, понеже волокна по полученіи раны врожденною въ нихѣ жизненною и эластическою т. е. чувствительностною силою (31) скорчиваются, и понеже кровь изѣ пересѣченныхъ сосудовъ проскакиваетъ, и такѣ край одинѣ отѣ другаго разходятся. Проясняется кровь сперва, будто бы линѣчка красненькая, потомѣ она поширѣ дѣлается, и на послѣдокѣ изѣ раны явной и различувшейся, а при томѣ и изѣ раздѣленныхъ красѣ кровь пропекается. Кровь, по состоянію раны, когда нѣсколько времени потечетѣ, сама собою останавливается, понеже жилы бьющіяся перерѣзанныя въ себѣ самихъ будто вмѣсто собираются, да и сама кровь воздухомѣ одерживается. А по все дѣлается, чѣмѣ попихоньку успѣица жилѣ бьющихся и жилѣ кровевозвращательныхъ заперлись. И для того на концѣ уже негустая и красная кровь, но по большей части сокѣ тонкой, жидкой и бѣловатой выходитѣ.

§ 347.

На другой или на третій день, по состоянію раны, ранѣ или позже, обыкновенно приходитѣ воженіе: дѣлается небольшая горячка, которая начинается подираніемѣ кожи, т. е. ознобомѣ, послѣ чего жарѣ приходитѣ. Край въ ранѣ разпухаетѣ, съ немалымѣ свербежемѣ, болью и жаромѣ. Тутѣ перестаетѣ и воженіе и горячка, край у раны мокнути. начинаютѣ, и показывается загноеніе. По прошествіи воженія и горячки, гной производитѣ, состоянію и величинѣ раны приличный.

§ 348.

§. 348.

Но въ онѣй мокротѣ, которая изъ раны течетъ, и называется гной [пусъ], превеликое различіе имѣется. Съ начала, и какъ долго устьяща разсѣченныхъ сосудовъ будутъ еще вожженіемъ сжаты, то онѣй гной бываетъ жидокъ, и отъ мокроты называемой Саніасъ малымъ чѣмъ отлична. Саніасъ худая также изъ раны печь можетъ, ежели въ ранѣ будутъ нѣчто такое, которое въ печеніи сокамъ будетъ препятствовать, или что будетъ рану сдвинуть, да припомъ, ежели къ ранѣ и обвязка крѣпко наложена будетъ. Когда же устья сосудовъ отъ всего того будутъ свободны и отворены, то гной пойдетъ. Гной хорошимъ признавается, ежели густъ, бѣловатъ, гладокъ, ровенъ, и величинѣ раны припоенъ, ни чѣмъ не пахнетъ. Напоследокъ при заживаніи раны, онѣй опять не густъ, и не много бываетъ.

§. 349.

Отъ всѣхъ сихъ познать можно, что вожженію, и горячкѣ при всякой ранѣ непремѣнно быть должно, оными спекшаяся мокрота, заживанію ранѣ препятствующая, гноемъ дѣлается (38, 49). Однакожъ обоимъ тѣмъ должно быть умѣреннымъ.

§. 350.

А понеже въ придавленной ранѣ гораздо сокъ больше запекшійся бываетъ, и понеже часто въ онѣй ранѣ плотныя части бываютъ, вовсе разможденные и замерлыя, а и пому и другому въ гной обратиться, и отъ живыхъ и неповрежденныхъ частей отдѣлиться надобно, для того большее и вожженіе, и большее загнаиваніе въ такой ранѣ весьма нужно.

В 3.

§. 351.

§. 351.

Сей родъ гноя отъ вожженія дѣлается изъ недвижимыхъ, поврежденныхъ, протскающихъ, и замерлыхъ частей плотныхъ. А гдѣ рана уже очисти́на, или гдѣ со всѣмъ свѣжая будетъ, она уже производитъ сокъ такой, который по всему пѣлу раздѣлившись, части всѣ насыщаетъ, и состоитъ, какъ мѣ кажется, изъ крови и изъ сока питательнаго. И апостъ сокъ дѣкари по большей части къ гною причитаютъ, а его какъ начинанію такъ и натурѣ особливая, понеже изъ онаго мясо наростаетъ, которыми рана наполняется.

§. 352.

А струпъ будто нѣчто новое бываетъ; дѣлается же оный такъ: Когда кожа съ оболочкою сальною сросается. Ибо чрезъ примѣчаніе узно, что кожа свѣзнова не рождается тамъ, гдѣ уже единой пропадетъ. Изъ сего разумѣть можно, для чего струпъ или никакого или очень мало чувствъ въ себѣ имѣетъ, и для чего сквозь его никакой испарины быть не можетъ.

§. 353.

Кромѣ того имѣются нѣкоторые случаи, которые къ знанію ранъ принадлежатъ. Ежели изъ раны кровь, а особливо свѣшло красная, съ немалымъ стремленіемъ и такъ будетъ течь, будто бы она чрезъ насосъ съ перерывкою прыскала, то можно думать, что жила бьющаяся ранена. Ибо изъ жилы крововозвращательной великой, кровь равно течетъ. Ежели невеликая жила бьющаяся вся перерѣзана, та сама въ себя будто собирается, и мясомъ покрывается

ся и сплскивается , а изъ великой жилы бьющейся кровь такъ скоро течетъ , что , когда не тотчасъ и съ крайнимъ поспѣшентемъ тому пособлено не будетъ , вмѣстѣ съ кровью и жизнь выпечетъ . А копорые отъ теченія крови изъ большой жилы бьющейся умираютъ , тѣ передъ смертью обмираютъ , протѣгиваются , и такъ кончаются . Если же великая жила бьющаяся и жила кровезовращательная , напримѣръ плечевая или голенная ранена будетъ , то больной неможетъ быть безопасенъ , хотя бы кровь и удержать можно . Понеже въ удѣ ономъ антонова огня опасаться должно , ежели въ оной удѣ , одною тою жилою бьющеюся , которая ранена , кровь течь должна , чего ради , ежели мѣсто удобное будетъ , то должно удѣ отрѣзать (181, 182, 229 *).

§. 354.

А то другая причина будетъ , ежели бьющаяся жила не вся перерѣзана , но съ которой нибудь спорной порѣзана явится . Если жила бьющаяся малюхонько будетъ разщеплена , и изъ раночки кровь будетъ итти , то дѣлается аневризма подложная нецѣльная или ненастоящая (аневризма спуріумъ). Если же прорѣзано будетъ много , кровь съ великою опасностью будетъ течь , оную удержашь не легко можно , развѣ только жилу бьющуюся всю перерѣжешь , и она сама въ себя соберется . Также лучше вся перерѣзанная жила бьющаяся припискивается .

§. 355.

Если великая жила чувствительная перерѣзана будетъ , шутъ въ удѣ со всѣмъ поперяется и чувства и движенія возможность , и оной удѣ или Антоновъ огонь имѣетъ , или сохнушъ будетъ , или по меньшей

шей мѣрѣ въ ономѣ слабость великая останеся (186). Чувствительнаяжѣ жила, ежели не совсѣмѣ перерѣзана будещѣ, но однакожѣ ранена, или только ножечкомѣ ся пронуть, то въ ранѣ пресильная боль, вожженіе, Антоновѣ огонь, и по всему шѣлу жилѣ чувствительныхѣ напряженіе завсегда приключаетсѣ. Тожѣ почти случаетсѣ, когда сухая жила, кончаніе мышцы, плеча и иная часть какая жильночувствительная ранена, а особливо, когда въ послѣднихѣ рана не широка, но маленька будещѣ.

§. 356.

Гдѣ желѣзы ранены бывають, шутѣ дѣлаетсѣ великое вожженіе и боль, понеже и къ желѣзамѣ многія жилы чувствительныя принадлежатѣ. Рана въ желѣзахѣ непрестанно бываетѣ мокра, отѣ которой мокроты бываетѣ она гадка и язвиною дѣлаетсѣ.

§. 357.

Когда составы ранены бывають, въ томѣ случаѣ не только приключаетсѣ великое вожженіе, но и еще нѣчто онымѣ свойственное или собственное видѣть можно. Понеже потчасѣ потечетѣ много мокроты называемой ихѣр, гусиной, клѣйкой, бѣловатой, которую ЦЕЛСѢ (* меліхризѣ, ПАРАЦЕЛСѢ (*) варварскимѣ именемѣ сѣновіею назвалѣ.

(*) ЦЕЛСѢ Кн. 5. Гл. 26. §. 20. Другіе читають меліхризѣ: Ибо меліхризѣ инное значить, сѣе слово значить опухоль, въ которой мокрота, на медѣ похожая, въ собственной своей оболочкѣ бываетѣ. Смотри у Целса въ Кн. 7 въ гл. 6. Есть же еще меліхризѣ у ЦЕЛСА въ Кн. 5 въ глав. 28 §. 13 язвинки нѣкоторымѣ родѣ, который такѣ названѣ былѣ отѣ подобности соту пчельному, и оный язвыны родѣ между болѣзнями головными описывается, и атѣ тѣ киріѣ различаетсѣ, отѣ АЕЦІА въ кн. 6 въ гл. 60 стр. 116

изд.

изд. Греч. Понже такъ во всѣхъ старинѣйшихъ Изданіяхъ ЦЕЛСОВЫХЪ напечатано. А ЛИНДЕНІЙ кажется рѣчь сію перемѣнилъ, онъ поставилъ хируру.

(**) Въ Хирургіи женской. Кн. 1. гл. 6.

§. 358.

Многія же приключенія въ ранахъ глазами можно разсматривать, и чѣмъ въ околичности лучше оказались, тотъ часъ кожу, ежели она въ волосахъ, обрить, а кровь обтереть должно. Послѣ того въ рану перстъ всунуть, или спичку, и такимъ образомъ извѣскивать, какъ далеко проходитъ, и что или перстомъ или спичкою оцупается. Но сего дѣлать не можно, доколѣ опасность будетъ въ кровотеченіи. Надобножъ и такое изслѣдованіе дѣлать полегоньку, чѣмъ кровь опять не пошла, или чѣмъ боль и вожженіе не причинилось.

§. 359.

Гдѣ рана глубока будетъ, а оную изслѣдовать должно, то весьма надобно нѣкоторымъ образомъ шло згибать: Ибо надлежитъ больнаго такъ поставить, или такъ положить, какъ онъ стоялъ или лежалъ въ то время, когда онъ рану получилъ.

§. 360.

А рана въ мясѣ окончилась, или внутрь и до самыхъ внутренностныхъ частей прошла, и что внутри повреждено будетъ, то знать больше тотъ можетъ, который чрезъ рѣзаніе пруповъ, внутреннихъ частей положеніе, величину и порядокъ въ памяти своей содержитъ. Узнавши все сіе, еще нѣчто, ежели возможно, спросить должно: какимъ образомъ въ то самое время, когда человекъ битъ, оба стояли, и тотъ, кто раненъ, и другой, кто-

ы

рой

рой ранилъ; какой былъ палашъ или шпага, или какое копье, или что другое, чѣмъ человекъ битъ, какъ сильно и какимъ способомъ оное началось, здѣлалось, или предложено или замышлено было. Которые случаи всѣ къ совершенному распознанію ранъ много пособствуютъ.

§. 361.

А понеже, когда внутренности и внутреннія части ранены бывають, то оныхъ и должность повреждается, оное изъ сихъ признаковъ или припадковъ, напр. больности, безчувственности, паралича, рвоты, икоты, пруженія, знать можно, что внутри ранено. Тоже и мокрота изъ раны вытекающая, будетъ значить.

§. 362.

Чего же въ ранахъ бояться и надѣяться, и есть ли рана смертельна, или неисцѣльна, скоро ли можетъ залечена быть или не скоро, прежде всего врачу знать надлежитъ. А признаки такіе изъ трехъ обстоятельствъ заключить можно, изъ самой раны, изъ раненой части, и часть она къ жизни необходима, и изъ самага леченія, можетъ ли такое леченіе къ такой ранѣ прилично быть? Лечить еще не можно поврежденія частей, которыхъ распознать не можно. Понеже почти оными оканчивается она Медицины судебной часть, въ которой о ранахъ смертельныхъ споръ бываетъ.

(*) Въ Медицинѣ судебной подъ титуломъ ранъ многія другія поврежденія, черепа головного и костей переломы заключаются.

§. 363.

Того ради смертельною называется рана та, оной которой шло дѣйствіе, въ которыхъ жизнь завитъ

зависитъ , лишается . И такъ ежели будетъ ранено сердце , ушка сердечныя , великія жилы быющіяся , или жилы крововозвращательныя , которыхъ раны истребитъ челоуѣка теченіемъ крови могутъ , ежели горло дыхательное со всѣмъ перерѣзано будетъ , или преграды грудобрюшной внутренняя сухожильная часть ранена , ежели въ мозгу и въ можжечкѣ раны глубокія будутъ , и до самого мозга костнаго пройдутъ , или ежели мозгъ хребетнокостный перерванъ будетъ , ежели великія и къ творенію движеній жизненныхъ надобныя , жилы чувствительныя , при свсемъ начинаніи перерѣзаны будутъ , скорая смерть слѣдуетъ .

§. 364.

Можетъ также рана быть смертельна , которая сама собою будетъ казаться невелика , однако она будетъ внутри въ такомъ мѣстѣ , котораго лѣчить никакъ невозможно (*). - И такъ ежели внутри какія нибудь жилы быющіяся , хотя бы не гораздо великія , повреждены будутъ , изъ которыхъ кровь течетъ , или ежели немного крови изъ какой нибудь прорвавшейся жилы крововозвращательной въ головѣ , или въ другомъ мѣстѣ выпечетъ , а оной никакимъ искусствомъ вонъ взять не можно , то рана смерть влѣкаетъ .

(*) ради *адвуніау* къ лѣченію .

§. 365.

Сумнительны также бываютъ раны , которыми нѣкоторыя пріятелища , желудокъ , кишки (*), соки въ себѣ содержащія , такъ ранены , что изъ нихъ сокъ будетъ течь , оный послѣ пюго гнѣенія , и въ другихъ частяхъ антоновъ огонь производитъ , котораго ошваршишь никакъ не возможно бываетъ .

Ы 2

(*)

(*) Человѣка вылѣчить можно такого, у котораго желудокъ не на днѣ, но съ верхней стороны, проколотъ будетъ, также и у котораго кишка прорѣзана въ одномъ мѣстѣ и нег. раздѣ, и которую хирургъ глазами видѣвши можетъ. бывали въ нѣкоторыя времена вылѣчены и такіе люди, у которыхъ со всѣмъ кишка перерѣзана. О такихъ ниже будетъ объявлено.

§. 366.

Между же сими ранами смертоносными называемыми, нѣсколько различности имѣется. Понеже бываютъ нѣкоторыя раны, отъ которыхъ человѣкъ подлинно и безъ всякаго излѣченія умираетъ, и оныя въ Медицинѣ судебной точно смертельными называются. А другія по себѣ самымъ смертельными слышувъ, отъ которыхъ люди также умираютъ, однакоже не всегда, но по большей части такъ, что хотя сопой человѣкъ, а вылѣчивается. Сія раны, въ случаѣ приговоровъ, съ первыми равнѣ положить можно.

§. 367.

Раны же, которыя сами изъ себя не такъ худы, однакожъ отъ другихъ причинъ такъ худы бываютъ, что человѣку смерть здѣлаютъ, таковыя раны смертельными по случаю называются. Ибо сіе случится можетъ, ежели рана, хотя бы по себѣ самой несмертельная, вовсе пренебрежена или не сильно, или весьма поздно, или крайне не прилично лѣчена будетъ. Еще же когда больной непослушавъ будетъ, и себя не будетъ содержать, и воздерживаться отъ прихотей и страстей, не будетъ въ покоѣ себя держать, будетъ сыропости жрать, въ холодъ, въ жару, въ любодѣніи будетъ упражняться. Ежели тѣло уже отъ другой болѣзни въ безсиліе приведено будетъ, то человѣкъ такой временемъ отъ небольшого случая пропадетъ.

§. 368.

§. 368.

Также надобно и время разсуждать. Ибо ежели человекъ вскорѣ по полученіи раны умираетъ , то можно думать , что отъ той раны смерть приключилась , и рана смертельна была ; а ежели человекъ раненъ будучи , еще долго живъ будетъ , то иначе разсуждать должно. Однакожъ въ ранахъ ничего непремѣннаго опримѣнить невозможно. Понеже иногда нечто другое , напримѣръ великое въ головѣ беспокойство , человекъ къ смерти можетъ довести , а отъ того человекъ могъ бы живъ быть. А иногда еще раны бывають , которыя также по природѣ своей послѣ гораздо спустя смертельными дѣлаются (*).

(*) Смолр. Абр. ВАТЕРЪ Диссерт. о ранѣ мозгового фузейной въ семую недѣлю кончию смертельной , въ Вишненѣ 1722 года.

§. 369.

Также ежели человекъ во многихъ мѣстахъ будетъ раненъ , и раны хотя бы легко залѣчены были могли , однакожъ отъ множества оныхъ можетъ исчахнуть и умереть.

§. 370.

Гдѣ Медику и хирургу надобно будетъ до вскрытія тѣла мертвого судить о ранѣ доносить , то онымъ надлежитъ о многихъ вещахъ съ разсужденіемъ подумать. Прежде всего именовать судью , или кто бы онъ ни былъ , кто имъ то здѣлать опредѣлилъ. Означить убиваго имя и возрастъ или лѣта , и какъ онъ жилъ , въ какомъ мѣстѣ , въ какое время , какимъ копьемъ , и отъ какого соперника , онъ убитъ , что ему послѣ полученія раны случилось , и что сверхъ того въ немъ примѣчено , какую больную употребилъ умѣренность и воздержность , и какое отъ

Ы 5

врачей

врачей лѣченіе. Понеже все сіе, сколько отомѣ увѣдомиться можно, сперва означить долженъ. Также все тѣла состояніе описать надлежитъ и показати ранъ число, величину, глубину, а припомѣ какія какъ наружныя такъ и внутреннія части были повреждены. Надобножѣ пересмотрѣть и кровныя приятища, сердце и жилы какъ бьющіяся такъ и крововозвращапельныя великія, а то весьма надобно бываетъ въ такомъ случаѣ, гдѣ сумнительство есть, не печеніемъ ли крови человѣкъ изощолъ. Не должно же и того оставить, ежели нѣчто въ другихъ частяхъ, или внутренностяхъ, найдено будетъ, или болѣзненное, или излишнее. Сверхъ того обыкновенно разсужденіе о ранѣ прилагается, которое иногда при сумнительныхъ случаяхъ и собранію медицинскому представляющъ тѣловскрываетъ.

§. 371.

Ко всякой же ранѣ сіе принадлежитъ. Всегда рана худыяся признается пришибенная, нежели разрубленная, или разрѣзанная. Всякая рана въ части жильночувствительной, больше и чувствительнѣйшія бѣдствія имѣетъ. И знаки за нехорошіе признаются, ежели при ранѣ сильная будетъ горячка, превеликая боль, икота, и жилъ чувствительныхъ протяженіе, ежели помраченіе ума, и удѣ нѣкоторый невладѣтеленъ будетъ, ежели частыя рвоты и на низѣ испраженія больному покоя не будутъ давать, ежели больной будетъ имѣть поты холодныя, или не по всему тѣлу ровныя. Много также причиняетъ воздухъ, сложеніе тѣла, лѣтъ, житія состояніе и время годовое (60). Какія же бѣдствія во всѣхъ родахъ ранъ обыкновенно случаются, оное я ниже покажу.

§. 372.

§. 372.

Рана , ежели къ ней ничего худаго сверхѣ не приключится , натурально сама собою заживаетъ. При всякомъ лѣченіи ранъ лѣкарь ничего не дѣлаетъ , кромѣ того , что оно употребляетъ , которое препятствуетъ заживанью.

§. 373.

Рана заживать не можетъ , доколѣ не будетъ чиста. Чего ради прежде всего надлежитъ все излишнее вонъ взять , что въ рану попало , или изъ нее самой происшедшее въ ней держаться будетъ : копья , шпаги , стрѣлы и обломки ихъ , осинки отъ раздраннаго платья , кровь запекшуюся , части пришибенныя и замерзлыя. Сіи всѣ безъ замедленія вонъ вынуть надлежитъ , ежели что нибудь тому препятствовать не будетъ. А препятствовать можетъ крови бѣдственное теченіе , преизлишняя боль , великое возженіе , великая больная слабость , сіи всѣ или будутъ , или ихъ крайне опасаться надлежитъ. Часто же то , что внутри раны оспанется , и что такъ глубоко уйдетъ , что свободно захватить и выпачить невозможно , оно по прошествіи возженія , и когда здѣлается гной , изъ ослаблой раны само собою выйдетъ , или безъ трудности вонъ вынимается. Однакожъ временемъ случается , что въ ранѣ оставшееся возженіе , кровотеченіе , боль и другіе тяжкіе припадки производитъ , и для того все такое съ крайнимъ усиленіемъ всякими способами , и хотя бы съ нѣкоторымъ бѣдствіемъ вытаскивать надлежитъ.

§. 374.

Всякое же копье , или другое что , въ шлоу
вонъ

вонзенное, и внутри держащееся, вонъ вынимается, или перстами, или другими инструментами. Для выпаскиванія пульъ свинцовыхъ многіе имѣются инструментомъ роды. Ежели пуля въ кости стоятъ будещѣ, и клещами оной выпациить невозможно, то ее буравомъ просверливаютъ и вонъ вытаскиваютъ. Иногда должно бываетъ рану больше дѣлать, и рану къ ранѣ прибавлять. Ежели копѣя или стрѣла съ той стороны, откуда вошла, безъ страха выпациить будещѣ не возможно, и ежели больше такого мѣста будещѣ, по которому стрѣла назадъ ворочается, нежели которое прорѣзать можно, то лучше остальное прорѣзать, а прорѣзать оное прошивъ конца стрѣльного и шуда стрѣлу выпациить; такимъ образомъ и ближе оную достать, и безопаснѣе выпациить можно. Завсегда же смотрѣть того должно, чтобъ какой жилы чувствительной, жилы бьющейся или жилы кровезовращательной, или стрѣлою выпаскиваемой не повредить, или ножечкомъ во время разпиренія раны не порѣзать. А припомъ раненаго человѣка наклонять, и такъ ставить надлежитъ, будто бы онъ въ то время стоялъ, когда раненъ.

§. 374.

Ежели же рана пришибенная, безобразная и нечистая будещѣ, оную вычистить, чрезъ произведеніе въ ней гноя, въ который гной, запекшаяся мокрота и всякая въ язинѣ лѣченію препятствующая нечистота претворяется. Чиста бываетъ рана кровавая, которая бываетъ свѣжая и простая рана.

§. 375

Рану, отъ стрѣлы и палаши полученную, которая только будещѣ разсѣчена, и которая свѣжа, не
безо-

безобразна и не весьма глубока будеть, и къ которой сверху того ничего худого не приключится, гдѣ также ничего не опрувлено и не опорвано, можно безъ всякаго лѣкарства залѣчить. Запекшуюся кровь губкою съ водою теплою вытереть, и край у раны вмѣсто свесить. А сіе можно здѣлать пластыремъ, приложеніемъ съ обѣихъ сторонъ суко-нечекъ или связкою соединительною. Край у раны такъ сводить и стягивать должно, чтобъ они прямо одинъ противъ другого былъ, чтобъ струпъ безобразной изъ того не произшелъ. Много къ тому по-собствуетъ и наклоненіе и положеніе раненаго уда, и покой, который всякому больному раненому по-требенъ. Ибо край такъ сведенные всячески беречь и одинъ отъ другаго не разводить, чего ради и рана скорѣе заживаетъ, когда обвязка или вовсе неразвязы-вается или весьма рѣдко (*).

(*) Смотр. у ЦЕСАРЯ МАГАТА о нечастомъ перевязываній лѣкарства-ми ранъ, и у БЕЛОСТА въ Книгѣ называемой Госпитальной Лѣкаръ.

§. 377.

Рану же, которая разинулась, и у которой краевъ вмѣсто свесить ни обвязкою, ни пластыремъ клейкимъ, не возможно, сшить должно: Сшивать надобно рану свѣжую, кровавую, разсѣченную, и въ которой мышки поперегъ пересѣчены, или косую, и фигуною угловасную, или въ которой нѣчто гдѣ нибудь будеть висѣть, или рана на ранѣ будеть. А въ ранахъ, гдѣ кровь гораздо течетъ, копорая будеть пришибена, тноиста, или копорая чѣмъ нибудь другимъ вожденіемъ, ядомъ, будеть попорчена, сшиваніе не годится. Ежели рана такъ глубока бу-детъ, что ни иглою до глубины ея достать, ни-
 Ъ ни-

нишкою всего мяса захватить не можно, сшивка не-
надобна, понеже надобно будетъ внизу пустое мѣ-
сто оставить.

(*) Между сочиненіями, находящимися и извѣстными, есть Эи-
пластрумъ а. Круце, оной на крѣпкую и новую холщину намазывать.
Можно и изъ другихъ пластырей клейкой пластырь дѣлать, ежели
въ нихъ прибавишь шерстянину или смолы.

§. 378.

Когдажъ гдѣ надобно будетъ рану сшивать, то
нишку, копорая бы ошѣ мокроты гораздо не-
сѣлась, сперва обмочишь, вдѣшь въ иглу кривую, осп-
рую, вылощеную, ни: малѣхонько ржавчиною не-
сѣденную. Надобно, чтобъ ушки у иглы гораздо засло-
нились нишкою продѣною. Также нишка, смотря по
ранѣ, гораздо крѣпкая быть должна, однако мягкая, и
не очень суровая, чтобъ легче въ плѣш оспашься
могла, но понѣскольку навощенная. Понеже нишка тон-
кая и съ сукроватицами, кожу прорываетъ. Въ сши-
ваніи же раны не только кожу захватывать надлежитъ,
но кожу съ мясомъ, чюбы край съ исподи вмѣстѣ
сошлись. Не только же рану одну должно зашивать,
но съ обѣихъ сторонъ по нѣскольку и кожи, чтобъ
она не прорвалась. А игла, какъ сперва снаружи на
одномъ краю внутрь раны продѣвается, такъ на дру-
гомъ, изнутри раны вонъ высовывается. Иголою
можно лучше прошивать, ежели сперва край у раны
съ обѣихъ сторонъ руками сожмутся, и мѣсто, гдѣ
иглою прокалывать, чернилами назначаться. Когда же
нишка продѣна будетъ, то оную вмѣсто стянуть
надобно, и дѣлать то съ опасностью, а между
плѣмъ край у раны съ обѣихъ сторонъ припскивать
и вмѣсто сводить. Нишку завязывать надобно такъ,
чтобъ безъ трудности можно опять развязать, пере-
клады-

кладывая пупъ небольшие сверпочки , а оные изъ шолковой матеріи очень хорошо здѣлать можно.

§. 379.

Ежели рана будетъ велика , то оную въ двухъ , трехъ и въ четырехъ мѣстахъ сшить должно. А иглу всегда тамъ напередъ продѣвать , гдѣ рана больше разинулась , и ежели въ трехъ мѣстахъ сшить должно , то съ середины начать. Ежели же рана будетъ угловатая , то сперва уголъ прихватывать и исшивать надобно. Рану косую наискось и сшивать. Сшивокъ не долженъ быть рѣдокъ , понеже онымъ раны не укрѣпишь , также и не весьма частъ , ибо чѣмъ чаще пупъ будетъ продѣтъ , тѣмъ оно больше будетъ вѣсть , и боль и вожженіе причиняетъ. Когда рана наискось и такъ разрѣзана будетъ , что на одномъ краю кожи будетъ много , и будто бы обвисла , а на другомъ голое мясо , такую рану не можно хорошо сшивать. Иногда бываетъ лучше сшивкомъ всю рану захватить , ежели рана не гораздо широка будетъ , продѣвши подъ рану нитку , концы ниточные вмѣсто стянуть , и послѣ кожу наискось разрѣзанную , пряжею придавить , и сверхъ той пряжи нитки узломъ завязать.

§. 380.

Нѣкоторые употребляютъ инструментъ такой , котораго посредствомъ иглу наставляють и просавываютъ (Портсэгвилле) ; ПЕТИТЪ къ тому нѣкоторое кольцо выдумалъ (*). Только же и иглы не будутъ требовать такихъ инструментовъ , ежели онѣ будутъ хороши , онѣ также безъ трудности проходятъ.

(*) Смолр. у ГАРЕНЖОТА десъ Инструментъ Т. 1, гл. 6, арт. 2 стр. 208.

§. 381.

Ежели рана такъ будетъ широка, что ея кра-
свѣ въ мѣсто свести невозможно, и опасно, чтобъ сшив-
комъ кожи не опорвать, то сшивку пластыремъ клей-
кимъ подсоблять надобно; пластырь такой на рану
и сверху сшиваго класъ. Такіе пластыри на край у
раны прикладываютъ, и послѣ ихъ нитку продѣва-
ють и концы узломъ связываютъ.

§. 382.

Никакихъ лѣкарствъ почти не надобно къ ранѣ
такой, которая только разрѣзана будетъ и свѣжая, и
у которой край такою сшивкою въ мѣсто будутъ
сведены. Подлинно въ самую рану никакого лѣкар-
ства класъ не надобно, только на рану положить
пряжу сухую. Послѣ того рану обвязать обвязкою,
и не развязывать до претяго дня, ежели что раз-
вязки не потребуетъ. Въ то время надобно къ ранѣ
приложить лѣкарство живучее (383), и которое бу-
детъ отъ воздушнаго вреда предохранять. Однако же
и того въ рану не класъ. Когда спрунъ на ранѣ
здѣлается, то нитку выдернуть можно, да и то
также здѣлать надобно, придерживая перстами край
заклепленной раны.

§. 383.

Временемъ же рану нѣсколько пришибеную или
уже попорченную сшивать надобно бываетъ. А наи-
паче се дѣлается, ежели нѣчто отъ нее будетъ ви-
сѣтъ, чего одною обвязкою хорошо привесъ и въ
своемъ мѣстѣ удержать не возможно, или гдѣ опа-
сается на послѣдокъ надобно, чтобъ не здѣлался широ-
кой спрунъ. Въ такомъ случаѣ швомъ край такъ
сводить должно, чтобъ оныя плоско край съ краемъ
нссхо-

не сходилъся, и чтобъ мѣсто осталось, куды изну-
при мокроу вѣтлоу выпекать. Сію рану такъ
же чистить надобно, и для того между краями
класть надобно лѣкарства къ тому приличныя (387).

§. 384.

Всякая же рана, которая только будетъ разрѣ-
зана, непришибеная, только чтобъ у нее край све-
денъ вѣтлоу были, и отъ воздуха сохранена была,
или сама собою заживаетъ, или отъ прикладыванія
лѣкарствъ, которыя воздуху приходятъ не допуска-
ютъ. Понеже то генерально и ко всѣмъ, хоня бы
пришибенымъ, ранамъ касающееся скажется, что
весьма хорошо въ первый день, сухую пряжу къ нимъ
прикладывать. Въ лѣчении же раны непришибеной
много пособствуеи то, ежели нечаяно будетъ пе-
ревязывана, и край не будетъ нарочно расходиться.
Ежели же въ слѣдующіе дни, для отвращенія возду-
ха къ такой ранѣ прикладывать надобно что будетъ,
но можно на рану, а не въ самую рану класть,
подушечки или мочочки, помачивая и выжимая съ ка-
кимъ нибудь спиртомъ горючимъ, или пряжу нѣко-
торымъ бальсамомъ напримѣръ де Меха, Перувиано,
де Толу помазавъ. Весьма хорошо сіи бальсамы спер-
ва въ самую рану пускать, а сверхъ того на рану
другую корпю, въ водѣ ранной помоча и выжавъ
накладывать. Сверхъ сего еще класть воштанку, или
пластырь, надобно, который въ себѣ могъ бы по-
мѣтъ, чтобъ какъ обвязка держалась, такъ и воз-
духъ бы наипаче не прошолъ. По большой же части лѣ-
кари, къ такимъ ранамъ пластырь, спикшикумъ на-
зываютъ, накладываютъ.

§. 385.

Рана же пришибенная заживать прежде не можетъ, доколь не очистится. А сіе дѣлается тогда, когда кровь и другой сокъ, въ ней запекшійся, и копорымъ сосудцы пересѣченные и передавленные, также пришибенныя и замерлыя части плотныя, въ гной превращаются (350, 351). Къ тому способны лѣкарства гной производящія и сквашивающія. Изъ сочиненій лѣкарскихъ весьма знакомая мазь унгвендумъ дигестивумъ, которая въ себѣ имѣетъ шерпентинъ (живицу смолу) съ желткомъ яишнымъ разболпанный. Если рана на мѣстѣ мясистомъ будетъ, то въ ту мазь прибавить можно меду, понеже онъ къ произведенію гноя гораздо способенъ, а въ ранахъ на частяхъ жильночувствительныхъ, желѣзныхъ, сухожильныхъ и составныхъ не годится. Къ такимъ больше способны сукцинумъ, элеме, мастиксъ съ вещми гноепроизводными смѣшанные. А изъ сочиненій предъ другими мазями за наилучшее признается балзамумъ Арцее.

§ 386.

Къ произведенію и созрѣванію гноя и отъ кровенію раны немало пособствуютъ пластыри, сверъху прикладываемые. Изъ оныхъ пластырей первыми признаются, малакшикумъ, дѣахилумъ симплексъ и композитумъ.

§. 387.

Есть и другія въ сквашеніе приводящія сочиненія, унгвендумъ базиликумъ, маіюсъ и минусъ, изъ нихъ послѣдняя и петрафармаконъ т. е. прилѣкарственною называется, унгвендумъ де апіо. т. е. мазь изъ селлеровъ.

§. 388.

§. 388.

Гдѣ рана не весьма пришибена, да только чуть разодрана, такая безъ нѣкотораго загнаиванія заживать не можетъ. И такъ плоть погресбны лѣкарства, которыя не подавляютъ или не сушатъ, но понѣскольку однакожъ не весьма гной производятъ. Изъ таковыхъ почти за первое почитася, Балсамумъ Арцетъ, Балсамумъ Лукателли, Балсамумъ Самаритпанумъ, да и потъ, который составилъ Сталль, который въ себѣ имѣетъ эссенцію мирре и сукцинн, съ нѣкоторою частицею скипидара. А всѣхъ лучше есть аква вульнераріа (292). Въ мѣстахъ жильно-чувствительныхъ мирра неспособна, для чего ея очень маленько прибавлять должно.

(*) Сія такъ называемая эссенція не надобно дѣлать изъ спириту такого, который въ себѣ саетъ тартари. имѣетъ, понеже отъ онаго ранамъ очень больно бываетъ. Лучше то, чтобъ уже изъ дѣланной эссенціи большая часть спириту чистаго выдохлась. Сія эссенція, балсамическою называемая, безъ опасенія можетъ смѣшана быть съ другими вещами сквашиваніе или гной производящими. Въ числѣ *εὐπρόσιτα* можетъ почестся сыръ облыи свѣжій несоленый. Смолъ у Ланцизія о сердцѣ стр. 99.

§. 389.

О сихъ же лѣкарствахъ генерально то знать должно, что масла и другія вещи жирныя, гной производятъ и въ созрѣніе приводятъ могутъ, ежели же однѣ прикладываются, а инаиначе, когда заржавѣлая или згорклая будучь, то отъ нихъ гнилость дѣлается, и раны нечистыми и смрадными бывають. Для такой причины въ оныя шерпенинн, и другія вещи изъ земли произрастающія, въ которыхъ сокъ кислый имѣется, примѣшивается. Спиритъ горючій, и все, что бы нибыло, другое изъ онаго дѣланное, рану

рану сжимаетъ , удерживаетъ гнилость и загнаиваніе. Чего ради при ранахъ пришибенныхъ , и которыя еще неочищены , оный неспособенъ , и онъ новому воуженію , да еще и жесточайшимъ припадкамъ , причиною бываетъ. А гдѣ рана уже очищена , и оной надобно поскорѣе заживать , тупъ спиритъ чистой потребенъ . онъ рану ядерною или сухою дѣлаетъ. Терпентинъ также и балсамы оныя Экзотическіе де Ме-ха , Перувианумъ и проч. воздуха въ рану недопускаютъ , и ежели къ мастямъ въ гной приводящимъ прибавляются , и къ ранѣ чистой прикладываются , исподоволь волокна обадриваютъ , и сокъ производятъ , такимъ способомъ мясо питаютъ , и раны и язвы , гдѣ ничто выхвачено , наполняютъ. А гдѣ рана еще нечиста , то оныя не только за презлишіе признаются , но и вовсе нендобны , понеже оныя дѣлаютъ , что гнилое мясо будетъ выростать , и изъ раны дѣлается худая болячка.

§. 390.

Всякое лѣкарство , которое на рану прикладывать вознамѣришь , сперва на огнь погрѣть надобно , воздуха , какъ возможно , къ ранѣ не допускать , чего ради всегда , при перерезываніи ранъ , поскорѣе поспупать. Немало тупъ помощи дѣлаетъ жаровня угольями огненными наложенная. Понеже огнемъ и воздушный вредъ отвращается , и лѣкарства , которыми рану должно лѣчить , согрѣваются. Ежели рана очень испорчена будетъ , и въ ней много такого будетъ , что онаго одними вещьми гноепроизводными искоренить не возможно , то надобно употребить вещи сильнѣйшія , которыя сбѣдаютъ.

§. 391

§. 390.

Къ благополучному и непродолжительному лѣченію ничто такъ много не пособствуетъ, какъ прилѣжное примѣчаніе вожженія, которое обыкновенно при всякой ранѣ случается, и я выше уже объявилъ (38, 347, 349). Ипакъ во время сего вожженія и въ разныя его времена, согласное тому въ кушаньѣ и питьѣ содержаніе приказывать, припомѣ и лѣкарства какъ внутрь давая, такъ и снаружи прикладывая, пристойныя избирать. Ибо крайне опасаться должно, чтобъ вожженіе къ Ангионову огню не склонилось. Сего бояться можно въ ранѣ пришибено-раздранной, и которою мѣста жильночувствительныя сильно повреждаются, ежели по величинѣ раны, крови не много течетъ, ежели загнаиваніе будетъ удержано, и ежели отъ неводержности болящаго горячка и жаръ приумножатся. Не меньшежъ того вредъ дѣлается, ежели все вожженіе къ загнаиванію весьма нужно, будетъ испровержено. И такъ все, что выше о различныхъ родахъ вожженія и лѣченіяхъ оныхъ я объявилъ (28, до 83. 100, 101, 156, до 165) употреблять должно. Превеликая польза отъ вожженія бываетъ въ теченіи крови, о которомъ тогда сказать надобно. Также когда мѣсто жильночувствительное и протяженіе мышечное небольшою ранюю будетъ ранено, часто бываетъ надобно оную рану пошире дѣлать, безъ чего вожженіе не перестанетъ (44, 83).

§. 391.

Потомъ еще случается, что гной, которому бы надобно было вонъ вытекать, удерживается, и жилами кровезовращательными поглощенный съ дру-

В

гими

гими соками смѣшивается , который случай также тяжелѣ , и временемъ смертоносной болѣзни причиною бываетъ . Всякая вещь рану берѣдѣющая , и гною вонѣ выходящѣ , когда рана уже въ гной склоняется , препящивающаяся , человека всѣмъ тѣмъ злоключеніямъ подверженнымъ здѣлать можетъ . Сіе можетъ также иногда приключиться , ежели рана во много разѣ сложенными , и тяжелыми суконками , кнѣшниками и несумѣренно туго обвязкою будетъ придавливана ; ежели водка и другіе сильные и горячіе ликворы , и прочія вещи воспрія , подавляющія и вяжущія на верхѣ прикладываны будутъ : Ежели лѣкарства безъ подогрѣванія , да такъ холодныя , прикладываются , и рана самая отъ холоду сожмется , или на воздухѣ , который при всякихъ случаяхъ превеликую къ поврежденію силу имѣетъ , часто и долго безъ закрѣпѣи будетъ держаться : Ежели рана небудетъ вычищаться , и гной выпираться , понеже оный въ ранѣ оставшись оспрѣетъ и ѣдимъ здѣлается : Ежели въ то время , когда рана уже въ гной приходитъ , проносныя сильныя даваны будутъ , ежели тогда давнѣе жаръ производящее , или отъ чего другого , горячка здѣлается , или чрезъ употребленіе вещей испражняющихъ , прѣизлишно въ умѣренность приводящихъ и холодныхъ , вся горячка пропадетъ . А прѣсильную и вредную горячку можетъ здѣлать и кушанья , а особливо силу дающаго , прѣизобильность , отъ вина и любодѣнія невоздержность , прѣзблное оскорбленіе . Кромѣ того все то , что больного человека и слабого еще въ безсиліе приводитъ , къ сему много пособствуетъ , и больного часто до смерти доводитъ .

§. 392.

Есть же знаки нѣкоторыя , изъ которыхъ можно узнать , что гной поглощенъ. Когда рана , уже послѣ прошествія вожженія и горячки , опять начнеть пухнуть , шло опять сверхъ чаянія разгорячися , и вновь горячка здѣлается : Или , когда рана суха будетъ , и вовсе не будетъ пухнуть , и будто бы умерлою покажется. Еще когда изъ раны влажность нѣкоторая будетъ просядать , ежели оной будетъ немного да и па шонкая , ежели въ ранѣ цвѣтъ нехорошій будетъ , и потъ сизый , черный , или блѣдный или неодинакой , ежели больной въ разныхъ мѣстахъ ознобу чувствовати будетъ , о боли въ головѣ , и о ночной безсонницѣ будетъ жаловаться , или ежели горячка опять такъ сильная здѣлается , что человекъ пустыя мечтанія получитъ , и , когда говоритъ , будетъ брѣдить. Также еще , ежели безъ пути на низъ испражненіе жидко , и часто , а не такъ какъ обыкновенное испражненіе бываетъ , припомъ моча густа , и часто ее испускашь будетъ хотѣться.

§. 393.

Но сіи всѣ приключенія двоякое окончаніе имѣютъ. Понеже оныя ежели случатся сильныя , по безвременная и скорая смерть будетъ слѣдовать , такъ , что больной опъ крайняго безсилія и безчувства , или опъ сильной горячки , умретъ , или на него сухота нападетъ , и будетъ долъ и бѣдственнѣ мучиться.

(*) Смолр. ФАВДАКК. Рефлексіонъ сюръ де Платесъ. Глав. 8-стр 16.

§. 394.

Но больныхъ сихъ золъ можно избѣгнуть , ежели прилжно вожженіе будетъ примѣчено (390) , и ежели загнаиваніе не будетъ препятствовано. Ежели же

сіи случаются , гдѣ рана уже будетъ испорчена , то потчасѣ прикладывать надлежитъ вещи гной производящія , и сверхъ того припарки жидкія и пластыри изъ вещей умягчательныхъ , чтобъ чрезъ оное соки въ язвину попрежнему обратилися . Край у раны также по немножку надобно понадрѣзать ; а внутрь давать должно лѣкарства , которыя или противъ воженія служатъ (62 до 69) , или ежели нещастіе такое съ безсиліемъ будетъ совокупно , другіе , которыми помалѣхоньку въ силу человѣкъ вбирается (70). Въ самомъ же дѣлѣ и причинахъ гораздо между собою различествующихъ непремѣннаго правила уставить неможно.

§. 395.

Рана же когда краснѣется , и непреизлишне суха , или мокра , и когда натурально чувствительна , чиста . Ежели же изъ нее нѣчто будетъ вырѣзано , стерто и опрѣзано , оное полнымъ здѣлать . Но къ тому полезны лѣкарства , которыя тѣло кормятъ : изъ которыхъ первыми почитаются балсамы и съ ними мирра , однакожъ я объявилъ (388) , что она предъ другими въ мѣстахъ мясныхъ полезна . Сіи вещи въ маси гной производящія прибавлять должно . Припомѣ рану не часто , перевязывать и не гораздо обтирать надобно . Тогда начнетъ изъ раны течь инной родъ влажности , отъ котораго новое приращеніе произойдетъ (351).

§. 396.

Когдажъ въ какой нибудь ранѣ придетъ до наведенія струпа , оное очень хорошо дѣлается прикладываніемъ пряжи сухой , а еще ежели обвязкою нѣсколько пошуже будетъ обвязывано , которою на-
распа-

распающія мяса по нѣскольку припискиваются. Нѣкоторые прикладываютъ пластыри : спикпикумъ Кролліи, де лапиде Каламинари, де миніо; или нѣсколько въ спиритѣ винномъ помоча пряжу и сукончки, или накрапливаютъ поронкомъ гораздо мѣлкимъ изъ перпенсину варенаго, мастики, олибана.

§. 397.

Ради пригожства лѣчить должно, чтобъ струпъ конечно съ кожею сровнялся. Она я рана бываетъ не пригожа, когда край у раны не порядочно будучи вмѣсто сведены, или когда обвязку часто развязываютъ. Рана жолобоватую оспасаетъ послѣ пришибенія, или изъ которой нѣчто вырублено было, сія, и нечистая рана, или язвина бѣжими и прижигающими, еще же весьма сушащими и подавляющими лѣкарствами была залѣчена. Много еще пому прибавляетъ спарость и сухощавость. Струпъ нарастаетъ въ тѣлѣ неплотномъ, полномъ, сочномъ, молодомъ и довольнымъ кушаньемъ питаемомъ, а особливо ежели на рану прикладывано, отъ чего она весьма разслабляю дѣлается, т. е. въ гной приводящія, балсамическія, и сверхъ всѣхъ сихъ непугое обвязываніе будетъ.

§. 398.

Ежелибъ безобразной струпъ наведенъ уже будетъ, а больной для пригожства и боль и лѣчение вытерпѣть, вторичельно желаетъ, то какъ въ горбоватомъ такъ и въ жолобоватомъ оно излѣчить можно. Вверхъ вырослой ножечкомъ подрѣзать, или лѣкарствами такими искоренить можно, которые тѣло сѣдаютъ, между которыми первое мѣсто заслужилъ лаписъ инферналисъ. Жолобо-

Ѣ 3

вашь.

вапый ножикомъ надрѣзать и язвиною здѣлать надлежитъ, и на него прикладывать лѣкарства наполнительныя и пѣлопитапельныя, доколѣ рана съ здоровою кожею сравняется. А послѣ того шитъ новый струпъ навесить надлежитъ. Къ выравниванію струпа впуклаго пособствуютъ припарки, изъ воды и елею пепельхъ (226).

§. 399.

Что же до порядка въ приниманіи внутреннихъ лѣкарствъ касается, оныя только должны быть такія, которыя вожженіе въ умеренности содержатъ. Того ради всѣ лѣкарства избирать пропивъ сего и пропивъ горячки, ежели оная приключится, а припомъ примѣчать и раненаго лѣща, состояніе пѣла, обыкновеніе въ кушаньѣ и пипьѣ, и намѣреніе къ житію. Ежели рана будетъ велика, а по величинѣ шой, не много крови пекло, то опасаться должно вожженія, и для того весьма, надобно оной крови много убавить (62, 68). Того ради не увидевъ бѣдственнаго кровищенія, вскорѣ удерживать не надлежитъ. Слабительныхъ, ежели оное за надобное при вожженіи не усмотрится (63), съ начала лѣченія, когда гной производитъ надобно, никогда давать не надлежитъ, ежели же на низѣ испражненія не будетъ, то клистерами умягчательными, ослабить, и вонъ испражненіе здѣлать можно. Когдажъ рану очищеную къ струпу приводить будетъ надобно, то очень надобно нѣсколько покрѣпче проносное давать.

§. 400.

Очень за излишнія да еще и за вредныя признаются оныя декокты, называемые трауматическіе, которые по большой части изъ гораздо вязущихъ зельй составляются. Благоразумному медику разсуждать

ждать надлежитъ и состояніе тѣла , потому и лѣкарства давать , которыя у всякаго къ очищенію всѣхъ соковъ въ тѣлѣ человѣческомъ служить могутъ. Оныя надобны тогда , ежели при ранѣ и другая погрѣшность въ тѣлѣ будетъ , каковыхъ , скорбуя , Французская болѣзнь.

§. 401.

При всякой ранѣ съ начала воздержность крайне надобна (67), а послѣ ежели надобно будетъ рану наполнить , то въ кушаніи и питіи содержаніе маленько подовольнѣе полезно и оное должно , въ себѣ имѣть соки хорошіе.

§. 402.

Великаго также благоразсмотрѣнія въ воздухѣ требуется , понеже отъ онаго всѣ раны вредъ получаютъ . больше вреденъ воздухъ тяжелый , холодный , безмѣрно жаркой и вредипельными да припомъ нечистыми парами смердящій , каковъ въ великихъ врачбницахъ обыкновенно бываетъ . Вовсе , ежели здѣлать можно , отъ всякихъ мысленныхъ страстей воздерживаться должно . Такъ еще всѣ попеченія и замыслы , требующіе душевнаго безпокойства отбросить надобно . Припомъ тѣло , а особливо часть раненую въ покоѣ содержать надлежитъ . Блудодѣяніе во время большихъ ранъ ни когда безвредно не бываетъ , но часто смертоносно , какъ то чрезъ опыты познано (*). Больныхъ повсрачивать бережно надлежитъ , чтобы они послушны были , понеже къ благополучному ранѣ лѣченію такихъ случаевъ нѣсколько нѣжная осторожность больше пособствуетъ , нежели иностраныхъ , собранныхъ и великимъ искусствомъ составленныхъ лѣкарствъ употребленіе.

(*) Смотри ГОФМАННОВУ диссертацию о болѣзняхъ происходящихъ отъ прездышяго блудодѣянія. въ Гад. 1725 года.

КРОВИ

КРОВИ ТЕЧЕНІЕ.

§. 403.

Въ лѣченіи ранъ , какъ пѣхъ , которыя лѣкаръ получаетъ такъ , и которыя онъ самъ дѣлаетъ , часто опасность бываетъ , чтобъ человекъ кровью не изошелъ и не умеръ . А кровь или изъ малыхъ жилъ бьющихся и жилъ кровезовращательныхъ идетъ , или изъ великихъ съ бѣдствомъ хлынетъ . Гдѣ первое случится , что самое изъ невеликаго ея спреmlенія уразумѣть можно , и ежели бьющаяся жила не весьма къ сердцу близка , то лучше кровь не топчасъ удерживать , но попустить ей печь , чтобъ отъ того меншее вожжніе могло быть (234).

§. 404.

Ежели же кровь сама собою не остановится , и страхъ будетъ , чтобъ силы не потерялись , то ее должно удержать . Сіе дѣлается , или только приписаніемъ самой раны , или приложеніемъ разныхъ родовъ лѣкарствъ , или завязаніемъ бьющихся жилъ .

§. 405.

Въ ранахъ , которыя глубоко прошли , и которыхъ глазами прозрѣть не возможно , больной не всегда въ безопасности можетъ находиться , хотя бы казалось , что кровь остановилась . Понеже примѣчено что и сердечныя , и большихъ жилъ бьющихся раны иногда замираютъ , понеже въ нихъ запекающаяся кровь останавливается . Сія кровь запекающаяся послѣ того насильствомъ спреmlяющейся крови , ежели больной тѣло , или раненой удъ , подвинетъ , продолѣвается , и съ мѣста выпихивается , такъ , что опять пшечніе крови дѣлается , которое человека топчасъ

и

и кромѣ всякаго чаянія можетъ умертвить. Чего ради у тѣхъ людей, гдѣ внутренности и внутреннія части, ещежъ хотя въ удахъ небольшія жилы быющіяся, не далеко отъ пня, изъ котораго начинаются, или выходятъ, будутъ ранены, въ первые дни въ теченіи крови не можетъ быть безопасность. И для такой опасности надлежитъ кровное спремленіе воздержностію и покоемъ утолить, и кровь, смотря по величинѣ раны, ежели не много текла, прорѣзавъ жилу кровезовращательную убавить.

Смолр. у ле ДРАНА въ Т. 1. Примѣч. 49, 50, 51.

§. 406.

Весьма изрядно кровь останавливается приложеніемъ прѣжи сухой, и сверхъ того придавкою равномерною. Ипакъ рану оною прѣжею полну накласть надлежитъ, сверхъ же того, ежели надобно будетъ, многосложными, плотными и спеленными суконками и нѣсколько потуже обвязкою обвязать надобно. Однакожъ опасаться должно, чтобъ раны съ излишествомъ не стиснуть и не придавить, понеже чрезъ то ее къ Антонову огню склонну здѣлать, или гораздо къ лѣченію продолжительну учинить можно (17, 37.)

§. 407.

Ежели же мѣсто порубленное не весьма способно будетъ ни обвязкою обвить ни приписнуть, ни жилы быющей завязать, или ежели обвязка наложенная не вовсе крѣпко будетъ держать, и кровь изъ подвязяски будетъ печь, послѣднее шипъ вспоможеніе, или самую жилу быющуюся перстами, или ежели уже обвязкою обвязана, обвязку руками обнявъ пособщикъ придержать долженъ. Надобножъ, чтобъ смо-

Э

пря

пря по величинѣ раны, жилу быющуюся подолѣ, и часпо чрезъ нѣсколько часовъ, и всегда ровно припискивашь.

§. 408.

Надобно же и другія примѣчанія имѣть. Устья сосудовъ лучше запираются, ежели оныя съ боковъ припискиваются, нежели, когда имъ компрессъ [придавка] прямо противъ устья положенъ будетъ. Жилы быющіяся сверхъ раны припискивать надлежитъ, а жилы крововозвращательныя подъ раню, чему насъ жизненное соковъ окружное теченіе научаетъ. Да припомъ и въ припискиваніи семъ умѣренность имѣть надлежитъ, чтобъ чрезъ оное члена не потерять. Въ ранахъ случающихся на рукахъ или на ногахъ не мало пособствуетъ обвязка заверпышная, когда на пень жилы быющей обвязку заверпышную, или воротъ [пюркуларъ] пласкъ или заверпышъ [спленіумъ] обвязкою припискивать должно (245). Но и оными жилу быющуюся не такъ припискивать должно, чтобъ удъ антоновымъ огнемъ здѣлался пораженъ, но только чтобъ спременіе въ теченіи крови ушло лишь.

§. 409.

Изъ великаго числа лѣкарствъ, которыя противъ теченія крови дѣйствовать могутъ, мало имѣется безопасныхъ. Ибо нѣкоторыя лѣкарства мало могутъ, нѣкоторыя очень крѣпки, ежели къ мѣстамъ жильно-чувствительнымъ прикладываются, то жилы чувствительныя сильно бередятъ, припомъ вожженіе и великую горячку причиняютъ. А еще многія изъ нихъ силу ядовитую въ себѣ имѣютъ, которую во все тѣло распускаютъ. Сіе то часто бываетъ причиною, что раненымъ лю-

людямъ негораздо отъ великой раны приключаются
тяжкіе припадки, блеваніе или рвота, безчувствіе, жилъ
чувствительныхъ разслабленія, отъ чего онѣ иногда
скоро умираютъ.

Смотр. у ЛАНЦИЗИЯ о сердцѣ стр. 98.

§. 410.

Почти межъ всѣхъ родовъ лѣкарствами за на-
илучшее лѣкарство почитается (алкоголь вини) спи-
ритъ чистой винной, отъ котораго и успѣхъ у со-
судовъ сжимаются, и самая кровь удерживается. Отъ
него и рана нѣсколько въ другое состояніе прихо-
дитъ. Надобно же, чтобъ оной былъ здѣланъ безъ
болѣ. Въ немъ помачивается оная пряжа, которою
рана вся закрывается, и, какъ я уже объявилъ (406)
приписывается. Тоже дѣлать можеть скипидаръ,
(олсумъ перербиншине). А чтобъ онъ не такъ ѣдокъ
былъ, можно его смѣшать съ холодною водою,
или съ бѣлкомъ яишнымъ,

§. 411.

Устья сосудныя также связываютъ и соки изъ
нихъ текущіе удерживаютъ ликворы и спириты,
такъ называемые, кислые, изъ купоросу, а особливо
изъ квасцовъ, произведенные; онѣжъ ядять, прижи-
гаютъ, и струпъ наводятъ, чего ради послѣ упо-
требленія ихъ, недавно упомянутыя бѣдствія (409)
слѣдуютъ. Имѣется множество сочиненій отъ ЛЕ-
МЕРИ (*), ВЕБЕРА (**) и ПУРМАННА (***)
представленныхъ.

(*) Смотр. Курсъ де Химі стр. 504.

(**) Смотр. и его Анхорамъ Савіаторумъ стр. 124.

(***) Смотр. его Примѣч. Хирургическія стр. 263.

§. 412.

На пряжу къ ранамъ прикладываемую посыпаютъ порошки, называемыя спиппици, ш. е. кровь останавливающіе, или самыя собою, или съ нѣкоторою жидкостію смѣшавъ намазываютъ. Все такое, что завязываетъ и останавливаетъ, изъ вещей бываетъ прозябающихъ. Не много дѣйствуютъ радикалы симфити, иреосъ нострапи, биспорте, флоресъ балавстіорумъ, маликоріумъ, farina волатилисъ. Дѣйствительнѣйшія гумми арабикумъ, колофоніумъ, прагаканта, Сангвисъ драконисъ, терра японика, галле, опіумъ устумъ: изъ рудныхъ випріолумъ, алюменъ, а наипаче, сжели будущіе жженые. Капуть мортуумъ випріоли, зѣмли, имѣющія въ себѣ купоросъ, болусъ армена, лаписъ гемашитесъ, крокусъ марписъ, сахарумъ Сатурни, и другія изъ свинцу здѣланныя или произведенныя. Тѣхъ самыя порошки смѣшиваются также или съ спиртомъ, или съ другими ликворами называемыми, спиппическими. Но до таковыхъ вещей не слѣшно касаться, понеже и отъ нихъ рана гораздо можетъ поршиться (406).

§. 413.

Нѣкоторые на устья жилъ быющихъ прикладываютъ пулечки съ купоросомъ жженымъ, и пѣми нѣсколько туго припискиваютъ. А другіе желѣзомъ раскаленнымъ жилы быющіяся прижигаютъ. Отъ обоихъ такихъ способовъ струпъ дѣлается, копорымъ устья жилъ быющихъ запираются. Но оный струпъ, хотя бы кровь иногда чрезъ нѣсколько дней остановлена была, не рѣдко спремленіемъ ея прорывается. Гдѣ же изъ такъ прижженныхъ жилъ быющихъ опять кровь потечетъ, шумъ превеликая опасность бываетъ, понеже

неже жилы быющіяся гораздо разшириваются, которыхъ ни приписнуть, ни другимъ какимъ способомъ запереть бываетъ не возможно.

§. 414.

И такъ для остановленія крови, ежели она изъ которой нибудь жилы быющей хлынетъ, всѣхъ безопаснѣйшая помощь, жилы быющіяся, когда будетъ возможно, завязывать, а по можно здѣлать такимъ образомъ, подъ жилу быющую нитку иглою кривою, хоть маленькою продѣть, и концы оной нитки узломъ завязать (смотри. 242, 243, 244).

§. 415.

А что жилу быющуюся, ежели она будетъ надрубана, перерѣзать должно, чтобъ сама въ себя скорчиться могла, уже выше показано (354).

§. 416.

Гдѣ будетъ жила быющая великая плечевая или голенная перерѣзана, ежели довольно времени останется, то потчасъ обвязку завершешную наложить, и удъ отрубать должно (229).

§. 417.

Всякому человѣку, у котораго опасаться надобно печенія крови, очень надобенъ покой и воздержность. Всякія дѣла и всякое попеченіе въ сторону отложить. Пить давать воду, да и шу, ежели что не будетъ препятствовать, нѣсколько холодноватую, и кушанье умѣренное, отъ котораго тѣло не тучнѣетъ, но только довольствуется. Больному лежать надобно въ горницѣ темной всѣ окна зашворенныя имѣющей, и отъ всякой прескотни ошдаленной. Давать можно больному селитру, которая во первыхъ попребна бываетъ, гдѣ жилы быющіяся скоро быются. Поль-

зують также клистеры, изъ сыворожки малошной съ селитрою, нѣсколько холодновато ставленные. Вяжущихъ или завязательныхъ или закрѣпныхъ внутрь лѣкарствъ не принимать. Ибо къ одержанію печенія кровнаго не много пособствуютъ, и не рѣдко, ежели мало-сильнымъ людямъ даются, во внутренностныхъ частяхъ худо дѣлаютъ (400). Иногда кровь отъ раненаго мѣста отворачивать можно, чрезъ кровепусканіе изъ жилы кровсвозвращательной въ противной ранѣ споронѣ. Но объ этомъ крайне разсуждать надобно, ежели кровь убавлена будетъ, чтобъ тѣла безмѣрно не истощить, и всей бы къ житію попребной силы не погубить. Гораздо безопаснѣйшее дѣло есть, на противной споронѣ банку поставивъ, и туда теченіе кровное склонить.

§. 418.

Ежели же кровь утолщится, а человѣкъ, всю силу потерявши, будто бы мертвой лежалъ, что до покоя касается, пошже наблюдать должно, о кспоромъ теперь сказано. Однакожъ съ первоначалія больного отъ сна удерживать, хотя при такомъ обезсилѣніи самый осповъ, п. е. со всѣмъ высохлось [маркоръ], и непреодолимая къ сну охота обычно случается. Въ такомъ случаѣ кормить больного надлежитъ похлѣбкою съ цыплятами какими нибудь вареною, или съ другимъ мясомъ молодымъ. А чтобъ незапно тѣла множествомъ кушанья не опягошить, то почаще и понемножку похлѣбочки давать. Понеже ослабѣлая внутренности, не только чего стягостнаго, но и такой сочности понести или сварить не могутъ. Отъ чего рождается недоварность, а часшо, ежели пища въ слабыя легкія придетъ, опасноснѣе

снѣсть, чѣмъ безъ временно больной не задохся. Гдѣжѣ страхъ будетъ, чѣмъ кровь опять не прорвалась, вредныя также можетъ теплота, чего ради больному уже простуженое давать можно. Въ семъ случаѣ всѣхъ и вещей жаръ производящихъ, и крѣпительныхъ или ободряющихъ не употреблять, и что между оными за первѣйшее почитается, вина ренскаго хорошаго (204). Вина такого понемножку давать можно, гдѣ вновь теченія крови никакой опасности нѣтъ. Сверхъ того когда человѣкъ нѣсколько въ силу прилетѣ, никогда многимъ кушаньемъ и силу прибавляющимъ ненадобно его опягощать, но понемножку и легкимъ кушаньемъ кормить.



АНЕВРИЗМА

§. 419.

Всякому извѣстно, что Аневризма часто дѣлается отъ ранъ жилъ бьющихся. Такой опухоли двасусть рода, одинъ изъ нихъ подлиннымъ или настоящимъ, другой подложнымъ или неподлиннымъ называется. Подлинная Аневризма называется, гдѣ жила бьющаяся не ранена, ни прорвана, но цѣла, и гдѣ она, или вся, или нѣсколько, гораздо распянута будетъ и расширена, а при томъ оная кожу и другія части, подъ которыми лежитъ, опухолью дѣлается.

(*) Расширенная жила бьющаяся Аневризму настоящую, жила кровезавращательная расширенная напряженіе жилъ кровезавращательныхъ, расширенная жила пасочиковозавращательная пузырь водной дѣлается.

§. 420.

§. 420.

Аневризма подложная есть опухоль, которая дѣлается отъ крови, изъ жилы бывшейся раненой и проколотой выпеклой и подъ кожею собравшейся.

(*) Ежели кровь изъ жилы кровезовращательной такъ защищенной подъ кожу зальется, то дѣлается *ἐκχυμωσις*.

§. 421.

Аневризма подлинная чаще случается въ частяхъ внутреннихъ, а неподлинная въ рукахъ и въ ногахъ.

§. 422.

Аневризмы подлинной и еще незастарѣлой знаки сїи суть: Опухоль будещъ круглая ровная и высоковавшая, которая какъ перспомъ подавится, то маленько ондается, и въ которой боль бываетъ всегда ровная. Опухоль послѣ какого нибудь удара, послѣ нѣскольکو напужнаго жilenья, и другой нѣкоторой причины полегоньку начнетъ подыматься, и какъ выросшетъ, то сильно бьется (*). Внутри же случающіяся Аневризмы, не такъ легко познавать можно. Подозрѣнїе можетъ производить пульсъ весьма неровно быющійся; а особливо ежели оный въ нѣкоторомъ мѣстѣ въ груди будещъ чувствоваться, дыханїе трудное, чувствованїе нѣкошорой пошайной болѣзни, необычная нѣкакая шоска.

(*) Пульсъ почитается, говорятъ, за знакъ паѳогнической, т. е. шочный и непреложный Аневризмы, а особливо подлинной или настоящей. Однакожъ иногда случаются и чирви къ жиламъ быющимъ блискіе, также почти бьются, какъ бы Аневризма. Тожъ случитъся можетъ въ *ἐκχυμωσις*. Ибо ежели напимѣрь, крови пусканіе изъ руки не благополучно удастся, и сухая жила или пропѣженіе мышечное мышцы двуглавной повреждено будещъ, и кровь подъ кожею соберетъ, и вожженіе произведетъ, скорчивается проши-

протяженіе или конченіе мышечное и сухая жила сильно, сплскивается или сдавливается оными лежащая подъ ними жила бьющаяся, которая какъ прооненя и поднимется, то также и ая опухоль приподнимется, чѣмъ такимъ будто бы аневризма обманетъ; смотр. у ЛАНЦИЗИЯ стр. 101. Онъ для того погрѣшность РИВЕРІЕВУ въ Примѣч. стр. 685. представляетъ, что риверій такую Эхимосиѣ, которая на послѣдокъ въ тѣной обратилась, за аневризму почиталъ. Можетъ же иногда и то случиться въ опухоли застарѣлой и окрѣплой аневризмы настоящей, только не всегда, что когда кровь въ опухоли прумножится, то она опухоль, а особливо будучи наружная, на послѣдокъ крѣпнетъ, а когда еще и кожа окрѣпнетъ, временѣ же почти роговою дѣлается, пульса чувствовать обстоятельно бываетъ невозможно. И для того поприлѣжнѣ всѣ признаки разсматривать и разсуждать надлежитъ, понеже въ такихъ случаяхъ и искусѣннѣе люди легко обманываются.

§. 423.

У Аневризмы неподлинной, опухоль бываетъ съ начала небольшая, послѣ, какъ подрастываетъ, бываетъ больше жестока, плоска, а подлѣ кожи широка и неровна. Меньше бьется, какъ настоящая Аневризма, однако же въ ней будто бы нѣкоторый потасанный прескъ чувствуется. Наконецъ опухоль вырастаетъ и въ непродолжительномъ времени къ Антонову огню склоняется, а что онъ будетъ, то кожа сизая и багровая или чернѣющая окажется. Если Аневризма ненастоящая на рукѣ случится, гдѣ она гораздо часто случается, отъ нещастливаго кровопусканія, то опухоль до самаго плеча доходитъ. Понеже въ низу плечу препятствуетъ оное распространіе мышцы двуглавной.

§. 424.

Подлинная или настоящая Аневризма отъ различныхъ причинъ дѣлается. Понеже бьющаяся жилы разпаваются, какъ въ внутреннихъ, такъ въ наружныхъ частяхъ, отъ сильного жиленья, и движе-

Ю

нѣя

нiя , пожѣ самое случитѣся можетѣ отѣ блеванiя , отѣ трудныхѣ родовѣ , и отѣ другаго силѣ потерянiя , или отѣ излишняго удовѣ напряженiя и нѣкоторыхѣ частей придавленiя. Ибо ежели кость переломлена или вывихнута , дитѣ косяная и другая опухоль жилу быющуюся большую давишѣ , то она прежде опухоли растягивается. Тожѣ еще случается , когда плевѣ жилѣ быющихся , отѣ близѣ находящагося чирья безверхушешнаго , или отѣ язвыны , и изѣ оныхѣ отѣ выходящей мокроты , мокнутѣ и расслабѣваютѣ. Часто Аневризма въ жилѣ быющейся начальственной дѣлается , когда каракатица въ сердцѣ бываешѣ , отѣ которой движенiю кровному препятствiе дѣлается. Тоже еще случается , когда какая нибудѣ жила быющаяся , а особливо въ то самое время , когда она отѣ вникающей крови расширяется , сильной и незапный ударѣ получишѣ , что самыми опытами изслѣдывано (*). Немало тому причиною бываешѣ худое пѣла сложенiе , и ежели человекѣ долговременною болѣзнию и худымѣ содержанiемѣ въ кушаньѣ и питьѣ поврежденѣ будешѣ. Ибо ежели соки въ пѣлѣ человеческомѣ будущѣ попорчены , то волокна и всѣ плотныя части , а припомѣ и оболочки жилѣ быющихся безильными и слабыми дѣлаютѣ (**).

(*) Смотр. у ЛАНЦИЗИЯ на пом. мѣст. ст. 108. и у ЮАННА НИКОЛАЯ ГОЛТОРФА въ Диссертаци о Аневризмѣ въ головѣ у мальчика одиннадцатилѣтняго въ Аргент. 1722 года.

(**) Сiе многими опытами доказываетѣ ЛАНЦИЗИЙ на пом. мѣст.

§. 425.

Но сiе случается не только отѣ порчи оныхѣ оболочекѣ , изѣ которыхѣ самыя жилы быющiяся соспущѣ , но Анастомiя учитѣ , что многiя жилы быющiяся

щіяся имѣющіе другіе обвои и одѣянія отъ близъ находящихся плевъ , которыя ихъ такъ обнимающъ , и сжимающъ , что крѣпость ихъ и врожденная сила непомалу отъ того пріумножается. Въ груди великія жилы быющіяся обхватываются плевою отъ околосердечной сорочки произшедшей , другія плевою подреберною одѣваются , въ брюхѣ плевою брюшинною , въ рукѣ и въ ногѣ разширеніемъ мышечнымъ. А гдѣ такія плевы отъ какой нибудь причины повреждаются и расслабнувшъ , шутъ всегда мѣсто Аневризмъ сыщется.

§. 426.

Въ плечѣ сіе обыкновенно бываетъ , ежели ножечкомъ , или другимъ какимъ способомъ , повреждена , прорѣзана или расслаблена будещъ пропаянность мышкы двуглавной.

§. 427.

Но въ томъ есть нѣкоторое различіе. Ибо временемъ вся жила быющая разширена и распянуша бываетъ , а иногда , и особливо ежели жила быющая на кости или на другой какой части жесткой будещъ лежать , только внѣшняя ея часть , такъ , что на ней опухоль килѣ подобная здѣлается.

§. 428.

Аневризма неподлинная или несовершенная дѣлается часто отъ проколотой жилы быющей , а по почти всегда случается , когда Лѣкари кровь пускающъ на рукѣ изъ жилы кровеовращательной владѣтельной (базилика) , подѣ которою жила быющая плечевая лежитъ. Временемъ жила быющая со всѣмъ прерывается. А то , какъ извѣстно , случается иногда отъ сильнаго протяженія костей локошной и лучевой будучи вывихнутыхъ.

Ю 2

§. 429.

§. 429.

Подлинная Аневризма не такъ скоро вырастаетъ. По времени, какъ опухоль выроснетъ, и жилъ бьющихся плены, и съ оными близъ лежащія части испорчятся, то часто начинаетъ изъ нея проседасть влажность такая, коюрая здѣлавшись острою, все, что ни случится въ близи, будетъ бѣсъ, да и самимъ костямъ вредъ здѣлаетъ. Поневже опухолью пасочные сосуды придавливаются и прорываются, а особливо во внутреннихъ мѣстахъ много мокроты выпекаетъ, каковѣ не рѣдко въ груди найдена. А послѣ того жила бьющаяся прорывается, и человекъ или шененіемъ крови изойдетъ, или задохнется безвременно. Въ жилахъ бьющихся по рукамъ или по ногамъ идущихъ опухоль, ежели свѣжая и не очень великая будетъ, однимъ придавленіемъ излѣчить можно, ежелижъ она уже застарѣетъ и затвердетъ, то ножъ употребить должно. Однакожъ такое рѣзаніе не всегда безопасно быть можетъ въ жилѣ бьющейся плечевой, ежели она не будетъ раздвоенная. Чего ради для Аневризмы часто цѣлый удъ опрѣзывать принуждены бываемъ. Въ шеѣ, въ груди, во внутреннихъ и другихъ мѣстахъ, гдѣ ни придавливать, ни рѣзать не можно, Аневризма подлинная до шѣхъ поръ роснетъ, покуда прорвется, и человека несчадно убьетъ.

§. 430.

Неподлинная Аневризма скорѣе къ концу приходитъ, въ оной только скоро Анпонова огня опасаться надлежитъ. Когда оной придавить не можно, то шопчасъ, за лѣченіе ножомъ приниматься должно, ежели время и мѣсто къ шому будетъ. Гдѣ жилы великія

ликія кровезовращательныя повреждены, напริมѣръ, пень плечевой, голенный, часпо хотя бѣдспвенная, однакожъ единственная, помощъ бывася, удѣ опрѣзанъ.

§. 431.

Я уже объявилъ, что Аневризма подлинная придавливаніемъ или припискомъ излечивася (429). И такъ, гдѣ она будетъ не очень великая, незастарѣлая, и еще неокрѣплая, и гдѣ жила быющая не вся, но въ нѣкопорой части только разширена будетъ (427), на рукѣ и на другихъ мѣстахъ, которыя безъ опасности придавливать можно, то опухоль напредъ всего перстами попираетъ и припискивать надлежитъ, доколѣ вся кровь, въ ней стоящая, разсыплется, и внутрь вдавлена будетъ. Послѣ того наложитъ на то мѣсто бумагу простую разжеваную и спиритомъ виннымъ намоченную, сверхъ того накласть надлежитъ нѣсколько суконкѣ или тряпокъ толсно и посепенно сложенныхъ. Промежъ сими суконками монешку какую, или нѣчто другое жесткое положить, чшобъ пѣмъ крѣпче придавливалась. Вошанку или пластырь, нѣкоторыми прикладываемый, лучше осавить. Сіе все прикрѣпить обязкою. Сею въ одинъ свертокъ свернутою начинающъ обязывать съ нижней части плеча, около котораго дважды обвернувъ вестъ на суконки посепенно накладыныя, которыя безпреспанно, чшобъ опухоль опять не поднялась, наложивъ два перста указательный и средній другой руки, придерживать надлежитъ. Ипакъ обязкою проходя до самого верха плеча, которое въ кругъ завязкою обведши, опять по суконкамъ посепенно накладынымъ къ плечу воз-

вращаются. Такимъ образомъ трижды плечо обвертывается, и когда обвязка до суконокъ дойдетъ, завсегда персты по перемѣнкамъ полегоньку перемѣнять должно. Она же завязка, когда плечо и локоть обнимаетъ, завсегда сама на себя заворачивается, и будто бы улипкою пресмыкается, или бы винтъ пологой изображаетъ. Напоследокъ, когда она такъ хорошенько придержитъ, и приписнетъ суконки, то ее къ верху оборотитъ, и длинной спелнѣй, который на жилу бьющуюся наложитъ должно, оною же привязать. И покуда Аневризма такимъ образомъ будетъ обвязывана, надобно руку нѣсколько къ боку привеситъ и согнуть, а по завязаніи, и когда оноѣ плечо на подвязку и на помочи положить надобно будетъ, опять не множко и какъ то можно здѣлать, протянуть надлежитъ, дабы чрезъ то суконки на опухоль наложенныя, лучше приписнулись.

§. 432.

Многіе роды машинъ изобрѣшены были, для припискиванія Аневризмы, а особливо на плечѣ, способныя, которыя вмѣсто обвязки употреблятъ можно.

Смотри фигуру у ГЕЙСТЕРА въ 1 Т. на Табл. 11 стр. 436. а я еще особливую придаю, которую отъ преискуснаго челоѣка Госп. СЕНФІЯ, берлинскаго, получилъ, фиг. 10.

§. 433.

Хоть обвязка, хоть машина къ тому будетъ употреблена, однако оныхъ обѣихъ скоро развязывать не надлежитъ, еще должно обвязку, ежели она ослабнетъ, тотчасъ поуже подтянуть, а между тѣмъ кровное спремленіе, частымъ кровепусканіемъ, слабительными, воздержностью, нesyшнымъ кушаньемъ и пишемъ воды укрошить.

§. 434.

§. 434.

Новѣйшіе утверждаютъ, что и винной способъ къ излѣченію Аневризмы не только подлинной, но и неподлинной употребить можно. Оный испытывать кажется надлежитъ въ аневризмахъ опчаянныхъ, гдѣ ни завязать не можно, да и рѣзать не безопасно, ибо временемъ ни малѣхонько опѣ такого лѣченія пользы не бывашъ, однако въ такомъ случаѣ лучше сумнительное вспоможеніе употребить, нежели никакого. Тутъ надобно имѣть много обвязокъ, которыми всякой персѣ на подобіе улипки или винта съ низу до верьху змѣйкою обвязать. Послѣ того другою обвязкою такимъ же образомъ въ верьхъ проходя обнимается локоть и плечо, такъ, чтобъ она обвязка на самомъ плечѣ окончилась. Такимъ образомъ обвязкою обвивать должно, чтобъ она обычнаго нѣсколько по крѣпче была, однако не такъ, чтобъ удѣ Антоновъ огонь могъ получить. Когда же до опухоли дойдешь, тутъ кладется на нее свинецъ или другое нѣчто жесткое, къ придавленію опухоли устроенное. Обвязкою же около опухоли, и около того что на опухъ наложено, нѣсколько разъ обернуть, дабы чрезъ то все покрѣпче приписнулось. А припомѣ на жилу быющуюся плечевую на самомъ верьху плеча накладывается спленій. И доколѣ плечо такимъ образомъ будетъ обвязывано, то оно сгибать и къ боку приводить такъ, чтобъ утиральникомъ способно подвязано будучи на шеѣ висѣть могло, дабы послѣ повѣшеннаго инако, и во время завязыванія, неклонишь, ине ворочать. Послѣ того почаще покрывать и поливать обвязку спиритомъ виннымъ съ камforoю, или сему подобнымъ ликворомъ. Обвязки прежде

прежде срока дней не развязывать, а ежели ослабнѣтъ, то ее такъ подтянуть, чтобъ хоть не все къ жизни касающееся окружное крови печеніе, толькожъ всебѣ ея презлишнее спремленіе удержать и оставишь.

§. 435.

А припомѣ у больного такъ много крови убавишь надлежишь, чтобъ онѣ чрезъ многіе дни будто бы безкровенѣ и безчувственѣ лежалѣ. Ибо такимъ образомъ въ тѣлѣ изможденномъ и ослабленномъ все кровное спремленіе разрушается, и дѣлается, что при вышнемъ припискиваніи въ то время жила быющая въ первую твердость или силу приходитѣ, а ежели въ Аневризмѣ неподлинной гдѣ жила быющая прокола бываетѣ, струпомъ опять зарастаетѣ. При всѣхъ сихъ очень надобно воздержаніе, очень по немножку кушать, а пить весьма поило жидкое, и которое въ тѣлѣ жару не причиняетѣ.

§. 436.

Ежели же Аневризмы подлинной, такъ завязывая и припискивая излѣчить буденѣ не можно, то оную вырѣзать надлежитѣ. А сего дѣлать никакъ не возможно какъ въ Аневризмѣ подлинной, такъ и въ неподлинной въ какой нибудь жилѣ быющей, которую одною кровъ въ удѣ припекаетѣ, для того я выше и сказалъ (429), что ее перерѣзать надлежитѣ. Однакожъ сіе чаще случается на рукѣ, при кровопусканіи изъ жилы кровевозвращательной, повреждается жила быющая плечевая, передъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ она на лучевую и локотную раздѣляется, что изъ положенія ея видѣть ясно можно, а однакожъ временемъ благополучно бываетѣ лѣченіе, ежели операція

ція будетъ здѣлана, и жила бьющаяся будетъ завязана и перерѣзана. Ибо понѣскольку прилѣжнѣйше Анапомики примѣтили, что жила бьющаяся плечевая въ самомъ плечѣ надвое раздѣляется. А сверьхъ того, хопя она и нераздѣльна выше згиба локопнаго шна, что весьма часто бываетъ, однакожъ изъ нее прежде раздѣленія, многія другія меньшія производятъ, которыя съ лучевою и локопною соединяются. Ибо безъ сумнѣнія и сіи двѣ жилы бьющіяся часто другими меньшими одна съ другою связывающіяся. И такъ случится можетъ, что хопя и выше состава локопнаго стебло жилы бьющейся плечевой перерѣжется, толькожъ плечо цѣло останется, понеже чрезъ другія жилы бьющіяся, или чрезъ другое плечной жилы стебло, ежели она выше, и уже въ плечѣ раздвоенная будетъ, или еще чрезъ меньшія, которыя ВИНЗЛОВЪ побочными (коллатералесъ) называетъ (*), съ лучевою и локопною соединившимися, кровь въ руку проходить можетъ. Да и того позабыть не надлежитъ, что кровь будучи изобильна, когда великія жилы бьющіяся будутъ перерѣзаны или передавлены, маленькими должна въ часть нѣкопорую протекать, и своею быстриною жилы бьющіяся не помалу разширивать. Изъ сего можно разумѣть, что въ рукѣ, ежели не будетъ видимаго опчаянія, всегда такое дѣйствіе аневризмы можно здѣлать. Ибо, хопя въ помѣ и не удалось, однакожъ послѣдняя помощь лѣкарю останется, что можетъ руку опнать.

(*) Смотр. у Винзлова. Экспосъ деъ артеръ §. 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 145, 160, и у АЛЕКСАНДРА МОНРО. ин. те медикаль Ессаисъ д' Единбург. Кн. 2, Примѣч. 17, Таб. 2.

§. 437.

А понеже подлинной Аневризмы лѣченіе не гораз-

А

до

до отпущенія отъ лѣченія Аневризмы неподлинной ; понеже сія чаще случается , то я о семъ прежде предложу. Предуготовишь болящаго человѣка , ежели время до того допустишь , кровопусканіемъ , слабительнымъ , пищею умѣренною и здоровою , и пиіемъ воды или ппизана. Надобно же еще доколѣ не начнешся рѣзать , обвязку заверпышную или ппски [фасціамъ шоршилемъ или поркуларъ] (237) на жилу быющуюся (240 , 249) положишь , чтобъ во время дѣйствія человѣкъ кровью не вышелъ. Ножикомъ прямымъ несободнымъ прорѣзывается опухоль , а чтобъ рану больше здѣлать , кладется въ нее спичка жолобоватая , и на нее ножницы косыя , которыми безъ трудности рана расширяется. Ранужь прорѣзывать должно наискось , начиная отъ кости лучевой , и продолжая до внутренняго мыщелка кости плечевой. Изъ сей раны , сколько бы крови запекшейся ни скопилось , всю вычистить. А понеже часто случается , что запекшаяся кровь подъ разширеніемъ мышечнымъ онымъ , которое отъ мышцы двуглавной происходитъ , мышцы и сосуды кровеносныя объемлетъ , оное также разрѣзать , чтобъ всю запекшуюся кровь вычистить было можно. Оное поперегъ разрѣзывать должно ; И то очень хорошо здѣлать можно , ежели локошь полегоньку согнутъ будетъ.

§. 438.

А чтобъ прежде усмотрѣть раночку перерѣзанной жилы быющей , и чтобъ жилы быющей не перерѣзать , надобно обвязку заверпышную или завертышъ не можно отпустить , чтобъ кровь отпуду брызнула. Когдажъ то найдется , надлежитъ жилу быющуюся отъ близъ лежащихъ жилъ кровевозвраща-
тель-

тпслныхъ и жилъ чувствительныхъ отдѣлишь, крайнее употребляючи прилѣжаніе, дабы чего ошѣ нихъ и ошѣ малѣйшихъ, которыя выше я назвалъ побочными, не повредить, для такой причины и кровь текущую тотчасъ пряпочкою вытереть (22) должно. А какъ жила быющая такимъ образомъ открыва и отдѣлена здѣлается, то ее завязать надлежитъ. Для такого случая, при нитки крѣпкихъ навошивъ, въ иглу вдѣтъ кривую великую, и подѣтъ подъ жилу быющую ушками. Къ тому многія выдуманы другіе инструменны, и ПЕТИТЪ употребляеть. иглу широкую изъ серебра здѣланную, которою и нитки продѣваются и жила быющая ошѣ другихъ частей отдѣляясь можетъ фиг. 11.

§. 439.

Нитки же продѣтыя такъ расположить должно, чтобъ двѣ изъ нихъ выше ранки жилы быющей, а третья ниже ранки лежали. Тогда жилу быющую начать завязывать, въ первыхъ ниткою вблизи выше ранки лежащую, а послѣ шую, которая ниже ранки. А при томъ жилу быющую и съ низу завязать должно, что изъ вышепомянутыхъ побочныхъ въ сію кровь втекать и бѣдственное лѣаніе произвести можетъ. Третьею же ниткою жилы быющей не затягивать, но такъ въ ранѣ оставить, для того, ежелибъ паче чаянія первая ошѣ теченія крови перервалась, и съ мѣста своего спихнулась, сею запянуть было можно. И чтобъ нитки жилы быющей не перѣбли или не перервали, то межъ концами ихъ, еще не завязываячи подложить небольшіе холстинные сверточки, которые не допускаятъ на жилу быющую нитки налягать. А что жила быющая хорошо за-

Я 2

вязана

вязна, узнать можно потому, ежели обвязка завершешная ослаблена будетъ, а крови ни малѣхонько не потечетъ.

§. 440.

Когдажъ надобно будетъ уже рану перевязать, то оную рану прежде губкою обмоча въ спиртѣ вышереть. Руку не множо согнуть и такъ положить, чтобъ черезъ плечо подвязанная свободно могла висѣть, и съ боку перевязаться. А какъ къ ранѣ придешь, то по бокамъ жилы быющей положить небольшіе холстинные сверточки, или продолговатыя и толсто сложенные сукопочки, на нихже гораздо много пряжи, и сверхъ того накласть множество сверточковъ постепенно сложенныхъ. Сіи всѣ охватываются особливѣмъ сверткомъ, съ одного конца разрѣзаннымъ. Сего свертка концы неразрѣзанный на рану кладется, а двумя оными разрѣзанными рука обвивается. Все сіе прикрѣпляется обвязкою такою, какую я ипеперь (431) описалъ. На жилу бѣющую въ верху на плечѣ положить должно свертокъ; а руку въ такомъ положеніи поставишь, чтобъ она нѣсколько приподнята была, а не обвисла, ошчего кровное стремленіе не мало удерживается.

§. 441.

Рука будучи такъ завязана почти всегда гораздо опухаетъ, для того, чтобъ въ ней Антоновъ огонь не приключился, надобно спараться, какъ кровь пускать и на содержаніе въ кушаньѣ и питьѣ посмаивать, такъ и о лѣкарствѣхъ разсуждать, которыя всѣ ошѣ вожженія предохраняютъ. Но въ дѣлахъ перемѣна еще нѣкоторыхъ благоразсмотрѣній требуетъ: ибо ежели рука ниже локтя гораздо горяча будетъ

будетъ, что значитъ сильное крови движеніе, тутъ полезны лѣкарства утолишельныя (76). Нашатырь и липаргиріумъ съ уксуомъ и съ водою сваривши, припарку жидкую дѣлають. Когдажъ рука будто мерзла и холодна покажется, и никакого движенія жилъ чувствительныхъ въ ней слышно не будетъ, а то часто случается, когда жила быющая плечевая завяжется, то должно переніе употребить, и съ наружи, спиритъ винный съ водою теплою смѣшавъ, руку полгоньку попираеть. Ибо по памятованію надлежитъ, что великой въ немъ страхъ бываетъ, ежели послѣ рѣзанія въ рукѣ никакія жилы быющія не будутъ бишься, однакожъ и изъ того подлиннаго опчаянія не заключають. Понеже многократно примѣчено, что иногда черезъ дватцать четьре часа то есть черезъ сутки и больше, жилы быющія поднимаются, и въ рукѣ цвѣтъ натуральный дѣлается.

(*) Смори примѣръ представленный отъ АЛЕКС. МОНРО въ те медикаль Ессайс Книг. 4. Примѣчан. 17. стр. 229.

§. 442.

Ежели что другое не востребуетъ, обязанности прежде четвертаго дня развязывать не надлежитъ. Когдажъ и въ четвертый день будетъ перевязывано, то должно въ готовности обвязку завершительную или клять имѣть. Также и пряжи къ ранѣ приложенной, ежели она сама собою не отспала, силою не отнимать. Не надлежитъ съ начала прикладывать вещей въ гной приводящихъ и е. растворяющихъ, и излишне смягчающихъ, въ которое намѣреніе поливать надлежитъ эссенціею бальсамическою, а припомъ и пряжу прикладываемую оною же намачивать. Нипокъ никогда перерѣзывать не надлежитъ, доколѣ сами не выпадутъ

надуть. А оптадываютъ по большой части чрезъ нѣсколько дней сперва та , которая выше раны на жилѣ быющей была , а послѣ того и другая. Когда же усмотрится , что уже печенія крови опасаться не для чего , то надлежитъ рукою попихоньку движеніе дѣлать , и къ употребленіямъ своимъ приводить , дабы отъ излишней неподвижности скорченной членъ не оспался. Когда же случится великая опасность и въ вожженіи , пособствовать пому воздержностью , умѣреннымъ и приличнымъ кушаньемъ и питьемъ , и всѣмъ тѣмъ , что отъ вожженія служить можетъ , какъ я уже часто выше объявлялъ.

§. 443.

Когда подлинная Аневризма такъ возрастетъ и ожесточится , что надобно будетъ и ее рѣзать , то почти тожъ самое бываетъ дѣйствіе и тутъ. Ибо жилѣ быющей , которая тутъ вся распухла находится , также завязываніемъ пособлять должно для того оную сперва выше и ниже опухоли нитками позашнуровать , послѣ того оную прорѣзать и взявъ изъ опухоли всю кровь запекшуюся. Можно также вырѣзывать и обрѣзывать то , что погребшное найдется какъ въ жилѣ быющей такъ въ шукѣ или жиру и въ кожѣ испорченное или окрѣпое ; а въ пропчемъ лѣченіи такимъ же способомъ поступать , какъ я о лѣченіи другого рода Аневризмы расположилъ.

§. 444.

Нѣкоторые въ лѣченіи аневризмы неподлинной кладутъ на ранку жилы быющей кашышокъ изъ купоросу здѣланной , когда имъ трудно покажется жилу быющую отъ жилы чувствительной и отъ другихъ частей

частей отдѣлать , и нипкою завязать . Но сей способъ лѣченія не вовсе безопасенъ , какъ то изъ пред-
реченныхъ явствуемъ (413).

§. 445.

Послѣ сего лѣченія по большой части бываетъ въ удѣ безсиліе . Когда таковой удѣ будетъ нѣмѣть : то весьма прилично его почесывать , и масью жильно-чувствительною (унгвенго нервино) помазывать , также спиритъ винный съ водою теплою смѣшавъ попаривать , и , кромѣ того , удѣ , ежели возможно , самому болящему , ежели же не возможно , другому въ движеніе приводить . Еще разжигать кожу можно или сѣченіемъ кропивою , или прикладываніемъ мухъ испанскихъ , или горчицею и симъ подобными .

§. 446.

Когда же по несчастію случится кровепускателю , что онъ жилу быющую порѣжетъ , оное изъ знаковъ вышеобъявленныхъ (353) знать можетъ , и ежели жилу , изъ которой кровь течетъ , перстомъ придавитъ . Ибо ежели выше ранки жила придавлена будетъ , и кровь остановится , то жила быющая прорѣзана . Понеже когда изъ жилы кровсвозвращательной кровь течетъ , то оную ниже раночки припискивать надлежитъ (408) . Гдѣжъ быющая жила прорѣзана , тамъ не надобно спѣшить кровь удержать . Ибо надобно , чтобъ изъ нее много крови вытекло , дабы чрезъ то кровное стремленіе утихло , и рану запереть лучше было можно . И въ такомъ случаѣ не надобно бояться больнаго слабости . Однакожъ сего примѣчанія лѣкарю позабывать не должно , что какъ усмотритъ , повыше раночки быющежилы , кожу начинающуюся распухать , то какъ возможно
въ

вперьвыхъ наложивъ свертки холщяные на раночку жилы быющейся, и взявъ тужъ самую обвязку, которую я при Аневризмѣ подлинной способною описалъ, обвязать. Понеже неподлинную Аневризму можеть предусмотръѣть, ежели она будетъ. Итакъ должно да и надобно изъ другой жилы кровезовращательной довольно крови пустить. При перевязкѣ же раны и во всемъ лѣченіи все то примѣчать надлежитъ, что при дѣйствии хирургическомъ въ Аневризмѣ неоптѣнно за надобное я предписалъ.



Б О Л Ъ.

Д О Л О Р Ъ.

§. 447.

Всякому извѣстно, что въ ранахъ иногда пресильная боль бываетъ, а она отъ жилъ чувствительныхъ производитъ, когда онѣ весьма напрягаются или отъ вещей ѣдкихъ, острыхъ, сушащихъ, колющихъ и другихъ сильно саднятся. Спрѣлы, пули свинцовыя, весьма плотно и негладко здѣланныя, многородныя желѣзныя и другія вещи въ пѣло вонзенныя и въ немъ ославившіяся, кровь выпеклая, ежели въ ранѣ закипѣла будеть держаться гной, ежели отъ мѣшканія, или отъ худого тѣлеснаго сложенія остръ здѣлается, приложенныя лѣкарства острыя, изъ которыхъ числа и медъ, понеже онъ въ мѣспахъ жильночувствительныхъ не годится, масти заржавѣлыя намазаныя, кнопы и другимъ образомъ сложенная пряжа, ежели онѣ къ ранѣ не полегоньку будуть прикладываны, но впихиваны, и другіе случаи боль дѣлають

дѣлаютъ , а припомъ и всякое вожженіе оную причиняетъ , когда край у раны отъ вожженія опухаетъ , и ради того жилы чувствительныя больше сводятся и натягиваются.

§. 448.

Острая же и нестерпимая боль дѣлается въ то время , ежели нѣкоторая жила чувствительная будетъ не перерѣзана , но надрѣзана , или кончикомъ уколота. Она кажется рождается отъ того , что перерѣзаныя волокна расходятся и скорчиваются , а прочія части еще будучи цѣлы чрезъ то наипаче натягиваются.

§. 449.

А то не въ однихъ только жилахъ случается , но и въ мѣсцахъ и частяхъ жильночувствительныхъ , особливо въ сухихъ жилахъ мышечныхъ , къ которымъ и плевы , *αποευωσας* называемыя , причислились должны , которыя изъ мышечъ производятся , или нѣ и другія части объемлютъ. Для сей причины въ небольшихъ ранахъ , ежели протяженіе мышцы двоглавной на рукѣ , въ влагаищѣ мышку червную прямую отовсюду объемлющемъ также и въ обвязкѣ широкой , на бедрѣ или на ногѣ , повреждены будутъ , а особливо ежели отъ стрѣлы , или отъ шпаги нѣсколько неострой , кончикъ въ нихъ останется , гораздо большая боль и большее вожженіе бываетъ , нежели въ ранахъ преселикихъ и разинуемыхъ , хоть бы такія раны и оныя части получили.

§. 450.

Раны , въ которыхъ пресильная боль бываетъ , много бѣдствія причиняютъ. Понеже отъ болѣзни приключается горячка , да и горячка отъ различныхъ причинъ , напримѣръ , отъ вожженія происшедшая ,

Θ

долго-

долговременна бываетъ , сонъ пропадаетъ , а на послѣдокъ слѣдуютъ пошяготы , временемъ же съ пріумноженіемъ вожженія къ Аншонову огню склонною бываетъ.

§. 451.

И такъ боль отъ разныхъ причинъ произходящая , различными способами и пользуется. Ибо ежели оную несродныя тѣлу вещи , въ ранѣ держащіяся , причиняютъ , оныя вонъ взять надлежитъ. Ежели рана пряжею и холстинными свершками будетъ давиться или обвязкою нѣсколько шуго завязана будетъ , должно завязку развязать , и что гнететъ , отбросить. А что отъ вожженія пособствуетъ , о томъ выше я донесъ. Между оными кровепусканіе за первое почиается. Не мало и то пособствуетъ , когда край у раны , какова бы она ни была , надрѣзываются , чпобъ по величинѣ ся нѣсколько крови вышло , а припомъ ежели на тѣ мѣста лѣкарства смягчательныя и въ гной приводящія положены будутъ.

§. 452.

Ежели близъ раны мѣста нѣкоторыя пухнутъ , да и болятъ , къ онымъ надобно припарку густую употребить , понеже такая припарка жесткость смягчитъ. Спосовно къ такому случаю масло розовое , смѣшанное съ спиритомъ горючимъ , которою микстурою больныя и опухлыя части мажутъ. Сія вещь въ брюшныхъ ранахъ весьма прилична. Ежели острая саніѣсъ рану будетъ развѣдать , или къ ранѣ приложены будутъ лѣкарства такія , которыя сильно будутъ саднить , оное все , обмоча губку , въ теплую воду вытереть. А гдѣ ржавыя вещи ранѣ будутъ доса-

досаждаѣ, памѣ обмоча губку въ спиртѣ винный приложиѣ, а отѣ болѣзни, которую вещи ѣдкія причиняюѣ, способны маспи, которыя въ загноеніе приводяѣ, изѣ числа же оныхѣ масть ѣблая съ камфорою. Сверхѣ же той можно припарку густую положиѣ.


§. 453.

Ежели же худое шѣлесное сложеніе, и худые въ немѣ соки рану будутѣ поршиѣ, и боль въ ней производяѣ, то какія бы ни прикладывались лѣкарства, мало пособствованія будетѣ, доколѣ соки не будутѣ очищены. И для того надлежитѣ примѣчать все то, что я выше (400) предложилѣ. А при томѣ опасаться надлежитѣ, чтобѣ для очищенія соковѣ лѣкарствами данными горячи и вожженія не навесѣ, и оными боль не пріумножитѣ. Гдѣ боль беспокоиваѣ будетѣ, надлежитѣ даватѣ вещи парегоричекія, т. е. боль облегчающія, или укращающія, Эмулсіи изѣ семени маковаго съ селитрою. Можно клистеры ставитѣ молочные съ травами мягчительными сварены, и съ масломѣ смѣшанны. Не всегда безопасно лѣкарствами сильными и самымѣ опіемѣ сонѣ больному наводиѣ.

§. 454.

Но ежели жила бьющаяся поколопа или порѣзана будетѣ, боль перестанетѣ, когда она вся перерѣжется. Еще же къ жиламѣ чувствительнымѣ такѣ поврежденнымѣ лѣкарства тѣ способны, которыя все чувствво отнимаютѣ. Межѣ таковыми наилучшимѣ признавается скипидарѣ, оный горячо разогрѣвъ почаще наливатѣ. Полезенѣ есть балсамѣ Перувианской, съ спиритомѣ чистымѣ смѣшанный. При сихѣ рану припариваѣ должно припарками умягчитель-

пельными и въ гной приводящими. А къ самому уду употреблять должно припарки жидкія , и съ начала такія , которыя преизлишнее къ ранѣ крови теченіе да и самое воженіе опвращающѣ и попушающѣ (76, 77, 78). Кордажѣ воженіе въ удѣ уже имѣться будетѣ , другія припарки , которыя разбивающѣ (79, 80, 81), и ничего того не опускаитѣ , чю нособствоватѣ можетѣ , а наипаче отѣ воженія. (сѣ 62, до 70). Ежели рана , на протяженіи мышешномѣ ш: с: на апоневрозѣ будетѣ , и не очень видна , да припомѣ будетѣ рдѣться (449), оную топчасѣ ширѣ здѣлатѣ.



ЖИЛЪ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХЪ РАСТЯЖЕНІЕ.

НЕРВОРУМЪ ДИСТЕНЦІО.

§. 455.

Жилъ чувствительныхъ растяженіе , которое часто послѣ ранѣ приключася , и больше за тяжкими бо-
лѣзнями слѣдуетѣ , такоужѣ требуетѣ лѣченія : Ибо гдѣ оно отѣ великаго кроветеченія дѣлаетѣ , то по большой части бываетѣ тушѣ конецѣ ; однакожѣ ежели къ лѣченію мѣсто и время еще будетѣ , то не иное что , но тожѣ самое , что выше сего я объявилъ (418) , пособствуетѣ . Ежели же когда человекѣ будетѣ пружиися , и порокѣ будетѣ производитѣ изѣ мозга чѣмѣ нибудѣ поврежденнаго , оно , ежели случай допуститѣ не опуская времени проверпѣвъ черепѣ головной ст-
вратитѣ должно. Лѣкарства отѣ растяженія жилъ чувствительныхъ нѣкоторыми выхваляемыя , мало пособствуютѣ , а временемѣ еще и вредятѣ.

жилъ

ЖИЛЪ СУХИХЪ СШИВАНІЕ.

ТЕНДИНИСЪ СУТУРА.

§. 456.

Жила сухая, будучи перерѣзана, сжели край не весьма одинъ отъ другаго раздадутся, и безъ затрудненія вмѣсто евестися могутъ, сраспытывается. А гдѣ жилы сухой перерѣзаной край чрезъ посредство обвязки вмѣсто свесить не возможно, оную, сжели другаго какого приключенія худого припомъ не будетъ, и она не будетъ размочалена, и отъ нее ничего небудетъ оторвано, или отдавлено, сшить должно. Крайжъ такъ хорошо и такъ плотно сжатъ надлежитъ, чтобъ они одинъ съ другимъ вездѣ сошлись. Ибо всегда понѣскольку отъ нихъ въ остальномъ лѣченіи теряется. Сшивкомъ должно захватывать не только сухую жилу, но припомъ и кожу, которой иные, нехотящіе такъ ее ниткою сшивать или завязать сперва разрѣзываютъ. Вдѣваютъ нитку одну въ двѣ иглы къ такому сшиванію здѣланныя. Оныя бывають кривыя, и неширокія, толькожъ весьма тонкія, съ боковъ воспрѣя не имѣють, а имѣють воспрѣя спороны какъ горбатую такъ и вогнутую (*). Иглу продѣвать должно отъ внутренней спороны сухой жилы поврежденной на внѣшнюю спорону, и сперва сшивкомъ обхватить верхній край, который отъ мяса зависитъ. Съ обѣихъ же споронъ отъ сухой жилы швомъ понѣскольку прихватить, чтобъ сшивокъ крѣпче держался, и чтобъ край ниткою не прорвался. Когдажъ первая игла такъ продѣта будетъ, такимъ же порядкомъ сквозь нижній край другую иглу, съ такою же ниткою, отъ

внутренней споронѣ продѣль должно. А нитку стягивающѣ и концы ся завязываютѣ на сверточкѣ изѣ шелковой матеріи воощаной свернупомѣ, а по самое свободнѣе здѣлать можно, ежели и удѣ, сколько возможно, согнуть будещѣ, и сухая жила, а особливо въ томѣ мѣстѣ, гдѣ она отѣ мяса произходитѣ, припискивается.

(*) Смощр. у ГАРЕНЖОТА деѣ Instrumant стр. 206 фиг. 4.

§. 457.

Нѣкоторыя шивокѣ дѣлаютѣ одною иглою съ двумя нитками въ нее вдѣпыми. Нитпошныя концы всѣ вмѣстѣ, завязываютѣ что будтобы поводокѣ здѣлаася. Послѣ того иглу на одной споронѣ снаружи внутри а на другой изѣ внутри отѣ края наружу продѣваютѣ. Въ оной поводокѣ, что я сказалѣ, сверточекѣ изѣ шелковой матеріи навоощеной кладутѣ, а послѣ того на другомѣ краю нитки одна съ другою соединенныя раздѣляютѣ и какѣ края одинѣ съ другимѣ вмѣсто сведены будутѣ, надѣ такимѣ же сверточкомѣ завязываютѣ.

§. 458.

Рѣдко оный инструментѣ, о которомѣ я упомянулѣ (380) надобенѣ бываещѣ, понеже иглы по большой часщи легко продѣваются. Ибо когда оныя инструменты просавываютѣся, то ихѣ надобно вынимать другимѣ инструментомѣ, который на шрубочку съ жолобкомѣ походитѣ (*); а иглы продѣшыя лучше персами выдерживаютѣся. Ежели многія жили сухія будутѣ пересѣчены, то почаше и шивокѣ положить должно.

(*) Смощр. у ГАРЕНЖОТА деѣ instr. стр. 223.

§. 459.

§. 459.

Къ ранѣ прикладываютъ бальсамъ Перувианской съ спиртомъ виннымъ составленный, бальсамъ изъ Мекки, эссенція янтарная съ скипидаромъ, или что за наилучшее признается, на рану присыпаютъ терпенпинъ вареный. А на рукѣ зѣлашь жидкую припарку, которая наиболее служить можетъ отъ вожденія. Весьма шутъ надобенъ покой, для чего руку въ желѣзномъ каналчикѣ или въ жолобкѣ держать должно, который такъ пристроить надобно, чтобъ, на шеѣ повѣшенъ будучи, передній конецъ, подъ персты подложенный, повыше и движимый имѣлъ, чтобъ персты побольше выпянулись, и на заднюю сторону почти бы заклониться могли. Ибо каналчикъ или жолобокъ, на которомъ дырочки имѣются, ремнями своими къ рукѣ привязывается (*). Но какъ скоро сухой жилы край вмѣсто сроснувшись, то передняя часть жолобка отгибается, персты полегоньку згибаются, и сшивная сухая жила въ прежнее состояніе приводится и вытягивается. Если сухая жила на ногѣ будетъ сшита, то удъ держать надобно въ коробочкѣ такой, какая для переломленныхъ костей устроена, о которой ниже сказано будетъ.

(*) Смотр. у ГАРЕНЖОТА въ пом. мѣст. Т. 2. стр. 299.

§. 460.

По нѣкоторыхъ людей примѣчаніямъ вѣдомо есть, что сухая жила Ахиллсова ш. с. Тендо Ахиллсѣ, изъ всего вѣла человеческого наибольшая, къ такому лѣченію способна (*); а гдѣ сія жила сухая безъ раненія перерывается, оную обвязкою прищипнуть и такъ излѣчивать должно. (**).

(*) Смотр. о шиваніи, отъ ГВИЛ. КОВПЕРА показанномъ въ Трансакц. Аглин. №. 252. стр. 153. и въ Компендіи ЛОВТОРПТ. Т. 3. стр. 298.

Таб.

Таб. 5. фиг. 72. Тутъ же принадл. ГАРЕНЖОТА десъ Операт. Т. 3. стр. 267. Оное дѣйствіе уже давно въ раздѣляемыхъ труппахъ примѣшилъ ВЕСЛИНГІЙ въ прим. 15. стр. 89.

(**) ПЕТИТЬ въ книгѣ де Малади десъ Осъ въ т. 2 Гл. 15 стр. 289 совершенно доказалъ, что сія жила сухая перерваться можетъ, ежели человекъ сильно натянутыя мышцы ножнойкорныя и подошвенныя въ верхъ скачучи незапно приписнетъ, и въ Коментар. И. А. К. Н. 1722. стр. 68. Сіе приключеніе за сумнительное почитено отъ Автора того, который противъ ПЕТИТА написалъ Диссертацию анъ фомъ де Лештръ анюотъ десъ увражъ делъ Оперъ дю Лѣуръ сюръ ле Малади десъ Осъ, Лештръ 5. стр. 261. Сіе примѣчаніе защищаетъ ПЕТИТЬ въ книжечкѣ названнѣй: Лештръ де Мос. ПЕТИТЬ акрипъ а М. Оперъ де л'Экстракт. ду либръ инспитюле Третъ де малади десъ Осъ. инсеръ данъ ле журналъ ду 8. Маръ 1724, который еще новымъ примѣромъ дѣло утвердилъ въ I. К. А. Н. 1728 году стр. 332. Ю. АДАМЪ КУЛЬМЪ еще иное примѣчаніе издалъ въ Диссертациі о жилѣ сухой Ахиллесовой перерванной и о жилахъ бьющихся, въ костяное существо преобразившихся, въ ГДАНСКѢ 1730.

§. 461.

Ежели сухая жила поколопа будетъ кончикомъ ланцетнымъ, что часто случается кровь пускающимъ, не упускаячи времени потчасъ приложитъ надобно лѣкарство, которое къ поврежденнымъ такъ жиламъ чувствительнымъ полезнымъ я предложилъ (454). А чтобъ отвратить кровное печеніе отъ рукъ къ плечу, положить обвязку подобіемъ винта, а къ верху идущую. Гдѣжъ паче чаянія ранка рдѣться начнепъ, то къ ранкѣ приложитъ легонько въ гной приводящее и сверхъ того припарку густую изъ вещей мягчительныхъ, прибавивъ въ нее шафрану. А на весь удѣ употребитъ жидкія паренія, которыя возженіе лѣчатъ, и прилѣжно всего наблюдать должно, что я о такихъ временахъ выше объявилъ.

РАНЫ

РАНЫ ФУЗЕЙНЫЯ.

вулнера склопеторумъ.

§. 462.

Въ ранахъ пулями свинцовыми и другими изъ фузей и изъ пушекъ чрезъ стрѣляніе порохомъ, нанесенныхъ, еще нѣчто особенное видѣнье должно, Ибо такія раны бывають претяжки и весьма раздроблены: понеже край имѣють, гдѣ мясо и другія части, въ которыя пуля прошла, со всѣмъ изможденныя и замерзлыя.

(*) Пулями свинцовыми и другими, которыми изъ пушекъ стрѣляютъ, не всегда раны дѣлаются, но также пришибаются и измождаются безъ ранъ различныя мѣста и самыя кости. О нихъ смотри, гдѣ о придавленныхъ и переломленныхъ сказано будетъ.

§. 463.

Раздробляются сіи раны погибельнымъ пуль и другихъ вещей изъ пушекъ выстрѣленныхъ импепомъ т. е. устремленіемъ, а не пулями, хотя пролетываютъ, обжигаются. Въ древнія времена какое неосновательное мнѣніе имѣли, будто пули при заженіи пороха горячи дѣлаются и раскаливаются.

(*) Смотри. у ПАРЕА въ Кн. 10. стр. 330.

§. 464.

А понеже такъ сильно и съ такою гибелью пули летятъ, то гораздо сильно сотрясаются или колеблются всѣ части, по которымъ онѣ ударяють. Сіе ежели попадетъ въ мѣста жильночувствительныя, претяжкіе припадки, безчувствіе, слабость и потчасъ пресильная боль, обомленіе, попяготы, или пруженія, вожженіе и Антюновъ огонь, слѣдуютъ.

У

Нс

Не мало къ тому придастѣ въ умѣ помѣшательство и страхъ , чѣмъ устрѣбленный чловѣкъ по большой части пораженъ бываетъ.

§. 465.

Изъ сихъ ранъ , ежели не будетъ какая большая или жила бьющаяся или жила кровезовращательная разодрана , мало или ничего крови не течетъ . По-неже онымъ струпомъ , который изъ раздробленныхъ и замерлыхъ мясъ здѣлается , устья у сосудовъ запираются.

§. 466.

Гдѣ пуля свинцовая въ тѣло или въ удъ про-скочитъ , въ томъ мѣстѣ рана , гдѣ пуля пришла ; немножко вдавлена , гораздо раздроблена , и съ нема-лымъ синевомъ , однако невелика будетъ . Ибо въ противной сторонѣ , куда пуля на вылетѣ вые-шитъ , рана ширѣ будетъ .

§. 467.

Однакожъ раны нѣкоторое различіе въ себѣ по-лучаютъ отъ той вещи , отъ которой онѣ здѣлались : Ибо не мало въ томъ приноситъ фигура . Пуля свин-цовая , которая будетъ круга , ежели нѣкоторую часть пробиваетъ , не столько вредитъ какъ пуля зу-беватая или другое какое желѣзо угловатое , ше-роховатое и щетиноватое , каковымъ все , что ни попадется , раздирается , и распаласывается . Одна-кожъ въ томъ мало нужды изъ какого металла или изъ какой руды были бы пули , только чтобы въ тѣлѣ не остались . Ежели въ тѣлѣ останется пуля свинцовая , она меньше вредитъ нежели мѣдная или серебряная надущая , которая въ себѣ много мѣди имѣетъ .

§. 468.

§. 468.

Не одѣжѣ пули перебиваютъ или перерываютъ, но съ оными часто уносятся вещи нѣкоторыя другія, отъ плаща лоскутья, деньги и другое все, что оными захвачено будетъ. Съ и иное въ раны увязлое внутри крѣпко держится, а будучи въ тѣлѣ великое вожженіе и другіе припадки причиняютъ,

§. 469.

Такія раны обыкновенно бываютъ весьма распухлы и съ великимъ *экхимомъ* т. е. синевомъ. Понже кровь изъ перерванныхъ сосудовъ течетъ, а изъ раны пѣчь съ онымъ струпъ пренятливуетъ. Гдѣ больше синева (сжимаеисъ) будетъ, туть больше и опасаться надобно Анпонова огня. Если же надъ раню незапно великая опухоль здѣлается, то еще гораздо больший страхъ быть можетъ, понеже оно по большой части будетъ значить, что жила чувствительную, или часть жильно-чувствительную сильно повредило. Если пониже раны удъ будетъ пухнуть, то можно разумѣть, что жилы кровообращательныя заперлись.

§. 470.

Если части жильно-чувствительныя уничтожены будутъ, а больной о сильной боли не будетъ жаловаться, но только будетъ жаловаться о чувствѣи сумнительномъ и о слабости, туть уже въ удѣ Анпоновъ огонь зародился.

§. 471.

Не рѣдко же при лѣченіи сихъ ранъ случается, что чрезъ нѣсколько дней, и гдѣ казалось, что уже кровь давно будто бы остановилась, предъдственное и смер-

смертельное крови теченіе дѣлается (405). Понеже струпъ, который у сосудовъ устья сперва заперъ, или отъ прибавленія горячки, или отъ движенія плѣснаго и самого раненаго уда, или и отъ самого въ гной пришествія иногда отдѣляется. Если же раненныя жилы быющія еще не будучи заживлены, то кровь съ крайнею опасностью хлыщетъ, которую удержать плѣмъ гораздо труднѣе, нежели въ другихъ ранахъ.

§. 472.

Если у больного человека, а особливо въ раненомъ удѣ, не обыкновенно жилы быющія приподнимаются и движутся, то надобно опасаться или вновь кровотеченія, или великаго вожженія.

§. 473.

Если новое и великое вожженіе послѣ четвертаго дня нечаянно, и безъ явной какой причины съ немалымъ стремленіемъ причинится, то будетъ значить, что или нѣчто въ ранѣ осталось (468), или повреждена часть жильночувствительная или мышечная жила сухая, или разширеніе мышечное (апоневросисъ), какое приключеніе не безъ бѣды бываетъ.

§. 474.

А за множествомъ частей жильночувствительныхъ и ради опасности Анпонова огня рѣдко удѣ зберечь бываетъ можно, если пуля свинцовая членосоставленіе или мѣсто къ составу близкое пробьетъ.

§. 475.

У которыхъ же глубоко и въ самыя внутренности пуля пройдетъ, такъ, что оныя повре-

дитъ

дитѣ , въ пѣхѣ мало бываетъ надежды , и рѣдко вы-
лѣчиваются , какѣ то извѣстно.

§. 476.

А гдѣ нѣкто прострѣленъ буденъ , и онаго
можно еще зберечь , то тотчасъ смотрѣть надлежитъ ,
чтобъ пули и другое все , что въ ранѣ увязло ,
и внутри держится , (468) вонъ взять ; для того
надобно рану ширѣ разрѣзать , чтобъ пули и прочее
въ ранѣ остановившееся свободно шудажъ , откуда
что пришло , выпастъ могло , или бы лѣкаръ безъ
трудности выпацилъ могъ. А иногда способѣ
бываетъ , остальное мѣсто отворить , и по , что въ
ранѣ есть вынать. Припомъ все то наблюдать
должно , что выше (372, 373) я представилъ. Щипцы
и другія желѣзные орудія , которыя для прогнанія
или просавыванія и выпаскиванія пуль свинцовыхъ
употребляются , часто мало надобны бывающъ , до-
колѣ раны не будутъ ширѣ разрѣзаны , понеже оными
раны , будучи узки , раздраются , или по меньшей мѣрѣ
больно бередятся. Того ради лучше , ежели что
другое препятствованъ не будетъ , рану ширѣ раз-
рѣзать , или рану къ ранѣ прибавить , дабы чрезъ
то мѣсто ослабло , и что тамъ есть , оказалось. Та-
кимъ образомъ свободнѣ или перстомъ , или оными
орудіями можно вонъ взять.

§. 477.

Да и не для того одного раны ширѣ дѣлать
надлежитъ , но и для предосторожности отъ воз-
женія. Ибо ежели въ сихъ ранахъ мало крови течетъ ,
понеже помянутый спрутъ жилъ быющихъ и жилъ
кровеовращательныхъ устья запираетъ , то всеко-
нечно надобно , чтобъ и рана поширѣ расширена

была и надрѣзана, и чѣмъ всѣ ея края опали, чѣмъ чрезъ по кровь лучше выпити могла. Припомѣ рана новымъ рѣзаніемъ разширенная гораздо легче залѣчивается. Толькожъ о томъ спарашься надлежитъ, чѣмъ жилы чувствительной, жилы большой крове-возвращательной, или жилы бьющейся не повредить. Нижѣ сухой жилы, ежели великой нужды не будетъ, перерѣзывать не надлежитъ. Да и самое протяженіе мышечное [апоневрозимъ] широко и поперегъ, или наискось, прорѣзывать должно.

§. 478.

Не рѣдко раны подѣ кожую поперешны бывають, шутъ очень хорошо въ раны спичку вставляють, и по ней раны разрѣзывать. Ежели же рана поперешная и длинная не гораздо далеко пройдетъ, но поспѣе подѣ мясомъ окончится, оную безъ всякаго сомнѣнья спичкою и ножомъ до самой глубины излѣчивать должно. Ежелижъ рана такая не вѣсѣ безопасно покажется, понеже глубоко прошла, то гораздо лучше спичку въ рану поставивъ, рану на другой сторонѣ прошивъ конца спичкина прорѣзать. Такимъ образомъ все находящееся въ ранѣ лучше вонъ вынимается: Ибо, хопя бы пуля наскрозъ удѣ пролѣтѣла, однакожъ въ такихъ ранахъ часто остаются лоскутья и другія вещи (468), которыя весьма бѣдственное вожженіе производить могутъ. А припомѣ лѣкарства въ рану лучше впускать можно. Въ поперешную рану продѣвать можно холщину, намазывая лѣкарствами ранѣ приспойными, и повсядневно проволакивать такъ, чѣмъ въ рану приходила та холщинка часпужа, которая сверху была. И сѣ холщинки или нищи дошоль не вынимать вонъ,

вонѣ, доколь не пройдетѣ вожженіе. А коней тому быть можетѣ, когда рана очистится, и заживать безѣ опасности можетѣ, въ томѣ случаѣ наипаче надобно, среднюю часть раны нѣсколько по силѣ нѣс придавливать.

§. 479.

Однакожѣ временемѣ раны и ширѣ здѣлать не возможно бываетѣ, понеже великія быющіяся жилы уже повреждены, и кровь изѣ нихѣ течетѣ. Которымѣ теченіемѣ спруѣ отдираетѣся, что самое за бѣдственнѣйшее признавается; ибо сіи раны припискиванія не терпятѣ, чрезѣ которое бы кровь остановить можно. какѣ я выше объявилѣ (406). И такѣ ежели кровь бѣдственно течетѣ, притомѣ время и обстоятельства то можетѣ потерпѣть, жилы быющіяся завязать должно. А понеже оныя подѣ спрутомѣ помянны бывають, то часто ихѣ открывать надобно бываетѣ вновь рѣзая, чпобѣ лучше захватить было можно. Ежели раны на рукахѣ или на ногахѣ случашя, съ такими смѣле поступить можно, когда потчасѣ обвязка завертышная, или завертышнѣ на удѣ наложится. Ежели въ другомѣ мѣстѣ на тѣлѣ рана будетѣ, да и въ той изѣ жилы быющейя кровь хлыдетѣ, которой такѣ какѣ на рукѣ или на ногѣ, обвязкою завертышною придавить не возможно, того ради отвѣдать другимѣ способомѣ оное завязать, туѣ иглу кривую большую съ нишкою гораздо крѣпкою подѣ жилу быющуюя продѣвають, и нишопные концы на жилѣ быющейя и сверхѣ кожи зашпигивають. Такимѣ образомѣ такѣ долго завязывается жила быющая верхняя, пока лѣкарѣ не усмотритѣ, что ни въ самой ранѣ ни въ другомѣ мѣстѣ нѣ опчего

оптчею крови невидно (смотрим. 251). Когдажъ жилы быющейся захватить и связать не можно, то апробовать надлежитъ лѣкарства, да такія, которыя къ оспановленію крови сильнѣйшими признаются (409 до 414). Понсже въ оптчаянныхъ случаяхъ и то въ помощь употребить можно, которое, хотя бы за безопасное не признавалось, однако временемъ и то пособствуетъ, ибо сумнительную и маловажную надежду завсегда предпочитать надлежитъ очевидному оптчаянію. Когда изъ глубокой и узкой раны кровь страшно хлыщется, то гораздо лучше оную ширѣ разрѣзать, и послѣ на жилу быющуюся приложить пряжу чистымъ спиртомъ, или другимъ ликворомъ крѣпкимъ намоченную для удержанія крови, и оную опустивъ въ рану, перстомъ такъ долго придерживать, доколѣ кровь не оспановится.

§. 480.

Что же до пропчего лѣченія касается, оное лѣчащему знать весьма нужно, то есть, что сія раны сильно пришибены бывають, и для того залѣчиваться немогутъ до того времени, покуда чисты не будутъ, а то вѣдаемъ, что дѣлается отъ лѣкарствъ гной производящихъ (343). А когда въ сихъ ранахъ находящееся гнилое больше умножается, и въ даль разширяется, то къ лѣкарствамъ въ гной приводящимъ прибавливать надлежитъ другихъ вещей, которыя гноистыя части пользуютъ. Перваго дня положить въ рану пряжу чистую, да и ту мягко и обвязкою такъ обвить, чтобъ раны не зашануль или не придавить. Во первыхъ сіе весьма пристойно тамъ, гдѣ рана ширѣ разрѣзана, и гдѣ край до самого живаго тѣла понадрѣзаны (476, 477) будучь

будушѣ. Ибо въ семѣ случаѣ спиртѣ винный не годится, который многіе употребляютъ. Ежели же, или ради печенія крови, или ради другой какой опасности, струи не рѣзанѣ, да цѣлой оставленѣ, и много такого будетѣ, которое гнить можетѣ, по тому часѣ сперва самого употребить лѣкарства, которыми гнилость вовсе искореняютѣ. Межѣ сильнѣйшими почитаются алкоголь т. е. спиртѣ чистой и другіе также называемые спириты, а понеже онѣ весьма сушатѣ, струи жестокѣ дѣлаютѣ и загнаиваться не попускаютѣ, по симѣ предпочесть можно нѣкоторыя вещи полегче. Между сими почти первое мѣсто имѣетѣ вода называемая ранная (аква вульнераріа), но она должна быть не очень крѣпка, хотя бы спиритуозная была. Также ежели оной водѣ не случится, можно алкоголь съ водою мѣшать и къ ранѣ прикладывать. Гдѣ же рана много мяса пороченаго будетѣ имѣть, и опасность будетѣ, чтобѣ оно гніюче не распространилось, тамѣ сильнѣйшія лѣкарства, и ликворы спиритуозные требуются.

§. 481.

Также, гдѣ опасаться можно, чтобѣ кровь не потекла, всего такого не употреблять, которое влажитѣ и смягчитѣ, и онѣ чего струи можетѣ разойтись. Для того и въ семѣ случаѣ можно прикладывать пряжу или въ алкоголь помачивая, или перпендиномѣ варенымѣ посыпая.

§. 482.

Рану, къ которой ничего другаго не приключится, ни печенія крови, ни великаго вожженія, ни боли, ни горячки, покрывѣ пряжею чистою, чрезѣ два дня

А а

такѣ

такъ не прогашь, послѣ того въ третій день развязашь, и гной наченшійся дѣлаться, выпереть. Въ это время намазывать, и прикладывать, и въ самую глубину раны опускать лѣкарства такія, которыя сваривающъ, и гной производящъ (385 до 394). Если же усмотрится, что край у раны гнишь начнушъ, и зло такое далѣе распространяться станешъ, то къ такимъ лѣкарствамъ прибавить еще вещей дѣйствительнѣйшихъ, которыя я противъ Антонова огня способными объявилъ (192, до 197), и другихъ, которыми спрутъ гнилой размягчивается (198 до 203). Сими лѣкарствами ежели рана вычистится, то ее наполнить надобно, и напоследокъ заживить, къ чему недругое какое лѣчение требуется, какъ поже самое, а какомъ при лѣченіи другихъ ранъ я предложилъ. Сіи раны опмѣнны въ частяхъ мясистыхъ, жильночувствительныхъ, и въ другихъ мѣстахъ, въ плѣхъ неплотномъ, или крѣпкомъ, зимою и лѣпомъ, въ мѣстѣ къ здоровію способномъ или тяжкомъ, ко всему тому во время лѣченія примѣняшся надлежитъ.

§. 483.

Часто случается, что отъ задержанной худой матеріи, и себѣ проходъ въ оболочкѣ клепчатой подъ кожею и между мышками находящейся съскавшей, новое воженіе дѣлается. Въ такомъ случаѣ нѣтъ лучше, какъ въ такой подкопъ, спичку всунувъ по ней кожу разрѣзать, или ежели онъ длиненъ будетъ, на другой споронѣ надъ концомъ спичкинымъ кожу прорѣзать. Донесе такимъ образомъ отвращается воженіе, и рана скорее заживаешъ. Гдѣ длинной подкопъ съ другой спороны будетъ прорѣзанъ

рѣзанъ, оный продѣвъ нить вычистить можно, и залѣчить прикладываніемъ холстинныхъ свершковъ и нѣсколько шугою обвязкою (478).

§. 484.

Ежели ударомъ пули свинцовой кость нѣкоторая вся перешибена будетъ, шутъ рѣдко можно бываетъ удѣ зберечь, ибо многіе обломки, да и пѣ часто острые отъ переломленной кости отскакиваютъ, которыми будпо бы булавками перепонка на костная и мясо такъ бередится, что отъ того производитъ великое вожженіе. И хопя бы сіе вожженіе въ разрѣшеніе привести было можно, однакожъ больной отъ великой гнойности, которая обыкновенно послѣ вожженія приходитъ, будетъ бѣдствовать (87). И такъ ежели великая рана случится, и кость близъ самага состава будетъ перешибена, и раздробленной кости обломки многіе будутъ, да и пѣ одинъ отъ другаго далеко разошлись, то почти завсегда надобно бываетъ удѣ отнимать. А сіе не медля дѣлать должно, доколь вожженіе, а изъ того горячка не дѣлается. Да и не ту кость, которая переломлена, рѣзать надлѣжитъ, но другую, которая выше состава, и здорова. Понеже опасность быть можетъ, чтобъ отъ сильно перебитыхъ около состава жилъ сухихъ и связокъ великое не произошло вожженіе, отъ котораго многія и великія бѣдствія рождаются. Иногда еще кость до самага состава раскалывается, то и для того самага зберечь уда не возможно. Такого приключенія знаки суть, ежели перепонка на костная въ томъ мѣстѣ, гдѣ кость самая перебита, будетъ рѣтса; немногіе же обломки, ежели отъ кости отдѣляясь, и будутъ высунувшись, пѣ въ свое мѣсто

мѣсто посклѣсь надлежитъ. Ежелиже маленькихъ обломковъ спрятать будетъ не возможно, и оныя будучи обнажены, а при помѣ на плевахъ висѣть будутъ, то надобно ихъ отрѣзать. Ибо, ежели онѣ будучи въ перепонкѣ споятъ, а взять ихъ похочется насильно или опорвать, то бѣду можно здѣлать. Которыхъ отрѣзывать не можно, оныя умираючи, и по разслабленіи чрезъ лѣкарства плевѣ, сами собою выпадываютъ. Гдѣ великіе обломки будутъ видны, которыхъ спрятать не можно, оныя пилочкою опиливъ, или клѣщами опципнуть должно. Ежели же удѣ перебитъ и кость переломлена будетъ безъ поврежденія кожи, оное мѣсто также лѣчить надобно, какъ лѣчатъ то, гдѣ кость другимъ способомъ переломлена. Ежелижъ обломки подъ кожей высунуты, которые мясо будучи рѣзать, что по болѣзни и по колотью узнавается, оныя попрежнему въ свое мѣсто вправить надобно. Ибо ежели то можно здѣлать, за нужное не признается мясо напротивъ того прорѣзывать, но часто надобно бываетъ ушибенную и разможенную кожу прорѣзать, чтобъ недвижимая и испорченная кровь выпити могла, дабы съ наружи не произошло вожженіе. Перепонка накопная ежели повреждена, или зардѣвшаяся сыщется, тотчасъ и ее разрѣзать надлежитъ, чтобъ отъ вожженія гной не здѣлался. А прочее что дѣлать останется, представлю, когда о болѣзняхъ буду говорить.

Смотр. у ЛЕДРАНА Третьѣ де плесѣ дѣрмѣ а феа.

СОСТАВ-

СОСТАВНЫЯ РАНЫ.

Артикулорумъ вулнера.

§. 485.

Раны также худыя бываютъ , когда конецъ шпажной , или другой стрѣлы , до самого состава пройдетъ , или когда составъ пуля свинцовая перебытъ , о чемъ я уже объявилъ (357, 474). Ибо бѣдство приияютъ , и великое жилъ сухихъ число , связки , желѣзы возгри въ составъ отдѣляющія , и самая влажность та , которая какъ изъ сихъ желѣзъ такъ изъ связокъ въ составъ стекается , да часпо еще кости и ихъ опроспки и надростки переламываются. Ежели тяжкая и размноженная рана будетъ и многимъ бѣдствіямъ подвержена , доколь еще она чрезъ воженіе не распухнетъ , удѣ надлежитъ отрѣзать (474, 484). Препрудно также лѣчить и самыя малыя раны , ежели онѣ подлинно въ составъ попадутъ , понеже сихъ ранъ разширитъ не возможно. Почти сноснѣ раны большія и ширшія , и изъ которыхъ значная часпъ связокъ отрублена , или стрѣлою и пулею разодрана будетъ (*). Безопаснѣ всѣхъ рана , которая будетъ на самомъ концѣ , и скрозь оную связку , которою составъ держится , называемую сумошною [капсуларе] не пройдетъ.

(*) ЛЕ ДРАНЬ де плесъ д' арме а феэ стр. 199.

§. 486.

Изъ сихъ ранъ выключая , что въ нихъ большая боль и воженіе безвременно дѣлаются , влажность течетъ нѣсколько густая , клейковатая и бѣловатая , и меду бѣлому будпо бы нѣсколько подобная , меліхура или синовіа называемая (357). Оный

А а з

сокъ

сокъ заживлять раны препятствуетъ , и очень трудно его остановить можно. А на послѣдокъ , когда онъ такъ долго будетъ печь , рана застарѣетъ , у которой ежели жесткость [калусъ] здѣлается , то она обыкновенно въ фистулу претворяется. Ежелижъ и рана залѣчена будетъ , однако составъ оный струпа скорченный останется , такъ что уда ни прогнуть ни согнуть будетъ не возможно.

§. 487.

Ежели же составъ будетъ перебитъ , а надежда останется , что удъ зберечь можно , то ударъ сколько возможно будетъ разрѣзать , и хотя около синевы будетъ , край у раны поразрѣзывать должно , дабы шрамъ выходъ соку здѣлался (477). Къ уду раненому положить жидкія припариванія , которыя наивышше противъ вожженія служатъ ; а на рану прикладывать эссенцію балсамическую , такъ чтобъ она въ себѣ имѣла большую часть янтарю (388) , эссенцію гумми , семи маспихисъ. Къ симъ ранамъ не годятся вещи въ гной приводящія , дигеренція , отъ которыхъ все , которое внутри связи будетъ , разслабываетъ такъ что оная влажность (486) больше потечетъ. Вредны и припариванія влажныя или мокрыя , или преизлишне смягчительныя , когда съ наружи къ составу прикладываются. Не надобно также употреблять вещей острыхъ. Надлежитъ же , особливо при лѣченіи сихъ составовъ , беречься отъ воздуха и холоду , отъ которыхъ пресильной вредъ дѣлается таковымъ ранамъ , да и лѣкарства , которыя въ рану кладутся , и которыя на рану накладываются , только быть должны теплыя.

РАНЫ

РАНЫ , ЯДЪ ИМѢЮЩІЯ.

ВУЛНЕРА , КВЕ ВИРУСЪ ГАБЕНГЪ.

§. 488.

Протяжки раны бывають , которыми ядъ нѣ-
который въ нихъ имѣющійся , въ шблѣ приходитъ ,
и по шбламъ скоропостижно расходитъ . Понеже
иногда человѣкъ стрѣлою ядомъ напоенною бываетъ
устрѣленъ , иногда ехидна , змея или бѣшеное и иное
животное укуситъ , иногда его скорпионъ ужалилъ ,
копорыхъ всѣхъ бояться должно , да и лѣченія
вдалѣ откладывать оныя не пребуютъ . Случится
также можетъ , что и къ ранѣ ничего ядовитого
въ себѣ не имѣющей , нѣчто приложится , которое
само собою ядовитое есть .

§. 489.

Но почти всего чаще случается , что ехидна
человѣка ужаливаетъ . Сіи животныя ядъ , въ осо-
бенной нѣкоторой желѣзѣ отдѣленный въ нѣкакомъ
мѣшечкѣ или пузырькѣ сокровенный имѣющія , скрозь
дуплястые или пустые зубы въ ротъ въ похъ самое
время выпискиваетъ , въ которое животное зубами
шбмижъ нѣчто хватаетъ .

(*) Вещей естественныхъ изслѣдователи доказываютъ , что
сей сокъ , который другимъ животнымъ вредителенъ , симъ не
обходимо надобенъ . Понеже они представляютъ , что ехидны , дру-
гими животными , и въ разсужденіи ихъ самихъ большими кормятся ,
и содержатся , сіи животныя угрызены будучи очень скоро отъ яда
ослабеваютъ и умираютъ , которыхъ въ другомъ случаѣ или оборо-
нотись или бѣгствомъ моглибъ спастись . Да припомъ ехидны и
зми все что ни пожираютъ прежде не жуютъ и не проглатываютъ ,
пока покусаніе ядомъ напоенное не здѣлается , чтобъ въ ихъ по-
рохъ скоро размягчилось и въ разрѣшеніе пришло , дабы шбмъ лучше
по всему шблу разойтись могло . Смотр. у МЕАДА обь отравкахъ
стр.

стр. 6. Сокъ оный безвреднымъ призналъ ХАРРАСЪ въ новыхъ испытаніяхъ или спытахъ о ехиднѣ, онъ ядъ въ люпости спиритовъ сего животнаго поставилъ, но сіе мнѣніе новыми опытами опровергъ ФРАНЦИСКЪ РЕДИ въ Оссервационе, и въ Лептера сопрялкуне Опозиціони фатте алле, сие оссервациони инто; но алле ви-пере. Еще смотр. у АНТОНІА ВАЛЛИСНЕРА Оссервациони варіи N. 42 инъ опп. Т. 3. стр. 229.

§. 490.

Скорпіонъ на самомъ кончикѣ хвоста имѣетъ жало внутри пустое съ двухъ боковъ по дирочкѣ имѣющее, изъ котораго онъ ядовишый сокъ въ раны жаломъ ужаленыя вливаетъ.

(*) Смотри разные опыты надъ скорпіонами учиненные и сіе жало нарисованное въ I. К. А. Наукъ 1731 году, стр. 318.

§. 491.

У насъ рѣдко случается такихъ ранъ лѣченіе, которыя бывають отъ страшилищныхъ улей, несѣкомыхъ, чрезъ кусаніе въ тѣлѣ причиняемыхъ. Ибо такія животныя больше въ жаркихъ мѣстахъ плодятся, а въ нашей землѣ рѣдко случаются, а хогя и есть однако такъ вредной силы не имѣють. А еще и того рѣже, развѣ только у варварскихъ народовъ, ядомъ напоенныхъ стрѣлъ употребленіе.

§. 492.

Который человекъ раненъ будетъ раною ядъ имѣющею, а особливо, котораго ехидна укуситъ: топчасъ въ лицѣ блѣденъ здѣлается, а послѣ того блѣдность оная съ начала показавшаяся вскорѣ желшветъ, и будетъ будпо бы желтцо немочью боленъ. Жилы быющіяся у него топчасъ млѣють, и бишься топчасъ начнутъ слабо, неравно, а часто и съ оспоновкою. Человекъ самъ будетъ побаиваться, части въ рукахъ и въ ногахъ позябывать, и повсему тѣлу пошъ холодный будетъ печь. Часто осморокси
будетъ

будетъ имѣть, а послѣ того потяготы начнутъ. Со всѣмъ тѣмъ при великомъ поносѣ и рвота у человѣка здѣлается. Нѣкоторые отъ неуполимой жажды прясущя, другимъ не всклонно спать хочется, а послѣ того скорчившись, нечаянно умираютъ.

(*) Смотр. у ХАРРАСА въ пом. мѣст. стр. 155. Дескрипціонъ десъ Іль де л'Америкъ паръ ле П. ЛАБАТЪ Т. 1 гл. 7 стр. 161. тутъ же поставъ Те Философікаль Транзакціонъ Вол. 39 No. 433 стр. 313.

§. 493.

А чѣмъ больше животное такое бываетъ сердито и бѣшено, тѣмъ рана больнее бываетъ. У котораго жѣ человѣка повреждена будетъ жила чувствительная, жила сухая, тому почти со всѣмъ и въ скоромъ времени умирать надобно. Которое животное уже нѣсколько разъ кусало, и уже большую часть онаго сока выдавило, не такъ сильно жалило.

§. 494.

Да и то знать должно, что всякой ядъ не всегда и не всякому человѣку вредитъ. Ибо иногда какъ ехидна такъ и змѣя безъ всякаго вреда кусаютъ. Рѣдко бываетъ ядовито скорпіоново угрызеніе, и не всегда послѣ укушенія бѣшеннаго животного человѣкъ бояться воды начинаетъ. Мнѣ кажется, многіе въ этомъ дѣлѣ обманулись, которые различнымъ и суебнымъ лѣкарствамъ и другимъ пособствованіямъ, въ такихъ случаяхъ ими употребленныхъ, нѣчто приписали, да и многихъ таковыхъ, которые не разсудя такого лѣченія въ лѣченіе вступали, обманули. Понеже часто сами въ себѣ думали, и другимъ наговаривали, будто имъ отъ лѣкарства облегченіе пришло

шло ; они и безъ лѣкарствъ не потерявъ здоровья быти бы могли.

(*) Смолпр. І. К. А. Н. въ томже мѣстѣ.

§. 495.

Въ такихъ случаяхъ лѣкарю весьма поворотливому быти должно. Какъ увидишь, на какомъ мѣстѣ ужалѣніе или укусъ, тотчасъ должно ему, не упуская времени, перстѣ или другой членѣ, повыше раны, нишкомъ нѣсколько пуго завязать, однакожъ не такъ пуго, чтобъ зашѣкъ, или бы Анпоновъ огонь приключился. А послѣ того рану частѣхонько и глубоко порѣзывать, дабы чрезъ то много крови запеклой выпекло, и ядъ вонъ выпити могъ.

§. 496.

Но къ такому дѣлу человѣкъ долженъ употребить другаго человѣка, который бы то высосалъ, да и то не можешь быти безъ крайней осторожности. Ибо тому сосуну надобно имѣть ротъ здоровый, чтобъ на деснахъ, на нѣбѣ, и на другомъ мѣстѣ въ роту, никакой язвы не имѣлъ. Понеже ядъ не въ смакованіи, но въ ранѣ вреденъ (*). А гдѣ такого смѣльчака не сыщется, чтобъ рану высосать, то должно банку наспавить, чрезъ которую посредствомъ ядъ съ кровью изъ разрезанной раны выпянуть можно. Ежели же мѣста удобнаго къ поставленію банки не сыщется, то неоптѣнно надобно рану желѣзомъ каленымъ гораздо выжечь, и послѣ стругъ, прикладывая лѣкарства гной производящія, въ разрѣшеніе привести, и долго прикладывая къ язвѣ вещи гноющія, а потомъ опять прижечь, или ножечкомъ понадрѣзать. Ибо должно, чтобъ рана долго не заживала.

(*) изъ

(*) Изъ древнихъ народовъ ПСИЛЛЫ ЛИВІЙСКІЕ , и Марсы , Италіанскіе народы , людей змѣю укушенныхъ раны высасывая лѣчили , сбѣывая о себѣ другимъ , будто бы имъ сіе сродное было. Но отомъ ЦЕЛСЬ въ Кн. 5 въ гл. 27 прямо говоритъ , что они великаго въ томъ ученія не имѣли , но только смѣльство свое чрезъ употребленіе утвердили. Смотри. онихъ у ПЛИНІЯ въ Кн. 7 въ гл. 2 стр. 371 ; у А. ГЕЛЛІА Кн. 19. гл. 11. Въ Елеспонтѣ около Паріумъ жили οΨιούγενεις , о которыхъ думали , будто бы они отъ змѣинова укуса однимъ прикасаніемъ лѣгостъ дѣлали , и приложеніемъ рукъ ядъ вытягивать могли. Смотри. у СТРАБОНА въ Кн. 13. стр. 880. у ПЛИНІА на пом. мѣст.

§. 497.

А гдѣ рана не прижжена , но изрѣзана будетъ , оную вымывать надобно водою съ солью , селитрою , и съ есеріакомъ смѣшанною , а послѣ того прикладывать должно лѣкарства смягчительныя и гной производящія (91, 92) , а при томъ худую матерію вонъ изводящія. Ксему способны густыя припарки , изъ муки съ молокомъ , съ винными сочными ягодами и съ пѣспомъ изъ квасни. Раны не заживляясь , доколь гораздо долго не будутъ гноиться , а межъ тѣмъ уды жидкими припарками припаривать такими , которыя противъ вожженія наисильнѣе служатъ могутъ.

§. 498.

Внутри лѣкарства давать должно крѣпительныя [кардіака] и потѣ легкой производящія [алексифармака] , отъ коихъ успѣхъ бываетъ благополучный , понеже потѣ по всему тѣлу производятъ. Того ради должно больному хорошо быть одѣтому , и содержать себя въ покоѣ , доколь весь потѣ окончится , тогда онъ теплымъ полотенцомъ всѣ свой уды долженъ обтереть. Во время раны , отъ схида полученной , за важнѣйшее лѣкарство признававшаяся соль схида [саль випере] ; оной можно

въ теплой похлебѣ принимать по драхмѣ. Оеріакѣ, Мипридапиво особенное лѣкарство отъ отравы [антидопумѣ Мипридапи] и другія, о которыхъ въ народѣ думается, будто отъ всякихъ отравъ человека избавляютъ, почти всегда обманываютъ, да и другимъ лѣкарствамъ народнымъ противу отравы не надобно вѣрить, которыми народъ легковѣрія своего приписывать не стыдился, за шѣмъ отъ бродяжныхъ обманщиковъ крайне выхваляются.

§. 499.

Однакожъ говорятъ, что не весьма давно отъ угрызенія ехиднина лѣкарство пособствующее найдено, а понеже оное чрезъ явственныя опыты узнано и апробовано, по о дѣйствительности онаго вовсе усумнѣваться не возможно: Ибо человекъ нѣкоторый ехиду самъ у себя къ перспу припустилъ, которая его такъ укусила, что изъ раны кровь покапала. Раненый человекъ пресильную и весьма нестерпимую боль въ рукѣ почувствовалъ, и послѣ того вскорѣ все то вытерпѣлъ, что при угрызеніяхъ ехиднинныхъ обыкновенно случается: Онъ началъ часто глазами повертывать, и поплакивать, въ груди и около сердца боль и тоска здѣлалась, дышать трудно, и обмиранъ началъ, потъ холодный потекъ. Вскорѣ послѣ того брюхо вспучило, въ брюхѣ воркотня и рѣвъ, да и въ поясницѣ претяжкая боль, а при томъ частая рвота и поносъ причинились. Между тѣмъ глаза помрачились и сволоклись какъ, что больному все, что онъ ни видѣлъ, вдвое казалось. На послѣдокъ съ четвертью часъ спустя, всю руку у него надъ канфоромъ масломъ деревяннымъ вымазали и терли руками хорошенько, отъ чего и боль и другой

то все, о чѣмъ больной жаловался, прошло или миновалось. Онъ въ сонѣ пришесть, и до другаго дни сильно спавъ выздоровѣлъ (*). Тоже самое еще новѣмъ опытомъ въ Дрезденѣ учиненномъ, апробовано.

(*) Гти опыты предѣ членами Королевскаго Медико-и-стскаго общества въ 1734 году Юля 1 дня дѣланы были. Смолр. Те Филозо-фическа Транзакціонъ Вол. 30. на мѣст. вышепоказанномъ.

(**) Смолр. славн. Авр. ВАТЕРА въ Диссерт. о лѣкарствѣ про-тивъ оправъ или ядовъ новомъ, отъ угрызения ехиднина весьма дѣ-ствительномъ, въ Англіи не весьма давно изобрѣшенномъ в. 1734 году.

§. 500.

Отъ укусу бѣшеннаго живошнаго послѣдуетъ боязнь воды; которую болѣзнь, *идрофобія* Греки на-зываютъ. Въ этой болѣзни больной жаждою и водою боязливоспѣю мучится: копорый самъ послѣ взѣ-сившись, тяжко и бѣдную смертью умираетъ. Ядъ таковой, въ тѣло впуценъ будучи, не потчасъ по-гибельныя сѣи мученія причиняетъ, но часто гораздо чрезъ долгое время въ человекѣ бываетъ безвреденъ, и будто бы задавленъ. А послѣ того нечаянно безчеловѣчная оная болѣзнь приходитъ, и такъ сви-рѣбитъ, что человекъ въ короткіе дни съ свѣта сводитъ. Живошныя же бѣшенныя не однимъ куса-ніемъ вредъ дѣлаютъ, но, понеже кровь и всѣ ихъ соки, а особливо слина, такимъ ядомъ исполнена, также и человекъ прездоровый въ эту болѣзнь попа-дася, ежели въ его соки, а особливо въ слину или въ кровь хотъ самая малѣйшая часнь испорченнаго сока придетъ.

ЛЕМЕРИ въ Истор. К. А. Н. 1767 году на стр. 31 представля-етъ, что собака проглотивши крови отъ человека болѣзною водо-болѣзною [*идрофобія*] немощствующаго взѣсилась.

§. 501.

А бѣшенство животнымъ отъ различныхъ тлу-
б б з; часвѣ

часѣхъ приключается. Ежели скопина, и особливо собака на цепи прикована будучи, на пресильномъ солнечномъ жару будетъ пекся. Ежели пить имъ даюхъ воду нечиспую, и гнилую, грязи и червей полную. Ежели пить не дадутъ, а она долго и жарко будетъ жажничать. Ежели кормятъ гнилымъ мясомъ и костями, вешчиною ржавою. Ежели отъ такихъ или другихъ причинъ черви въ почкахъ и въ другихъ пошрохахъ зарадятся.

§. 502.

Ежели же на человѣка такой падежъ случится, и отъ того уже болѣзни надобно быть, то она начинается необычайною и скучною болью въ томъ удѣ, который укушенъ. При томъ части околосердечныя болятъ, вздуются, больной необычайно сномъ отягощенъ бываетъ, которая слабость и безчувственный сонъ ночь и день продолжается. Больной, когда опамятуется, на силу болѣзнь можетъ терпѣть, крайнее изнеможеніе во всемъ чувствуетъ, испоманамъ начнетъ мучиться, и дышать безъ трудности и воздыханій не можетъ. Когдажъ болѣзнь усилится, то начнетъ воду и всѣхъ жидкихъ вещей бояться, такъ, что ежели въ глаза слезъ водяной попадетъ, или услышитъ хотя маленькое теченіе или шумъ, тошчасъ начнетъ корчиться. А при томъ въ роту непомѣрная жажда продолжаться будетъ, которой пособить колыми паче утолить никакимъ пойломъ не можетъ, ради оной *идрофобіа* т. е. боязни воды. Много блюетъ желчнымъ. Удѣ дѣтородный спойтъ, въ мысли суешныя мечтанія рождаются, однакожъ безумство на нѣсколько минутъ временемъ отходитъ. На послѣдокъ же онъ сильнае дѣйствовать начинаетъ, бѣсится,

бѣсится , кусаетъ , языкъ распухлый , вовсе засохлый , расщепавшійся изъ рта высунетъ , слину текущую глотать не можетъ , ежели говоритъ , то голосъ ничего не значить . А къ концу , по частой потягопѣ духъ холодный чуть чуть будетъ слышенъ , и вовсе останавливается , и такъ больной около четвертаго дня будто бы задавленный умираетъ .

§. 503.

Въ тѣлахъ послѣ смерти вскрытыхъ зѣнія гортанныя зардѣлы , желудокъ желчными и клейкими мокротами наполненъ , желчи много и черной , и части внутренностныя всѣ будто бы сухи нахожены . А кровь во всемъ тѣлѣ жидка была , которой ни на холодъ застудить было не возможно .

(*) Смотр. въ Истор. К. А. Н. 1699 стр. 55. Однакожъ РОЛ-ФИНЦІЙ тому противится , чтобъ въ скрываныхъ трупахъ зѣнія гортанныя воженныя находились . Смотр. въ его Диссерт. Анастом. Кн. I , гл. 13 , стр. 179.

§. 504.

Во всякомъ больномъ сею болѣзною посѣщенномъ надежда бываетъ малая , а опчаяніе вовсе извѣстное , ежели больной потчасъ занеможетъ . А зло такое тѣмъ жесточе бываетъ , и тѣмъ извѣстнѣйшую гибельнаноситъ , чѣмъ неукротимѣйшимъ бѣшенствомъ шапающаяся бываетъ скопина кусающая . Много къ сему способствуетъ время годовое , возрастъ , тѣла состояніе , въ кушаньѣ и питьѣ содержаніе и другое , о чемъ я уже нѣсколько разъ говорилъ .

§. 505.

Ежели рану такую лѣкаръ принимается лѣчить , то ему все дѣлать поспѣшно надлежитъ , что я о дру-

другихъ ядовитыхъ ранахъ (495, 496, 497). показалъ; а человекъ, который бы отважился ядъ изъ такой раны высасывать, пропасть и смерть себѣ здѣлать можетъ. Пошъ въ больномъ производить должно, да не горячестъ имѣющими въ себѣ лѣкарствами, которыя въ сей болѣзни смертельными признаются, но уксусъ безоардической съ водою теплою, даючи. Больнаго же одѣялами очень хорошо покрывъ въ постелѣ содержать, или со всѣмъ въ баню не весьма жаркую сажать должно. Послѣ пошнѣя очень хорошо давать проносныя (капарктика) пропивъ вожженія способными мною признанныя (63). Весьма путь надобно воздержаніе, кушать давать понемножку и кисленькаго. А пить прилично или холодную воду, и ппизанъ изъ ячменю съ сокомъ цитроннымъ. Должно припомъ клисперы спавить, а въ оныя довольно соли и селистры класть. Платье оплеванное пошъ часъ скидывать надобно.

§. 506.

У весьма старинныхъ авторовъ чрезъ опыты изслѣдовано, весьма хорошее лѣкарство къ отпращенію *υδροφοβία*, то есть боязни водной, человека въ море, или въ прудѣ, бросать, и дать ему попопшему пить, и когда напьется, вонъ вынять, и опять окунуть, чтобъ и не хоща напился, такимъ способомъ отъ страха водянаго избавляются. Но лучше будетъ человека не чаянно, и чтобъ онъ воды не видалъ, въ воду спихнуть. Ежели же такимъ образомъ человекъ въ водѣ холодной измается, то сго послѣ того въ постелѣ теплою согрѣть должно.

(*) Целъ Кн. 5. гл. 27.

§. 507.

§. 507.

Ежели человѣкъ совершенно уже въ болѣзни находится, то вся надежда пропала. Однакожъ гдѣ никакой надежды не видно, тупѣ кровь такъ пустить надобно, чтобъ чрезъ то пусканіе человѣкъ вовсе слабъ здѣлался, а послѣ его въ воду опустить (505), или къ свѣ привязавъ, безмѣрно водою поливать должно. Тупѣ не надобно пощяготѣ или пруженій бояться, ибо оныя у таковыхъ пресильныя бывають: Понеже примѣчено, что иногда больной, потерявъ всю жизненную силу обмираетъ, а послѣ какъ почувствуется, то на воду безъ всякаго страха глядѣть можетъ.

(*) Смотр. въ І. К. А. Н. 1690 году на показ. мѣстѣ.

§. 508.

И прошивъ сего яда премножество отъ разныхъ Авторовъ предложенныхъ антидотовъ ш. е. лѣкарства отъ яда или отъ отравы, и такъ похвальныхъ, что кажется они писали больше то, что кому ни понравилось, а не то, чтобъ ясное нѣчто въ оныхъ показали, о нихъ можно думать, будто бы другую нѣкакую часть медицины постигли. Однакожъ я не могу удержаться, чтобъ не представить здѣсь того, что не весьма давно въ народъ издалъ преславный мужъ РИХАРДЪ МЕАДЪ (*).

(*) Сие лѣкарство уже давно описано въ Трансакціяхъ Англическихъ въ Но. 237; смотр. ЛОВЕОРПІЕВЪ Компендіи Вол. 3 стр. 284; а найдено было ДАМПИЕРІЕМЪ славнымъ въ кораблеплаваніи человекомъ, которое славный ІОАННЪ СЛОАНІЙ описалъ, и въ народъ выдалъ, МЕАДЪ же, какъ слухъ носится, различными опытами изслѣдовавъ утвердилъ. Прежде всего человѣку, котораго собака бѣшеная укуситъ, крови унцовъ восемь или девять пустить. Послѣ здѣлать порошокъ, который въ себѣ будетъ имѣть полунда лихенисъ терестрисъ ш. е. коросной травы земляной, высушеной и мелѣхонько
В а стершой,

репонки повреждаются, отъ которыхъ всякъ знаетъ, что крайняя бѣда бываетъ.

§. 310.

А на головѣ ранены быть могутъ кожа, жиръ, мышки, разширенія или протяженія ихъ [апоневрозъ] сухія жилы, перепонка надчерепоголовная, которая собою и мышки височныя обнимаетъ, и другая перепонка надкостѣемъ называемая, которая черепъ самый окрываетъ, и подъ помянутыми спрянана; кромѣ того проламывается черепъ разными способами, съ которыми повреждаются мозгъ и плевы его. О ранахъ на лицѣ, на глазахъ, и на другихъ мѣстахъ случающихся, особенно поговорить должно.

§. 311.

Иногда случается, что человѣкъ, у котораго голова сильно ушибена будетъ, потѣ часъ умираетъ, у котораго по вскрытіи тѣла ничего не находится такого, отъ чего бы онъ такъ незапно умереть могъ: Ибо въ такихъ случаяхъ и то мѣсто, по которому съ наружи ударилъ, не распухаетъ. Такіе люди въ минуту умираютъ, понеже мозгъ и можжечокъ отъ удара сильно потрясуются (*), и придавятся ихъ жилъ чувствительныхъ начинанія, которыя къ внутренностнымъ частямъ принадлежатъ, и въ нихъ жизненное движеніе производятъ.

(*) Потрясеніе мозга [коммोटіо церебри] называется, когда отъ удара по головѣ, или отъ упаденія съ вышины сильно ушибется, и потрясется то *εγκεφαλον*. Уже то Иппократъ узналъ въ част. 7. Афоризм. 58, о болѣзняхъ К. 1, Разд. 4, Т. 2, стр. 4; и Коак. пренот. ч. 37, Точ. 1, стр. 572. Мозгъ и отъ другихъ случаевъ трясти можетъ, наприм. ежели человѣкъ съ духомъ полонъ собравшись, шакъ чхаетъ, что все тѣло сильно содрогнется. Смотри у ДУРЕТА въ Комментар. на Коак. стр. 408. Отъ сего мозга потрясенія кажется дѣлается все то, что у чело-

у человека послѣ полученія удара въ голову приключается, понеже у него все предъ глазами бывающее, будто бы въ нѣкоторой мракъ вершился, въ глазахъ темно дѣлается, и другія чувства помрачаются. Такъ зашибенный человекъ, когда его спрашиваютъ, не отвѣтствуетъ, обивается, опускается, желчь блуется, и безъ чувства, будто бы спящій, лежитъ. Ежели же все такое спустя нѣсколько времени случится, то можно думать, что то дѣлается отъ крови изъ жилъ кровообращательныхъ перерванныхъ изтекшей, и мозгу давящей. Еще же случиться можетъ, что сосуды отъ одного шокъ въ мозгу потрясенія перерываются. А то пошому узнашь можно, что иногда на черепѣ никакой щели не находится, а подъ черепомъ множество крови запеклой. Еще же гораздо сильнѣе мозгъ спрашивается, когда кость или вся цѣла останется, или не много раскалывается, а когда проламывается, не такъ великое бываетъ мозга поворачиваніе, и то самая правда. Ибо ежели послѣдній припадокъ случится, то кость, такимъ образомъ движеніе претерпѣвающая, когда проламывается, то онаго потрясенія жестокость не такъ сильна бываетъ, а ежели бы она не проломилась, то бы всякъ сила до внутреннихъ частей коснулась. Смотри у ЛЕ ДРАНА Обс. въ Т. 1 стр. 111. Однако же мозга съ нѣща потрясеніе, особливо въ случаяхъ судебныхъ, часто за причину поставляется тогда, когда у мертвыхъ послѣ удара недолго жившихъ, ни кость проломлена, ни кровь запекшаяся, ни иное что не находится, которое бы такъ скорую смерть причинить могло. Понеже въ сихъ шлахъ, ни рана на кожѣ нашедшаяся, ни нѣсто ушибенное какъ у другихъ, не краснѣетъ и не распухаетъ, зашвы что по умершимъ всей жизненной силы кровь нѣстѣ сходящаяся не можетъ. Смотри дешопамашнимъ примѣръ І. К. А. Наукъ 1705 года, стр. 68. Но я думаю, сіе рѣдко случается.

§. 512.

Гораздожъ часто случается, что иной человекъ шяжко ушибенный, съ начала худыхъ знаковъ имѣть не будетъ, и будетъ думать о себѣ, будто бы вовсе безопасенъ. А чрезъ нѣсколько, да еще и много дней, не чаянно, приступяиъ худыя болѣзни и мозга сильно уязвленнаго знаменованія, которыя по большой части слѣдующую смерть будутъ значить, которой по слабости человѣческой и поразличію шѣлъ и ранъ избѣгнуть не возможно. Для шого надобно Медику

дику ни объ одномъ, кому голова проломлена, не думать, что онъ безопасенъ, но всѣми силами стараться высмотрѣть, что тутъ бѣдственное и небѣдственное есть, и ежели нѣчто изъ тѣхъ усмотришь, объ чего можно знать, что человекъ въ опасности находится, не опуская времени, тотчасъ оному человеку долженъ пособствовать. Понеже такія пособствования, хотя бы ничего не дѣлали, и больной хотя бы умеръ, однакожъ за то больше медику проспительно есть, что онъ разсудительно и благоразумно въ томъ поступалъ. Случится еще можешь, что человекъ раненый, за безопаснаго почтеть и безъ увѣщанія, не смирно себя будетъ содержать, толькожъ надеждою своего здоровья обманешь, умрешь.

(*) Смотр. многие примѣры ранъ головныхъ, которыя съ начала легкими казались, а послѣ чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ смертоносными оказались, въ БОНЕТОВОМЪ Сепульхрѣ Кн. 4 Раздѣл. 2 или Частъ 2.

§. 513.

Да и то еще знать должно, что сихъ ранъ почти умомъ постигать не возможно, каковы онѣ, и ни въ какомъ другомъ ранъ родѣ знаки будущаго здоровья или смерти такъ не безизвѣстны, какъ въ ранахъ на головѣ случающихся. Понеже иногда прешаяжкія раны, которыми жестокая мать и самый головной мозгъ такъ ранены случались, что великое множество гноя изъ проломленаго или прорубленаго черепа головного выпекало; и хотя раненый человекъ, въ холодѣ, въ жару, въ похощахъ обращался, и со всѣмъ не умѣренно и не постоянно жилъ, однакожъ безъ всякой опасности, и безъ тѣхъ злоключеній, каковыя при сихъ ранахъ случаются, бывали вылѣчиваны (*).

В в 3

лось,

лось, что человекъ тяжко раненый, при всѣхъ такихъ знакахъ, которыхъ бояться надобно, но и которые всю надежду отнимаютъ, и настоящую смерть показываютъ, збереженъ бывалъ и вылѣченъ (**). И такъ въ Медицинѣ, хотя бы нѣчто за вѣчное и за совершенно такъ дѣлаться надлежащее признавалось, однако то не есть вѣчное, чему дѣлаться надобно (***). Для того при лѣченіи ранъ головныхъ очень хорошо всякому знать, чего и когда наибольше опасаться, толькожъ что можетъ напоследокъ дѣлаться, того подлинно никому неможно прежде времени ни знать ни угадывать.

(*) Вѣной памяти достойна исторія, за нѣсколько лѣтъ, наздѣ отъ Лѣкаря Авертѣнскаго ЛУДОВИКА ФРАНЦИСКА МАННЕ весьма хорошо написанная. Человеку въ тридцать лѣтъ камнемъ голову проломили, на правомъ боку въ верхней части кости лобной. рана въ томъ мѣстѣ величиною была съ гривенникъ. Послѣ получения раны той ничего не послѣдовало, чего бы опасаться надлежало. Человекъ оный, будучи за три двора отъ своего дому камнемъ ударенъ, безъ всякой вредности домой вернулся, и съ своею женою спалъ. Послѣ въ городокъ Авертѣю пришолъ, и у Аптекаря балсаму Арцей и пластыря изъ бетоники купиши приложилъ. Оное здѣлавши чрезъ двадцать дней со всѣмъ былъ здоровъ, торчяки не было, голова не болѣла, сонъ не клонилъ, и потягивъ не было. Завсегда бѣсть хотѣлось и бѣлъ очень довольно, ночью въ обычное время сладко спалъ; а между тѣмъ разныя работы работалъ. Разныя тяжести на плечахъ носилъ, пашню пахалъ, и оралъ, вино квасилъ, и пресомъ виноградъ давилъ. Днемъ на прежестокѣ жару солнечномъ, ночью на полѣ подъ деревьями во всякомъ непогодѣ, спалъ. Когдажъ надобно было ранъ заживать, онъ пришелъ къ сему Лѣкарю, то онъ его въ городскую лечебницу отвелъ. Лѣкарь посмотрѣвъ на рану, увидѣлъ, что снѣ не имѣетъ въ себѣ никакихъ худыхъ признаковъ, приложилъ вѣди прижигательныя на гнзюее мясо, которое на ранѣ выросло, чтооъ оное сѣбло. И когда присмотрѣлъ, что изъ раны можетъ гноная потекло, прорѣзалъ кожу, и вытащилъ обломкѣ, верхняго слоя черепа головного. А понеже какъ онъ вѣпотъ обломкѣ вынулъ, показала ему внутренняя часть цела, то онъ ее не пронувъ оставилъ. Когда же со дня на день увидѣлъ, что гной прибавляется, попробовалъ въ рану спичкою, которая глубже и глубже дошла до самаго мозга,

по

тѣ онѣ вынулъ и другой пластины, называемой стеклянью, обломкѣ многими будто булабочками напыханной. А какѣ открылъ мозгѣ, тушѣ начался превеликимѣ множествомѣ гной, такимѣ образомѣ всякой день, когда онѣ хотѣлъ рану перевязывать, великое множество гною изѣ язвыны вытекало. Послѣ того какѣ перестало гноение, мозгѣ, который выгнилъ, выросъ, и все, что было пусто, наполнилось. Напослѣдокѣ мясомѣ отѣ жестокой матерїи и отѣ самой кости, какѣ то обычно дѣлается, произрастающимѣ, дѣра полная зѣблалась, и челомѣкѣ выздоромѣлъ. Только, чему почти никакѣ вѣрить не возможно, вовсе то время въ больномѣ ничего того не примѣчено, что у другихѣ, у кого голова бываетѣ проломлена, и мозгѣ поврежденѣ, случается.

Не меньшаго примѣчанїя достойна мнѣ кажется и сїя исторїя въ Санктпетербургѣ случившаяся, у Минїатурнаго живописца Самсоа 1757 года Генваря сѣ 19 дня на двадцатое, въ ночное время посторонніе люди желая чрезѣ окно въ раздѣлѣ достать пожизки его, саужителя его Григорья Максимова, который ихѣ дѣйствиѣ услышавѣ въ томѣ противилсѣ, изѣ горницы окномѣ бездѣномѣ въ шомже самѣмѣ мѣстѣ на лѣвой сторонѣ, такѣ голову проломилѣ, что онаѣ рана не сѣ гривеникѣ, но сѣ цѣлѣй большой рублевикѣ была, и черепѣ въ мозгѣ былѣ вдавленѣ перста на два; оный по указу Медицинской Канцеларїи присланѣ въ Санктпетербургскую Адмиралтейскую гошпиталь, гдѣ сѣ превеликимѣ трудомѣ оныя обломки вынуты, тушѣ найдена жестокая матѣ прорвана, мозгѣ, какѣ объявлено, вдавленѣ, однако онѣ будучи пользованѣ оной гошпитали Главнымѣ Лѣкаремѣ МАРТИНОМѣ ШБИНЫМѣ, который и самого мозга удромѣ до четырехѣ вычерпалѣ, чрезѣ два мѣсяца и восемь дней, почти безѣ всякихѣ важныхѣ припадковѣ, кромѣ горячки въ нѣкоторыя времена, выздоромѣлъ, мозгѣ наполнился, жестокая матѣ кѣ дѣрѣ проломленной присовокупиласѣ, и произвела своими жилами бьющимися изѣ черепа головнаго новую кость, и такимѣ образомѣ онѣ Марта 29 дня здоровый при репортѣ Канцеларїи Медицинской обратно представленѣ.

(**) Смотри такую исторїю, въ примѣчанїи первомѣ бРИССЕ-РОВОМѣ, которая не меньше какѣ первыя двѣ удивленїя достойна, въ ней описывается, что будто бы самый можечокѣ у мозга головного сильно былѣ раненѣ.

(***) ЦЕЛСЬ. Кн. 7. гл. 12 §. 4.

§. 514.

Не безѣ опасности же и такїя раны, гдѣ воло-
сая кожа, и гдѣ частїи подѣ кожей находящїяся,
какѣ

какъ я сказалъ (510) разбиты будутъ , хотя бы вся кость цѣла осталась. Ибо временемъ и въ мышкахъ и въ ихъ сухихъ жилахъ , также и въ распространѣнїяхъ или протяженїяхъ мышечныхъ вожженїе дѣлается , а понеже такія части жилы чувствительныя въ себѣ имѣютъ не далеко отъ начинанїя ихъ опшедшїя , то могутъ причинять страшную боль , и превеликое удовъ разслабленїе. И плевочка или на костная оболочка черепъ головной съ наружи оболочающая , сообщается съ жестокою оболочкою надъ мозгомъ. Понеже и сосуды кровеносные и жилы чувствительныя изъ одной въ другую , а особливо сквозъ швы проходятъ. Всякъ видитъ , что пѣмѣ плевами , каторою мозгъ покрывается , и каторою самая головки верхушечка , будто бы косочетыреугольной проломчикъ , по нашему пѣмѣ , во время небытїа костей покрыто бываетъ. А при томъ и всѣ жилочки кровеносныя , въ средостѣнїи то есть между слоями черепа головного находящїеся и его питающїе , изъ сихъ плевъ производятъ , и для того случиться можетъ , что ежели будетъ ушибена плева наружная , кость будетъ цѣла , а въ жестокой матерїи мозговой превеликой и весьма бѣдственной дѣлается огонь.

(*) Смотр. у ЛЕ ДРАНА Примѣч. 27. стр. 179.

§. 515.

Сїе все разсмотрѣвши надлежитъ ко всякому особливо виду головныхъ ранъ приступить. Рану , гдѣ кожа волосами оброслая , будетъ шпагою острою разсѣчена , также лѣчить надобно , какъ я выше объявилъ (376) : Но всегда и вездѣ , гдѣ кожа волосатая случится , сперва ее обрить надобно. Ежели тутъ будетъ жила быющая перерублена , оную или приписнуть

писнууть должно (406, 408) или на хорошей перспѣ отспуня отъ краю раны, продѣвъ нитку подѣ нее завязать (242, до 244, 414, 415). И тутъ рану изрѣдка зашивать надобно (382, 384). Изъ обвязокъ нитъ способна обвязка соединяющею (фасція уніенсѣ) называемая. А ежели сею обвязкою край у раны хорошо одинъ съ другимъ свестъ будетъ не возможно, то положишь должно на нихъ свертки холщинные, и сверхъ тѣхъ употребить иную обвязку, фундам. е. праца, или еще иную капиталъ минусъ п. е. головникъ меньшій называемую (15).

§. 516.

Ежели же пропязаніе мышечное и плева надчерепоголовная будутъ ранены, то можетъ здѣлаться вожженіе, когда рана будетъ больше на кожѣ и на внѣшнихъ плевахъ нежели на плевѣ надчерепоголовной. Онаго вожженія избѣгнуть можно, ежели плевѣ надчерепоголовную поширѣ разрѣжешь.

§. 517.

Гдѣ кожа съ одной стороны будетъ отрублена, а на другой сторонѣ будетъ висѣть, ту рану надобно будетъ сшить (377). Толькожъ тѣмъ сшивкомъ захватить должно все то, что отвисло, и скрозь всѣ плевы иглу съ ниткою продѣть. А на другой сторонѣ, ни скрозь протяженіе мышечное, ни скрозь плевѣ наклонную не продѣвать, но только кожу одну захватить, ибо ежели тамъ оныя осаднены будутъ, иглою или ниткою, то великое вожженіе дѣлается. Ежели же висящее мясо не только отрублено, но и разлито будетъ, однако оно сшить должно. Но только все то примѣчать надлежитъ, что я выше о такихъ случаяхъ (383) приказалъ.

Г г

§. 518.

§. 518.

Рана стрѣлою тупою прострѣленная и разши-
бенная, часто очень рдится. А чтобъ то не могло
быть, надлежитъ рану больше потчасъ разрѣзать,
и ежели найдется путъ скопившаяся кровь, оную
вонъ выпустишь. Когда же рану будешь ширѣ дѣ-
лать, то также широко разрѣзать надобно плеву
надчерепоголовную, какъ кожу и другія плевъ наруж-
ныя (516). Къ ранѣ приложить должно, отъ чего
бы гной дѣлался, а не такое, какое прикладывается
къ часпямъ жильночувствительнымъ, какъ я выше
сказалъ (385). Сверху много наложитъ пластырь изъ
бепоники или изъ куміна дѣланной. А отъ вожже-
нія полезны припарки въ мѣшечкахъ изъ траевъ,
божья деревца, палыня, бепоники, шалфеи, оригана,
серпилла, пулегія, маерана, розмарина, мелиссы,
руты, и изъ цвѣтовъ лавендуловыхъ, розовыхъ съ
виномъ вареныхъ, и выжиманыхъ.

§. 519.

Не такъ часто случается, чтобъ край у раны
распухали, понеже воздухъ въ плену сальную и въ
ся клѣточки или ячейки собирается, и оныя гораздо
распираетъ. такой родъ опухоли Ермѣида назы-
вается, онъ узнавается потому, когда около раны
опухоль холодная будетъ, которую какъ перстами,
подавишь, то будто бы съ нѣкакимъ трѣскомъ опу-
холь опадаетъ. Сіе обычно случается, ежели въ рану
воздухъ и холодъ не будетъ проходить допусканъ.
Такую опухоль такъ лечатъ; край у раны запухлая
попихоньку припскиваютъ, и воздухъ вонъ выдавли-
ваютъ, а послѣ того прикладываютъ. Теперь только
цодянушыя мѣшечки припарошныя, или суконочки лива-
номъ,

номъ, смирною, ш. е. маспиксомъ, бензоемъ, шершен-пиномъ переваренымъ накуренныя, а припомъ шѣмъ же суконочками край ураны можно легонько и попирасть.

§. 520.

Тораздо же часто послѣ такихъ ранъ приключается вожженіе и рожа. Первое ш. е. вожженіе въ протяженіи мышечномъ и въ плевѣ надчерепоголовной дѣлается, а рожа на верхѣ кожи. Послѣднюю сію попому узнать можно, ежели и уши, которые одною только кожею, а не другими какими прикрыты, одною будучъ захвачены. Отъ такой легко излѣчиться можно, обрить сперва волосы, и прикладывать лѣкарства сухія, которыя полезными я призналъ выше (163, 164) разсуждаючи о рожѣ. А отъ вожженія ничего полезнѣйшаго не находится, какъ только рану опять вновь разрѣзать (516, 518) А припомъ рану мягко завязывать должно, понеже въ шѣхъ частопомянутыхъ жильночувствительныхъ частяхъ, отъ жесткихъ къ нимъ приложенныхъ пряхъ и суконокъ и отъ пугой обвязки, которая будетъ давить, часто великое и бѣдственное вожженіе случается. Къ ранѣ прикладывать должно вещи квасноспъ производящія и гной дѣлающія (385, 518); а на шѣ мѣста, гдѣ вожженіе есть, употреблять оныя припарочныя мѣшечки. Или изъ шѣхъ же травъ съ виномъ сваривши дѣлать припарку и прикладывать. А прочее лѣченіе быть такое должно, какое бываетъ при великихъ вожженіяхъ и ранахъ въ частяхъ жильночувствительныхъ случающихся. Ни при которыхъ другихъ ранахъ кровоспусканіе такъ не полезно, какъ при шѣхъ, которыя на головѣ, въ какомъ бы нибудь мѣстѣ ни случились.

§. 521.

Ежели на головѣ никакой раны нѣтъ, а по ней камнемъ, палкою, или какою стрѣлою тупою, ударено, то можно думать, что кость цѣла осталась, когда ничего не воспослѣдуетъ того, о чемъ ниже представляю, что обыкновенно случается, гдѣ черепъ бываетъ проломленъ, и гдѣ внутри черепа находящіяся части бываютъ повреждены. А кожа ссаженная, ежели ударъ будетъ невеликъ, безъ рѣзанья, можетъ залѣчена быть тѣмъ же вещами, которыя отъ воженія пособствуютъ (518). Ежели же съ кожею и другія части подъ нею лежащія повреждены будутъ, то должно въ самой скорости оное мѣсто разрѣзать, и текущую кровь вытереть, а послѣ приложивъ тѣ же самыя вещи, которыя воженіе лѣчатъ. Да когда нѣсколько позже, и когда уже мѣсто оное распухнетъ, такимъ же порядкомъ поступать.

§. 522.

Но сѣ лѣченіе больше надобно употреблять, когда множество крови запечется подъ кожею, или подъ самою плевою надчерепоголовною, ибо она великое причинитъ воженіе можетъ. Ежели такая кровь подъ сею плевою черепъ головной объемлющею соберется, то опухоль будетъ очень крѣпка и неподатлива, только почти всегда невелика, ежели же подъ кожею, то бываетъ мягче и гораздо обширнѣе. Сію опухоль не мѣшкая разрѣзать и кровь вонъ выпустить должно, гдѣ надобно, чтобъ и рана больше была. Однако же рѣзать надобно да съ разсужденіемъ, что бы нечаянно Аневризмы не здѣлались, понеже она и на головѣ здѣлаться можетъ.

(*) Смолр. Диссертац. при §. 424 приложенную.

§. 523.

§. 523.

Ежели же въ ранѣ плева наkostная оторвана, отодрана, или измочалена будеть, и кости нѣкоторая часть обнажится, то прежде всего знавъ должно, что кость безъ такой плевы здоровою быть не можетъ, и по крайней мѣрѣ хоть не со всѣмъ, однако внѣшняя и верхняя часть, то есть потерявъ свое пропитаніе умретъ. А то тѣмъ скорѣе случиться можетъ, ежели воздухъ на то мѣсто попадетъ, или, ежели какія лѣкарства приложены будутъ, а особливо жирныя и гной производящія, отъ которыхъ всѣхъ, какъ то и отъ гноя и отъ Саніи, т. е. отъ матеріи въ ранахъ и язвинахъ гноя жиже, острѣе и крововатѣе изъ раны вытекающей кость жирѣетъ, чернѣетъ и гнилою дѣлается.

§. 524.

Того ради ежели сіе на черепѣ головномъ случится, то отъ кости, такимъ образомъ поврежденной, чешуйка отдѣлится, и послѣ того, все оставшееся и здоровое, новою плевою закроется. На кость прикладывать должно или сухую чистую пряжу или спиртомъ чистымъ обмоча. А припомъ оную пряжу посыпать порошкомъ весьма хорошо и мѣлко истертымъ маслихиннымъ, варенымъ перпеншиннымъ янтарнымъ, росноладоннымъ. Временемъ же, и особливо у людей молодыхъ, случается, что отъ кости ничего не оплупляется, и она кость тотчасъ новою плевою закрывается (*). А гдѣ такое нещасіе нѣсколько поглубже случится, то кость ножечкомъ скрестъ надлежитъ, покуда нѣсколько запеклой крови покажется; о каковомъ способѣ лѣченія, а припомъ которое желѣзомъ каленымъ и другими различными

лѣкарствами обыкновенно дѣлается , пространнѣе объявлю , когда о болѣзняхъ костяныхъ буду говорить.

(*) .Смотр. въ руищевомъ примѣч. 5. стр. 11.

§. 525.

Кость , которая такимъ образомъ обнажена , и ни воздухомъ , ни другимъ чѣмъ испорчена гораздо еще не будетъ , попровертывать надлежитъ частыми дирочками , скрозь всю первую табличку черепа головного. А то дѣлается буравомъ оспроконечнымъ , который вершючи до самаго средостѣннаго мозга проходитъ . И чтобъ кости какого вреда отъ воздуха не приключилось , все дѣлать надобно съ поспѣшностію. Когда же кость такими дирочками будетъ пронзена , вредноснѣ воздушную уголемъ огненнымъ отвращать должно (390). Кость же , такъ открытую и многими да припомъ маленькими дирочками проверченую , шѣмъже порошкомъ очень хорошо изтертымъ , о которомъ я теперь (524) предложилъ , посыпать , или покрыть ее пряжею въ спириитъ горючемъ или въ эссенціи маслихинной , янтарной , элемовой , обмоченною и выжатою. Ничего такого не употреблять , которое кость будетъ смачивать , или жирною будетъ дѣлать. А кость , когда съ какимъ возможно проворствомъ пряжею и суконками покрыта будетъ , то прежде трехъ и четырехъ дней , не открывать , ежели того какой другой случай не потребуетъ , понеже ничто такъ много не пособитъ , какъ рѣдкое перевязываніе. Припомъ же еще посматривать , чтобъ Саніасъ т. е. матерія кровавая жидкая и острѣе гноя изъ раны пекущая , на кость не попадала ; ибо кости сухой и чистый быть надлежитъ.

§. 526.

§. 526.

Иногда же случается, что гнилость или червоточина въ средостѣннѣ бываетъ. А. то дѣлается не отъ однихъ только попорченныхъ соковъ, но и отъ жестокаго удара, которымъ внѣшняя табличка разшибена быть можетъ; а внутренняя цѣла остается. Такое несчастіе, которое въ средостѣннѣ начинается, очень широко разходится, отъ чего не только гнилое мясо и дичь съ наружи выростають, но послѣдокъ худой сокъ и внутреннюю т. е. спешную табличку сѣбѣ. Послѣ чего, превеликія несчастія слѣдуютъ, понеже надмозговая плева, да и онъ самъ сильно повреждаются (*). Сему злу тотчасъ пособить должно, весь черепъ трепаномъ вывертѣть, и все попорченное вонъ взять надлежитъ.

(*) Смотри Исторію искуснаго и мнѣ великаго пріятеля ЮХРИСТОФРА ПОДА въ Эфемер. Нат. Курюз. въ книг. 4. Прим. 100. стр. 384. Голову, которую почтенный Мужъ мнѣ подарилъ съ зброею другихъ вещей, которыя къ изъясненію косяной паводотіи много служить, могушъ, а у себя берету.

§. 527.

Голова по большой части прѣмя способами ранена быть случается. Ее или шпагою оспрою прорубаютъ, или ударомъ проламываютъ, или раскалываютъ, и щели дѣлаютъ.

§. 528.

Если черепъ головной стрѣлою острою устрѣленъ будетъ, то останется послѣ того зѣра, мѣсто (*). Мѣсто сіе если будетъ линією прямою, то называется ежоту, если наискось, диакоту, а если изъ него нѣчто вырублено будетъ, или будно бы выколупнуто алогепарикомъ (**).

(*) Смотри

(*) Смотри фигуру въ ПЕТРОВЫХЪ ПЛАВІЕВЫХЪ Сукценш. Анат. на стр. 77, 80, 94. ИΠΠΟΚΡΑΤΗΣ оное такъ описываетъ пишущи о ранахъ головныхъ въ Том. 2. на стр. 692. Издан. Линд. $\epsilon\delta\epsilon\eta\ \delta\epsilon\ \kappa\alpha\lambda\epsilon\epsilon\tau\alpha\iota,\ \delta\tau\alpha\nu\ \mu\epsilon\nu\omicron\nu\ \tau\omicron\ \delta\epsilon\iota\omicron\nu\ \epsilon\nu\ \tau\eta\ \epsilon\omega\nu\tau\eta\ \Phi\upsilon\sigma\epsilon\iota,\ \tau\omicron\ \beta\epsilon\lambda\omicron\varsigma\ \varsigma\eta\gamma\iota\zeta\alpha\nu\ \kappa\epsilon\ \tau\omicron\ \delta\epsilon\iota\omicron\nu\ \delta\gamma\lambda\omicron\nu\ \pi\omicron\iota\iota\sigma\tau\eta,\ \delta\pi\eta\ \epsilon\varsigma\eta\gamma\iota\zeta\epsilon\nu.$ Мѣсто или вонзеніе случается и съ проломомъ кости, а особливо таблички внутренней. Е'κκοπηу такое описываетъ ДЕ ДРАНЪ въ Т. I. Прим. 27 стр. 179, и фиг. смотр. у ПЛАВІА на стр. 103.

(**) Смотри фиг. на мѣст. помануш. стр. 101. и Дефиниц. въ ГАЛЕНОВЫХЪ Дефиниц. Мед. Издан. Хартер. Т. 2 стр. 268 и у ПАВЛА въ кн. 6 въ гл. 90 стр. 96. Смотри тутъ же задачу или Программу, которую въ 1737 году я назначилъ анатомію публичную, о излѣченіи τὸ ἀποσκεπαρισμὸς на черепѣ головномъ, и прибавкомъ фигуры такой черепа головнаго, у котораго значная часть кости палашомъ трублена, а внутренняя табличка разколота была, кость же весьма крѣпкою спайкою срослась, а понеже не прямо на прежнее мѣсто вправлена была, то нѣсколько видна и выпучилась.

§. 329.

У младенцовъ, у которыхъ кости мягки и во всю подобны бывають, иногда кость впадаетъ такъ, что ни снаружи ни изнутри не бываетъ разломлена, и снаружи ямку, а внутри горбъ будеть имѣть, какъ на мѣдной или на свинцовой посудѣ обыкновенно случается. Оное Φλάσι или Θλάσι называють (*). Однакъ въ давленная кость, чаще случается разломана, и называется ἐσφλασι или ἐνθλασι, ежели со всѣмъ кость проломлена и опъ черепа головнаго опдѣлился (**). Подъ симъ именемъ заключается ἐκπίεσμα, гдѣ многіе обломки бывають опломленные, и гдѣ такіе обломки шапаются, и оболочку надъ мозгомъ лежащую и мозгъ головной саднятъ. Εγγίσμα называется, когда кость проломленная на одной сторонѣ внизъ вдавится, а на другой на верхъ черепа взлѣзетъ. А κβμάρωσις называется, гдѣ кости разломанные вонъ выпучатся, и будто городками подѣлаются (***).

(*)

(*) Смотр. у ГИЛДАНА въ Сошн. 2 Примѣч. 3 стр. 87, а фигуру у ПААВІА стр. 86.

(**) Смотр. Фиг. у ПААВІА стр. 94.

(***) О такомъ проломѣ, который и ГАЛЕНЪ въ Книгѣ о Способѣ лѣченія въ глав. 6. и ПАВЕЛЪ въ Ки. 6 въ гл. 90 описали. Многие Авторы признаются, что они такого случая, чтобъ кость такъ высоко подымалась, не могутъ разумѣть. Смотр. въ КОРТЕЗИЕВОМЪ Комментар. на ИППОКР. о Головныхъ ранахъ стр. 132. ЮВЪ МЕЕКРЕНЪ въ Прим. въ гл. 1 на стр. 12 написалъ, что онъ у мальтика видѣлъ тѣмъ *καμάριον*, или, какъ то называешь, клѣточность. Однакожъ и онъ, хо-ть стариныхъ писателей опровергаетъ, такого случая прямо, какъ надлежитъ, не описываетъ. Ибо ежели чрезъ *καμάριον* то разумѣешь, гдѣ многія кости разломлены и вдавлены снаружи впадину вдавливаютъ, а внутри будто горбы, жестокую мать давятъ. Поставь тутъ РОГАУЛЬТОВО вышешомаунт. стр. 16 МАННЕ мѣст. вышешом. стр. 155. Случай не много отличенъ отъ *ἐνθλάσει*. Но чужь ли снаружи кость въ верхъ подниматься можетъ, ежели не захочетъ умнчать съ ЦЕСАРЕМЪ МАГАТОМЪ, ибо онъ въ Ки. 2 въ гл. 11 на стр. 30 пишетъ, что это дѣлается отъ стрѣлы, ежели она, будучи въ кость вонзана, вытаскивается, которою кости, а особливо проломленной, часть къ верху подниматься можетъ. Однакожъ я и шому случаю легко не могъ бы вѣрить.

§. 530.

Кость также многими образами раскалывается, чтобъ на ней щель (рима или *ῥήγμα* была) Щели межъ собою нѣкоторыя различности имѣютъ. Ежели щель великая будетъ, называется *ῥωμή* (*). Ежели же щелочка малѣхонькая будетъ, которой видѣть не возможно, и лѣкаря черепъ головной осматривающаго обмануть можетъ, оная называется *τριχόμες*, или *ῥωμή τριχόμες* (**). Ежели же человекъ по одной сторонѣ ударенъ будетъ, а на другой сторонѣ кость расколется, *ἀπόχιμα* называется. Новѣйше писатели тожъ самое, Ошголоскомъ резонитумъ, или Проши-воращелиною Контрафиссурамъ назвали (***).

(*) Смотр. у ПААВІА стр. 76.

Д д

(***)

(**) Смотр. у ПАВЛА въ вышепомынуш. мѣст. и у ПАВЛА стр. 77.

(***) ИППОКРАТЬ о ранахъ головныхъ въ ш. 2. на стр. 693 издан. Динд. называется *ξυμφόρην*, ш. с. бѣдностью или несчастіемъ, ибо такой разщелинѣ легко пособствовать нельзя: заплѣмъ, что ее зашити не возможно. Мнѣ, какъ кажется, многие не вѣрили, чтобы такая разщелина дѣлаться могла, увѣряясь на ГАЛЕНЪ, который въ Кн. 9. о способѣ лѣчен. въ Гл. 17 ш. 4. на стр. 526 думаетъ, что каждаго проломъ на черепѣ головномъ случающійся, на шавъ останавливается; ибо цель съ одной кости на другую переходить не можетъ, за тѣмъ что одна отъ другой раздѣлится, и на двахъ будто бы кошками оденится. Противъ таковыхъ, которые сию, такъ называемую, противоразщелину признаютъ, весьма многими доказательствами являетъ ПАВЕЛЬ: на помынуш. мѣст. Изъ новѣйшихъ же ДИЕМЕРБРЕКЪ въ Анаст. Кн. 9 гл. 4 стр. 529, МУННИКСЪ въ Хирург. въ Кн. 2. въ гл. 15 на стр. 264 и РОГОЛЬ: де пле де ла тешъ Гл. 7 стр. 49. Однако же, кромѣ ИППОКРАТА и ЦЕЛЬСА изъ недавнихъ авторовъ многие, а изъ нихъ Г. Ф. Акценденскій. ОПП. Хирург. въ Кн. 2. въ гл. 14 на стр. 94. утвердили, что кость на одной сторонѣ будетъ ударена, а на другой проложится. Примѣры такте показали. НИК. ФОНТАНЪ въ Комм. на ВЕЗАЛІЕВЪ Эпитоменъ гл. 1 стр. 3, ВАНЪ МЕЕКРЕНЪ на выш. томъ. м. стр. 20 и БОГНІЙ: о ранахъ почечн. въ част. 2 гл. 1 стр. 194. Тоже самое дѣло другими и явственнѣйшими примѣрами доказано было въ Диссертац. ГЕНР. СИГИЗМ. СТОША въ проломѣ черепноголовномъ на другой сторонѣ прошивъ удара бывающемъ чрезъ опыты изслѣдованномъ, де резониту. экспе.тенцѣ. пробато. въ Архив. 1722 году изданной, которая примѣтила знатный и искусный предъ другими Антерпоратскими лѣкарями, лѣкарь ЛЕ МЕРЪ. Пристойна еще здѣсь ПАВЛА АММАНА дисп. Хирург. де Резониту или контрафиссура краніи [о противносторонномъ проломѣ черепа головнаго] 1694 и ГЕО. ВОЛФГ. ВЕДЕЛІЯ Дисс. о противносторонномъ проломѣ по правиламъ механическимъ физическимъ и медицинскимъ сочиненной или произведенной въ Еиѣ 1707 году напечатанной. Въ сей послѣдней еще многія и различныя доказательства, изъ случаевъ, какъ движенія могутъ быть, произведенныя отъ ІО МАРКА МАРКОВА ЛЕЙБНИЦА, и отъ другихъ предложенныя представлены.

§. 531.

А что сіе различными образами случается, то уже чрезъ другіе опыты изслѣдовано: 1) Ибо временемъ

немѣ удареная кость раскалывается, а съ нею и другія, да и отдаленныя кости, по которымъ щели будто бы отъ первой происшедшія бывають (*). 2) Иногда таже самая кость по одному мѣсту бываетъ ударена, а въ другомъ мѣстѣ раскалывается (**). 3) Случиться можетъ, что по одной кости ударено будетъ, а другая расколется (***). 4) Часто табличка наружная черепа головного цѣла остается, а внутренняя и подъ верхнею лежащая проламывается (****).

(*) Такіе проломы весьма часто случаются, и всегда щель дѣлается, не только на кости въ близгі лежащей, но и на другіхъ, а иногда и во весь черепъ головной. Смотр. въ РУИШЕВЪМЪ Примѣч. Анат. 47 стр. 60 въ Ефес. Нат. Кур. въ Сопѣч. 5 Прим. 32 и примѣръ первый въ СТОШЕВОЙ Диссертаці.

НВ. Здѣсь въ Санктпетербургѣ въ Сухопутной гошпиталѣ 1744 года въ зимнее время работникъ несучи плаху дровъ посколизнулся, и упавъ однимъ бокомъ на ледъ, по другому боку въ голову несенною плахою такъ ударенъ, что отъ того удара черепъ головной по поламъ раскололся, на примѣръ наченъшися щель отъ удареной височной кости поперегъ черепъ головной такъ кругомъ обошла, что только не расколола немножко; она же ушибеная височная кость въ части каменистой осталась, а прочія кости какъ то обѣтѣмнныя, противносторонняя височная, и основная, однако больной 18 дней безъ великихъ припадковъ жилъ.

НВ. 1758 года въ Октябрѣ мѣсяцѣ Партикулярной Берфи конопатчикъ привезенъ въ Санктпетербургскую Адмиралтейскую гошпиталь, который будучи на работѣ въ нѣкоторомъ знатномъ домѣ, стоя на лѣсницѣ конопатилъ въ прѣтѣмѣ апартаментѣ окна, по несчастію ево служитель борзо на извожикѣ будучи подшибъ съ нимъ лѣсницу, онъ принужденъ былъ лѣтѣть, и упасть на землю каменемъ высланною, въ которомъ случаѣ онъ не только кости челюстныхъ изъ швовъ поразстрогалъ, но и вломивъ височную кость того бока такъ черепъ раскололъ, что только нѣкоторая часточка не переломлена осталась у кости основной въ мѣстѣ, сѣдомъ шурецкимъ называемомъ. Сей больной также чрезъ семь дней жилъ, однако вовсе безъ памяти.

(**) Смотри другой Стошѣвъ примѣръ.

А А 2

(***)

(***) Въ семъ родѣ проломовъ нѣкоторая разность бываетъ. Ибо иногда ближняя, иногда дальняя, межъ которою и межъ ушибеною костью другая посредственная случается, разщепленными называются. Первый случай не такъ рѣдко случается. Смотри притѣю СТОШЕВУ исторію и при ней фигуру, а впрочемъ читай въ тойже Диссерт. Сопн. 4 §. 3. Другой родъ проломовъ кажется рѣже случается и одинъ случай изъ Примѣч. медич. ФРИД. ЛОССІА изъ Кн. 1 приводится, гдѣ послѣ удара по лбу кость затылочная раскололась, съ которою исторіею не много несходна отъ ПЕТРА ДІОНИСА въ Хирургіи стр. 415 представленная, гдѣ по лбу ударею, отъ чего не только кость лобная но и кость затылочная проломлена была. Но я думаю, чаще случается, что ежели черепъ головной во многихъ мѣстахъ проломленъ будетъ, то оный не единойды будетъ и ударею.

(****) Сей пролома родъ, я думаю, весьма часто случается, что я самъ иногда въ врачевницѣ сего города видалъ. За девять лѣтъ назадъ человекъ съ высокаго мѣста упавши голову сильно ушибъ, отъ котораго времени такъ безумствовать началъ, что его отъ нахальствъ и прихотничествъ временемъ грознымъ обузданіемъ укротать было надобно. Однакожъ по облегченіи того, что на него найдеть, всякія дѣла домашнія дѣлалъ, напоследокъ, какъ хотѣлъ изъ рѣкы воды напиться, въ оной же рѣкѣ утонулъ. У него на черепѣ, какъ перепонку надчерепоголовную съ кожею отняли, и черепъ весь оголили, съ наружи ничего поврежденнаго или отколошаго не найдено. А какъ черепъ головной вскрыли, то на кости тѣмъ правой въ верху на внутреннѣмъ слою щель гораздо немалая явилась, у которой край будто бы иглами испыканы были. Отъ колотья ихъ и жестокая оболочка надъ мозгомъ, и мозгъ сильно поврежденъ и изрытъ былъ. Не очень давно почти такой же случай Нашимъ Членамъ медицины представленъ былъ. Смотри другіе примѣры у ПАРЕА въ помянут. мѣст. у ПЕТРА БОРЕЛЛА въ Сопн. 2 Прим. 20 стр. 121, у СКУЛТЕГА Прим. 14 стр. 226.

§. 532.

Между знаками, которые будто бы черепъ головной проломленный показываютъ, многіе есть, которые обманывать могутъ. Однакожъ потчасъ надобно разсуждать, какимъ камнемъ, какою стрѣлою, небольшою или великою, сильно или излегка, по головѣ ударено. Гдѣ рана будетъ, тушъ надлежитъ спичку

спичку въ нее опустить, чрезъ копорую можно узнать, проломлена ли кость. Можетъ же быть, что спичкою ничего не ощупаешь, только что гладкое и слизкое мѣсто, а ежели что найдется шероховатое, а то не будутъ швы, то будетъ значить кость проломленную (*). А спичку опускашь полегоньку, чтобъ оною, ежели черепъ будетъ проломленъ, перепонки надмозговыхъ и самого мозга не пронуть.

(*) ИПОКРАТЪ Епидем. въ Кн. 5 въ Текстѣ 14 Т. 1 стр. 778 признается, что онъ швами былъ некогда обманутъ, которое простое, и такъ великому человеку согласное въ погрѣшности признаніе крайне хвалитъ Целсъ въ кн. 8 въ главѣ 4, и КВИНТИЛИАНЪ въ Наст. Ораш. въ кн. 3 гл. 6.

§. 533.

Ежели же спичкою ничего не сыщется, то разсуждать надобно самого человѣка, и выпрашивать, не упалъ ли онъ въ то время, когда его ранили, глаза у него тогда не были ли помрачены, не былъ ли нѣмъ и безъ чувства, нѣсколько времени не лежалъ ли, изъ ушей и изъ ноздрей кровь не текла, желчью не блевалъ ли, которое все случается, ежели отъ удара мозгъ повернется. Ибо, ежели сие случится, то опасаться надлежитъ, чтобъ отъ движенія жила кровес-возвращательная не перервалась, и крови не испустила.

§. 534.

Явственнѣйшіе признаки показываютъ, и бѣдствіе открываютъ знаки шѣ, которые нѣсколько времени спустя послѣдуютъ. Ежели то мѣсто, по которому голова ударена будетъ сильно, и не отступитъ болѣть будетъ, ежели ознобъ приключится, и при ономъ горячка небольшая, ежели будетъ безъ памяти, ежели человѣкъ будто бы спящій лежать будетъ, ежели у него лице будетъ свирѣпо, глаза будто бы

А д з

раз:

разбредшіеся , на всѣ стороны поворачивающіеся , ежели они будутъ красны , ежели моча или калъ самовольно испускаются будутъ , ежели жилы чувствительныя или ослабнутъ , или будутъ напрягаться. Между знаками и то починается , ежели около седьмого дня , въ разсужденіи раны , гораздо много гною , или другой мокроты , изъ нее потечетъ , и ежели мѣсто гораздо мягко вдаляется , и будто припухнетъ. Ибо все сіе иногда скорѣе иногда позже , и по многихъ дняхъ приключается , ежели подъ черепомъ головнымъ жила бьющаяся или жила кровезовращательная порвавшись кровь испуститъ , или кость повреждена будетъ (*).

(*) Лѣкари и по другимъ признакамъ хотѣли знать , продолжится ли кость или нѣтъ. Они даютъ больному человеку нитку , или тряпочку въ зубы , которую ежели онъ схватитъ и держать будетъ , то они покрѣче плынуть начинаютъ , и смотрѣвъ , можетъ ли онъ зубами скрежещать. Орѣхъ , или нѣчто другое жесткое въ зубы кладутъ , и оно разгрызати вѣдѣтъ ; ежели то больной безъ всякой трудности и безъ чувствованія боли здѣлать можетъ , то они ничего опасаться не вѣдѣтъ. Но такіа догадки маловажны. Ибо ежели черепъ головной подъ мышкою височною расколѣтъ или проломленъ будетъ , то онъ прѣсущагося движенія , и кусанія досадное производитъ чувство , а не такъ легко какъ онъ въ другихъ мѣстахъ бываетъ поврежденъ.

§. 535.

Еще знать также можно , что много мокроты изъ порванныхъ жилъ бьющихся и жилъ кровезовращательныхъ подъ черепомъ напекло , ежели то (533) , хотя не скорѣе послѣ удара , толькожъ въ короткомъ времени , окажется. Понеже я выше представилъ (532) , что худыя знаки , которые тотчасъ за ударомъ слѣдуютъ , происходятъ отъ поворачиванія мозга. Гдѣ кровь запекая въ нѣкоторомъ мѣстѣ будетъ сплѣсться , она или тяжестью своею мозгъ давитъ будетъ , или испор-

истощившись, горячку и возбуждѣніе производить. Ежели же другая мокрота внутри будещь, оная временемъ въ санию обращается, и жестокую масть сѣбѣ дастъ, и не такъ возбуждѣніе, какъ жилъ чувствительныхъ пропѣженіе производитъ. Жилы чувствительныя также напрягаются, когда кость разломленная жестокую оболочку надмозгную колещь, или когда она отъ другихъ частей досаждаема и озлобляема бываетъ, которое приключеніе также весьма опасное производитъ возбуждѣніе. Ежели мозгъ, какой нибудь опломокъ костный будещь давать, то пощъ самое слѣдуетъ, что обыкновенно случается, ежели пощъ же мозгъ запеклою кровью будещь давленъ (534).

§. 536.

Почасу случается, что, когда на одномъ боку жилы чувствительныя разслабляются, пѣжъ самыя на другомъ боку напрягаются. Сіе частѣе случается не на томъ боку, гдѣ рана и подъ черепомъ запеклая мокрота бываетъ, но на другомъ. Опшуда догадываться начали, что жилъ чувствительныхъ начинанія, или медулярныя мозга головного волокна, съ лѣвой стороны на правую, а съ правой на лѣвую сторону переходятъ, и другъ дружку пересѣкаютъ. Однакожъ въ такихъ случаяхъ ничего не бываетъ перемѣннаго (*).

(*) Смотр. бриссеево Прим. въ помян. м. стр. 4 и стр. 16. У одного челоѣка, который вытерпѣвши ударъ по головѣ въ двадцать первый день умеръ, и которой часто въ челюсти и въ плечѣ напряженіе на правомъ боку имѣлъ, найдено, что мозгъ головной въ лѣвой сторонѣ весь въ гной обратился. Смотр. въ I. К. А. М. 1700 году стр. 36.

§. 537.

Ежели же все сіе, или еще больше знаковъ представлять будещь, что кость проломлена, то оно об-

об-

обстоятельнѣе и достовѣрнѣе изслѣдовать должно , хотя бы никакой раны не было , руками здѣлать рану , кожу со всѣмъ и съ самую перепонкою наkostною , разрѣзать , и кость обнажить.

§. 538.

На обнаженной такимъ образомъ кости , цель видная окажется. А притомъ ежели кость въ мѣстѣ , послѣ разрѣзанія кожи блѣдновата , или порчена найдется , изъ того можно разумѣть , что тушъ есть нѣкакой вредъ. Ежели же кость целочку маленькую , которой никакъ глазами видѣть не возможно , будетъ имѣть , то кость зачернить чернилами писательными , и потомъ оную выскрестъ должно: Ибо чернило въ томъ мѣстѣ останеся , гдѣ расколо.

§. 539.

Также хотя бы оныя худыя предвозвѣстія лѣкаря и обманули , и въ томъ мѣстѣ , гдѣ кожу разрѣзалъ , цель не нашлась , это не напрасно здѣлано , понеже , когда изъ сей снаружи здѣланной раны кровь выпустится , то она , чтобъ во внутреннія части не пробралась , нѣсколько отвращается , или , когда по случаю ее нѣсколько изъ порвавшейся небольшой жилы кровевозвращательной выпекло , то она , покуда еще не запечется , разойдется и прочь взята быть можетъ. Да притомъ не весьма трудно кожа сростается , хоть бы она и напрасно разрѣзана была.

§. 540.

Гдѣ же въ томъ мѣстѣ , по которому ударено , и на которомъ кожа разрѣзана , кость цѣла найдется , а худыя знаки представляютъ , что черепъ головной
въ

въ другомъ мѣстѣ расколѣтъ, тутъ надобно больше прилѣжанія употребить. Голову вплоть до кожи обрить должно, и смотрѣть, нѣтъ ли какого мѣста нѣсколько мягкаго, и опухлаго, или необыкновенно краснаго. Для изобрѣщенія такого мѣста пособствуетъ пластырь смягчительный, оный на нѣсколько часовъ на голову приложить. Понеже человекъ, въ беспамятствѣ находяся, въ которомъ мѣстѣ боль будетъ чувствовать, а другой, за несклоннымъ сномъ, когда его кличутъ, имени своего не будетъ знать, или, который говоря будетъ бредить, на которое мѣсто руку часто будетъ класть, тутъ можно догадываться, что въ томъ мѣстѣ повреждено.

§. 541.

Я уже (512) сказалъ, что ни единого человека безопаснымъ почитать не надлежитъ, у котораго голова будетъ ушибена. Да и по знать должно, что разсужденіе всѣхъ предзнаменованій и догадокъ таково, что, какъ временемъ часто збываются, однажъ иногда и обманываютъ (413). Всего того лучшую причину усмотрѣть можно изъ человѣческихъ головъ. Понеже у нѣкоторыхъ черепъ головной бываетъ тонокъ, тотъ для того отъ небольшой приины проламывается. Не малоюжъ тому причиною бываетъ жестокая мать, она у нѣкоторыхъ а особливо у молодыхъ людей, такъ къ черепу головному прицепляется, что отъ легкаго удара сильно ушибается; который случай или бѣдственное воженіе производитъ, или дѣлаетъ, что жилы бьющіяся и жилы кровевозрацательныя, по обѣимъ плевамъ надмозгнымъ разходящіяся, прорываются, и кровь изливаютъ.

Е с

§. 542.

§. 542.

Больше всѣхъ младенцы мучаются , когда у нихъ черепъ головной бываетъ проломленъ или расколотъ. Понѣже ихъ черепъ сверла , каковымъ у взрослыхъ людей выверливается черепа часпочка , понесши не можеть. Коспижъ младенческія зашѣмъ , что молоды и вязки , и спайки имѣющъ мягкія , не безъ трудности проламываются.

§. 543.

Ежели високъ будетъ проломленъ , шаковая рана весьма бываетъ бѣдственна , а часто и смертельна : Ибо въ томъ мѣстѣ и коспь весьма тонка , а при томъ какъ подъ кожу , которою виски покрываются , такъ внутри подъ костью великія жилы бьющіяся проходятъ , которыя порвавшись кровь весьма опасно выпускаютъ ; особливо та жила бьющаяся , которая изъ сонной внѣшней произшедши , сквозь диру коспи основной къ жестокой оболочкѣ надмозговой проходитъ , и ее питаеть , часто на срединѣ коспи тѣмянной , и въ переднемъ и нижнемъ оныхъ углѣ , будто спрятанная и врослая , лежитъ , которая коспяными обломками , или инструментами , ежели при лѣченіи до оныхъ дойдетъ , повредиться можеть.

§. 544.

Спариннымъ Медикамъ , а между оными самому Иппократу (*), всякое поврежденіе мышки висошней весьма спрашно было. Они всегда думали , что ежели на одномъ боку мышка будетъ ранена , на другомъ боку другая скорчится. А въ нынѣшнія времена дознались , что безъ напряженія жилъ чувствительныхъ сіи мышki перерѣзанныя (**), да еще и размачаленыя (***) , излѣчить можно.

(*) о ра-

(*) О ранахъ головныхъ Текст. 19. Т. 2 стр. 696 въ Коак. ч. 369 Т. 1 стр. 572 и о проломѣ костей височныхъ ч. 57 стр. 538 и ПАРЕЙ не смѣлѣ. Смотри. кн. 9 гл. 19 стр. 292.

(**) Смотри. у ГАРЕНЖОТА дежъ Операш. Т. 3 Прим. 15 стр. 131.

(***) Смотри. у ла МОТТЕ въ Хирургіи Т. 2 стр. 292.

§. 343.

Въ большей опасности бывають тѣ , у которыхъ швы бывають разшибены , и особливо шовъ , который отъ запылка по срединѣ головы до лба проходитъ , и называется стрѣловиднымъ. Ибо жесткая оболочка надмогная къ швамъ наиболее придерживается , и стрѣловидная перегородка изъ жесткой матеріи или отпросокъ серпообразный , который мозгъ раздѣляетъ. А пришомъ въ семъ отпроскѣ пазуха или рукавъ великій жильнокровесвозвращательной скрытъ , который ежели порвется , то изъ него смертельное бывастъ кроветеченіе. Рукавы или пазухи инныя жильнокровесвозвращательныя въ той перегородкѣ , которая можечокъ отъ мозга отдѣляетъ , и подъ швомъ находятся , который греческою литерою λ. представляется , и называются боковыми , для того не безъ опасности шовъ буравомъ тащимъ , какимъ черепъ головной проверчивается , просверливать , хотъ видимъ по нѣкоторымъ и дѣлали (*).

(*) Иппократъ сіе запрещаетъ о ран. Гол. въ Текст. 17 стр. 698. Но ЯКОВЪ БЕРЕНГАРИЙ , а инако КАРПЪ именуемый представляетъ , что онъ часто швы высверливалъ , и ничего другаго не нашелъ , какъ только что въ другихъ черепа головного мѣстахъ при просверливаніи обыкновенно случается , о проломѣ черепа головного стр. 83 ВЕРДЕНБЕРГІЙ въ письмѣ къ ГИЛДАНУ пишетъ , что онъ сіе въ Італіи видѣлъ Примѣч. въ Сопн. 2 Прим. 8 стр. 86 и ГАРЕНЖОТЪ въ предисловіи новаго изданія Хирургіи стр. 16 объявилъ , что онъ у ребеночка шестилѣтняго семъ дырокъ буравомъ просверливалъ , и изъ нихъ одну на швъ стрѣловидномъ , а другую на швъ вѣнечномъ. Однакожъ того не объявляетъ , что выздоравлилъ ли ребеночъ. Я разсуждаю , что на швахъ , ради показанныхъ причинъ

И с 2

упо-

употреблять сверло не безъ опасности, и къ тому и прозорливому Лѣкарю не покушаться, хоть можетъ быть нѣкоторые отвагою къ тому пригедены были. Ежели близъ шва вредъ будетъ, то лучше кость съ обѣихъ сторонъ провертѣть. Смотр. у РОГАУЛТА на показ. мѣст. стр. 89.

§. 546.

Почти пакіяжъ злключенія и съ пѣми дѣлаются, у которыхъ кость лобная надъ бровью расколола, или проломлена будетъ. Ибо всякому извѣстно, что тамъ кость вдвое, и внутри пазухи имѣетъ, которыя плевою возгри отдѣляющею охватываются, И такъ ежели внутренняя кость часть проломлена будетъ, то рану чуть ли можно залѣчить. Да въ такихъ мѣстахъ и сверла наставлятъ не возможно, какъ для сихъ пазухъ, такъ и для того что кость внутри не ровна, и Лѣкаръ долженъ быть въ опасности, чтобъ буравомъ плевы мозговой да и самого его не повредить.

ВВ. Въ Санктпетербургской Адмиралтейской Госпитали былъ случай такой въ 1756 году: Шляхетнаго Кадетскаго морскаго корпуса подкляшникъ Иванъ волковъ шестидесяти осми лѣтъ въ квартирѣ своей поздориъ съ нестарою своею женою, и хотѣвъ ее зашибить бросилъ къ ней, она не хотя того вытерпѣть, поставила ему вскорѣ ухватъ межноги, на который онъ бѣдный старикъ споткнулся, упалъ и бедру не много выше колѣна переломилъ, привезенъ въ госпиталь, гдѣ хотъ оная нога и перевязана, однако будучи не хорошо выпянута, долго и худо срослась, понеже чрезъ три мѣсяца верхней бедерный отломокъ изъ тѣла концомъ высунулся, которой будучи отпиленъ, ранъ далъ зажить. Однако господинъ подкляшникъ съ короткою и кривою ногою не могъ изъ госпиталя прежде девяти мѣсяцовъ выйти. Напоследокъ выписався пошелъ къ своему дѣлу, и отправлялъ должность чрезъ шесть мѣсяцовъ. По должности его въ сумерки надлежало ему въ погребъ камнемъ услаанный итти, куды идучи короткою ногою на лѣсницѣ оступясь, упалъ на камени, разсѣкъ на нѣсколько частей лобъ и бровь на лѣвомъ боку, и раскололъ кость лобную наскрозъ съ дугою бровною, и привезенъ въ госпиталь, гдѣ по обстоятельнымъ изслѣдованіямъ думали, что онъ отъ того случая умретъ, а по крайней мѣрѣ глазъ поше-

потеряетъ , толькожъ все предсказанію противное явилось , чрезъ шесть недѣль рана залѣчена , глазъ збереженъ , и больной старикъ вылѣченъ.

§. 547.

Запылокъ весьма самъ собою толстъ , а подъ нимъ спрятанъ можжечокъ , изъ котораго жилы чувствительныя произходящъ , которыя кажутся къ чувствамъ жизненное движеніе производящимъ принадлежатъ. Чего ради , ежели оный или костью , или кровью угнетаемъ будеть , то скоро смерть послѣдовать можетъ. Съ низу кость многими мышками закрыта , а внутри на самой срединѣ неровна пакъ , что изъ нее бугорокъ дѣлается , который изъ двухъ остей , продолговатой и поперешной и обѣихъ высоковатыхъ , спаивается. Для того и на сей кости бурава спавить не возможно , разѣтъ съ боку или съ самага верху.

(*) Раны , на запылкѣ случающіяся , правда бѣдственны , однакожь не всегда отъ нихъ смерть слѣдуетъ. Смотри Исторію , гдѣ кость запылошная каменнымъ ударомъ разможденная адавлена , и кровь подъ нею и подъ жесткою матерью изъ перерванныхъ жилъ бьющая вытекла , однако же человекъ безъ горячки и другихъ худыхъ припадковъ выздоровѣлъ въ ЛА МОТТОВОЙ Хирургіи Т. 2 стр. 322. Объ опухоли жесткой въ срединѣ въ можжечкѣ здѣлавшейся смотр. Примѣч. 3 ОРИССЕЕВО. Мнѣ нѣкогда похвальный Аргенторатскій Лѣкарь ЛЕ МЕРИ сказывалъ , что онъ въ одно время вылѣчилъ больного , у котораго великая запылка часть съ немалою частію корки можжечковой палашомъ отрублена была.

§. 548.

А впротчемъ та рана тяжелѣ бываетъ , когда черепъ головной спрѣлою тупою будеть проломленъ и разможденъ , нежели острою проспрѣленъ. А хуже всѣхъ ударъ отъ свинцовой пули , ибо отъ ея бѣдственнаго налѣту и черепъ и самый мозгъ сильно ударяемы бывають , и попрясаются (*). А сокровен-

Е е 3

НЫЯ

ныя шрецинки и не въ шомъ мѣстѣ , по которому ударъ пришолъ, бывающія; понеже трудно находить, для того оныя не легко и лѣчить.

(*) Смолр. прилѣръ у ПАРЕА въ кн. 9 въ гл. 8 стр. 273.

§. 549.

Припомъ же при шаковыхъ ранахъ много причиняетъ возрастъ , годовое время , состояніе тѣла , содержаніе въ кушаньѣ и питиѣ. А уже выше представилъ, что въ такихъ ранахъ ничего такъ вредительнаго не признается, какъ пасмурной, сырой и нечистой воздухъ (402); чего ради въ великихъ лечебницахъ, гдѣ воздухъ отъ нечистыхъ испаринъ смраденъ, сѣ раны съ трудностью залѣчиваются. Еще же онѣ гораздо порочнѣе, ежели не скоро перевязываются, и на воздухъ, а наипаче холодномъ, бывають долго незавязываемыя оставлены, что уже самимъ дѣломъ изслѣдовано. Сколько шумъ и шрескъ имъ вреденъ, онаго отъ ПАРЕА (*) можемъ научиться.

(*) Кн. 9 гл. 14 стр. 283.

§. 550.

Такимъ образомъ, гдѣ по извѣстнымъ признакамъ, или по нѣкошорымъ догадкамъ догадаться можно, что голова проломлена, и гдѣ худые знаки опасности будущи представляють. Черепъ головной должно обнажить, и щели или пролома искать. А разрѣзъ хоть отъ раны-будетъ таковъ, каковъ намъ надобно имѣть, или руками оный дѣлать надлежитъ, въ такомъ случаѣ за наилучшій признается, шомъ который двумя поперешними линиями на литеру Х походящій дѣлается, чтобъ послѣ отъ всякаго шорцащаго угла кожу отрѣзать было можно. Ибо такимъ образомъ мѣсто бураву дѣлается, который упош-

употребить шутъ будеть надобно. Смотрѣть же надлежитъ, когда кожу и другія части сверхъ черепа находящіяся будеть подрѣзывать, чтобъ чего отъ той плевы, которая подъ кожею черепъ головной охватываетъ, на кости не оспалось; понеже она буравомъ будучи разодрана горячку съ вожженіемъ произвести можетъ. При всякомъ особливомъ случаѣ, особливымъ способомъ и рѣзать должно. Ежели кость будеть расколота, а не проломлена, то ножечкомъ усиленнѣе придавить можно, которымъ мѣстомъ и кожа и оболочка на костную прорѣжуся. А гдѣ кость со всѣмъ будеть проломлена и шатається, то руку больше поддерживать надлежитъ, чтобъ обломка костнаго внутрь не вдавить, и чтобъ оный обломокъ мозга и его плевы не досадилъ. Ежели кровь изъ раны будеть течь, оную приложеніемъ пряжи чистой, или, ежели надобно будеть, придавленіемъ или завязаніемъ удержать. Между углами кожи подрѣзанной и между костью положить надлежитъ пряжу, чтобъ опять не срослись.

§. 551.

Послѣ какъ кровь остановится, то опять черепъ головной должно открыть и губкою въ винѣ тепломъ обмоченною обтереть. Ежели кость не проломлена, но только верхушка зашибена, и взшерошена, оное довольно только соскрести и згладить. Ежели какіе маленькіе обломочки торчатъ, вынуть, и ежели съ перепонкою висѣтъ, будутъ, ножницами отрѣзать, ежели же съ самою костью держатся и вломлены, на мѣсто свое поставитъ, чтобъ срослись. А которое не сроспается, оное умираетъ, и напоследокъ отъ части здоровой отдѣляется.

§. 552.

§. 552.

Ибо при всякомъ расколѣ и проломѣ черепъ головномъ не надобно употреблять такихъ инструментовъ , какими черепъ головной обыкновенно просверливается. Понеже когда никакихъ знаковъ худыхъ нѣтъ , или когда уже оныя бывшіе , полегче станowiąтся , и ежели никакой сани , и ее , въ разсужденіи раны , не весьма много , изъ язвыны печь будетъ , и ежели изъ обнаженной кости мясо будетъ выростать , шувъ употреблять сверло за излишнее признается. Ибо щели на черепъ головномъ , слово въ слово какъ и на другой кости , ежели какой иной вредъ не приключится , мясомъ крѣпкимъ заростають. Къ тому , какъ я думаю , не мало пособствуетъ , ежели не упуская времени по полученіи удара крови много убавлено будетъ , и даны будутъ лѣкарства нѣсколько крѣпкія на низъ слабящія (63) , которыми дѣлается , что , хотя бы внутри жила бьющаяся или жила крово-возвращательная нѣкоторая въ плевахъ мозговыхъ отъ удара порвавшись , нѣсколько крови испустила , оное врознь разойдется. Того ради ежели худые знаки не дѣлаются , или и дѣлаются да излегка , и послѣ оныхъ никакіе тяжкіе не послѣдуютъ , то надобно отвѣдать лѣчить чрезъ кровопусканіе , и чрезъ прикладываніе вещей врознь разбивающихъ.

§. 553.

Ежели же черепа головного только наружная часть проломлена будетъ , и расщелины до мозга средостѣннаго , а не до другой и внутренней его части или до бляшки стекляной проходятъ , то надобно опасаться гнилости или червоточины (526). Весьма. хорошій способъ къ тому , буравомъ худос мѣсто

мѣсто захватить, и кость всю вывертѣть. Также когда худое мѣсто ширѣ будетъ того, чтобъ буравомъ можно было захватить, то выходъ мокропѣ оставляется той, которая въ промежкахъ средостѣнныхъ расплылась, и то, что въ кости попортилось, засыхаетъ, и отъ здороваго отдѣляется. Если мѣста попортившагося окружность велика будетъ, то очень хорошо впористельно сверло поставитъ. Нѣкоторые кость скребелками скоблютъ или скребутъ, доколѣ то основательное цѣлымъ окажется; но я разсуждаю, что то мѣсто лучше со всѣмъ вырѣзать.

§. 554.

Если черепъ головной, съ наружи прорубленный *с'дгав*, то есть мѣсто (528) имѣетъ, тутъ не другое какое лѣченіе надобно, но то, о которомъ я выше предложилъ (524, 525). Надобно спараться о костяномъ обломкѣ, чѣмъ оный или съ другою костью сросся, и чтобъ на немъ перепонка выросла, или, если тому здѣлаться не лзя, чѣмъ высохши отъ другой кости отдѣлился.

§. 555.

Но если обломокъ, палашомъ отсѣченный со всѣхъ сторонъ отдѣленъ будетъ, который родъ *ἀποσκηπαρισμός* у древнихъ назывался (*), оный, если еще не попортился, зберечь можно, когда кожа не со всѣмъ отрублена, но съ костью будетъ висѣть. Понеже очистивши рану кость на мѣсто свое можно положить, а кожу обвязкою или сшиваніемъ прикрѣпить, и не часто перевязывать, то кость сросется.

(*) Примѣры смотри у ПАРЕА въ Кн. 9 Гл. 7 стр. 274, у ЛЕДРАНА въ Т 1 Прим. 22 стр. 146; снеси тутъ вышесказанное письмо.

Ж Ж

§. 556.

§. 556.

Чрезъ опыты изслѣдовано, во время Элагии, то есть, когда у молодыхъ людей кость безъ пролому вдавливается, по большей части напрасное бываетъ всякое лѣченіе, онаго предначинашь не надлежитъ дополь, покуда не приключатся такіе припадки, которые будутъ значить, что мозгъ давленъ. Ибо иногда по давленое само собору, и безъ всякихъ посредственныхъ вспомогательствъ, выздоравливаетъ (*); также часто Элагия безъ всякаго мѣшательства такъ оставляется (**). Ежели лѣченіе за не-обходимое дѣло признается, то очень хорошо, кость подлѣ того мѣста, которое давлено, буравомъ провернѣть, и оное такимъ способомъ поднять, какимъ проломлены и давленыя части поднимаются; о чемъ вскорѣ объявлю, какъ до того дойду. Нѣкоторые съ наружи къ кожѣ пластырь клейкой прикладываютъ, и оной приподнимающъ, чѣмъ съ кожей и кость въ верхъ приподнялась, но такимъ способомъ боль немалая причиняется, а пользы мало бываетъ. Можно отвѣдать въ такомъ случаѣ банку такую, которая чрезъ огонь приспавливается (***). Большая опасность произойти можетъ, ежели по буравомъ (пирефондъ) будетъ дѣлано, понеже когда онъ въ кость будетъ ввертываться, крайне опасаться надобно, чѣмъ кость не расколется, и мозговой перепонки сильно не повредила (****).

(*) Сіе отъ движенія крови дѣлается, и ежели сильно будутъ подниматься жилы бьющіяся, по молодымъ костямъ дѣтскимъ расходящіяся, что самая правда. Смотр. у ПАРЕА Кн. 2 гл. 5 стр. 270, и Примѣръ въ Ефemerид. Н. К. въ дес. 2, 3 года Прим. 192 стр. 377.

(**) Смотри множество исторій у МАГАТА Кн. 2 гл. 19 стр. 41. Мы нѣкогда случилось къ челоѣку призвану бытъ, который изъ

съ третьяго палатнаго строенія упалъ, съ начала безъ чувства будто спящій былъ. А понеже догадываться надобно было, что онъ голову повредилъ, лѣкаръ, волосы обриваючи, показалъ глубокую и гораздо обширную пазуху и черепъ вдавленный. Когда мы начали удивляться, что кожа въ томъ мѣстѣ не пришивена, и ничемъ не досажена, человекъ очулся, и опасаясь, чтобъ его не рѣзали, сказалъ: Тутъ мѣстъ ничего испорченнаго, у меня съ ребячества та пазуха была. И онъ безъ всякаго вреда выздоровѣлъ.

(***) Дѣло самое и банку представилъ ГИЛДАНЪ въ Сочн. 2 Прим. 5 стр. 87.

(****) Смори у СКУЛЬТЕТА въ Армянск. Декл. Таб. 23 стр. 117.

§. 557.

Ежели кость вдавленная будетъ еще разломана (ἐνθλασις), она не только мозгъ и его перепонку можетъ бередить, но иногда еще изъ обломковъ будто нѣкоторыми иглами будетъ колоть. Межъ такими припадками, которые обыкновенно случаются, ежели мозгъ будетъ придавливаться (532, 533, 534). Въ семъ случаѣ сильное дѣлается возженіе, которое къ загноенію клонится будетъ: Чего ради, ежели о лѣченіи не будутъ спараться, то изъ мозгу въ щель широкую гной попечетъ. Ежели воздухъ попадетъ, то язвина гнѣючи раздуваться начнетъ, и мясо внутри худое здѣлается, которое, будто бы грибокъ, весьма скоро и на самомъ черепѣ головномъ наростетъ.

§. 558.

Того ради не упуская времени должно кость вдавленную приподнять. Многіе начинали сіе дѣлать выдуманными различными инструментами, буравомъ (перевра, пирефондъ) и другими называемыми качадыками (елеваторіисъ), изъ которыхъ одинъ, при ножки или рожка имѣющій, тройникомъ или презубцомъ (триплоидесъ) называется (*), а другой имя себѣ получилъ отъ изобрѣтателя ГИЛДАНА (**). Но

еи махины такіяжѣ какѣ буравѣ, чего ради завсегда боясья должно, чтобѣ опѣ него внутренняя кости часть не разломилась (555). Да бурава вѣ кость, со всѣхѣ сторонѣ опѣбленную и хлябающую, безѣ опасности ввернуть не возможно. Инакѣ гораздо лучше кость, вѣ низѣ впадшую, прямо (***) приподнять. Ежели же щель не будетѣ столь пространна, или обломка свободно опнять не лзя, подпорки подспавить не возможно, доколѣ не будетѣ проверчена дыра на кости цѣлой, оную проверѣть, подѣ вдавленной кости, чтобѣ подковыркѣ мѣсто пространство и проходѣ зѣбался. А какѣ ломаное подковыркою будетѣ подымано, тутѣ смотрѣть надлежитѣ, чтобѣ оною подковыркою у дыры край гораздо не припискался, для чего завсегда межѣ костями перстѣ подкладывать надлежитѣ.

(*) Смотр. у СКУЛЕТТА таб. 3.

(**) Смотр. у ГИЛДНА Сотн. 1 Прим. 4 стр. 79.

(***) Смотр. ГАРЕНЖОТЬ десѣ Инстр. Т. 2 гл. 3 Арш. 11 стр. 152 и XIII стр. 158.

§. 559.

Ежели же кость, вѣ низѣ вдавленная, вынята будетѣ, то надлежитѣ стараться, и мокрому подѣ черепѣ напекшую вонѣ взять, и обломки шатающиеся, а наипаче тѣ, которые будучи остры плеву бередящѣ, прочѣ опѣблять. Также повырѣзать должно все, что бы ни было, игловастое и внутрь торчащее. Часто дыра не бываетѣ такѣ велика, чтобѣ вѣ нее обломки можно вынуть, для того другія дырки буравомѣ подѣлать надлежитѣ, и перемычки межѣ ними повырѣзывать, что бы выходѣ зѣбался внутри вредѣ дѣлающимѣ костямѣ.

§. 560.

§. 560.

Какія лѣкарства къ жесткой оболочкѣ надмозговой и къ мозгу прикладывать должно, ниже покажу. А понеже опасаться надобно, чтобъ кость, которая разломана была и приподнята, не упала, то голову должно такъ обвязать, чтобъ она кость опять не опустила. Ради того на край костяныя, что цѣлое оспалось, свернувъ накласть пряжи и суконокъ въ нѣсколько разъ сложенныхъ, а проломленное мѣсто излегка только прикрывъ надлежитъ, чтобъ въ то время, какъ голову обвязкою будущъ обвязывать, костяного обломка не придавить. А обвязка туго па надобна, которая капишаль маюса и. е. наголовникъ большой называется.

§. 561.

Иногда также черепъ головной раскалывается (§30), оного часто случается, что внутри жила бьющаяся или жила кровообращательная порвавшись нѣсколько крови выпускаетъ. Но ежели по онымъ обстоятельствомъ, каковыя больному случаются, и о которыхъ я выше объявилъ (§32, §34 до §39), се уразумѣется, безъ замедлѣнія къ употребленію сверла приступить должно. Ежели же щель широка будетъ, то прорѣзавъ кожу, мокроту въ щель вонъ взять можно. И ежели крови не много вышло, оную другими способами разбить можно, о чемъ выше я представилъ (§51). И такъ при такихъ лѣченіяхъ оспаться должно будетъ до тѣхъ поръ, куда худыя знаки не покажутъ, что черепъ головной не опмѣнно просверливать должно, а наибольшее, ежели оныя уменьшаться не будутъ, а будутъ прибавляться

Ж Ж З

ливаться

ливаются. На расщепленной и проломленной черепъ головной пластыри, или вышепредставленные мѣшечки (518), прикладывая излишнее да еще и вредное дѣло есть, безъ убавленія крови. Понесже жаръ съ наружи приложенныхъ лѣкарствъ крови печеніе изъ перерванныхъ сосудовъ умножитъ, и самую кровь скорѣе гораздо вредительнѣйшею и гнилою здѣлать можетъ. При семъ случаѣ весьма надобно воздержаніе, покой и питіе жидящее, при которыхъ наблюденіи иногда превеликія опасности безъ употребленія инструментовъ опращены быть могутъ.

§. 762.

Ежели же знаки будутъ такіе, что болѣзнь примножается, то не надобно вдаль откладывать сего дѣйствительнѣйшаго въ лѣченіи способа, который, какъ вознамѣренось, апробовать, то надобно хотящему лѣченію на себя принять, весь снарядъ по настоящему расположенный подъ руками имѣть. Изъ инструментовъ сіи надобны: 1) Ножечекъ, которыми кожа разрѣзывается, и отъ черепа головного отдѣляется; 2) Буравокъ или сверло остроконечное, которыми сперва ямочку маленькую высверливаютъ, чѣмъ спержень, гвоздь (клавумъ) можно было вставить; 3) Буравъ пустой (модіолусъ или феррамментумъ конкавумъ) круглопродолговатый, на самыхъ краяхъ пиловатый, который у новѣйшихъ Трепаномъ называется; 4) Въ средину самого пустава бурава спержень, гвоздь (клавусъ) вставлявается, который послѣ, какъ буравъ пустой себѣ слѣдъ назначилъ, вонъ вынимается; 5) Инструментъ, которымъ клавусъ изъ бурава вынимается; 6) Напарье (перебра), которое въ ямочку спержнемъ здѣланную ввертывается, и ко-

и копорымъ косточка изъ черепа головнаго высверленная, вонъ вынимася (пирефондъ) (*); 7) Перо очиненое или опилка, которою дыры глубина мѣряется, или провѣдывается; 8) Кисточка для очищенія опилокъ къ бураву прилиплыхъ; 9) Ножечекъ вырѣзательной, копорый съ одной стороны тупъ, и на концѣ горошечку имѣетъ для оскребанія и сглаживанія краевъ у дыры, вдѣланный; 10) Подковырки различныя: и большія и маленькія; копорыми косяныя обломки опавшіе поднимаются; 11) Перепонки хранипель или *membranae Philae*, копорымъ жесткая оболочка надменная придавливается, чтобъ мокрота, подъ черепомъ головнымъ находящаяся, выходъ получила **; 12) Кисточки или пинзелки многіе, копорыми мокрота, подъ черепомъ головнымъ, или подъ левую мозговую ступѣвшаяся, вонъ можетъ быть взята; 13) Волокочъ [волоса] копорымъ маленькіе обломки вонъ вынимаются; 14) Ножечекъ обоюднои, копорымъ при случаѣ жилу кровообращательную прорѣзываютъ; а повсѣгда онымъ жесткую матъ отворяютъ, по еѣ холстинкою обертываютъ, чтобъ больного чловѣка да и другихъ не испужать.

(*) Изъ новѣйшихъ есть также, которые клещи или щипцы на то вдѣланные употребляютъ; смотри оныя фигуру у Шарпиа фиг. 12.

(**) У древнихъ сѣ имъ дано было бляшкѣ мѣдной крѣпкой нѣсколько парскодонной, съ вѣнней стороны гладкой. Сію такимъ образомъ опускали, чтобъ вѣнняя ея часть близко къ мозгу была, и потчасъ подъ нее клали то, что ножечкомъ раздѣлить было надобно; чтобъ медикъ по долоту вырѣзательному молоткомъ сильнѣе ударить могъ. Смотри у Цельса въ Кн. 8 Гл. 3.

§. 563.

Ежели же дыру и рану обвязать надобно будетъ, то къ тому неосмѣнно надобны: 1) Тряпочка изъ тон-

тонкаго полотна кругленько обрѣзанная , которая внутрь опускается , и подѣ черепѣ головной подсаживается. Сквозь эту пряпочку нитка мягкая продѣвается , которой нитки концы одинѣ съ другимѣ связанные внѣ раны оставляются; чтобѣ пряпочку свободнѣе вонѣ взять было можно : 2) Подушечки или небольшіе клубочки кружками свернутые , копорые, въ дыру вложены будучи , мозгѣ удерживающѣ , чтобѣ изѣ него дикое мясо не росло (*). 3) Еще къ тому надобна небольшая бляшка свинцовая часпыми дырочками испроколота , и съ двухѣ сторонѣ поцѣпочки имѣющая , съ наружной стороны , копорую къ мозгу будещѣ лежать , гладкая , которая въ дыру опущена будучи , также мясо удерживаетѣ , чтобѣ не выросло (**). 4) Подушечекѣ нѣсколько различной величины для прикрыванія кости. 5) Свертковѣ довольное число во много разѣ сложенныхѣ , копорыми все сіе покрывается. 6) Вошанка или плаштырь. 7) Упиральникѣ или пошпенцо , копорое во время обвиванія головы наголовникомѣ большимѣ (капиталь магнумѣ) называется.

(*) Смотр. Фиг. 4 къ § 21.

(**) Смори у БЕЛЛОСТА на показ. ж. гл. 8 стр. 102.

§. 564.

Также мѣсто избирать надлежитѣ , на копоромѣ свободно поставишь буравѣ пустой можно. Я уже выше объявилѣ , что не безѣ опасности сіе быть можетѣ , гдѣ внутри въ самой кости великія жилы быющіяся къ верху идущѣ , что самое въ переднемѣ нижнемѣ углу шѣмянной кости находится (543). Не меньше же и по бѣдственно , гдѣ жилы быющіяся и жилы кровесовращательныя , сквозь дыры на черепѣ головномѣ продолбленныя проходящѣ , каковыя нахо-

дятся

дятся на самой верхней и задней части костей пѣ-
мянныхъ , подлѣ швовъ , которыми сіи кости межъ
собою одна съ другою , и съ костью затылочною
соединяются. И шовъ вырѣзывать не должно , развѣ
крайняя нужда лѣчащаго къ тому понудитъ. Одна-
кожъ большее бѣдство быть можетъ , ежели шовъ
проборный или стрѣловидный вырѣжется для отпротп-
ка серповиднаго , и для пазухи въ немъ находящейся
жильно-кровоовозвращательной , нежели , когда вырѣ-
жется шовъ вѣнечной или опѣ Греческой лише-
ры А имя имѣющей. Понеже и здѣсь отпротпкъ ,
и въ немъ пазуха , также и подлѣ костью лобною до
кости рѣшетчатой проходящъ , ни лобная сре-
дняя , и та часть , которая надъ мѣстомъ межъ
бровями находящимся , безъ опасенія проверчивано
быть не можетъ. Въ нижней части надъ ямою гла-
зною , кость вдвое находится , и пазухи имѣетъ ,
которыя оной кости проверчивать не поустятъ.
Кость затылочная на срединѣ имѣетъ бугорокъ ,
гдѣ и пазуха она , которая въ перегородкѣ мозго-
вой , или въ отпротпкѣ серповидномъ , имѣется , раз-
дѣляется на двѣ боковыя , которыя съ обѣихъ сто-
ронъ производятъ , и въ оную перегородку ввязы-
ваются , которая мозгъ и мозжечокъ нарочно раздѣ-
ляетъ. Пазухи же прицеплены къ кости , на кото-
рой и слѣды ихъ вдавленные видѣть можно. Снизу
затылокъ многими мышками закрытъ. Того ради и
на сей кости бурава наставлятъ не возможно , развѣ
въ самой верхушкѣ и не на средней , но на боковой
части къ шву близкой. Онаго же и кость пролом-
ленная и шатающаяся вытерпѣть не можетъ. Ежели
же черепъ головной будиъ расколотъ , и щель бу-
деиъ имѣть усую , то лучше оную буравомъ рас-

пространить, однакожъ такъ чпобъ спержень въ щель, не былъ поставленъ, но спавить на мѣспѣ къ щели гораздо близкомъ. Ежели щель широка будетъ, или, ежели кость палащомъ порублена будетъ, и лѣченіе буравомъ непремѣнно надобно покажется, то оный при-
чоровить сбоку у раны, оставивъ маленькое распояніе.

§. 565.

Надлежитъ же прежде всего кость обнажить. Уже я выше приказалъ (549), кожу, хоть бы никакого раз-
рѣза изъ раны не было, до самой кости разрѣзать дол-
жно, и то весьма хорошо дѣлается двумя чертами межъ собою поперешными на подобіе буквы Х. Также хорошо кожу двумя чертами, полумѣсячными, которыхъ бы роги одной съ другою сошлись, разрѣзывать, и часть кругленькую въ шожъ, самое время вырѣзывать. Ежели близъ шва диру дѣлать надобно, то гораздо лучше кожу разрѣзывать двумя чертами на подобіе Т. Ежели же должно будетъ мышку височную разрѣзывать, то можно предпочесть разрѣзваніе буквы, V изображающее, такъ, чпобъ верхушка ея въ низу была, а базъ въ верху, и къ кости пѣмянной. Какую умѣренность употреблять, надлежитъ, въ то время, когда надъ костями проломленными и шатающимися кожу подрѣзываемъ, уже выше я предложилъ (549). Очень сурово мнѣ кажется, углы раз-
рѣзаной кожи потчасъ ножницами отрѣзывать, гораздо лучше ихъ оставлять, и промежъ ими и костью пряжею перекладывать. Ибо, надобно, чпобъ сперва кровь изъ зѣланной такъ раны текущая со всѣмъ оспановилась, покуда буравъ на косиѣ не поставился; чего ради рану обложивъ или чистою, или въ спирипѣ помоча, пряжею, обвязываемъ, и самое лѣченіе назавтрее откладываямъ. Ежели же, худые знаки, боль:

больнаго къ концу приближающагося , будутъ представлять , то не должно ожидать другаго дня , но потчасъ оную кровь изъ зѣланной раны вытекающую , копорую и другими способами остановить можно , потчасъ черепъ головной начать просверливать.

§. 566.

Рану шакъ чрезъ ночь продержавъ , лѣченіе начать должно въ мѣстѣ тепломъ , свѣпломъ , и ежели обстоятельства дозволятъ , въ горницѣ пространной , въ которой воздухъ былъ бы чистъ и сухъ , или , ежели пасмурно и туманно покажется на дворѣ , благовоіііями и куреніями оный поправить. За дверьми замокъ дверной также должно завѣсипъ , чтобъ въ горницу не вѣяло , копорымъ вѣяніемъ досаждена быть можетъ открывая плева мозговая. Лѣченіе такимъ образомъ начинается. Человѣка , уши хлопчатою бумагою заткнувъ , положить на постелъ должно шакъ , чтобъ подъ голову подложена была жесткая и кожена подушка. Онъ также , ежели довольно силы будетъ имѣть , сидѣть можетъ на низенькой скамѣечкѣ. Голову одинъ помощникъ держать будетъ. Лѣкарь перстами возьметъ у бурава головку или рукояпку съ напарьемъ остроконечнымъ (561, 562) , копорымъ сперва ямочку маленькую зѣлаетъ , въ которую бы спержень (клавусъ) поставился , чтобъ , въ ней спюючи , въ округъ обращающійся буравъ выскальзывать не могъ. Есть и такіе , копорые на это не смотрятъ , и потчасъ дѣло свое буравомъ съ спержемъ дѣлать начинаютъ. Когда же надобно будетъ буравомъ въ округъ вертѣть , тогда спержень (клавусъ) въ оную ямочку напарьемъ выверченую , вставляивается. А на самую верхнюю головочку , томъ , кто лѣчитъ хочетъ ,

числѣ , накладываеѣ лѣвую руку , и на нее лбомѣ или подбородкомѣ облегается : Искуснѣйше же лѣ-
кари одну только руку накладываютѣ . Ежели въ
округѣ верѣѣть надобно буравѣ , то всегда его съ
начала нѣсколько въ пропивную сторону обводитѣ
должно , и послѣ такѣ верѣѣть , чтобѣ край пильные
на кости подѣлались . Есть же нѣкоторая и въ дав-
леніи ухватка , чтобѣ и проверчивалось , и въ округѣ
верѣѣлось , ибо ежели легко давлено будеѣ , мало
успѣху здѣлаешь , ежели сильно , то не будеѣ вер-
ѣѣться . Но , гдѣ уже слѣдѣ бураву показанѣ , то
спержень потчасѣ вонѣ вынимаютѣ , и буравомѣ од-
нѣмѣ дѣйствовать начинаютѣ . Между тѣмѣ цоточ-
кою опилки пупѣ прилипые обпираютѣ , и перомѣ
очиннымѣ , или спичкою , дыры глубину , вездѣ
она ровна , измѣриваютѣ . Ежели косточку вырѣзан-
ную , напарьемѣ вонѣ взять будеѣ надобно , то
должно оное , которое на подобіе винта здѣлано , въ
ямочку спержнемѣ выверченую , поспавить , чтобѣ
косточка , во время выниманія напарьемѣ , не
была вдавлена и внизѣ не опустилась . Опилки крова-
вые значаѣ , что до мозга средостѣннаго дошли ,
съ котораго времени можно будеѣ разумѣть , что
уже кости мягче , по движенію бурава , и по треско-
пѣ отѣ него произходящей . Но тогда съ большою
осторожностію дѣло свое дѣлать , и руку лѣвую больше
на повѣсѣ держаѣ , и буравѣ потишѣ верѣѣть дол-
жно . Припомѣ часто дыры глубину , и вездѣ ров-
на пробовать . Ежели же она въ которомѣ нибудѣ
мѣстѣ поглубже будеѣ , на пропивную сторону на-
клонить и нѣсколько покрѣпче припискать можно
буравѣ , чрезѣ такой способѣ пропущеное , прежде вы-
пилѣ

пилился. Когдаж опилки опять бѣловапы будутъ , и ежели ихъ кисточкою (фоссѣ пениѣ , 562 , 12) обопрешь , кружокъ буравомъ выпиленный внизу пошлемная бытъ начнетъ , и будпо синеватѣ , то надобно разумѣть , что кость почти проверчена : Того ради буравъ надлежитъ почаще вынимать , и все гораздо прилѣжно провѣдывать , чтобъ кость нечаянно не прорвалась , и краями буравными зубчатыми мозговая плева не повредилась. Косточку же вынимающѣ или онымъ напаремъ (561 , 6) или клещиками нашо здѣланными (561 , 6).

§. 567.

Когда же черепъ головной такимъ образомъ , проверченъ будетъ , тогда ножечкомъ вырѣзывательнымъ (561 , 9) край у дыры обскоблить надлежитъ , и что бы ни было остистосъ , и внутрь торчащее , вырѣзать. А пѣмъ орудемъ , который я сторожемъ или храницелемъ плевнымъ назвалъ (561 , 11) придавливается плева мозговая , чрезъ что выходъ мокротѣ внутри запекшейся дѣлается. Которая не станетъ печь , оную вычерпать можно кисточками (561 , 12) такъ , что никакого слѣда ея не останется. Не мало еще къ оному вонъ изгнанію мокроты способствуетъ то , ежели больной въ то время духъ захватитъ , и кашляючи и чхаючи мозговую плеву въ движеніе приведетъ и приподниметъ. Ежели же оная мокрота подъ жестокою оболочкою надмозгнуо собралась , то надобно сію оболочку ножечкомъ (561 , 14) ничего не опасаяся такъ прорѣзать , чтобъ рана пространна была. Однакожъ беречь надобно жилы бьющіяся , по сей перепонкѣ разходящіяся. Ежели которые найдутся костяныя обломки , оныя или от-
3 3 3
нятъ

нять надлежитъ, или когда велики будутъ, припод-
нять, уже выше я сказалъ.

§. 568.

Ежели маленькой костяной обломокъ внутри
запрячется, и онъ будетъ остръ, жестокою масть
будетъ берeditь и въ ней торчать будетъ, такого
обломка часто безъ великаго сея плевѣ вреда вынуть
бываетъ не возможно. Въ такомъ случаѣ лучше
плевѣ разрѣзать, нежели насильно тащить и раз-
мачаливать. А еще, ежели за нужное покажется,
другую дыру буравомъ провертитъ надлежитъ, чтобъ
чрезъ то черепа головного проломъ ширѣ дѣлался,
и обломокъ свободно можно было вынуть. Не рѣдко
и по случается можетъ, что обломокъ великой, весь
разломанный и тапающійся, а припомъ и жестокою
масть берeditъ, въ дыру выпащить бываетъ не можно.
Ежели много дыръ дѣлать надобно; то должно,
чтобъ сперва съ кружкомъ другой дыры сошлась,
понеже такимъ способомъ перемишка межъ ими почпа
не останется, копорыя доломомъ вырѣзывательнымъ
и молоткомъ выколачивать бы надлежало.

§. 569.

Что же до лѣченія принадлежитъ, что прикла-
дывать прилично къ плевѣ надмозтной, ежели она
открыта, а впротчемъ во всемъ цѣла будетъ, я
за наилучшее почишаю, холстинку (563) чистенькую
и на эту еще пряжу сухую накладывать, а особливо
ежели всей мокроты взявъ вонъ было не возможно,
копорую сія пряжа такимъ образомъ выпивать мо-
жетъ. Другіе лѣдонною пылью пряпочку посыпаютъ,
и оную на плевѣ, ежели она цѣла, кладутъ, а ее пряпоч-
кою и пряжею сухою покрываютъ. А будетъ ли же-
стокая

спокая оболочка надмозжная вожжена, или попорчена, оное по цвѣту легко узнать можно. Понеже вожженна будучи краснѣется, а поврежденная нѣсколько блѣдноватѣе казаться будетъ. Того ради, ежели она вожженна будетъ, по тряпочку, какъ въ дыру опустишь и на мозгъ положишь, покропитъ должно водою ранною [аква вулнераріа], къ которой немножко Эссенціи сукцини, маслихисъ и кроци прибавитъ можно. Смотрѣть же надлежитъ, чтобъ сіи лѣкарства не были остры, и кумъ сале шартари здѣланныя. Надобно, все вмѣстѣ употреблять, въ чемъ противу вожженія весьма бѣдственное вспомошествованіе бываетъ, о чемъ я уже представилъ.

§ 5702.

Ежели же не только жестокая мать, но и самый мозгъ, въ нѣкоторой части поврежденъ будетъ, и изъ дыры гной, или саніасъ, или другой порченой сокъ будетъ течь, то прикладывать надобно лѣкарства къ очищенію язвыныя способныя. Наилучшее лѣкарство есть эссенція сукцини, съ нѣсколькими капельками olei теребинтинисъ смѣшанная. Ежели же язва очень не чиста: покажется немножко эссенціе мирре прибавитъ можно; ежели и сіи крѣпкими покажутся, то можно ихъ разжидить аква вулнераріа. Способнѣйшій еще есть ликворъ, который французы часно употребляютъ балсамумъ флораванши называемой. Неприспойны здѣсь лѣкарства водяныя, жирныя и весьма гной производящія. Весьма полезны лѣкарства спиріуозныя называемыя, однакожъ вредны могутъ ежели крѣпки будутъ, понеже мать жестокая будучи весьма жилами чувствительными изнанаполнена, оными гораздо бередишься. А что упо-

пре-

прѣбленіе спиритовъ вовсе загнаиваніе оспанавливаеѣтъ, о шомъ въ другомъ мѣстѣ я объявилъ.

§. 571.

Ежели язвина въ мозгу будеѣтъ , и ежели она въ воздухѣ или лѣкарствами весьма мягчительными и гноющими въ другое состояніе приведена т: е. испорчена будеѣтъ , и ежели рана слабо перевязывана , то въ дыру черепа головнаго , и на самомъ черепѣ головномъ опухоль здѣлается неплотная , мягкая , на гнилое мясо схожая , а понеже она въ скоромъ времени велика очень вырастаеѣтъ , грибомъ мозговымъ (фунгусъ церебри) называется. Сего гриба мы имѣть не можемъ , ежели не будемъ употреблять всѣхъ тѣхъ вещей , отъ которыхъ онъ родится , и ежели въ дыру черепа головнаго , которая будеѣтъ отъ раны , или буравомъ проверчена , будемъ класть оныя небольшіе и нѣсколько жестковатыя клубочки изъ пряжи здѣланные (563 . 2. фиг. 4) , и сверхъ тѣхъ накладывать многія и одна другой больше постепенныя суконки. Также весьма надобно къ употребленію въ семъ случаѣ она въ свинцовая и частыми дырочками изпроколота въ бляшка белоспѣева (563 , 3). Которыя всѣ , и ликворы оныя спиритуозныя ежели употребляемы будутъ , да и рана рѣдко и скоро перевязывана будеѣтъ , не попустятъ мозгу такъ вырасти.

§. 572.

Но когда уже грибокъ выросъ , то его должно ножечкомъ срѣзать , и окропить спиртомъ чистымъ , которымъ также крови печеніе удерживается. Сверху прикладывать надобно пряжу въ спиртѣ масличномъ и янтарномъ обмоченную и выжупую. А при томъ какъ приложена будеѣтъ пряжа и суконки , надобно

добно нѣсколько попуке обвязку зашнуръ , которую то , что могло бы опять вырастать , удержишия . Нѣкоторые лучше хотяпѣ употребляяпѣ лѣкарства къ сѣяденію нарастающаго мяса , способныя . И такѣ посыпаютѣ порошокѣ изѣ арисполохѣа , сабина , каріофиллисѣ , маспихе , олибано , и випріоло усто , которые , понеже сами собою ѣдки , для того и небезопасны : ибо мозгѣ сильно бередаютѣ , и великое вѣ немѣ загнаиваніе производятѣ .

§. 573.

Ежели же перепонка , и немоцной человекѣ , не будетѣ худыхѣ знаковѣ имѣтъ , то голову такѣ связанную содержать должно , доколѣ у дыры край или кость умершая отѣ части здоровой не отдѣлится ; а то не потчасѣ , но чрезѣ многіе дни дѣлается . Между пѣмѣ къ обнаженной кости прикладываяпѣ должно пряжу вѣ спиртѣ чистомѣ обмоченную и выжатую . Когдажѣ время пройдетѣ , тогда кость шатапѣся начнетѣ , а послѣ того мясо вырастатѣ сплетѣ , которое межѣ цѣлою и умершею частью проходитѣ , и по , что порожно будетѣ межѣ костями , наполнипѣ . Сіе мясо будѣо бородавка или мозоль окрѣпнетѣ , и будѣо бы струпомѣ костянымѣ здѣлается . А на концѣ мозоль [калусѣ] по времени цѣлѣнѣ здѣлавшись , вѣ кость претворяется .

§. 574.

Какѣ долго мозоль еще мягка будетѣ , и еще не утвердился , каковѣ вѣ пѣлахѣ малосильныхѣ иногда долго бываетѣ , оную , отѣ такихѣ случаевѣ , которые сѣ наружи вредѣ причинитѣ могутѣ , беречь должно , приложѣ золотую , или свинцовую бляшку , или хопѣ суконкою часпою и полспою .

И и

§. 575.

помѣ въ нихъ попеченіе имѣть , чѣмъ струга безобразнаго не здѣлать , и чѣмъ оный ни выше не выросъ , ни жолобоватиною не здѣлался , но во всемъ съ кожею ровенъ былъ.



ВѢКА ВЕРХНЯГО ПАДЕЖЬ.

ПАЛПЕБРЕ СУПЕРІОРИСЪ КАЗУСЪ.

§. 577.

Гдѣ мышкѣ на лбу находящіяся поперегъ будутъ перерублены, и она я рана съ глазомъ подъ нею находящимся такъ будещъ перевязывана , что кожа между собою много разширится , и широкой стругъ здѣлается ; то случится можеть , что верхнее вѣко не будещъ подъ яматься , который порокъ πτωσις τῆ φλεφάγης называется. Ежели же то случится , что волосы или рѣсницы къ самому глазу завернутся , Φαλαγγωσις (*) именуется. Сей порокъ еще дѣлается , когда мышка она я , которою верхнее вѣко въ верхъ приподнимается , разслабнеть , или поперегъ будещъ перерублена.

(*) Смотр. у АЕЦІА въ Кн. VIII. гл. 68 стр. 135 Издан. Алд.

§. 578.

Сему злосключенію еще отъ весьма старинныхъ Авторевъ (*), лѣченіе изобрѣтено , во время того лѣченія , кожу на вѣкѣ излишнюю показывающуюся вырѣзываютъ , и рану заживляютъ. А чѣмъ сіе лѣченіе не такъ было сумнительно , новѣйшіе употребляютъ инструментъ на по выдуманной и здѣланной (**). Оный инструментъ здѣланъ изъ двухъ серебряныхъ палочекъ , на одномъ концѣ вмѣстѣ сведенныхъ ,

И и 2

скрозь

скрозь которое мѣсто, будто скрозь дверную петлю, крюкъ продѣвъ, а на другомъ винѣ имѣюшѣ. Симъ винѣмъ, палочки, частыми дырочками испроколошья, свививающѣся могушѣ. А тому, кто лѣчишѣ будетѣ, прилѣжно разсуждать должно, сколько кожи опрѣзавши можешѣ здѣлаться, чѣмъ натуральной величинѣ вѣко оспалось; длинноватую же кожу оными палочками такъ прижащѣ, чѣмъ то, которое вырѣзавъ надлежитѣ, изъ нихъ торчало. Сперважѣ ослабѣлое вѣко прошишѣ должно, и иглою небольшою съ ниткою шолковою вошнаною скрозь оныя палочкины дырочки и кожу такъ попродавѣть, чѣмъ во всякой дырочкѣ нитка нѣсколько подлиннѣе была оставлена. Сѣе все здѣлавши ножечекъ взять, и имъ все то, что изъ палочекъ вѣко держащихъ будетѣ торчать, опрѣзавъ. Когдажѣ кожа опрѣзана будетѣ, то палочки отнять такъ надобно, чѣмъ нитки скрозь вѣко продашья въ немъ остались. Послѣ того концы ниточныя одинѣ съ другимъ позавязавъ, и край у раны мѣсто свесѣть. На рану прикладывавъ лѣкарства, заживляющѣя. Весьма хорошо прикладывавъ пряжу балсамо де Меха намазаную. Съ крайнимъ прилѣжаніемъ оное, что такъ шишѣ, беречь, для чего оба глаза завязавъ и чрезъ нѣсколько дней такъ оставивъ надлежитѣ.

(*) Смотри у ЦЕЛСА въ Кн. VII гл. VII числ. 8 у ПАВЛА и АЕЦІА, въ поманутомъ мѣстѣ.

(**) Сей инстр. первый нарисовалъ ГЕО БАРТИШЪ въ ОФѢал-мѣдѣлѣзѣ ч. IX. Кн. XIV. стр. 178. Споръ объ ономъ задался у РУИШІА и РАВІЕМЪ. Смот. и объ ономъ РУИШІЕВУ Епист. XIII и РАВІЕВЪ отвѣщѣ на защищеніе РУИШІЕВО, гдѣ и фигура приложена.

§. 579.

Ежели же глазѣ ошворяшѣся не можѣтъ, за шѣмъ,
что

ΔΑΓΟΦΘΑΛΜΟΣ.

Другой порокъ есть верхняго вѣка, когда оное мало опускается, и для того глаза не закрывается. И по также приключается, когда раны пришибены или на самомъ вѣкѣ, или въ мышцахъ на лбу находящихся, не хорошо будутъ залѣчены. Сего порока лѣчить не возможно, ежели онъ случится у человека малосильнаго, и у котораго кожа скорчилась, также и у того, у котораго много вѣка нѣтъ. Ежели же человекъ будетъ полнолѣтъ, и не множо вѣка не доставать, оное чрезъ лѣченіе поправлено быть можетъ.

§. 581.

Разнявши вѣки , въ глазъ положить надобно
рожокъ , (по Француски амбошеманъ) или бляшку
свинцовую. И доколѣ еще рожекъ или бляшка въ

И и з

глазъ

глазъ вложены не будутъ , глазъ надобно какимъ нибудь саломъ помазать , и наложитъ тонкохонькой пузыря (323) шмапочекъ. Сіе здѣлавши , вѣко приподнимающъ , и кожу съ жиромъ пониже брови разрѣзываетъ , луноватою фигурою , рогами ея близъ обѣихъ купковъ внизъ смотрящими. Но при такомъ случаѣ шу умѣренность наблюдать должно , чтобъ ни вѣковъ хрящикъ , ни мышку вѣко вверхъ поднимающую , не повредитъ. Ибо ежели мышка будетъ повреждена , то вѣко подниматься не станетъ. Кожу такимъ образомъ разрѣзанную , такъ нарочно разводитъ , чтобъ , какъ рана разинется , самый вѣка край нѣсколько опустился. А въ разрѣзанную рану кладутъ бляшечку свинцовую , напередъ къ ней принаровленную , или пряжу сухую , которыя , нарочно разведенной кожѣ , вмѣсто сходятся не даютъ. Глазъ обложивши суконочками , обвязкою нѣсколько поуже завязать. Есть нѣкоторый инструментъ , которымъ глазъ гораздо припискиваться можетъ (Фиг. XIII.) , однакожъ шутъ беречься должно , чтобъ въ немъ , отъ такихъ досадностей , вожженіе не здѣлалось. Ежели лѣченіе хорошо продолжаться будетъ , то струпъ широкой здѣлается , которымъ , ежели мѣсто наполнился , глазъ хорошо закрываться можетъ.

Е К Т Р О П І Й.

Э К Т Р О П І У МЪ.

§. 582.

Иногда на нижнемъ вѣкѣ погрѣшность бываетъ , отъ которой мало въ верхъ поднимается , виситъ ,
рози-

розиноу, и не можеть съ верхнимъ сходиться, Ехтэ-
пиу Греки называютъ. И то приходитъ отъ худого
лѣченія, когда отъ струпа кожа корочѣ здѣлается.
Временемъ внутри подъ вѣкомъ опухоли рождаются. А
иногда младенцы съ симъ порокомъ на свѣтъ про-
изходящъ, которымъ глаза перстами бабъ повивальницъ
очень досажены бывають. У сипариковъ временемъ осла-
бѣваетъ мышца, круговую называемая. Ежели въ фисту-
лѣ слезной нѣсколько покрѣпче дѣйство употреблено
будетъ, иногда, или ножечкомъ, или желѣзомъ кале-
нымъ, кожа повреждается, отъ чего вѣки въ кушкѣ глаз-
номъ внутреннемъ одно съ другимъ сдѣлаются, ко-
торый случай также ехтэпиу причину подасть можеть.

§. 583.

Ежели кожа короче будетъ, такимъ же способомъ
въ лѣченіи поступать, какъ выше (581) я предло-
жилъ. Только разрѣзные рога къ челюстямъ, а не къ
глазу оборачивать должно. А когда внутри подъ вѣ-
комъ мясо выросло, оное нѣтъ лучше, что подъ
самый корень иглою кривою поддѣть и послѣ ножеч-
комъ вырѣзать. Вырѣзывать же должно помаленьку
рѣзая, и такъ, чпобъ ножечекъ и къ иглѣ продѣ-
шой и къ самому глазу поворачивался. А очень
хорошо дать крови печь, и когда она оспановится,
рану еще глубже ножечкомъ разрѣзать, и на самомъ
днѣ ланіе інфернале помазать. Ибо больше силы
надобно употребить, чпобъ опухоль опять не вы-
росла и не опрыгнулась. Также крайнюю умѣрен-
ность имѣть надобно, чпобъ сильными прижигательными
вещми глазу не досадить, для того сперва надлежитъ
его, саломъ, или балсамомъ изъ туции, помазать, и
пузырь межъ глазомъ и вѣками положить. Ежели мын-

ка

ка круговая ослабѣлою покажеться, отвѣдать должно нѣхъ способовъ, о которыхъ выше (579) я далъ знать. Ибо ежели отъ другихъ случаевъ порождетъ сей будеть здѣлавшійся, онаго никакимъ способомъ лѣчить не можно.

§. 584.

Е'утропію называется, гдѣ вѣка нижняго край отъ глаза оборотится. Сей случай не такъ часто лѣчить можно бываеиъ, ежели внутренняя оболочка разрѣзана, и рана такимъ способомъ, какъ я сказалъ, расширена и залѣчена будеть.




СШИВАНІЕ ВѢКА.

СУТУРА ПАЛЬПЕБРЕ.

§. 585.

Ежели все вѣко разрублено будеть, оно сшить можно. И доколь игла не будеть продѣла, надобно межъ имъ и глазомъ свинцовую бляшку положить. Сію бляшку послѣ зашивья вѣка; вонъ взявъ, а въ глазъ положить пузырь, балсамомъ де шуцѣа, съ нѣкопорою часпочною смѣшаннымъ съ балсамомъ де Меха, намазанный.



РАНЫ ГЛАЗНЫЯ.

ВУЛНЕРА ОКУЛЮРУМЪ.

§. 586.

Ежели будеть роговая плесва (корнеа) или матерая (склоресника) ранены, то вся влажность изъ глаза выпекаетъ; а что она въ скоромъ времени
опяиъ

опять родится, о томъ уже старинные врачи знаніе имѣли. Ежели никакого другаго порока не приключится, то рану заживить можно бѣлкомъ яишнымъ, положа между вѣками пузырь. Въ глазъ также класть можно балсамъ де пуціа, смѣшавши нѣсколько съ балсамомъ де мека. Надобно же, чтобъ глазъ въ покоѣ былъ, въ которое намѣреніе оба глаза должно завязать, и больного въ постелѣ содержать.

(*) Оное ГАЛЕНЬ у малаго видѣлъ, но онъ сіе особеннымъ нѣчемъ призналъ. Смотри. въ Кн. 1. о причинахъ припадк. гл. 11. Т. VII. стр. 48. Въ прошедшемъ вѣку многихъ осмѣялъ бурргъ, искусный тайностей изслѣдыватель, который лѣкарствомъ такимъ хвастывался, которымъ влажнѣости глазныя могутъ быть исправлены. Смотри. его Еписполу отъ ѲОМЫ БАРТОЛИНА изданную.



СТАФИЛОМА.

СТАФИЛОМА

§. 587.

При раненіи глаза еще другое бѣдство случается, то есть, когда водяная влажнѣость изъ раны плевы роговой выпекается, шупъ же вмѣстѣ выпадаетъ оболочка ягодковая, а понеже сей порокъ фигурую на зерно [ацинусъ] похожъ, того ради *σάφύλωμα* называется. Сіе когда случится, понеже плева роговая худымъ чирьемъ сѣбѣдена будетъ, зрѣніе потеряется, и глазъ трескается, и для того всякое лѣченіе за излишнее почищается. Ежелижъ отъ раны выпрыгнетъ плева ягодковая, то глазъ можетъ сохраненъ быть, однакожъ и того лѣченія вдаль не откладывать.

§. 588.

Человѣка потчасъ навзничъ положить должно, и то все, что изъ раны выпадшее было, спрятать.

І і

Сіе

Сіе свободно здѣлать можно спичкою изъ усовъ кишковыхъ здѣланною. А чѣмъ плева ягодковая лучше на свое мѣсто приведена быть могла, глазъ пологоньку подавливать можно. Ежели рана такъ узка будетъ, чѣмъ въ оную выпавшее вправить не возможно, то оную малѣхонькимъ ножечкомъ кривымъ должно разрѣзать, чѣмъ довольной величины здѣлалась. А припомъ великую умѣренность употребить надобно, чѣмъ оной средней плевы: роговой чисти, которая къ зѣницѣ глазной завернулась, и вышедшей оболочкѣ, во время рѣзанія или подавливанія не повредить. Первое преступленіе ежели случится, спрутъ оставшійся зрѣніе уменьшитъ; а ежели ягодка придавится и разбередится, изъ того бѣдственное будетъ слѣдовать вожденіе.

§. 589.

Напоследокъ когда плеву ягодковую такимъ образомъ вправишь, можно тѣмъ лѣкарствами съ пользою употреблять, которыя къ заживленію ранъ глазныхъ способны (586). Надлежитъ также и съ ними пузырь вкладывать. Для отвращенія же вожденія оное лѣченіе способно, о которомъ выше я предложилъ (292). А чѣмъ рана скорѣе затворилась, глазъ нѣсколько попридавивъ надлежитъ, для чего сверхъ пряхи снаружи на глазъ положивъ можно бляшку свинцовую и обвязкою прикрѣпить, или приладишь машину къ шому здѣланную, фиг. XIII.

§. 590.

Къ сему случаю и то касается, чѣмъ тѣло хорошо положено было, всегда бы оная спорона была къверху, на которой рана. Того ради, ежели рана

рана будетъ въ низу , шо человекѣка положить должно на-
взничь , сѣдалищныя части приподнявъ повыше , а голову
опустивъ пониже. Ежели съ боку , положить на ту сто-
рону , съ которой глазъ цѣлъ , ежели же на самой верхней
части глазной рана будетъ , должно человекѣку почти
прямо голову держать. Больнаго такъ долго держать ,
пока рана заживетъ и въ глазу опять влажность родится.

§. 591.

Ежели же оное , что выпало , уже застарѣло
и попорчено покажется , на то есть другое лѣченіе ,
оное крючкомъ или нипкою продѣлою приподнять
и до самаго кореня вырѣзать , а рану залѣчивать ,
но отъ того лѣченія все глазное зрѣніе повреждается.

РАНЫ НОСОВЫЯ

ВУЛНЕРА НАЗИ.

§. 592.

Всякому шо извѣстно , что въ носу кости и
хрящъ имѣются. О костяхъ переломленныхъ ниже го-
ворить будемъ. А хрящъ не безбѣдственное дѣло
иглою прошивать , того ради , ежели сшиваніе не оп-
тѣнно надобно , то одну кожу захватывать должно.
За шѣмъ неприличны шутъ всѣ лѣкарства жирныя ,
и прѣизлишне гной производящія. Наибольше полезна
эссенція балсамика. Ежели же внутренняя плева , отъ
мокрошы себѣ имя имѣющая , повреждена будетъ , то
внутри прыскавъ , или ноздрями похлѣбывать должно
аквамъ вулнераріамъ , къ которой прибавлять можно
эссенціамъ сукцины , или иной ликворъ къ сему
полезный.

§. 593.


Нѣкоторые пишутъ что носъ со всѣмъ перерубленный опять залѣчить можно (*). Другіе еще сильныя доказываютъ, что носъ, или отъ тогожъ самаго человѣка, или у другаго, а наибольше изъ плеча, вырѣзавъ кожу и приложивъ, сшить можно (**).

(*) Приводится Історія изъ Примѣч. Медич. ГЕНР. МОЙНИХЕНЬ. с. въ ЛИЗЕРОВОЙ книгѣ, Культурѣ Анатомикусъ называемъ-й, изданныхъ прим. 23. стр. 212. Онъ объявляетъ, что АНТОНИЙ МОЛИНЕТТЪ въ Прелекціяхъ о отцѣ своемъ Лѣкарѣ Венеціанскомъ, представилъ, что онъ у нѣкакого человѣка за прегрѣшеніе такую казню наказаннаго, носъ отрѣзанный, положи въ теплый хлѣбъ, по поламъ разрѣзанный, сшилъ и выѣчилъ. Но МОЛИНЕТТЪ въ Диссерт. Анат. Патологическихъ въ кн. IV. въ гл. XII. на стр. 174. ничего о такомъ лѣченіи не упоминаетъ, толькожъ то утверждаетъ, что онъ самъ въ 1625 году видѣлъ, что отецъ Польскому шляхтичу ноздри весьма хорошо пришилъ. (сіи слова его). А та Історія, которую ГАРЕНЖОТЪ десъ операціонъ Т. III. Прим. VI. стр. 55 предложилъ, кажется не мало у Автора вѣроятія уѣавила.

(**) О семъ обрубленныхъ ноздрей лѣченіи чтенія достойна КАСП. ТАЛЮКОЦІА Хирургія короткихъ частей чрезъ отрубленіе, книга весьма хорошимъ и краснымъ ученіемъ изобильная. Есть же много такихъ, которые думаютъ, будто все, что въ ней ни представлено, выдуманное, и для игранія умомъ ТАЛІАКОЦІЙ написалъ. Въ числѣ таковыхъ былъ и ЮГ. ДЕ АНДР. А КРУЦЕ въ Хирургіи Т. II. Кн. II. гл. III. стр. 82. А чтобъ мы съ нимъ и съ другими въ согласіи не были, запрещаютъ весьма знатныхъ и вѣроятія достойныхъ писателей свидѣтельства: Ибо по свидѣтельству КОРТЕЗІЕВУ въ Мисцелл. медическихъ десяток. III. стр. 83. ТАЛІАКОЦІЙ сію науку получилъ отъ Турпіанскихъ медиковъ, изъ бояновой фамиліи рожденныхъ, въ которой, какъ то въ старину медицина въ фамиліи Аскліпіадовской, сіе искусство отъ нѣкакого ПЕТРА БОЯНА изобрѣтенное, показано было, говорятъ. И самъ ТАЛІАКОЦІЙ, въ предисловіи признается, что не онъ сіе искусство изобрѣлъ, но отъ медиковъ нѣкоторыхъ въ Калабріи перенялъ. А притомъ весьма сильно стойтъ противъ тѣхъ, которые искусство суешнымъ дѣломъ сами поставляютъ, и другимъ наговариваютъ. Кн. I. гл. XVII. стр. 44. Приводитъ Авторъ многихъ, которые о правдѣ прежде времени того, когда онъ писалъ, свидѣтельства важныя дали. АЛЕКСАНДРА ВЕНЕДИКТА, ВЕЗАЛІА, ПАРЕА, ГОУРМЕЛЕНА, ШЕНККІА гл. XIX. стр. 49. Еще же

дѣло

дѣло сіе опытами отъ него здѣланными утверждаетъ. Кн. I. гл. XXIII. стр. 69. Также въ Епистолѣ къ МЕРКУРІАЛІЮ писанной, и которая въ его книгѣ де Декораціоне, т. е. о Красотѣ, или Изрядствѣ въ гл. XVIII. издан. въ Франкфуртѣ 1587 напечатанная находится, что онъ многихъ благородныхъ мужей именемъ называетъ, у которыхъ онъ ноздри подлинно вылѣчивалъ. И не только МОЛИНЕТТЪ на показ. м. но и ФІЕНЪ въ хирург. кн. XII. гл. 1 и ГИЛДАНЪ въ сошн. III прим. 31. стр. 214 и въ Епистолѣ къ ІОГ. ГРИФФОНІЮ въ Еписп. сошн. Еписп. XXII. его за такое лѣчение у дѣвочки благополучно окончанное похваляетъ, и свидѣтельствуеетъ, что онъ такихъ видѣлъ, которыми ноздри пришиты были и вылѣчены. Сличи шумъ Г. Ф. ДЕ ФРАНСКЕНАУ Диссерт. де Респишум. инъ интершумъ т. е. о вылѣчиваніи со всѣмъ, Сат. Мед. стр. 501. САЛТСМАННОВУ Дисс. де Хирургіи Курторумъ т. е. о Хирургіи короткихъ 1712 году, и И. К. А. Н. 1719 году стр. 36. ВАГЕНСЕЙЛЪ въ Экзерц. различныхъ аргум. стр. 61 написалъ, что ТАЛІАКОЦІЮ въ Оеишѣ Анатомическомъ боннскомъ статуя поставлена въ правой рукѣ носъ держащая.



РАНЫ НА ЩЕКАХЪ.

ВУЛНЕРА МАЛАРУМЪ.

§. 594.

Раны на щекахъ, ежели глубоки будутъ; должно сшивать. Иногда случается, что желѣзы околоушной каналъ, отъ Спенсона имя себѣ имѣющій, перерубленъ бываетъ. Понеже онъ изъ помянутой желѣзы вышелъ идетъ надъ мышкою жевательною, проходящъ наскрозъ мышку прубаческую, и подлѣ выпорога или трепьяго челюстного зуба верхней челюсти въ ротъ впадаетъ. Когда сей слинный протокъ бываетъ перерубленъ, тогда мокроты много спонкой, жидкой изъ раны печетъ, и оной заживать не дастъ, отъ чего напоследокъ рана язвиною дѣлается. Слина въ то время больше печетъ, когда человекъ говоритъ, или кушанье жуеетъ, и челюсть движетъ.

(*) Смотри СТАЛІЕВУ Оеор. Медическую стр. 720.

§. 595.

Сие ежели случится , или изъ раны , или изъ чирья , то слинѣ новую дорогу въ ротъ отворить должно. Того ради прубочку , или другой инструменѣ острый конецъ имѣющій , въ самую рану такъ вставишь надлежитъ , чѣмъ и скрозь перспонку , которою ротъ изъ нутри кончился , прошелъ. А чѣмъ ничего внутри не было повреждено , надобно тому , кто лѣчитъ хочетъ , перстъ въ ротъ всунуть , и поставитъ прошивъ конца. Въ рану такимъ образомъ зѣланную , спичкою или иглою прямою ушками обороченою , продѣвъ нитку шелковую нѣсколько толстую и ссученую , и въ ранѣ ее оставитъ. Понеже надобно , чѣмъ внутренней раны край окрѣпли , то ротъ почаще спиртомъ горючимъ полоскать должно. А что довольно окрѣпло , оное попому уразумѣть можно , ежели въ ранѣ никакого чувства не будетъ. И дабы слина въ ротъ текла , нитку вонъ выдернуть должно , и лапиде infernali только наружнаго чирья жесткость выправливать , а внутренняго не прогать. Когдажъ такимъ порядкомъ наружный чирей на щекѣ чистъ зѣлается , тогда должно оный приписывать , и прикладывать вещи живучія , отъ чего слина въ ротъ потечетъ. Ежели рана тотчасъ внутрь пройдетъ , или она еще и пришибена будетъ , то нитку развѣ при концѣ лѣченія продѣвать должно. А когда надобно будетъ струпъ наводить , то не надобно больному , ни говорить , ни кушанья жевать , ни щокъ надувать.

(*) Смотр. у ХЕСЕЛДЕНА въ анатоміи кн. III. гл. III. стр. 133 у АЛЕКСАНДРА МОНРО , въ те Медикал. Ессаисс. Вол. II. прим. XIII. стр. 249. Мы примѣръ есть знакомъ , гдѣ рана свѣжая жожечкомъ тоненькимъ разбѣзана , и изъ которой множество слины вышло

выткнуло, прикладываніемъ однихъ суконокъ и нѣсколько тугимъ обвязываніемъ въ короткомъ времени была залѣчена. Я думаю, что протокъ слинный, хоть бы очень онъ маленькой былъ, не былъ перерѣзанъ, но надѣзанъ.

УШНЫЯ РАНЫ

авріумъ вулнера

§. 596.

Ухо временемъ бываетъ ранено, котораго большая часть хрящевая. Если рана будетъ свѣжая, можетъ оно приложено быть, и въ скоромъ времени залѣчено. Если надобно будетъ пришить: оною шпиквою одну кожу, а не хрящъ должно захватывать. Если рана уже будетъ испорчена, то не опіѣнно надобно опіѣ хрящика нѣсколько, какъ бы опіѣ кости, опіѣлившись, для того надобно къ ранѣ прикладывать эсенціамъ маспахисъ, сукцини, элемеи. Если все ухо опіѣчено будетъ, то человекъ съ большею трудностью слышать можетъ. Облегченіе въ слышаніи дѣлаетъ цурупъ пустой изъ мепалла зѣбланный, которымъ воздушныя трясенія собираются и умножаются, и до внутреннихъ частей относятся.

ГУБНЫЯ РАНЫ.

лаброрумъ вульнера.

§. 597.

Губы, если разсѣчены будутъ, съ трудомъ залѣчиваются, понеже онѣ, когда кушанье въ ротъ принимается, и рѣчь продолжается, много движенія имѣ-

имѣющъ. Отвѣдовать въ такомъ случаѣ должно пластырь клейкой , и хранить покой и воздержность. Ежели же разрѣзъ великъ будетъ , или нѣчто опру-блено будетъ , то за оный родъ сшиванія ухватиться , которое при короткихъ губахъ , и при называемой губѣ заячей , употребляется.



ГУБА ЗАЯЧЬЯ. лабрумъ лепоринумъ.

§. 598.

Не рѣдко младенцы рождаются , у которыхъ на срединѣ губы нѣкопорою частицы не доспаетъ. Сей порокъ ежели въ маткѣ здѣлается , почти всегда на верхней губѣ бываетъ. Съ губою также временъ челюсть и самое поднебенье расколото бываетъ и разрублено , отъ копорого случая великое безобразіе дѣлается.

§. 599.

Лѣченіе , которое при семъ случаѣ употребить должно , препятствуетъ младенцамъ питью сосать , для того къ оному лѣченію сей возрастъ неспособенъ. По меньшей мѣрѣ опложивъ должно до того времени , когда дѣти опъ молока опнышы бываютъ. Крикъ также вредить много можетъ.

§. 600.

Способъ лѣченія таковъ есть : Края на губѣ ращепленные съ обѣихъ сторонъ поразрѣзать. Понеже оные края одинъ съ другимъ сложенные срослись не могутъ , ежели не будутъ свѣжею раною здѣланы.
Но

Но съ великимъ прилѣжаніемъ оспергаться , чтобъ излишне много кожи не разрѣзать. Также ножницами , никакого конца на ножъ похожаго неимѣющими , прорѣзывается оная перепонка , которою губная самая верхняя часть съ десною соединяется. Ежели также въ верхней части нѣсколько отъ края оставшагося будетъ , оное или ножницами надрѣзать , или ножечкомъ разрѣзать должно. Сіе все здѣлавши , кожу съ обѣихъ сторонъ перспами придавливаютъ , и вмѣсто сводятъ. Смотрѣть же надлежитъ , чтобъ края шероховатые прямо одинъ съ другимъ сошлись , чтобъ безобразный сгруппъ не здѣлался. И такъ скрозь оные края посредствомъ нѣкотораго инструмента къ тому здѣланнаго (380) продѣваются иглы острия , у ребятъ по двѣ , а у взрослыхъ иногда три , которыя въ губѣ и оставляются.

§. 601.

Иголѣ же многіе роды имѣются. Желѣзные весьма изрядно скрозь проходятъ. Но когда въ ранѣ оставляются , то ржавчина ранѣ вредна быть можетъ. Для того предпочесть должно иглы изъ золота здѣланныя , молоткомъ хорошенъко крѣпко укованныя. Когда иглы продѣваются , надобно между губою и десною бляшку свинцовую положить. Первая игла скрозь верхнюю губы часть просавывается , а другая скрозь нижнюю. Но иглы продѣвать такъ должно , чтобъ края межъ собою ровны были. А кожа натягиваемая лучше вмѣсто сводится , когда щѣки руками прислужниковыми прижиманы бывають. Когда иглы такимъ образомъ продѣваны въ губѣ останутся , тогда ихъ обматываютъ ниткою , чѣмъ тѣмъ края вмѣстѣ крѣпче могли держаться , и чтобъ опять не

К к

разо-

разошлись. Ежели иглы длинныя надлежащаго будутъ , и опасность будутъ , чѣмъ онѣ кожу не бередили , то оныя клещами перерѣзываютъ , и подѣ концы ихъ пластырь или пряжу подстилаютъ. А лѣкарства прикладываютъ не инныя какія , только пѣ самыя , копорыя сшитой ранѣ полезныи выше я представлялъ (382).

§. 602.

Но сіе лѣченіе также нѣкоторыхъ осторожностей требуетъ. Гдѣ изъ поразрѣзанныхъ краевъ кровь течетъ , оной никакимъ лѣкарствомъ останавливать не должно ; Ибо она самовольно остановится , когда край вмѣсто сведенъ и сшитъ будетъ. Оспергающаго же должно , чѣмъ она будучи болынымъ проглочена , рвоты не произвела , или духу не захватила , для того голову высоко держать надобно , такимъ способомъ кровь изъ рта выходить можетъ ; и сіе особливо примѣчается , когда младенцевъ лѣчатъ.

§. 603.

Иногда которойнибудь изъ переднихъ зубовъ гораздо торчитъ , который препящивать можетъ , чѣмъ край выздоравливали и залѣчивались ; для того не начиная еще лѣчить , оный зубъ вырвать должно. И чѣмъ губа съ десною послѣ лѣченія не были вмѣстѣ сросшися , внутрь межъ обѣими частями пряжу класъ надобно. А понеже она всякую мокроту въ себя вбираетъ , отъ чего рана испорщивъ ся можетъ , то не отменно ее чаще перемѣнять надлежитъ. Оная пряжа младенцамъ весьма полезна , понеже горло заслоняетъ и дыханіе запираетъ можетъ ; а иногда могутъ младенцы ее и глотать.

Симъ

Симъ прилично пушокъ медомъ или инымъ лѣкарствомъ къ тому полезнымъ намоченный, частенько внутрь класть, и такъ не допускашь, чтобъ оныя части межъ собою сроспались.

§. 604.

Если же послѣ разрѣзанія краевъ, рана очень широко разинется, что оныхъ стянуть, какъ надлежитъ, невозможно, то другихъ способовъ опробовать надлежитъ. Къ пластырямъ клейкимъ, на щекахъ прикладываемымъ, пришиваются съ обѣихъ сторонъ лудочки или трубочки, сквозь которыя продвигается нитка, которою, если покрѣпче потянешь, край у раны такъ стягиваются, что одинъ съ другимъ сплываются: Сквозь тѣ пластыри также много нитокъ иглою продѣть, ихъ концы одинъ съ другимъ стянуть и завязать можно. Другіе съ обѣихъ сторонъ кожу фигурою или чертою лунастою и къ ранѣ обращенною разрѣзываютъ, и сего разрѣза край межъ собою гораздо нарочно разводять, чтобъ чрезъ то кожа, когда для заживленія первой раны краевъ будетъ притягиваться, подвигаться могла. На черту оную прикладываютъ пряжу или бляшку свинцовую, чтобъ мясоросло, и оную наполнило, чтобъ струпная ширина нѣсколько кожи могла здѣлать.

§. 605.

Нитка, которая около иглы обертывается, должна быть навощенная и крѣпкая. Надобно же, чтобъ въ каждой иглѣ особенная нитка была, которыми онѣ, послѣ, какъ край сростутся, безъ затрудненія могутъ вонъ выдернуться. Обязка предъ другими къ тому способна та, которая фигурою на пращу ходитъ. Когда оною обвязано будетъ, то прежде четвертаго дня ее развязывать не должно, и

сшивокъ не вынимать, доколѣ край не будетъ заживленъ. Сіе почти всегда въ пятый или шестой день обыкновенно случается, что иглы пошатываются начинаютъ. Когда онѣ выдергиваются иглы, перстами прижимать край должно, и крайнюю умбренность прикладывать, дабы то, что срослось, не разорвалось. И не надлежитъ въ одинъ день всѣ иглы вынимать, но сперва верхнюю или среднюю, а послѣ и нижнюю. Когда онѣ вынимаются, то шить свободно опадаетъ. А какъ иглы вынуты будутъ, то суконки продолговатыя поспешенно сложенные на верхъ положить можно, и на нихъ наложить обротъ на срединѣ въ длину разрѣзанную, которую обвязку соединяющею (унташемъ) я назвалъ (15, 376).



ЯЗЫШНЫЯ РАНЫ.

ЛИНГВЕ. ВУЛНЕРА.

§. 606.

За рѣдкость почестъ того не возможно, что языкъ бываетъ раненъ, а оное или стрѣлою и пулею свинцовою, или тогожъ самаго челоука зубами обыкновенно дѣлается. Сіе приключеніе съ болью еще и сію имѣетъ досадность, что говорить нельзя, и кушанье жевать и глотать на силу можно. Къ языку раненому недругія какія лѣкарства прикладывать должно, только такія, которыя безъ вреда проглатывать можно. Эссенція сукцины на маленькой кушечкѣ сахару напанная на языкъ прикладывается. Ежели же въ роту будетъ горѣть и болѣть крайне, то больше полезно мигдальное масло сладкое съ сахаромъ

харомѣ смѣшивать, и къ нему эссенцію вышеобъявленную прибавлять. Также полезенъ есть мель росапумѣ, а особливо къ ранѣ пришибеной, къ которому такимъ же образомъ съ пользою примѣшивается эссенція балсамическая. Ромѣ почаще полоскать можно декокпомъ такимъ, который и по состоянію раны и времени вожженіе причиняющему приличный быть долженъ. Слина, которою раны очищаются, немало къ лѣченію пособствуетъ. Если языкъ въ вожженіе будеть приходить, то сего глубже разрѣзать надлежитъ да и по знанію мы должны, что ни одна въ цѣломъ тѣлѣ часть, больше къ раку несклонна, какъ языкъ и обѣ губы.

РАЗРѢШЕНІЕ ЯЗЫКА.

РЕЗОЛЮЦІО ЛИНГВЕ.

§. 607.


Дѣйства хирургическаго нѣкоторый есть родъ, который у дѣтей такихъ дѣлается, у которыхъ отъ перваго дня ихъ рожденія языкъ съ нижнею частью подъ нимъ сросшійся бываетъ, которые для того не безъ досады питію сосушъ, да когда и выроснутъ, словъ хорошо выговаривать не могутъ. У таковыхъ перепонку, на которой языкъ держится, ножечкомъ перерѣзывать надлежитъ. А чѣмъ сіе безбѣдно быть могло, и чѣмъ болышнія жилы кровѣвозвращательныя, подъ языкомъ лежащія, не были ранены, подъ языкъ подкладывается желѣзной инструментъ на концѣ выпиленной (фиг. XIV). Сего выпиленную частицею подхватывается оная перепоночка, уздочкою называ-

К. к. 3;

смая

емая, которую ножницами разрѣзываютъ. Есть другой желѣзной инструментъ (фиг. XV.), къ которому маленькой ножечекъ придѣланъ такой, что съ боку движется. Симъ, когда въ ротъ кладется, и языкъ приподнимается, и жилы кровесвозвращательныя охраняются, и приписнувши съ боку перепонка она безъ всякаго бѣдства перерѣзывается.

(*) Сіе дѣйствіе Цицерону знакомо было. Смотри въ Кн: II о божествахъ. Гл XL VI. Т. IV. стр. 1120.



КАМУШКИ ПОДЪ ЯЗЫКОМЪ. КАЛКУЛИ СУБЪ ЛИНГВА.

§. 608.

Камушки подъ языкомъ въ пропояхъ слину носящихъ иногда вырастаютъ, которые, когда велики случаются, превеликую боль причиняютъ. Оныя надлежитъ, прорѣзавши перепонки, выбрать и рану залѣчить. Поневже и сея раны лѣченіе между первыми положено.



ЗАШЪЙНЫЯ РАНЫ. ЦЕРВИЦИСЪ ВУЛНЕРА.

§. 609.

Случиться можетъ, что мышки на зашѣйкѣ лежащія, и которыхъ дѣйствіемъ голова въ верхъ поднята держится, палашомъ глубоко перерублены бываютъ. Сіе ежели будетъ здѣлано, то голова на переднюю сторону упадетъ, и приподниматься не можетъ

можетъ. Да того и сшивкою удержать не можно, но надобна тупъ обвязка, которую раздѣляющую [дивидентемъ] называютъ.

(*) Смотри. въ ГЕЙСТЕРОВОЙ Хирург. Ч. III Гл. III стр. 1197 Таб. XXXVII. БАССИЙ Таб. IX. фиг. 1. А а. Однакожъ гораздо лучше голову держитъ сѣ обвязка, ежели къ ней придастся другой ручникъ длиною банъ двухъ аршинъ. Сперва впопъ на голову такъ накладывается, чтобъ концы сѣ обихъ сторонъ со лба и сѣ зашѣйка висѣли. Сверхъ этой серединою на лобъ накладывается иная длиннѣйшая обвязка, сѣ двухъ концовъ свернутая, или въ двѣ големы скатаная. Свертки на обѣ стороны поведенныя, на зашѣйкѣ одинъ сѣ другимъ наперекосъ переплетаются, оный висѣй ручникъ захватываютъ, и такъ одерживаютъ. Обвязкины свертки такимъ образомъ продолжаются, правой лѣвою, лѣвой правою рукою подкрыльца поведатся, изъ подъ которыхъ опять по груди къ зашѣйку проходятъ. А доколь шуда еще не придутъ, захватить и тошъ конецъ ручника, который со лбу висѣлъ, и обвязкою тою же, что два свитка: имѣетъ и одинъ сѣ другимъ переплетаются, прикрѣпится. Обвязкины свертки или головы: къ человѣческой головѣ возвращаются, и сколо сѣ обвиваются, отъ которой по зашѣйку до крылецъ въ низъ опускаются, и при концѣ въ различныя стороны раздѣлившись, грудь обнимаютъ, и кончатся. На зашѣйкѣ одну оборотъ къ обвязкѣ крестъ на крестъ проходящей пришить, и или иглою проколотъ можно.



РАНЫ ШѢЙНЫЯ

ВУЛНЕРА КОЛЛИ.

§. 610.

На шѣбъ также много совершенно бѣдственныхъ ранъ случается: ибо ни въ которой шѣлесной части столько, и такъ различныхъ частей: къ употребленію жизненному нужныхъ нѣтъ, какъ въ шѣбъ (*). Кромѣ бо извѣстныхъ шѣлесныхъ покрововъ и многихъ мускуловъ, еще есть многія жѣлѣзы, оная наибольшая шишоподобная [широидса], и кромѣ этой, иныя ярем-

временныя и зашбйныя, горло дыхательное съ гортанью желудокъ съ жерломъ т. е. съ устьемъ горла пище-пріемнаго жилы быющіяся сонныя, которыя подъ челюстями на внутреннія и внѣшнія раздѣляются, жилы крововозвращательныя, въ верху также на внутреннія и наружныя раздѣленныя, жилы быющіяся и жилы крововозвращательныя позвоношныя съ обѣихъ сторонъ скрозь позвоношныя отростки, въ шбѣ тоненькими впадинами проспранными идущъ, жилы чувствительныя осмой пары отъ сея возвращающіяся (**), жилы чувствительныя межреберныя (***), зашбйныя, и изъ нихъ преградогрудобрюшныя и инныя, кость ижицъ подобная, позвонки и скрозь оныхъ по срединѣ проходящая спановая жила.

(*) Смотр. КОНР. ГРАФІА Диссерт. о случаѣ самоубійства, въ Писѣ 1712. Въ сей исторіи о ранѣ написано, что самъ себя *autóχeis* причинилъ, въ которомъ случаѣ шбу отъ уха лѣваго до праваго разрѣзалъ, и перерѣзана была гортань, желудокъ не со всѣмъ перерѣзанъ, а однако надрѣзанъ; сонная внѣшняя, двѣ временныя, наружныя также ранены; а однако человекъ до двенадцати дней жилъ. Почти сему подобный случай объявляеши ЛА МОТІЙ Хирург. Т. II. Прим. 212 стр. 519.

(**) Смотр. о жилѣ чувствительной назадъ идущей [де нерво рекурренте] пересѣченной у ГАЛЕНА о мѣстахъ раненыхъ Кн. 1. Гл. VI Т. VII стр. 396. и у ЛА МОТТА въ томже мѣстѣ человекъ хоть ртомъ говорить можетъ, однако потаеннымъ и тихимъ голосомъ. Опыты надъ звѣрями дѣланныя смотр. въ ГАЛЕНѢ о Предзаніи къ Постгуму гл. V. Т. VIII. стр. 837. Снеси тутже те Медикаль Ессансѣ Вол. II. примѣч. VIII стр. 114.

(***) Смотр. опыты, которыми жилы чувствительныя пары скипающей и межреберныя перерѣзаны были въ Ком. К. А. Наукъ 1726 году стр. 96.

§. 611.

Сии раны глазами видѣть можемъ. А самыя мѣста, которымъ чрезъ Анатомію научиваемся, показаніемъ бываюшъ частей перерубленыхъ. Знать также можемъ

можемъ изъ оныхъ особенностей, которыя въ другомъ мѣстѣ я предложилъ (362, до 368, 370), изъ которыхъ или надежда или отчаяніе можетъ родиться, которыя скорѣе, которыя труднѣе лѣчить можно, и которыхъ никакъ лѣчить не возможно.

§. 612.

Человѣка, у котораго жила бьющаяся сонная, или, гдѣ она раздѣлилась, внутренній сучокъ ея, перерубленъ, сохранить живаго не возможно. Внѣшнюю, а припомъ и жилу кровевозращательную яремную наружную завязать и приписнуть можно (405, до 409). Также я думаю, никакой надежды къ лѣченію нѣтъ, ежели жила кровевозращательная яремная внутренняя сильно ранена будетъ. А будетъ ли человѣкъ послѣ завязанія сѣя жилы кровевозращательной жить, я въ томъ сомнѣтеленъ. Маленькую на ней рану перстомъ приписнуть можно, доколѣ спаяется. У которыхъ передъ раздѣленіемъ или сонная или яремная будетъ перерѣзана, шѣхъ по большей части смерть весьма скоро, и покуда еще лѣкаря не призовушъ, поспигаетъ.

§. 613.

У которыхъ горло дыхательное все перерѣзано будетъ, онымъ никакимъ образомъ пособить не возможно. Ежели же оное проколотое не очень великую рану будетъ имѣть, ту залѣчить можно. Великое прилѣжаніе прикладывать должно, чтобъ изъ раны кровь или лѣкарство или иное нѣчто въ горло дыхательное не попало. Ибо, ежели сіе случится, кашель пресильный человѣка будетъ мучить, и задавитъ. Край у раны вмѣсто свести должно, и приложить лѣкарства живучія со всѣмъ заживить. А гдѣ

А л

рана

рана не только разрѣзана, но еще пришибена будетъ, туиъ надобны лѣкарства въ гной приводящія, которыми способными къ частямъ жильночувствительнымъ я призналъ. А прежде всего голову наклонить должно, и къ груди привесить, и пакъ наклоня на постелъ пакъ долго имѣть, доколѣ рана не заживетъ.



ГОРЛА ДЫХАТЕЛЬНОГО ПРОРѢЗАНІЕ

бронхотоміа.

§. 614.

А временемъ, ежели за тѣсною тѣхъ путей, которыми дышемъ, дыханіе запирается, и человекъ задавливается, горло дыхательное прокалывать надобно бываеиъ. Сіе особливо случается во время жабы, и ежели въ глоткѣ или щелкѣ, въ гортани имѣющейся, нѣчто въ горло дыхательное попадеиъ шакое, котораго кашляючи выкашлять не можно.

§. 615.

Человѣка посадить надобно на низенькомъ стулѣ; а сзади служилель голову его гораздо заклоня и не подвижно держать долженъ. Подъ гортанью и подъ хрящикомъ ея коцеобразнымъ разрѣзываютъ кожу съ нѣкоторою часпочною желѣзы щипообразной, и открываютъ горло дыхательное. Кровь изъ здѣланной раны текущую, губкою въ спиртъ чистой обмоча вытираютъ, и удерживаютъ. Когдажъ желѣза щипообразная будетъ рѣзана, не должно поранить жилы кровесвозвращательной оной, кошорая спереди по
горлу

горлу дыхательному идетъ , чтобъ изъ нее кровь не пошла. Да не надобно ранить жилъ чувствительныхъ назадъ возвращающихся , которыя съ боку въ верхъ къ мышкамъ горшаннымъ идутъ (бго **). Прорѣзываютъ же самую серѣдочку плесы межъ шрепымъ и четвертымъ колечкомъ хрящевымъ. А припомъ хрящевыя колечки не гораздо опасаяся рѣзашъ можно , однакожъ лучше оставить ихъ цѣлыми. Прикладывать должно такое стараніе , чтобъ кончикомъ ножечковымъ или спичкою или инымъ чѣмъ перепонки оной не разбередишь , которою горло дыхательное изнутри оканчивается , и чтобъ въ него оною раною здѣланною кровь не текла , понеже сіе приключеніе пресильный кашель произвести можетъ.

§. 616.

И такъ въ рану здѣланную легонько опустишь спичку , и сверхъ ее вставишь серебряную дудочку , или прямую или кривую съ загнутыми на вѣшнюю сторону краями , или обвертѣшь ее должно чѣмънибудь такимъ , которое бы не попустило ей со всѣмъ внутрь упасть. Одержка съ обѣихъ боковъ прокола быть должна , за которыя дирочки трубочка къ шѣѣ свободно привязана быть можетъ. Другіе скрозъ кожу , желѣзу и горло дыхательное потчасъ инструментомъ съ трубочкою продѣваютъ , который инструментъ во всемъ походитъ на топъ , которымъ у больныхъ водяною болѣзнію страдающихъ вода выпускается (проескартъ). Сіе лѣченіе поспѣшно , однакожъ не безопасно. Въ трубочку потчасъ кладутъ губку въ тепломъ винѣ обмоча , и выжавъ , чтобъ очень холодный воздухъ , который легкимъ не привыченъ , въ легкія не попалъ , и ихъ не повредилъ :

А л 2

Для

Для такой причины оному человеку, котораго budú лѣчить, въ теплой горницѣ быть должно.

§. 617.

Трубочка въ ранѣ оставляется, и къ шѣѣ прикрѣпляется. Между краями трубочкиными и кожей кладутъ пряжу, а на трубочку пластырь и суконку на самой срединѣ прорѣзанныя. На дырочку кладутъ самую тоненькую и рѣденькую тряпочку. А какъ скоро зѣваніе [фауцесъ] въ первое состояніе придетъ, то рану залѣчить должно. (*) (613).

(*) Сіе дѣйствіе еще АСКЛИПАДЪ изобрѣлъ, по свидѣтельству Галенову въ Медикѣ Гл. XIII. Т. II. стр. 329, и ЦЕЛІА АВРЕЛІАНА Кн. III. Острыхъ. Гл. IV. стр. 195. А понеже сіе дѣйствіе не всегда благополучно оканчивалось, того ради АРЕТЕЙ Остр. въ Кн. I. Гл. VII. стр. 111 и ЦЕЛІЙ также, оное будто бы не полезное и вредное или погубительное, вовсе отбросили. АВИНЗОАРЪ въ Кн. I. Оезирѣ тракт. X. Гл. XIV. опытъ надъ козою зѣлалъ. Примѣры, гдѣ люди онымъ отъ смерти были избавлены, читай въ РЕНАТИМОРЕАВ. Экзерц. де Ларинготоміа. с. Оом. БАРТОЛИНА Тр. о жѣбѣ удѣшей изданномъ стр. 132. (также въ Епистолѣ Мед. БАРТОЛИНОВЫХЪ Сочин. I. Епист. 81 стр. 336 представлено), онъ дважды выдѣлъ съ благополучнымъ успѣхомъ зѣланное, сперва у садовника, а послѣ того у салдата, у котораго послѣ лѣченія нѣсколько голоса хриповать остался. Примѣрыжъ новѣйшіе видѣть можно въ ГАРЕНЖОТОВЫХЪ дѣсѣ Операціонсѣ Т. II. стр. 455, въ Трансакц. Аглин. No 416 стр. 448 въ Компендіи ЮГ. МАРТИНСА Вол. VII. стр. 496.

§. 618.

Можетъ ли сіе дѣйствіе утопшихъ въ водѣ, ежели вскорѣ надъ ними учинено будетъ, оживотворятъ, то употребленіе и примѣчаніе опытовъ покажетъ (*).

(*) Сіе дѣло особеннымъ благоразсмотрѣніемъ и разсужденіемъ изслѣдовалъ ГЕОРГІЙ ДЕЭАРДИНГЪ въ Епистолѣ къ ШРЕККИЮ о способѣ, какъ помогать утопшимъ чрезъ Ларинготомію въ ростокѣ 1714 году. Но что сіе лѣченіе не всѣмъ утопшимъ пособствовать можетъ, показалъ мужъ весьма ученый Ю. ГЕНР. КЕССЕРЛИНГЪ въ Диссерт. о смерти утопшихъ въ водѣ, при Президентѣ. ХР. ЛУДОВ. ХАРИЗИИ въ Регіомонтѣ 1735 года предложенной.

РАНЫ

РАНЫ ЖЕЛУДОШНЫЯ.

ВУЛНЕРА СТОМАХИ.

§. 619.

Лѣченія какъ горла дыхательнаго, такъ желудка, общія суть. Въ рану горла дыхательнаго воздухъ вонъ выходитъ, а въ рану желудочную кушанье и питье. Неизлѣчимая та рана, когда весь желудокъ разрѣзанъ бываетъ. Больному облегченіе можетъ дѣлаться, ежели чрезъ воронку похлѣбки въ раненый желудокъ будутъ вливаны. А гдѣ на желудкѣ рана будетъ, да и та разинувшись, то надобно голову нагнуть и обвязкою къ груди прижать (бю) чрезъ что край у раны заволокутся. Когдажъ рана не будетъ заживать, развѣ чиста здѣлавшись, при такой ранѣ голодъ и жажда требуются. А гдѣ нѣчто человекъ скушаетъ, то рану поотпустишь и губкою въ винѣ тепломъ обмоча и выжавъ обтереть должно. Также чѣловѣкъ, который ничего не ѣстъ, съ голоду не умеръ, онаго кормить можно похлѣбками, чрезъ клистеры впускаемыми. А доколь оныя еще впущены не будутъ, внутренности другими омовеніями на низъ производящими, очистить надобно (*).

(*) Весьма достопамятный есть опытъ, отъ РАМАЗЗИНА здѣланный, который въ Операкѣ его стр. 173. видимъ, о двѣхъ монахинѣ, которая чрезъ сорокъ шесть дней, понеже ничего глотать не могла, одними похлѣбками чрезъ задній проходъ въ брюхо вливаемыми сохранена была. Снеси путь ГИЛДАНА Сопн. IV. Примѣч. 30. стр. 311. О употребленіи Клизмъ питательныхъ споръ былъ въ прежнія времена у ЛИТТРА съ ЛЕМЕРИ, смотр. въ Истор. К. А. Наукъ 1717 году стр. 25.

РАНЫ ГРУДНЫЯ.

ВУЛНЕРА ПЕКТОРИСЪ.

§. 620.

Теперь слѣдуетъ мнѣ говорить о ранахъ тѣхъ, которыя въ груди бывають. Сїи обыкновенно случаются или отъ острой стрѣлы, или отъ пушечной и тяжелой и отъ пули свинцовой. Случиться же можетъ, что рана до внутренностей не дойдетъ, но въ мясѣ остановится, которое самое должно знать, ежели рану будемъ ощупывать, примѣчая все то, что я выше сего приказалъ (358, до 361). Для испытанія той раны потребна спичка гладкая, тупая и полная, какова есть трубочка серебряная, которою мочу, ежели по натуральному нейдетъ, у женъ выпускають лѣкари.

§. 621.

бывають же нѣкоторые случаи, которые того, кто лѣчить будетъ, обмануть могутъ. Понеже когда рана узка, но глубока и крива, а тѣло полное будетъ и жирное, случиться можеть, что хопя ни спички впустишь, ни насосомъ слабительнаго, въ оную рану впустишь не возможно будетъ; и хопя ни духъ, ни много крови изъ раны выходить не будетъ, однако оная рана глубоко пройдетъ, и внутри сокровенныя внутренности жилы быющіяся и жилы кровеовращательныя разбишы будутъ. Ибо перстну и спичкѣ сопротивляясь можеть жиръ или мышка, а особливо, когда тѣло въ то время, какъ спичка впускается, не такъ, какъ бы надлежало, наклонено бываетъ. Иногда также шпагою тонкою острою пересѣченъ бываетъ одинъ хрящикъ изъ
тѣхъ,

пѣхъ , которыми ребры кончашся. Сія рана не бываетъ разинута , или спички не вмѣщашъ , ни кровь изъ нее , ни духъ неидетъ , а однакожъ внутри части внутренностиныя и великія жилы бьющіяся и жилы крововозвращательныя повреждены быть могутъ (*). Того ради оная рана въ самомъ мясѣ и небѣдственна бываетъ , въ которую спичка проходить не можетъ , изъ которой ни духъ ни кровь не выходитъ , и съ которою больной свободно дышетъ (**). Ежели впрощемъ никакой (эмпизмы) не будетъ , и въ раненомъ человѣкѣ ничего того , чего бояться можно , видно не будетъ.

(*) Смотр. Примѣръ въ ФАВДАК. стр. 429.

(**) Есть также нѣкоторое въ дыханіи затрудненіе , ежели мышки наружныя и тѣ , которыя дыханію ничего не пособствуютъ , ранены и вожжены будутъ , напримѣръ грудная большая. Но се , которое отъ боли дѣлается , легко распознать можно отъ того , которое отъ вытекшей крови въ грудь происходитъ. Однакожъ случится можетъ , что въ первые дни больной легко дышать будетъ , а на послѣдокъ , отъ трудности дыханія задохнется , ежели маленькая жила бьющаяся , или жила крововозвращательная , или протокъ грудной , будутъ пересѣчены , и изъ нихъ влажность поменьку будетъ течь.

(***) Емфизема п. е. раздутіе , обыкновенно чаще случается послѣ ранъ грудныхъ , которыя внутрь проходятъ , а наибольше , ежели оныя кривы будутъ и въ которыя воздухъ свободно проходить не можетъ. А однако же , какъ въ груди , такъ и на головѣ , то здѣлаться можетъ , что ежели воздухъ , а особливо холодной , въ ячейки тучныя снаружи прокрадется , и оныя растянетъ. Того ради и Емфизема подлиннымъ доказательствомъ быть можетъ , что рана внутрь прошла.

§. 622.

Рану въ мясѣ бывающую , не инако лѣчить должно , только такъ , какъ я выше сего предложилъ. Ежели рана будетъ глубокая и съ излучинами , то надлежитъ оную поспѣе съ изнова ширѣ разрѣзать

зашь (373, 476, 477), дабы чрезъ по кровь заекающуюся, и другое, ежели что въ ней будетъ, можно вонъ вынуть, и до самого дна раны дойти. Если она будетъ поперегъ подъ кожею, то и кожу по спичкѣ разрѣзать (478), или ежели рана весьма длинна будетъ, что лѣкарю не возможно ножикомъ оной со всѣмъ рѣзать, то спичку въ нѣе опустить, и кожу надъ концомъ сея спички въ другой сторонѣ разрѣзать (478).

§. 623.

Иногда хотя рана и въ одномъ мясѣ бываетъ, однако и въ мясѣ да глубоко, и до самой перепонки подреберной пройдетъ, шить надобно бояться, чтобъ плева подреберная не загорѣлась, и чтобъ гной не прорвалъ, и въ грудь не пропѣлъ. Временемъ гной также расплывается, и оболочку плечную подъ мышками, а наипаче подъ грудною и ширшею хребтною находящуюся, сѣбѣдаетъ, который случай великимъ суппураціямъ причину подати можетъ. Такъ и для такой причины рану ширѣ разрѣзать надлежитъ. А больному лечь должно на самую рану оборотясь, дабы чрезъ по весь гной могъ выпустить. Въ такую рану и кнопа класъ не должно, понеже и оный гною въ выпеканіи одержку здѣлать можетъ. Прикладывается сверху пряжа, или лѣкарскимъ полезнымъ помоченная. Обвязываютъ обвязкою, которую мантіею съ подвѣскою (мантيله кумъ суспенсоріо) называютъ. Да и обвязка туго завязана быть не должна.

§. 624.

Рану великую, разрубленную и гораздо разинувшуюся сшить можно. Однакожъ шить сшивку ранъ не

не годится , понеже грудь ради необходимости въ дышаніи въ покоѣ быть не можетъ. А хопя сное сшиваніе и употребить , то должно сшивать не весьма рѣдко.

§. 625.

Весьма худое лѣченіе оныхъ ранъ бываетъ , при которыхъ позвонки и ребра переломаны , и на хрестѣ , близъ позвонковъ , жилы сухія , протяженія мышечныя , и другія жильночувствительныя части , передавлены будутъ , у таковыхъ кровь пускать должно , и сверхъ воздержности все то употребить , что ошъ воженія наибольше пособствовать можетъ.

§. 626.

Ребро , что переломлено , узнать можно изъ боли покалывающей , которая въ то время , какъ духъ въ себя тянетъ , почаще дѣлается , и когда мѣсто ошъ припрогиванія побаливаетъ , такому заключенію не упуская времени пособствовать надлежитъ , понеже послѣ того сильное воженіе въ плечъ подрежетъ , горячка и загниваніе , а часто и смерть слѣдуетъ. И такъ надобно прошивъ ребра кожу и мясо разрѣзать , чтобъ то переломленное на мѣсто свое можно было поспавить. А обломки острые , которые плеву подреберную или мясо ранятъ , вонъ вынуть , а ежели еще будутъ придерживаться , отрѣзать должно. Прочее , что до лѣченія сего принадлежитъ , нѣже сего , когда о костяхъ переломленныхъ говорено будетъ , пространнѣе прошлую. Ребра суть кости нецѣльныя , и которыя легко испорчены бываютъ. Къ лѣченію раны тѣхъ лѣкарства потребны , о которыхъ я въ другомъ мѣстѣ предложилъ (523 , 524) , и въ сихъ случаяхъ лучше пособствовать и воженія опасность

М м

отвра-

отвратить нѣчемъ , какъ только кровопусканіемъ и воздержаніемъ.

§. 627.

Рану же глубоко и въ самую грудь прошедшую по многимъ признакамъ узнать можно. Разсудить надобно стрѣлу , которою человекъ раненъ (360). Перстѣ , или спичку вложить (358 , 359 , 621) , чистительное насосомъ впускать можно. Ежели снаружи на ранѣ эмфизема эдѣлается , изъ того догадываться можно , что плева подреберная ранена (621). А всѣхъ подлиннѣйшая примѣта есть , ежели изъ раны духъ , и крови много , да еще и ной съ воздухомъ смѣшанной и пѣнистой пещь будетъ , или раненой человекъ такую плевать будетъ , что случается тогда , когда легкое ранено будетъ. А для чего иногда , ни воздухъ , ни кровь , хотя ее не мало внутри скопится , изъ раны неидущъ , уже я выше объявилъ (621).

§. 628.

Однакожъ межъ пѣмъ есть нѣкоторая разнь. Кровь ежели пещь алая и пѣнистая , она изъ легкаго идетъ , ежели алая съ воздухомъ несмѣшанная , то жила бьющаяся , на примѣръ межреберная повреждена. Ежели выходитъ кровь темная , то жила крововозвращательная проколота , ежели молочная жидкость съ кровью будетъ смѣшана , она будетъ значить , что протокъ грудной перерѣзанъ. Надлежитъ же при сихъ и ударѣ разсуждать , каковъ онъ былъ , и рану и внутреннихъ частей мѣста , которыя также предсавить могутъ , что внутри повреждено будетъ.

§. 629.

§. 629.

А великую жилу быющую и жилу кровесвозвращательную, или и самое сердце раненое познаваемъ потому, ежели кровь сильно изъ раны течетъ, а особливо, ежели рана въверху на груди будетъ, и ежели загнувши рану дышать трудно будетъ, ежели жилъ быющихся движенія ослабѣваютъ, неровны дѣлаются, и часно останавливаются. Ежели цвѣтъ весьма блѣдной, помы холодныя, руки и ноги холодны быть начинаютъ, и больной обомлѣваетъ, все сіе значитъ, что онъ близъ смерти находится. Ежели легкое будетъ ранено, и кровь ртомъ сильно и безъ кашля идетъ, оное будетъ значить, что великая жила быющая и жила кровесвозвращательная въ легкомъ проколола. Ежели съ кашлемъ только нѣсколько крови проскакиваетъ, то можно думать, что жилы быющія и жилы кровесвозвращательныя маленькія ранены.

§. 630.

Но ежели кровь въ грудь спечетъ, оная во время движенія пѣлснаго такъ волнуется, что человекъ раненый стремленіе ся почувствуетъ. Сверхъ же сего еще нѣкоторыя примѣты дѣлаются, въ которыхъ общее есть, дышать трудно. Понеже когда кровь преграду грудобрюшную обремѣняетъ, человекъ головы вверхъ поднявъ держаъ безъ затрудненія не можетъ, и когда оную такъ онъ держитъ, то духъ легче внутрь втягиывается, нежели вонъ испускается. Больному жъ на томъ боку, въ которомъ кровь заперлась, лежать пріятнѣе. А когда очень много крови выпечетъ, и оная легкое такъ будетъ давить, что духу глотать не возможетъ, то чело-

вѣкъ нѣсколько посвободнѣе дышетъ вставши, нежели лежучи. Ибо такимъ образомъ кровь собравшаяся, хотя перегородку поперешнюю давишь, а не все легкое запираешь, а по дѣлается, когда человѣкъ, полную грудь имѣющій, навзничъ лежитъ. Ежелижъ онъ со всѣмъ на бокъ обернувшись ляжетъ, то духъ гораздо запирается, а однако далеко легче вонъ выпускается, нежели въ себя втягиивается. Ибо мокрота средогрудіе или средогрудную плеву давишь, и не отпускаешь, чтобъ преграда грудобрюшная довольно въ низъ опускалась.

§. 631.

Не рѣдкожъ легкое къ перепонкѣ подреберной приростаешь. Ежели въ томъ мѣстѣ рана случится, и самое легкое будетъ повреждено, кровь, которая въ грудь скапливаться не можетъ, изъ раны течетъ, и изъ рта проскакиваетъ, отъ того больной очень легко дышетъ.

§. 632.

А плеву средогрудную раненую знать можно по самому случившемуся удару, по сірѣлѣ, глубоко ли прошла, изъ человѣческаго положенія, и ежели на самой срединѣ груди боль сильная будетъ. Человѣкъ также, которому навзничъ лежать свободнѣе, съ трудностью въ себя дышитъ. Случится можетъ, что въ обѣихъ грудныхъ впадинахъ кровь скапливается.

§. 633.

Кромѣ примѣтовъ, легкое раненое показывающихъ (626, 627, 30), еще сіе отвѣдать можно. Омовеніе въ рану пускати должно, которое, ежели собственнымъ своимъ вкусомъ въ роту будетъ чувствоваться, оно будетъ значить легкое поврежденное. Еще отъ спа-

старинныхъ писателей преданіе имѣется , что человекъ , у котораго легкое сильно ранено будетъ , ежели на самую рану повернется , говоритъ , а ежели на другой бокъ перевернется , онѣмѣвается (*).

(*) Смотри ЦЕЛЕСА кн. V. гл. 26 § 2. ПАРЕА кн IX гл. XXX. стр. 308. Причина можетъ быть сія есть. Духъ легкимъ вдуваемый сквозь рану его , ежели она велика будетъ , вонъ выходитъ , и для того онаго столько , сколько къ произвожденію голоса неотменно надобно , въ гортань не приходитъ. А гдѣ рана ребрами придавлена , то духъ въ оную рану проходитъ не такъ легко можетъ. Сіе дѣло иначе толкуетъ ГЕНГА въ Комментар на ИППОКР. Афоризмы къ Хирургіи касающіеся. Секц. VI. Афор. XVIII. стр. 250. Онъ думаетъ придавливаніемъ плевы средогрудной рѣчь терлется , понеже туда Преграда грудобрюшная весьма притягивается.

§. 634.

Не толькоже сокровенныхъ но и будущихъ вещей нѣкоторыя примѣты имѣемъ , которыя больного или утѣшать , или устрашать могутъ. Всякой раны въ грудь проходящей завсегда бояться должно , однакожь той поменьше , которая шпагою проколола , нежели той , которая и пришибена будетъ , или отъ пули свинцовой. Рѣдко и иногда въ то время , когда легкія вздыхающія сжимаются , случится можетъ , что грудь проколютъ , и внутри ничего не повредятъ. Можетъ несчастіе и тому случиться , которъ ни великой ни глубокой раны въ легкомъ не имѣетъ , но только на верхней его части. Страшныя бѣдствія въ себѣ раны имѣютъ , которыя глубоко проходятъ , а особливо которыя пулею свинцевою пробиты будутъ. На такихъ раненыхъ , ежели ни отъ кровотеченія не умрутъ , ни вожженіемъ не задавятся , сухота нападетъ , съ оными чирьпки въ легкихъ иногда дѣлются. Къ лѣченію склоннѣйшія раны суть , которыя въ низу груди повыше преграды грудобрюшной причинены бываютъ , понеже подъ

оними ни жилы быющіяся , ни жилы кровезовращательныя великія не бывають , и понеже самая рана за помощь почитается , которою мокрота внутри скопившаяся , выпитъ можеть . Для того больше бояться надобно тѣхъ ранъ , которыя въ верху на груди случаются . Ежели стрѣла сквозь обѣ стороны грудныя пролѣтивъ , ежели сердце , великую горла дыхательнаго , жилы быющей , и жилы кровезовращательной опрасль пробьтъ , смерть предъ глазами обыкновенно бываетъ . Ежели у чловѣка , который чрезъ сильное кроветеченіе ослабѣвъ , и будетъ будто бы мертвый лежать (626) , чрезъ двацать чепыре часа теплопа , и въ жилахъ быющихъ сила появився , онъй можеть выздоровѣть .

§. 635.

Сии раны заживлены быть не могутъ , доколь вонъ не испражнится изъ груди , и воздухъ , и вся , копорая бы внутри ни собралась , мокрота . Ежели рана будетъ невелика , то воздухъ съ кровью вонъ можно рпсмъ чловѣку раны высасывающему , высосать . Ежели вся мокрота и весь воздухъ шакъ высосанъ будетъ , ежели послѣ разрѣзанной раны топчасъ завязано будетъ , а чловѣкъ будетъ и кровь пускать , и воздержно жить , то рана часито въ весьма немногіе дни выздоравливаетъ , что такія лѣченія нѣкоторымъ малоразумнымъ людямъ волшебническими покажутся , и будто бы опъ самой главнѣйшей и чародѣйной науки произшедшими . Должно же шому , кто такъ лѣчитъ , вѣдать , что въ груди ничего липняго оставлено не было . Ежели такого чловѣка не сыщется , копорой бы рану высосалъ , то

воз-

воздухъ и кровь вышянушь можно сифонами къ тому способными.

(*) Смощр. л' артв де сукде ле плае парв АНЕЛЬ.

§. 636.

Но сіе лѣченіе въ такихъ случаяхъ, гдѣ изъ великой жилы быющейся и жилы кровезовращательной внутри раненой кровь течетъ. Ибо никогда кровь изъ груди выпускашь не должно, покуда она внутри еще не остановится. А временемъ съ упѣсненнымъ легкимъ и весь духъ запирается, случай заставивъ ее вонъ итти, и по самос весьма свободно самую раню здѣлается. Надобно же, чѣтобъ больной лежалъ, и чѣтобъ весьма по маленьку дышалъ, понеже спрашно, чѣтобъ кровь больше не пошла, когда легкое и грудь будущъ распространяться.

§. 637.

А чѣто кровь внутри скиблается, потому догадываться можно, когда трудность въ дыханіи не умножася: которос дѣло изслѣдовавши кровь вонъ вызвать должно. Здѣлается сіе можетъ самую раню, ежели она на нижней грудной части будетъ. Ежели рана пѣсна, оную должно разрѣзать, чѣтобъ довольно распворилась, наблюдаячи то, чѣтобъ легкого не повредишь (*). Надобножъ, когда легкое ранено не будетъ, и когда изъ него никакого въ кровезеченіи опасенія нѣтъ, чѣтобъ больной духу, сколько возможно, легкимъ въ себя натягивалъ, а между пѣмъ наложя перстъ рану прикрыть. Когда такимъ образомъ опѣ духу легкія разширяются, перстъ опняшь, и больному приказать кашлять. Кашлемъ бо мокрота изъ раны изгоняется.

(*) Къ тому способъ ножичекъ оведный, съ пухомъ козломъ. Онмъ

Оный я приписать могу славному Аргенторашскому Лѣкарю выше по-
мянутому Де МЕРУ. Смолр. флг. XVI.

§. 638.

Ежели кровь въ груди скипѣваяся неподвижна
останется, надлежитъ въ рану полосканіе пустить,
чтобъ куски кровныя запекшіеся разбились. спосо-
бенъ къ тому декоктъ яшной, съ корнемъ алтее, съ
цвѣтками вербасци малве, свареный. Ежели же усмо-
трится, что кровь уже загнилась, прибавить можно
меду, или воды ранной, и маленько нашатыря. Мо-
кроша, ежели раною выпить вонъ не можетъ, когда
рана въ верхней грудной части будетъ, то новую рану
здѣлать надлежитъ; о которой хирургіи вскорѣ ска-
жу; а прежде, что къ лѣченію раны принадлежитъ,
продолжать буду.

§. 639.

Взявши мокроту всю вонъ, рану обвязать над-
лежитъ. Велѣтъ словѣчку, сколько возможно, чтобъ
духъ въ себя набиралъ, и оный задерживалъ. Въ ра-
ну, какъ долго покажется, се не заживлять, вклады-
вать тряпочку тоненькую чистенькую, и хорошею
ко обрѣзанную, у которой край въ нипочки расщипа-
ны (22). Сверхъ той накладывается пряжа мягкая
другою тряпочкою обверченая (*), и на верхъ сукон-
ки надѣвается манилинъ съ подѣскою. На са-
мый верхъ груди такой обвязки положить не возмо-
жно, къ оной части способна оброть, которую подъ
крыльцомъ правымъ обвернувъ по груди до праваго
плеча доводятъ, и оное со всѣмъ обхватываютъ,
послѣ того отъ крыльца праваго опять по груди на
крестъ къ лѣвому плечу проводятъ, которое также
обнимаютъ, и такъ нѣсколько разъ кругомъ обводятъ.
Ежели же и на спинѣ рана будетъ, обвязкою охватя
самое

самое плечо, по лопаткамъ провести должно, и такъ обѣ раны закрыть.

(*) Кнопки, ежели велики и жестки будутъ, оные рану испорчить и край мозолистые здѣлать могутъ, отъ чего фистулы рождаются, которыя съ трудностью заживаютъ. Крови вонъ выходитъ, другія внутри находящіяся препящиваютъ (20). Ежели легкое повреждено, оное само собою рѣдкое и губкъ гредкой подобное бередаѣтъ, и вожженіе производяѣтъ, или подлинно гораздо умножаютъ. Того ради надобно оные оставить, и ежели, надобно будетъ, лучше рану пространіе разрѣзать. Трубочки отъ иѣжкоржѣхъ употребляемыя, еще гораздо вредительнѣйшія. Что же бы въ рану ни было вкладывано, оное нишкою связывать должно, которой нитки концы въ раны оставяши наддежитъ, что бы оное въ грудь не ушло.

§. 640.

Какъ долго нѣсколько мокроты показываться изъ раны будетъ, раны заживлять не надлежитъ, но объявленную тряпочку (22) завсегда оставяти. Раненому человеку надлежитъ всегда на рану обернувшись лежать, чтобъ мокрота, которая еще внутри осталась, вонъ выходила. Когда же она вся вонъ испразднилась, то не мѣшавъ рану заживлять. Много пособствуетъ, ежели рана рѣдко развязывается, и всякой воздухъ чрезъ употребленіе великаго старанія отворачивается. Въ которое время надобно рану закрывать, совѣтовать больному, чтобъ онъ духу набирался, и въ себѣ держалъ, чрезъ что оный, который сквозь рану въ грудь прорвался, разгонится. Ежели двѣ раны будутъ, никогда обѣихъ ранъ разомъ не развязывать, но въ то время, когда одна перевязывается, другую хорошенько закрыть должно. Понеже бѣда можетъ здѣлаться, чтобъ легкое, воздухомъ сквозь обѣ раны утѣсненное, призмѣне не скорчилось, которое приключеніе погибельно быть можетъ. Воздухъ и холодъ также весьма вредны симъ ранамъ, для того поскорѣе и при огнѣ перевязывать наддежитъ.

Н и

житъ.

(*) Смотри. ГАРЕНЖОТЪ десѣ операціонѣ Т. II. стр. 430.

§. 644.

(*) Эмфизему, отъ которой почти все тѣло распухло. Смотри. въ Коппеншт. К. А. Наук. 1713 году стр. 5, и другую отъ перелому ребръ с. а. стр. 154. Привнеси сюда Ле ДРАНЪ Пр. Т. 1. Примѣч. XXXVII. стр. 232. ФАУДАККВ. стр. 449 и далѣ, предѣ прочими весьма ученаго мужа ЮГ. ГЕНР. ШУАЗА Дисс. о Эмфиземѣ, въ Галлѣ 1733 года.

§. 645:

Случится можетъ , что пуля свинцовая въ пѣ-
ло попадетъ , которая издадека пущеная въ грудь
Н н 2 прой.

пройти не можетъ, но между двумя ребрами увязнетъ, и тамъ будетъ сидѣть. Оную съ великимъ трудомъ вынимать надобно. Ибо: ежели въ грудь упадетъ, движеніе преграды грудобрюшной остановитъ, и скорую смерть принести можетъ (*). Того ради ежели она лежитъ глубоко, и вонъ взять ее безъ затрудненія неможно за тѣмъ, что колеблется, то подъ нее иглу кривую съ подвязочкою или тряпочкою въ ушки вдѣваю, просунуть должно, которою пуля охватывается, чтобъ назадъ взять и безопасно вытащить ее было можно.

(*) См. также подобный ему случай в ФАВДАКК. стр. 447.



Э М П І Э М А.

ЭМПИЭМА...

§. 646.

Осталось еще, о хирургіи той мнѣ поговорить, въ которой грудь раною прободается, чшобъ мокрота въ нутри скопившаяся, вонъ вышиться могла. Она же не только нужна, гдѣ рана въ верхнемъ мѣстѣ на груди будетъ (бзо), но также, когда отъ раны и отъ вожженія, емпища, по есть въ гной пришестье или загнаиваніе здѣлавшееся, а вомика прорвется. Понеже сея вомики гной скоровоспигнымъ множествомъ преграду среднюю отягощаетъ, и духъ запираетъ. Рѣдко сей лѣченія способъ шѣмъ пособствуетъ, у которыхъ водяная болѣзнь, или другой родъ такой болѣзни будетъ, которыми въ грудь множество воды собирается. И при ранѣ оное дѣлашь не позволяется до того времени, покуда кровь не

не устоится , какъ я выше приказалъ (636). Одна-
кожъ въ томъ великая разность есть , когда вомика
сѣ стороны отъ реберъ , или когда отъ легкаго
дѣлается. Последнее бо ежели случится , отъ во-
мики прорвавшейся по болюй часпи худой чирей
остається , который легкое сѣдаетъ , и чахопку при-
носитъ. Такое же бѣдствіе обыкновенно бываетъ ,
когда случай застарѣлой будетъ , и когда кровь , или
гной , который внупри да изъ подлинной эмпіемы
спекшійся , уже загнился , отъ котораго также чирь-
евапость случается.

§. 647.

А что загнаиваніе напоследокъ дѣлается , оно
изъ достовѣрныхъ признаковъ подсперечь можно.
Ежели колотье въ грудяхъ (плевришисѣ), сильная и
острая горячка въ нѣ дни , которые христѣ Медики
называютъ , ни потомъ по всему тѣлу дѣлавшимся ,
ни кровью изъ ноздрей и изъ почечуя текущею въ ре-
золюцію не пришла , ежели въ уринѣ на днѣ ничего
не опало , ни гноевапю она не шла , ежели и на низѣ
испражненіемъ ни сколько желчнаго и гноевастаго не
было , или хотя и было да весьма мало , и отъ ко-
торыхъ больному легче не дѣлалось , то эмпіема
дѣлается. Еще того бояться можно , ежели сѣ на-
чала болѣзни крови или ничего не пущено , или то
и дѣлано было да поздно , и тѣло худыми лѣкарствами
повреждено. Горячка же хоть многократно будетъ от-
пускашь , а иногда вовсе не переспаетъ , но вре-
менемъ такъ усилятся , что больной испугается. Онъ
будетъ чувствовать сѣ сими потаенную и непре-
рывную боль и тягость въ той часпи , гдѣ сѣ начала
сильная болѣло ; все гадко ему спанетъ , и гноевапю

Н н з.

смакъ

смакъ въ роту будетъ чувствовать ; и тѣло не будетъ полнѣть ; Кашель небольшой будетъ мучить , однакожъ съ нимъ ничего выбрасываться не будетъ ; изъ которыхъ всѣхъ предугадывать можемъ , что вомика будетъ , которая около дваццатаго дня обыкновенно показывается.

§. 648.

Другія же примѣны показываютъ , въ которомъ боку изъ прорвавшейся вомики гной собрался. По большей части явственна дѣло показывается , когда кровь изъ раны соберется. А вомика обыкновенно родится въ томъ мѣстѣ , въ которомъ съ начала острая и тяжкая боль была. Послѣ прорванія вомики человекъ почувствуетъ внутри стремленіе откашляющей мокроты , ему на томъ боку , въ которомъ гной , ложиться пріятнѣе будетъ. Ежели же на здоровомъ боку ляжетъ , то оный будто бы нѣкакою тяжестью заваленъ покажется. Огнь множества также гноя больной бокъ больше приподнимается , и нѣсколько припухаетъ. (Посп. шупъ 630.)

§. 649.

Того ради ежели не ошибно надобно , или кровь или гной вонъ взять , то должно грудь отворить ; больной долженъ лечь на брюхо , и пакъ его положа , прежде всего мѣсто сыскать надлежитъ , въ которомъ грудь безъ опасности проколоть можно. Оно обыкновенно бываетъ между девятымъ и десятымъ ребромъ , подлѣ позвонковъ около трехъ перстовъ отъ ихъ отростковъ поперешныхъ , и около пяти или шести отъ самой кости хребетной. Когда мѣсто найдено будетъ , чернилами на томъ мѣстѣ проведши по ней разбзать должно.

§. 650.

§. 650.

Прежде же надлежитъ разрѣзать кожу и жиръ прямо внизъ , и чтобъ оный разрѣзъ не былъ тѣсенъ , длинный здѣлать. А послѣ человеку подъ брюхо подушку подложитъ , и другую поперешнюю рану разрѣзать , которымъ разрѣзомъ и мышки и плева подреберная отворяются. Припомъ великое попеченіе прикладывать должно , чтобъ легкаго не повредить , и жилы бьющейся не перерѣзать , для чего ножичекъ отъ нее подалъ , и къ самому верхнему краю ребра нижняго побольше склоняетъ , и вездѣ весьма легкою рукою держать.

§. 651.

По прорѣзаніи такимъ образомъ груди , гной или густая кровь выбрасывается. Рану онымъ ножичкомъ обоюднымъ (637 *) ширѣ здѣлать. Если великое множество гноя внутри скопилось , не поспѣетъ весь , но большую его только часть выпуститъ , и сіе лѣченіе раздѣлитъ надобно. Въ рану положить и въ ней оставитъ холщину бохромовашую (22, 629). Если для вычищенія худой матеріи то за нужное усмотрится , внутрь вливать можно вышепомянутыя полосканія (638). Часто оныя и оставляются , понеже и мокрота , и самый воздухъ , внутрь съ ними проходящій , больше повредятъ нежели пособятъ.

§. 652.

Если , для раны и для выпусканія крови , новая рана здѣлана , то первую и отъ случая полученную , сперва залѣчивать должно , а изъ другой то , что еще мокроты осталось , можетъ выпущено быть. Что до прочаго лѣченія , и до больнаго , касается , выше все уже показано (639, 640).

§. 653.

§. 653.

Через примѣчанія открылось, что гной въ груди собравшійся, иногда через испражнение на низъ и через урину вонъ выходитъ (*). Такого случая познание, какъ безопасность въ человѣкѣ можетъ производиться, такъ и къ способствованію сего лѣченія принадлежитъ. Понеже полезныхъ вспомоцествованій найти будетъ не возможно, ежели здравіе подающихъ отъ погибельныхъ не будемъ распознавать.

(*) Смотри у ГАЛЕНА о мѣстахъ раненыхъ кн. VI. гл. V. т. VII. стр. 517. у ИППОКРАТА въ Коакахъ No. 429. о гноеватыхъ скалахъ, ежели у нихъ гной заднимъ проходитъ потечетъ, знакъ смерти. Но сіе разумѣть кажется должно о людяхъ чахотныхъ, и у которыхъ легкое повреждено, а не о эмпиѣхъ. Памяти достойный примѣръ имѣется въ Комментар. К. А. Наукъ 1731 года стр. 724.

§. 654.

Великую бѣду также причиняетъ гной, когда его соборище въ средогрудной плевѣ заѣлается. Сіе узнавать трудно бываетъ. Догадки производятъ боль, которая въ срединѣ груди подъ костью грудною чувствуется, и когда оныя признаки, выше отъ меня предложенные (647) придутъ, и когда припомъ при выкашливаніи ничего гною не вытекаетъ. Въ семъ случаѣ еще въ древнія времена Хирургія предложена была; но время оной кость грудинную буравомъ выверчиваютъ (*), къ такому пособію тогда должно прибѣгать, когда будетъ положено послѣднее отвѣдать.

(*) Сіе дѣйствіе дѣлалъ въ древнія времена ГАЛЕНЪ о показаніи Анаст. гл. XIII. т. IV стр. 262.

РАНЫ

РАНЫ БРЮШНЫЯ.

ВУЛЬНЕРА АБДОМИНИСЬ.

§. 655.

О ранахъ на брюхѣ случающихся также сумнѣваться можно, глубоколь и внутрь ли прошли. Сіе по шѣмже примѣтамъ, которыя выше я предложилъ (621), познавается, и ежели въ разрѣзѣ не другую мокроту, какъ только кушанье, питье, самой чистой сокъ изъ кушаньевъ, сокъ питательный, пасоку, желчь, калъ, мочу, или сихъ всѣхъ запахъ, испускаетъ, ежели и то, что изъ рта или на низъ выходитъ, съ рыжею кровью смѣшано бываетъ, ежели не иные худыя знаки, и которые гибель показываютъ, спужа, ознобъ и горячка, возженіе, боль, дыханіе трудное, икота, попягопа, обомлѣніе, потъ холодный, или который не по всему шѣлу ровенъ, на послѣдокъ приключатся.

§. 656.

Также въ ранахъ таковыхъ случиться можетъ, что изъ небольшой, но глубоко проходящей, раны ничего ишпипъ не будетъ. Того ради все сіе (655) должно разсудить, и смотрѣть, свободноль дыханіе есть, и встряси брюхо, не ощупаетсяъ какая опухоль или жесткость. Ибо, гдѣ кровь въ брюхо спелась, то брюхо пуго вздѣлается, и раздуется, предсердія вверхъ подымутся и болятъ, духъ на силу тянется. На послѣдокъ, ежели человѣкъ отъ кровопеченія не умретъ, то обыкновенно приходятъ возженія внутренняго примѣты.

§. 657.

Бѣдственны суть раны, которыми мышкѣ чре-
О ○
ныхъ

ныхъ сухая жила, черпою бѣлою называемая, будетъ ранена. Понеже всегда обыкновенно дѣлаются вожденія съ знаками худыми, и которыхъ гораздо бояться можно, съ оспрою болью, рвою, икою, попягою, а послѣ того и съ самою смертию. Тутъ безъ всякаго медлѣнія неопмѣнно надобны пѣвщи, которыя онѣ вожденія сильно пособствуютъ.

§. 658.

Великое также воженіе получаютъ мышкѣ прямыхъ протяженія, ежели въ нихъ концы шпажной, или иной стрѣльной увязнутъ, и онѣ маленькою только частицею расколоты будутъ. А по познаванію, когда около небольшой раны, жесткая опухоль останеся, да и на съ воженіемъ и съ другими худыми знаками возрастаетъ. Оное гдѣ ежели случится, надлежитъ рану ножикомъ ширѣ разрѣзать (83, 187, 199), чѣмъ она довольно отворилась, и мокротѣ выходъ дѣлался. Къ ранѣжъ оной употребляютъ надлежитъ лѣкарства, которыя къ произведенію гноя въ частяхъ жилищувствительныхъ удобны сунъ, прикладывая съ верху другія вещи, и употребляя всякія вспомошествованія, которыя противъ вожденія силу въ себѣ имѣютъ.

§. 659.

Рана великая и глубокая, которою и кожа и мышкѣ разрублены, хоть бы она до самыхъ внутренностей не прошла, другую и тяжкую бѣду дѣлать можетъ. Понеже плеса брюшинная или брюшина, которою внутри брюхо обнато, онѣ тягости оную обременяющихъ внутренностей растягивается, чѣмъ кишекъ и салника удержатъ бывающъ не въ состояніи.

См-

Опишуду нѣкоторый родъ килы дѣлается, о чемъ послѣ скажу. А чѣмъ того избѣгнуть, рану не продолжая времени должно зашить, такимъ же образомъ, какъ потчасъ о другихъ ранахъ я скажу, въ которыхъ сей сшиванія родъ, который гаспоррафією называють, потребенъ. А съ прочими ранами, которыя до внутренностей не прошли, такимъ же образомъ въ лѣченіи поступать, какъ о ранахъ грудныхъ (622, 623) я протолковалъ.

§. 660.

А что рана до внутренностей прошла, оное по примѣтамъ, отъ меня выше показаннымъ (627, 628, 629, 655) узнать можемъ. Если надобно спичку употребить, она не весьма тонка и неостра быть должна, и ее очень легко рукою держать, ибо спастись надобно, чѣмъ ею чего встрѣчу попадаться, не повредить. Частіхонько случается, когда брюхо проколото будетъ, сальникъ и кишки вонъ вылазятъ, и глазами ихъ видѣть можно.

§. 661.

Что же внутри повреждено будетъ, оное другія примѣты покажутъ. Впервыхъ самую стрѣлу разсудить должно, чѣмъ можно знать, куда, и какъ глубоко, она прошла. Спичка покажетъ, прямая ли рана, или согнувшись и излучинами, какова быть можетъ, если раненый въ то самое время, когда онъ раненъ, тѣло потчасъ на которую сторону согнулъ. И внутреннихъ частей мѣста, которыхъ знаніе чрезъ Анатомію получается, показываютъ, что внутри ранено. Однакожъ и то должно знать, что внутреннихъ частей положеніе отъ различныхъ причинъ не мало перемѣняется. Понеже когда тѣло

стоймя стойтъ , внутренности нѣже опускаются , и самая на нихъ напаяная преграда грудобрюшная. Много и въ томъ различїа есть , человекъ голодной ли рану получилъ , или покушавши и напившись. Ибо и это дѣлаетъ , что , прїумноженною въ желудкѣ тягостью , кишки больше припскиваются. Всякому еще извѣстно , что преграда поперешная со всѣми внутренностями , которыя къ ней присокуплены , въ то время на низъ опускаются , когда легкія духъ въ себя вбираютъ , а въ другое время , какъ онѣ вздыхаючи сплющиваются , опять въ верхъ поднимаются.

§. 662.

Ежели же обо всякомъ случаѣ подробну начать разсуждать , то когда преграда поперешная ранена будетъ , части предсердныя сильно болятъ , приключается возженіе и горячка. Дыханіе бываетъ рѣдкое , и то съ трудностію , человекъ часто икаетъ , по временамъ блюетъ : Все же сіе еще труднѣйшее бываетъ , ежели ранена будетъ середина преграды поперешной , которая , какъ то извѣстно , жельночувствительна.

§. 663.

Ежели желудокъ раненъ будетъ , послѣдуютъ частей предсердныхъ боль , гадость , шоска , въ часномъ блеваніи кровавая и желчная блевошина выбрасывается. Ежели нѣсколько покушаетъ или изопьетъ , оно въ томъ же часѣ или раною или горломъ вонъ выбрасывается , А припомъ и икота и отпрыганіе часно бывають.

§. 664.

Почти тѣхъ самая (663) примѣты бывають и при кишкѣ раненой. Изъ тонкой кишки выходитъ сокъ

сокъ питательный, изъ толстой калъ, которыхъ запахъ изъ раны въ носъ приходитъ. Брюхо пухнетъ и жесточее, на низъ съ кровью испражняется. Человѣкъ тузъ болѣе страждетъ, какую тошноту, кпорѣзомъ въ животѣ мучится. Частожъ дѣлается рвота и икота.

§. 665.

Гдѣ печенька ранена бывае, тутъ человекъ или печеніемъ крови вскорѣ изойдетъ, или хотя онъ и живъ останется, то дышать будетъ съ трудомъ и болью. По приключеніи вожженія то есть гепатитидисъ, все тѣло разноцвѣтно и желто дѣлается. А гдѣ желчное пріятелище, и оныя протоки, которыми она протскае, ранены бываю, желчь изъ раны печетъ.

§. 666.

Когда почки ранены бываю, то моча въ жиръ, которымъ вокругъ обняты, и въ клѣпочки его проходитъ. Въ сихъ клѣпочкахъ худые чирьи, а иногда и Антоновъ огонь, дѣлаются. Боль острая съ свербежомъ и горячестію бывае, понеже моча пропала, зывая и проходя жиръ и другія части тѣла. Мочи понемножку да и то съ трудностію испускается, въ которой нѣкакіе кровавые запекшіеся шматочки бываю, или кровь проходитъ уриннымъ вонъ печетъ. Гдѣ раню перерубленъ будетъ мочеточникъ, боль до самыхъ паховъ и до ятеръ проходитъ, какую боль иногда терпятъ тѣ, у которыхъ камушекъ изъ почекъ въ мочеточники выпадшій проходитъ.

§. 667.

Брыжейка когда бывае ранена, тутъ пресильная боль обыкновенно случается, а особливо когда жилы чув-

спивительныя перерублены будутъ. Понѣже извѣстно въякому , что во всей брыжейкѣ жилы чувствительныя многочисленныя влещены (*).

(*) смотр. руишѣвы адверс. дис. II. гл. IV, стр. 8.

§. 668.

Ежели матка ранена будетъ , кровь чрезъ естество печь будетъ. Не надлежитъ тутъ говорить , что сіе и ошъ другаго случая здѣлаться можетъ.

§. 669.

Когда у мужчинъ моча заднимъ проходомъ будетъ печь , то значитъ , что пузырь въ томъ мѣстѣ раненъ , которымъ онъ съ кишкою заднепроходною сходитъся.

§. 670.

Случиться можетъ , что изъ свѣжей раны гной съ кровью печь будетъ , а то бываеиъ , когда въ какой части вомика была , прежде опъ нѣкоторой причины произшедшая , а теперъ спрѣлою проколаша будучи прорвалась.

§. 671.

бѣдственныя раны бываюиъ , которыя глубоко въ брюхо проходятъ. рѣдко случаетъся , чтобъ рана внутрь и посреди брюха наскрозъ такъ прошла , чтобъ внутри чего нибудь оною не было бы повреждено. Понѣже изъ разрубленыхъ сосудовъ кровь печетъ , а опъ разрубленыхъ чувствительножилыхъ мѣстъ прѣтяжкая боль и вожженіе дѣлаеиъся , или мокрота изъ раненыхъ прѣятелищъ испекшая портитъся , чѣмъ на послѣдокъ цѣлыя части повреждаюиъся и худы дѣлаиъся такъ , что человекъ ошъ Аншонова огня , или ошъ сухоты умретъ.

§. 672.

§. 672.

Чуть ли выздоравливаютъ когда тѣ люди , у которыхъ переграда поперешная ранена будетъ. Однакожь опчаяніе извѣстнѣйшее бываетъ тутъ , когда средняя и сухожильная ея часть проколота будетъ.

§. 673.

Сумнительны бываютъ и тѣ , у которыхъ желудокъ поврежденъ , а особливо , ежели двѣ кожицы ранены. Гдѣжъ проколота будетъ верхняя самая желудочная также и оная часть , гдѣ нижнее устье желудково есть , и оно е въ самую верхнюю кишку закрючивается , никакой надежды въ тѣхъ не остается. Однакожь временемъ бываютъ вылѣчены тѣ , у которыхъ на верхней части рана случается (*).

(*) Оно свидѣтельствуютъ примѣры людей ножи глотающихъ. Смотри о ножеглотѣ Прусскомъ написанное отъ БЕККХЕРА и ЛОДА и о женщинѣ повѣсть ГИБНЕРОВУ.

§. 674.

Почти такуюжъ бѣду приносятъ раны кишечныя. Могутъ иногда заживлены быть небольшія и прямыя раны , а особливо ежели раненую кишку къ перепонкѣ брюшинной хорошенько привесить можно. Кишка съ обѣихъ сторонъ проколота , по большей части скоро смерть причиняетъ. Свободнѣе заживаетъ кишка толстая ; нежели тонкая. Иногда люди бывали вылѣчены , у которыхъ кишка со всѣмъ перерѣзана была (*); а другіе , у которыхъ великая часть была испорчена , и прочь отрѣзана (**).

(*) Смотри у БЛЕГНІА въ Зодіак. Мед. Франц. 1690 году въ Іюль мѣсяцѣ Прим. IV. стр. 123 Эфем. Нат. Куріоз. Дес. II. а VIII. Прим. 229 , и оный случай , отъ славныхъ мужей АВР. ВАТЕРА въ Диссерт. о смертоносности или о смертельности разъ кишечныхъ въ Вишнев. 1720 года и ПОЛУКАРПА ГОТТЛИБА ШАХЕРА въ

въ Диссерт. о положеніи кишекъ ненатуральномъ въ Липс. 1721 года , описанный. Снеси сюд. Трансакц. Аглин. No 366 стр. 89, и въ Компендіи Вол. VII. стр. 515 Таб. XVII. фиг. 81.

(**) РАВІЙ въ рѣчи о способѣ, какъ Анатоміи учить и учиться стр. 36 признается , что онъ вылѣчилъ кишку подвздошную , которая на три локтя длиною изъ раны вышла , и чрезъ четырнадцать дней на воздухъ лежала. съ великимъ загноеніемъ. МЕРІЙ въ Комментар. короля. Ак. Наукъ 1701 году стр. 370 представляеть , что у женщины , у которой кила вожженіемъ обдержима была , повреждена была кишка длиною около четырехъ или пяти пядей , однакожъ она женщина выздоровѣла , а припомъ осталась въ паху дыра , которою все то , что чрезъ кишки на низъ обыкновенно испражняется , вонъ испражняется было. Такіяжъ почти исторіи имѣеть ХЕСЕЛДЕНЪ въ те Анатомии стр. 148 и далѣе таб. XXIII и XXIV. и преславный ГЕЙСТЕРЪ въ примѣч. Медич. Мисц. Теоретическихъ и практическихъ въ Гелмст. 1730 года предложенныхъ , куда принадлеж. те Медикаль Эссайсвъ ВОЛ. I Обсерв. XX. стр. 227 , гдѣ на послѣдокъ чирей въ паху сставленной , опять залѣченъ ФАВДАККЪ. рефлексіонъ сюръ де пле стр. 562 , рану описываетъ весьма разможденную , то есть множествомъ маленькихъ пулечекъ (мнѣ шробѣ) ш. е. дробью кишкѣ ободочной причиненную , и она опять вылѣчена: рану на кишкѣ ободочной , изъ которой и калъ уже выходилъ , совершенно излѣченную , описалъ ГАЕТАНЪ ТАККОНИ. Смотри. Коммерц. Литерар. 1738 года Недѣл. XIII. стр. 329. Изъ сихъ со всѣмъ явствуется , что раны кишечныя , да еще тяжкія , излѣчены быть могутъ.

§. 675.

А у которыхъ верхняя часть печени или послѣдняя часть излегка ранена будетъ , оныя вылѣчены быть могутъ. Гдѣжъ сія внутренность въ середку ранена будетъ , и гдѣ повреждены будутъ великія жилы быющіяся и жилы крововозвращательныя , и желчныя проходы , та рана смертоносна бываетъ.

§. 676.

Погибель также извѣстная обыкновенно бываетъ , когда другія внутренности , селезенка , желѣза пригожмясная и ея протокъ , также пріятелище сока пищеваельнаго , ранены будутъ. Смерть также по боль-

большой части слѣдуетъ, ежели перепонка брыжейка ранена будетъ. Понеже она и много великихъ жилъ быющихся и жилъ крововозвращательныхъ, кровеносныхъ и сокопитательныхъ, множество жилъ чувствительныхъ имѣетъ, и жиръ природный, ради котораго она къ поврежденію и къ Аншонову огню весьма подвержена бываетъ. Сальникъ весьма скоро порипитъ; но то, что поврежденное сыщется, безъ всякаго вреда отрѣзывается.

§. 677.

Матка крайнюю опасность дѣлаетъ будучи ранена, а наипаче у беременной женщины, у которой жилы быющія и жилы крововозвращательныя распянуты бывають. Понеже такія женщины по большой части скоро печеніемъ крови, или вожженіемъ, умирають.

(*) у беременной женщины матка надутая легко ранена быть можетъ. Смотр. Примѣръ, въ которомъ не только матка, но и самой младенца дробинкою свинцовою (Шротъ-Корнъ) прострѣленъ былъ, въ Диссерт. о Маткѣ Чреватой женщины въ мѣстѣ съ младенцемъ употребивъ раненою, которую ЮГАН, МАРТ. РЕЙХАРДЪ въ Аргенторатѣ 1735 года предложилъ.

§. 678.

Раны почечныя не такъ опасны, которыя на верхней и наружной ихъ сторонѣ случаются, а которыя глубоко пройдутъ, смертоносны бывають. Ибо ежели изъ раны, которою почка ранена будетъ, или мочеточникъ перерѣзанъ, моча печь будетъ, она слѣдующую или скоро или не скоро смерть провозвѣщаетъ.

§. 679.

Не всегда смерть слѣдуетъ, когда пузырь раненъ бываетъ, чего самая хирургія у людей камнемъ страдающихъ употребляемая насъ учитъ. Временемъ еще слу-

П п

чалось

чалось, что свинцовая пуля, скрозь брюхо въ пузырь прошедши, въ немъ по заживленіи снаружи раны оставалась, къ которой напоследокъ камень приросъ (*). А однакожъ сіи раны весьма худы, и великія бѣды дѣлаютъ.

(*) Смотр. у ГИЛДАНА въ Примѣч. Хирург. Сопн. III. Прим. 67 стр. 250 и о Лишотоміи ш. е. о вырѣзываніи камня гл. III. стр. 710; Эом. БАРТОЛИНЪ въ Епп. мед. Сопн. III. Епист. XXXV. стр. 128; другой примѣръ отъ МОРАНДА предложенный въ Тр. дела Талье. о готъ Аппарелье, стр. 224. Сюда прицѣл. И. К. А. Наук. 1725 году стр. 30 и Хесельденовъ Трестизе онъ те гикъ Операционъ таб. X. Лип. Д. ТУЛПІЙ въ прим. Медич. Кн. III. гл. IX. стр. 195 имѣтъ исторію о челоѣкѣ, которому волъ лѣсной дикой рогомъ подбрюшную часть проболъ. Послѣ залѣченія раны челоѣкъ камнемъ пузырнымъ страдать началъ, и напоследокъ очень великой изъ пузыря былъ вынутъ, въ срединѣ сего камня нашли кнотъ, можетъ быть въ ранѣ тогда забышой.

§. 680.

Ежели же по всѣмъ извѣстнымъ обстоятельствомъ догадываться можно, что внутри, хоть бы рана глубоко прошла, ничего не повреждено, то пошчасъ смотрѣть надлежитъ, чтобъ нѣсколько воздуха; крови, или иной какой мокроты въ брюхѣ не оспалось. Того ради ежели что ни будь тому препятствовать не будетъ, (а препятствовать могутъ кишки и сальникъ, когда они въ рану выйдутъ) больного, какъ долго что нибудъ печь будетъ, надлежащимъ порядкомъ положитъ, и на рану оборачивать должно, чипобъ такимъ образомъ все внутри находящееся вонъ выпскало. А припомъ лучше оное вонъ изгоняется, ежели больному велятъ временемъ духъ въ себѣ поудерживать. Мокроту также другому челоѣку ртомъ или сифономъ можно вонъ выпшнупъ (635), ежели рана очень уса, оную вновь поширѣ разрѣзать должно. Въ рану можно также впускать полосканіе (638)

(638), которымъ все внутри находящееся будетъ вы-
поласкиваться, доколѣ чистая мокрота въ рану пойдѣтъ. На послѣдокъ рану, какъ въ другихъ дѣлается,
мясомъ наполнишь, и спрутъ навесить.

§. 681.

А крови такими способами вонъ брать не над-
лежитъ до тѣхъ поръ, покуда она не устоится,
чему такая примѣта, ежели брюхо не станетъ больше
пухнуть. Понеже доколѣ печь кровь не перестанетъ,
то больной въ сумниельствѣ находится (629). Не
вовсѣхъ безопасное дѣло, хоть то за одну помощь
къ здравію признаваютъ, кровь изъ другой части
пускать, дабы тѣмъ отъ раны отвратилась; и
чтобъ самое малосиліе человѣческое печенію крови
воспрепятствовало (636, 637, 641).

§. 682.

Во всѣхъ брюшныхъ ранахъ ничто больше не
пособствуетъ, какъ легкое слабительное изъ мягчи-
тельныхъ вещей составленное. Понеже облегчивши
такъ кишки, брюхо мягко дѣлается, и рана скорѣе
заживаетъ. Но ежели въ толстой кишкѣ рана будетъ,
клистеры безъ вреда употребляемы быть не могутъ,
понеже то, что въ брюхо ввергаемо бываетъ, сквозь
рану въ брюхо проходитъ.

§. 683.

Чаще случается, что изъ раны, ежели она
нѣсколько широка будетъ, и сальникъ и кишки вы-
падаютъ. Сальникъ потчасъ осмотрѣть должно,
весь ли онъ цѣлъ, понеже въ скоромъ времени портятся
и умираютъ. Понеже иногда бываетъ, ежели онъ
красноватъ и шепелъ, то его потчасъ на кишки

навесѣ можно. Случись же можетъ, что съ нимъ кишка выскочитъ, которую, ежели подъ нимъ задержатъ, и въ брюхо не вправятъ, свившеюся остаться можетъ и едею болѣзнь причинитъ, чего ради оную, покуда еще не будетъ спрятана, прилѣжно, а припомъ крайнюю употребляючи умеренность, развить должно. А то, что отъ сальника синевато, черно и умерлое будетъ, надлежитъ тотчасъ ножницами отрѣзать. Но прежде того нѣчто здѣлать надобно, чѣмъ отъ кровотеченія бѣды не здѣлалось. Оное выпадшее по-маленьку поприпаянущи и осмодрѣть, чѣмъ какой жилы бьющейся или жилы кровезовращательной не повредить, продѣвается въ средину онаго игла великая, съ ниткою навоощеною. Оной нитки два конца сперва на верхней сторонѣ, а послѣ снизу одинъ съ другимъ завязать, а что ниже завязаннаго останется, оное ножницами или ножечкомъ отрѣзать. Послѣ того, что выше завязаннаго будетъ, опять спрятать, а концы нитки оной, которою сальникъ завязанъ, должно внѣ раны оставить.

§. 684.

Не всегда же сіе лѣченіе надобно бываетъ. Понеже когда рана тѣсна и сальникъ одинъ, а не съ кишкою выпалъ, оный, ежели краями ранеными туго будетъ давленъ, замретъ, и безъ вредности отпадетъ, а остальное по назначіи гноя съ раною заживаетъ (*).

(*) Смотри. ЛЕДРАНЪ т. 2. Примѣч. 90. стр. 238.

§. 685.

Ежели же сальникъ съ брюшиною такъ сойдутся, и больной во время лѣченія поднимая голову навзничъ будетъ лежать, то случится можетъ, что туда и желудокъ припаянется. Таковымъ людямъ, послѣ за-
лѣче-

лѣченія раны , какъ скоро онѣ или покушаютъ , или напыются нѣсколько посыпнае , рвога дѣлается , понеже сальникъ желудка растягиваясь не попускаетъ ; и такому пороку помочи нѣтъ.

§. 686.

Ежели кишка или одна , или съ сальникомъ , вонъ выпадетъ , и оную поспѣе осмотрѣть должно , всякъ цѣла или ранена. Цѣлая кишка , какъ духъ въ себѣ задержится , раздувается , а проколоная опадетъ , и мѣрѣю , которая скрозь ее на низъ проходитъ , вонъ испускаетъ ; а припомъ раненая кишка рѣдко выпадетъ. Ежели кишка будетъ цѣла , оная въ брюхо вправивъ ее должно , однакожъ не всегда по зѣласть можно бываетъ легко , а больше , ежели она долго на воздухѣ лежать будетъ , или отъ духу , или отъ калу , въ ней задержаннаго гораздо раздуются. Съ великимъ же поспѣшеніемъ тому пособствовать надлежитъ , чтобъ кишки воздухомъ окруженныя не повредились. Понеже когда блѣдны , сизы , черны и холодны зѣлаются , тогда по большой части всѣ лѣкарства бываютъ напрасны. Ежели уже онѣ позасохнутъ , тогда ихъ водою неочень теплою смѣшавъ нѣсколько съ масломъ , покрѣплять можно. Можно еще на верхъ прикладывать губку , или холстинку , теплою водою или молокомъ теплымъ намоченую. Къ сохраненію натуральной теплоты пособствовать еще можетъ , какое нибудъ животное убитое и еще теплое прикладываемое. Да и то знать должно , что излишняя теплота почти вредитъ , понеже отъ нее духъ , внутри запертый , тонъ бываетъ , и кишка больше растягивается.

§. 687.

Когда же оную вложить должно будетъ , то

П п з

чело-

человѣка навзничь оборотить. Понеже впомѣ много прибыли, что человекъ лежишь прямо, дабы завсегда наверху была оная часть, на которой рана. Того ради ежели рана выше пупка-будетъ, то больному голову высоко держать надлежитъ. А ежели пупка пониже, онъ опустя голову пониже, а сѣдалищныя части повыше приподнявъ, лежать долженъ. Ежели рана будетъ на боку, то больной завсегда на цѣлой бокъ переворачиваться долженъ. А въ карю же надлежитъ кишки вправлять такъ, чтобъ онъ пальцами перебирая одинъ за другимъ полегоньку внутрь впискивалъ, и чтобъ завсегда прежде то вправлялъ, что послѣ выпало. Вложивши все внутрь, брюхо у человека легонько потрясти должно, чтобъ всякая частица на своемъ мѣстѣ установилась. Куріозно также смотрѣть должно, чтобъ кишка и сальникъ, которые вправить должно, на свой мѣстъ и въ брюхо приведены были. Понеже случиться можетъ, что оная кишка и сальникъ подъ кожей промежъ мышечъ и промежъ ихъ просяженіями спрячутся, отъ котораго случая смертоносное вожженіе дѣлается.

§. 688.

Ежели же рана будетъ узка, и кишки, понеже толсты, пухнутъ, назадъ вправляться не могутъ, должно другихъ способовъ отвѣдать. Надобно ихъ перстами больше повыпащивъ, дабы чрезъ то духъ спершійся, и туда опадшій калъ поширь распространился. Часно также пособствуетъ кровопусканіе, которое и отъ вожженія и отъ судорогъ пособствуетъ, и рану тѣсную расслабляетъ. Многіе кишки иглою прокалываютъ, дабы чрезъ то духъ спершійся вонъ выпитъ могъ, однакожь то думаю безъ худа не проходитъ,
понеже

понеже кишки не мало бережятся, и онѣ того въ нихъ вожженіе и загнаиваніе здѣлаться можетъ.

§. 689.

Однакожъ иногда все сіе мало пособствуетъ, только рану съ изнова ширѣ разрѣзать должно. Но сіе дѣло крайней умѣренности или кротости требуетъ, чтобъ кишокъ не повредить, и чтобъ жилъ бьющихся и жилъ кровезовращательныхъ не прорѣзать, а пришомъ сальнику; ежели онѣ уже попорченъ, большаго вреда не причинитъ. Въ рану должно вложить спичку, жолобокъ въ длину протянутой имѣющую, пупоконечную, и у которой на срединѣ щипокъ маленькой здѣланъ быть долженъ (*), которымъ прижимаются кишки; чтобъ онѣ отъ ножичка подалъ были. Ножичекъ также по спичкѣ въ рану пустить, прикладывая спараніе, дабы онѣ чего не повредилъ. А послѣ какъ и спичку и ножичекъ вмѣстѣ вонъ надобно взять, разрѣзывается кожа съ лежащими подъ нею мышками и брюшиною; доколѣ рана довольно пространною покажется.

(*) Смотр. ГАРЕНЖОТЪ десъ Instr. Т. I. гл. VII. Арш. I.

§. 690.

Многіе употребляютъ другіе инструменты. Понеже употребляться можетъ Сиринготомъ по народному Царскій называемый (Сиринготомусъ региусъ бистури-роіаль) (*) или Гернотомъ, ш. с. ножичекъ серповидный, который въ инструментѣ будпо какъ въ футлярѣ спрячется; и придавивъ съ боку приподнимается (бистури-кашѣ) (**). Сей ножичекъ, понеже концомъ легко вредить могъ кишки, то не весьма давно переѣнилъ, и къ такой Хирургіи гораздо способнѣйшимъ здѣлалъ ле ДРАНЪ (***) ПЕТИТЪ

ПЕТИТЪ выдумалъ еще инный ножичекъ , который острее имѣетъ пилою а не оселкою выпоченное , и конецъ тупой и круглой. Сей , ежели сильно не придавишь , рѣзать не можетъ , и для того кишекъ безъ причины не повредитъ (****).

(*) Смotr. въ ГЕИСТЕРОВОЙ Хирург. Таб. V. фиг. 3.

(**) Смotr. у ГАРЕНЖОТА десъ Операт. Том. I. гл. VII. Арш. III. стр. 232.

(***) Смotr. ЛЕДРАНЪ Прии. Т. II. стр. 26.

(****) ГАРЕНЖОТЪ шамж. Арш. II. стр. 227.

§. 691.

Гдѣжъ рана ужа будетъ , и выпадшая кишка , получа въ себя духъ или калъ такъ распухаетъ , что безобѣдно ни спички ни другаго какого орудія въ рану просунуть не возможно , рукою кишку завернуть должно , и подложъ въ средину перстный ноготь , къ низу ножичкомъ береженько самую верхушечку у кожи разрѣзать , великую осторожность употребляя , чтобъ конецъ до кишки не проскочилъ , и оной не поранилъ. Для того больного уговаривать должно , чтобы онъ не ворочался , понеже онъ легкимъ движеніемъ здравіе свое къ крайнему бѣдствію довести можетъ. Когда кожа распространена будетъ , то и мышки равномерно рукою вислою , завсегда поглубже ноготь придавливая разрѣзываться могутъ , доколѣ рана пространнѣе здѣлается , и въ нее спичка пролезетъ.

§. 692.

Но сіе дѣйствіе также иныхъ нѣкоторыхъ предосторожностей требуетъ. Ежели рану вновь ширѣ разрѣзывать надобно , то беречься должно , чтобъ жилы быющей надчеревной или верхобрюшной , которая подъ мышкою брюшною прямою въ верхъ идетъ , не ранишь

ранишь , изъ которой смертельное крови печеніе
здѣлаться можетъ. Если же рана подлѣ пупка бу-
детъ , то ножичекъ такъ наклонять должно , чтобъ
связокъ не пронуть пѣхъ , которыя изъ жилъ бю-
щихся и жилы кровосвозвращательной здѣлались , у
младенцевъ къ пупку надлежавшихъ. Понеже чрезъ
примѣчаніе узноано, что сныя у молодыхъ людей иногда
еще дуплясты и проходны находятся , ибо кровь изъ
нихъ печь можетъ. Также не должно повреждать ,
разѣ съ крайнимъ бѣдствіемъ , бѣлой спези (бѣгъ),
чего ради ежели надобно будетъ рану къ ранѣ при-
бавить , надлежитъ всѣ сіи мѣста миновать. Ко-
гдажъ кишки уже вправлены будутъ , тогда прилѣжно
осмотрѣть должно , чтобъ крови , или другой мокро-
ты , въ брюхѣ не осталось. Запрещается больному
на рану оборотясь лежать , и въ то время , какъ его
обвязываютъ , духъ въ себѣ задерживать , А запре-
щаетъ то часто опасноснъ , чтобъ въ брюхо всѣ
вправленные и на мѣста свой приведенныя части ,
опять не выпали.

СШИВОКЪ КИШЕШНЫЙ.

ЕНТЕРОРАФИ.

§. 693.

Кишки будучи проколоты , иногда заживаютъ ;
ежели рана къ брюшинѣ , или къ другой какой части
или и къ брыжейкѣ прижмется , и съ нею сроснется (*).
Однакожъ завсегда тонкія кишки прудняе лѣчатъ ,
нежели толстыя , и сноснѣе бывають раны прямыя
продолговатыя , нежели наискось идущія и поперечныя.

Р р

Также

Также о зашиваніи или сшиваніи кишекъ Лѣкари думали, какой сшивокъ пущѣ употребить можно, не для того чтобъ на то крѣпко надѣяться, но для того что сумнительная надежда завсегда лучше бываетъ извѣснаго опчаянія (**). Преждевсего разсудить должно, здоровой ли въ нихъ цвѣтъ. Понеже когда сизы или блѣдны или черны будупъ или безчувственны, то излишнее и суетное сіе будетъ лѣчение.

(*) Прежде всего то памятовать должно, что раны кишешныя желудошныя, и другія вмѣстилищъ, хотя залѣчиваются, однако не такъ срастаются, какъ другія раны. Понеже ни край такъ плотно не сходятся, чтобъ одинъ съ другимъ спаялся, и сросся, ни раны нарастаніемъ мяса не наполняются, но часть раненая совокупляется съ другими, къ ней близкими, съ которыми чрезъ посредство струпа срастается. Смотри, какъ человекъ самъ себя рѣзалъ, который уже давно на брюхѣ многія раны, да еще скрозъ кишки подблалъ, и опять выздоровѣлъ, въ Комментар. Къ А. Наукъ 1705 году стр. 40.

(**) Разсужденіе ЦЕЛСОВО о рѣзъ Хирургіи Кн. VIII. гл. XVI.

§. 694.

И такъ ежели сіе зашиваніе апробовать въ на-мѣреніи положено будетъ, вынимаютъ изъ брюшной раны проколотую кишку, совокупляютъ межъ собою край, и Лѣкарь перстами большимъ и указательнымъ лѣвой руки беретъ кишку, а пособникъ онуюжъ въ другомъ мѣстѣ возьметъ, чтобъ край у раны одинъ съ другимъ прямы и ровны были. Надлежитъ же персты оныя, которыми кишку захватывать, пряпочками въ теплой водѣ смоча обвернутъ, чтобъ мягче держать было. Прокалываютъ на скрозъ край иглою небольшою гладкою, жало острое тріугольное имбюющею (378), однако она пополице нипки быть должна, чтобъ не было надобно нипку насильно протягивать, но, будшобы она самовольно, за иглою слѣдовала.

§. 695.

§. 695.

Въ народѣ и такой шовъ при зашиваніи кишекъ употребляется, какой скорняки или мѣхошвы употребляютъ, и которымъ ниткою черезъ край шьютъ, и оныя захватываютъ. А понеже нитку, при зашиваніи раны, опять вонъ выдернуть должно, то шовъ, ежели кто употребитъ похочетъ, такъ дѣлать, чтобъ игла не за одинъ разъ скрозь оба края проходила, но сперва въ одинъ а послѣ въ другой, и не прямо, но наискось. Также и ниткою стягивать крѣпко не надлежитъ, чтобъ не было больно. И конца узломъ не закрѣплять, и другимъ способомъ не завязывать, но концы ниточные долгіе вмѣстѣ свесить должно, чтобъ внѣ раны висѣли.

§. 696.

А понеже при такомъ швѣ игла скрозь кишку нѣсколько разъ проходила, также и нитка часто продѣлая оную рану сильно кусаетъ, то оная нитка великое и весьма бѣдственное вожженіе произвести можетъ. Того ради новѣйшіе сей зашиванія способъ не употребляютъ, а употребляютъ рѣдкой сшивокъ, и почти почти самой шовъ дѣлаютъ, который при другихъ ранахъ способнымъ признанъ. Ипакъ нитку въ оба края продѣваютъ, сей нитки концовъ ни связываютъ, ни узломъ завязываютъ, но перстами нѣсколько скручиваютъ, и оныя вмѣсто сводятъ, и внѣ раны оставляютъ, и частаго шва не употребляютъ. Понеже, когда раненая кишка къ ранѣ брюшинной приводится, то оная съ сею и заживаетъ (693*).

§. 697.

Но сей сшиванія способъ можетъ пользу дѣ-

ласть, ежели рана на кишкѣ невеликая да продолговатая будетъ. А поперешная рана, ежели кишка вся разрублена и перерублена будетъ, другаго пособствованія требуетъ, которое не меньше затрудненія въ себѣ имѣетъ. Понеже должно, ежели по здѣлать можно, кишки перерѣзаной концы повытянуть, и оный конецъ, который къ брюху ближе, ниткою завязать, а другой съ верьху висящій, къ наружной ранѣ такъ пришить, чтобъ изъ нее, все въ кишкахъ на низъ идущее, испражнялось, и чтобъ сіе испражненіе будто бы чрезъ новый задній проходъ дѣлалось. Для такого случая къ сему мѣсту суденышко оловянное придѣлать, и оное къ ранѣ привязать должно, въ которое бы пороша проходила. Бѣдное сіе пособіе, отъ претерпѣннаго бѣдственнѣйшаго злключенія дѣлается, понеже, когда бы онаго не исполнили, надлежалобъ больному погибнуть. А припомъ такое пособіе только пѣмъ прилично, у которыхъ нижнія кишки напимѣръ подвздошная, или ободочная, ранена будетъ (*).

(*) Снеси сюда примѣч. выше подъ §. 674. представленные.

§. 698.

Кишки же раненыя никогда заживать не могутъ, ежели не будетъ упоиребленъ голодъ, или пища съ голодомъ по поламъ. Понеже сытость раны производитъ, и оныя распяливаетъ, и больного въ крайнюю и смертельную бѣду приводитъ можетъ. Давать можно по временамъ понемножку ушнова и жижи студеньной, и отъ которыхъ больной не такъ насыщается, только чпо живетъ. Ежели рана на кишкѣ тонкой будетъ, тогда въ брюхо ушное вливать можно (619).

§. 699.

§. 699.

Когда и въ желудкѣ рана будетъ , такимъ же способомъ лѣчить должно. Понеже желудокъ свободнѣе раненъ можетъ быть , когда онъ полонъ , нежели когда голоденъ и пустъ. Ибо , по изгнаніи матеріи внутри находящейся , и самъ желудокъ и края у раны сжимаются. Для того нѣкоторые велятъ , больному раненому сытому рвотное давать , чтобъ чрезъ то желудокъ выпорожнился , когда наружной раны мѣсто показывать будетъ , что на верхней сторонѣ желудковой рана. Но сіе развѣ весьма легкими способами дѣлать можно я думаю , т. е. всунувши перстъ въ горло. И такимъ больнымъ долгое время надлежитъ быть голоднымъ , всякая сытость смертоносна бываетъ.

§. 700.


Вложивши въ брюхо и сальникъ и кишки , и испражнивши всю внутри собранную мокроту , рану также , на брюхѣ находящуюся , залѣчить должно. Однакожъ ее , хоть маленькая будетъ , не должно залѣчивать до того времени , когда ни гной ни другая какая мокрота изъ раны не станетъ печь. Въ рану кнопъ не легко класть можно , но вкладывать пряпочку , и ежели нужда востребуется , рану ширѣ разрѣзать должно. Ежели же гораздо полезнѣе покажется , кнопъ употребить , то оный дѣлать должно коротенькой , небольшой и мяконькой. Оный гораздо вредить можетъ , ежели сальникъ попорченный или кишка раненая , къ ранѣ брюшинной приведены будутъ. Снаружи прикладываются подушечки и суко-ночки , а сверхъ тѣхъ пластырь , однакожъ на немъ по срединѣ должна быть дыра прорѣзана , накладыва-
ется

Р р 3.

вается еще мантія съ поддепкою. Понже сія обвязка и къ груди и къ брюху годится.

§. 701.

Ежели лѣченіе хорошо продолжается, то нитка, которою кишка сшита, и другая, которою сальникъ завязанъ, по начатіи гноя сама собою опадаетъ, и безъ затрудненія вонъ вынимается, а то дѣлается обычно въ пятый или шестой день, когда больной на кишкѣ, будто бы нѣкоторой свербежъ почувствуетъ. Ежели нитку изъ кишки раненой выпустить надобно, то ее оба концы весьма близко подлѣ раны перерѣзать, дабы она пѣмъ свободнѣе выпаскивалась. Когда нитка выпаскивается, должно рану перстами прихватить, и во всемъ чѣмъ нѣчто нарозно не растянулось и повредилось, весьма кропко поступать.



СШИВОКЪ БРЮШНЫЙ.

Г А С Т Р О Р А Ф І А.

§. 702.

Рану на брюхѣ, великую и разинувшуюся, зашивать надобно. Но оный сшивокъ, который при другихъ ранахъ употребляется, не очень держитъ, для того многіе сіи раны пѣмъ швомъ зашиваютъ, который зубчатымъ [сунура пинната] называется. А почти гораздо лучше шовъ, изъ общаго и изъ сего съ зубцами бывающаго, здѣланный.

§. 703.

Сведши вмѣсто края, чернилами назначить можно

жно на кожѣ, гдѣ прокалывать. Надобно же, чтобъ между швомъ и обѣими краями на перстѣ разстояніе было. Въ двѣ иглы большія вдѣть нитку, изъ девяти нитокъ крѣпкихъ такъ сложенную, что будто бы одна нитка была. А нитки сіи нессучены быть должны, но одна къ другой бокъ съ бокомъ сложены, и сердочки промежъ ими такъ воскомъ завощены, что будто бы подвязкою казались. Тогда иглу съ внутренней стороны на внешнюю, сквозь оную черниломъ здѣланную замѣшку, употребивъ припомъ орудіе (380), продѣваятъ, такъ, что и брюшину, которая обыкновенно широко расходится, пуще иногда прокалываютъ. Такимъ же порядкомъ и другая игла съ тоюже ниткою сквозь другой край пронзается. А сіе, перемѣняя руки, такъ дѣлать, чтобъ правая рука, теперь только иглу просунувшая, уже крѣй держала. Припомъ же крайнее спараніе, имѣть должно, чтобъ часть иглы, вострая отъ кишки далеко отстояла, для того жало или самый конецъ на перстѣ положить, и съ перстомъ въ брюхо опустить должно. Если рана гораздо велика будетъ, оную подобнымъ образомъ въ другой разъ или въ третій сшить надобно завсегда изнутри иглами проходящими. Продѣвши такъ нитки, всю мокроту изъ брюха выдавить, а край у раны, положи съ обѣихъ сторонъ руки, вмѣсто свести должно. Послѣжь, какъ все сіе здѣлано будетъ, нитки въ ранѣ держащіяся на три ровныя части раздѣляются. Одной части концы межъ собою завязываются, слово въ слово такъ, какъ въ общемъ швѣ, переложа межъ ими небольшую суконочку, которую изъ шелковой матеріи навощенной свободно дѣлать можно. А по,

что

что отъ нитокъ еще останется, порознь раздѣляется, и съ обѣихъ сторонъ на наконечникъ или на другой палочкѣ, связывается. А понеже сѣи пружинки, будучи нѣсколько жестки, давленіемъ своимъ обыкновенно досаждаютъ, по ихъ можно зѣлать изъ камышу тонкаго, обернувъ матерію шелковою обвитого, или изъ тойже матеріи скатанной, концырими вмѣсто сведенные края удерживаются.

5. 704.

А доколѣ еще зашивая рана не будетъ обвязана, нитки оныя осматривать надлежитъ, которыми или сальникъ связанъ, или кишка зашита будетъ. Понеже сѣи нитки къ ранѣ приводятся, снаружи на брюхѣ кладутся, и пластыремъ прикрѣпляются. Ежели и сальникъ завязанъ и кишка зашита будетъ, то очень хорошо, чтобъ сѣи нитки разноцвѣтныя были для того, чтобъ лучше распознаваемы быть могли. На рану такіяжъ лѣкарства прикладываютъ, какія уже я въ другомъ мѣстѣ показалъ. Ежели же рана размождена будетъ, или, ежели сальникъ будетъ завязанъ, то прикладывая лѣкарства гной произвестъ должно. Для того рану не весьма туго швомъ зашивая надлежитъ, чтобъ выходъ мокротъ чрезъ то могъ быть, и чтобъ туда лѣкарства гной производящія можно было класть. О кнотѣ, который многіе въ семъ случаѣ занеобходимо потребный, признаютъ, я нѣсколько разъ сказалъ, что его не употреблять, понеже кишки и сальникъ сильно имъ бередятся. Однакожъ объ томъ стараться надлежитъ, чтобъ мокрота внутри собирающаяся вонъ вытекала, и чтобъ гной изъ раны вытекающій на низъ не опадалъ. Много тому способствуетъ, ежели человекъ почаще на рану оборотится, будетъ

будетъ полеживать. Если бояться вожженія должно, то рану и все брюхо помазывать масломъ розовымъ съ нѣкоторою частючкою вина или спирта горячаго смѣшаннымъ.

§. 705.

Чтобъ край у раны нарозно не расходился, надлежитъ больному спокойному быть, и на кровати лежать. Ибо шо также бытъ можетъ, что и посидѣть надобно случается, а понеже брюхо опѣ жленья обыкновенно надувается, для того почаще слабительныя внутрь употреблять, чтобъ на низѣ испражненіе безъ напуги дѣлалось. Избѣгать надобно и чханія, которое молоко къ носу приложенное удерживаетъ, также кашель и вздыханія. И духу целыми легкими глошать не надлежитъ. Все сие и тому жно буди бы выздоровѣвшимъ казался, долго такъ хранить должно, и употреблять воздержность. Понеже всѣмъ тѣмъ, которые раненко заприхотничаютъ, и въ томъ что ни принимаютъ, или времянемъ или количествомъ, или родомъ погрѣшаютъ, многія времена и роды, въ бѣдство обращаются. Также долго употреблять, и шуго около брюхо обвязкою съ пришитымъ къ ней мячикомъ обвивать. Понеже подъ сей мячикъ подкладывается еще не со всѣмъ укрѣпившійся спрутъ, и внутри подворачивается кишка и сальникъ. Случитсяжъ можетъ, что сей мячъ по ослабѣніи тѣла и кожи опадетъ, и такъ родъ килы здѣлается, о которой дѣченіи въ другомъ мѣстѣ скажется. Ибо брюшина, ежели будетъ наскрозь ранена, къ другимъ частямъ присовокупляется, и съ оными ерастается, а край ее вмѣсто не сходятся; для того въ ономъ мѣстѣ великая крѣпость обыкновенно

С с

венно

венно не бываетъ. Сие все собственно къ ранамъ брюшнымъ принадлежитъ, прочее и въ лѣченіи и въ пищѣ тожъ самое быть должно, что въ другомъ родѣ ранъ я уже приказалъ. И другія внутренности, будучи внутри повреждены, особеннаго лѣченія не требуютъ. Понеже въ сихъ кромѣ того, что въ другихъ ранахъ дѣлать надлежитъ, ничего не записывать.



ЗАШИБЫ, УШИБЫ, УДАРЫ.

ДОСАДЫ, ПРИШИБЫ.

В Е К С А Т А.

§. 706.

Доселѣ ранъ лѣченія предложены были, а теперѣ къ УДАРАМЪ приступитъ надлежитъ, о которыхъ также нѣчто особенное знать должно. Досаждения, которыя у другихъ ушибами, ударами или пришибами называются, суть пѣла живаго часпи, по которымъ спрѣлою или другимъ нѣчемъ и жесткимъ тупымъ такъ ударено будетъ, что внутри и подъ кожей небольшія жилы бьющіяся и жилы возвращательныя различный сокъ носящія, раздѣрнутся, и сильно повредятся, отъ чего изъ нихъ сокъ, въ нихъ текущій, или вонъ выливается, или въ печеніи своемъ удерживается, и оспанавливается.

§. 707.

Того ради и въ досажденныхъ частяхъ пѣлипка по маленькимъ жилкамъ проходящія оспанавливаются, лишь заслоняющъ, и запоръ дѣлающъ, послѣ чего за-
всегда возженіе слѣдуетъ. Отъ чего можно заклю-

чить

чишь, что досажденные части къ вожженію весьма близки. Что же въ костяхъ подлинное вожженіе не бываетъ, хоть онѣ и часто ушибены случаются, ономъ выше. (35) я предложилъ.

§. 708.

И такъ досажденные мѣста бываютъ отъ вещей, снаружи такимъ же способомъ вредящихъ, какъ въ другомъ случаѣ раны дѣлаются (338*).

(*) Досажденные части наибольше бываютъ отъ тѣлъ жесткихъ. А когда и жидкое да съ большею силою въ тѣло, напримѣръ сифономъ ударитъ, или когда тѣло съ высоты въ воду низвергается, также части сильно ударяемы бываютъ, изъ того можно заключить, что досажденные части не отъ однихъ жесткихъ но и отъ жидкихъ дѣлаются. Также дѣлаются отъ сосанія, или, когда кожу ртомъ сосутъ, или къ ней чрезъ огонь приставляется банка: Ибо и отъ сихъ части багровыя и кровью густою подлитыя остаются. Но такія пѣтна и отъ другихъ и внутреннихъ причинъ рождаются, что особливо при различнородныхъ прыщахъ, и въ горячкахъ тѣхъ, которыя съ *εξαισθημοσι* бываютъ, усматривается. Часто въ сихъ горячкахъ, а наибольше въ заразительныхъ или зловредныхъ, кровь излишне будучи жидка и не стройна, въ малюхонкія жилочки бьющаяся прогоняется. У больныхъ цынготныхъ пѣтна бываютъ, понеже отъ крови нечистой, густой, и весьма остановчивой, жилочки бьющаяся маленькія запираются, и оная кровь въ жилы бьющаяся пасочныя прогоняется. А людей умирающихъ имѣющихъ оныя большія пѣтна сизы и темны дѣлаются, понеже кровь красная въ маленькія кожныя жилочки бьющаяся и жилочки кровевозвращательныя, жизненной силы лишившіяся и разслаблыя проходятъ, въ которыхъ она и не ходя послѣ того остается.

§. 709.

Инструментъ оный, который вредитъ, долженъ тупой быть, понеже стрѣла острая рану дѣлаетъ (341). Если досажденные мѣста будучъ съ раною, рана оная изможденною называется, о которой выше уже донесено (341, 350, 370, 375, 385, до 402, 462, до 487).

§. 710.

Не однимъ же способомъ части такъ досаждаемы бываютъ. Понеже ихъ иногда ударъ вредитъ, а иногда падежъ съ высоты. Также за досаждаемыя части почитаются тѣ, которыя сильно припискиваются, напрягаются, раздвигаются, для того сей порока родъ при вывиханіяхъ и переломахъ чаще обыкновенно случается.

§. 711.

И не одни сии различія имѣются, которыя отъ причины происходятъ, большія въ себѣ заключаютъ мѣста и части, которыя обыкновенно досажжены, или пришибены бываютъ. А сии свободно на два вида раздѣляются, по естѣ на внѣшній и внутренній. Если о первыхъ начать говорить, гдѣ будетъ кожа досаждена, туитъ дѣлается синево или багровой знакъ, которой Греки *εγχύμοσις* называютъ.

§. 712.

Εγχύμοσις же называется опухоль, на самомъ верху на кожѣ бывающая, которая сперва краснѣется, и послѣ сизовата дѣлается, и при которой ни боли великой, ни вожженія не случается. Дѣлается она, когда кровь красная, или въ тѣхъ жилочкахъ быющая, которыя пасокъ опредѣлены, или въ клепочки жирныя перельется, и изъ подъ сквозной кожи будетъ казаться (*).

(*) Если другая влажность, напримѣръ, пасака, отъ такой же причины въ жилы быющая иную мокроту несущія и нечувствительная, или въ жирныя ячейки, переливается, дѣлается также опухоль, но другого рода, напримѣръ *Οπίδυ* (Эдема); оный же отъ той же причины, т. е. отъ удара происходить можетъ. *Εκхимωσις* же въ другомъ случаѣ и отъ раны дѣлается, когда рана будетъ язва и наискось, и кровь текущая въ ячейки жирныя понудится.

Евз

ЗАШИБЫ, УШИБЫ, УДАРЫ. 421

Гораздо часто сѣ случается, когда при кровепусканіи одна сторона жилы кровевозвратительной будетъ прорѣзана, а другая ранена, или если и ежде кровепусканія кожа отъ лѣкаря не умѣренно натянута будетъ, и прорѣзы неровны какъ въ кожѣ такъ въ жилѣ, т. е. на кожѣ меньше, а на жилѣ больше будетъ.

§. 713.

Но когда будетъ сильный ударъ, а припомъ сильно зашибены будутъ мяса внизу лежація и другія части, тутъ бояться надобно вожженія, загнаиванія, Анпинова огня, чирья и фиспулы.

§. 714.

Какъ повреждено будетъ накостѣ [періостіумъ], оно вожжигается, и слѣдуетъ на послѣдокъ дичь костная [экзостозисъ], червопочина или гниль [каріесъ]. Если вся кость зашибена такъ будетъ, то вся она и порпится. О которыхъ всѣхъ приключеніяхъ до костей принадлежащихъ въ другомъ мѣстѣ писать присшойнѣ будетъ. Въ желѣзѣ тяжко ушибенной, или гной дѣлается, или она въ скиррѣ обратится, изъ котораго не рѣдко ракъ дѣлается. Если ушибена будетъ жила бьющаяся, послѣдуетъ аневризма (424). Если чувствительная жила тяжко ударена будетъ, она со всѣмъ недѣйствительна дѣлается, и чувство пропадетъ, и членъ, въ которомъ слабость начинается, изсыхаетъ. Если же она не множо досаждена, дѣлается сильная боль и пропѣженіе. Къ составу такъ ушибенному обыкновенно приключается великое вожженіе и боль, и оный иногда скорченный бываетъ, и остается ахиллѣ.

§. 715.

Отъ сихъ, которыя внутри и на высокихъ членахъ случающіяся, приступаю я теперь къ тѣмъ, ко-

С С З

торыя

торыя во внутреннѣйшихъ частяхъ и въ самихъ внутренностяхъ, ежели онѣ поколоты и пришибены, обыкновенно приключаются. Что случается, когда голова зашибена будетъ, выше уже я предложилъ (511 до 514, 518 до 526, 529, 530). О спановой жилѣ я ниже скажу. Глазъ ушибенъ будучи, вожженіе получаетъ, или красенъ дѣлается (284); И въ немъ иногда ипопѣонъ (321), а иногда подтѣкъ [суффузіо] родится, и вся зрѣнія возможность отъ него отъемлется. Ежели ушибена будетъ желѣза, изъ которой слезы въ глазъ идутъ, дѣлается скирръ, а для него σκληροφθαλμία (279). Ежели оная часть въ кушкѣ внутренномъ ударъ сильный получитъ, подъ которымъ проходъ слезный, или такъ называемый мѣшокъ слезный лежитъ, αγγίλωψ и αιγίλωψ здѣлаться можетъ, которыхъ вредностей толкованіе также въ другое мѣсто опнестъ надлежитъ.

§. 716.

Ушибеной же и раздавленной груди и брюху, также тяжкія бѣды случаются. Понеже иногда внутри великія жилы быющіяся и жилы крововозвращательныя, да и самыя внутренности перерываются и раздражаются, такъ, что по изліяніи всей крови скорая смерть воспослѣдуетъ. Въ селезенкѣ сіе часто случается, какъ то примѣчаніями дознались (*). Отъ такой же причины и внутри аневризма бываетъ, о чемъ я выше объявилъ (422, 424).

(*) Смотри селезенку разорванныхъ примѣчанія отъ ЮГ. ФИЛ. ШЕЙДА въ Аргенторатѣ 1720 года предложенныя и ЮГ. ФИЛ. ФУЗЕЛІА Диссерт. о порваніи Селезенки въ Ерф. 1696 года. Печенки разорванной примѣръ приводитъ ВИЛАРСЪ Курсъ де Хирургіе, Т. I. стр. 415.

§. 717.

Если же ударъ нѣсколько не такъ сильной будетъ, и человѣкъ такъ скоро не умретъ, то другія причины иногда послѣдуютъ, которыя пропязною смертию его уморятъ. Понеже при поврежденіи легкаго, человѣкъ начинаетъ кровью харкать, послѣ чего часто и чахотка [фтизисъ] остается. Переломившій грудную кость и ребры претяжкимъ страждетъ вожженіемъ. Кости сіи неплотны будучи также портыся, и худые чирьи производятъ. Когда печенка ушибена, дѣлается вожженіе или гепатитисъ, скирръ, желтая немочь [иктерусъ], чирей безверхушешной [абсцессусъ], болячка [улькусъ], поносъ желчный [флюксусъ гепатикусъ], водяная болѣзнь [идропсъ], сухотка [табесъ]. Не весьма рѣдкое дѣло и то, что и въ другихъ внутренностныхъ частяхъ, въ желѣзѣ пригожемясной, наипаче въ селезенкѣ, брыжейкѣ и въ маткѣ скирры родятся.

§. 718.

Напослѣдокъ также когда сильно ушибено и раздавлено будетъ брюхо, сильно во многихъ мѣстахъ брюшина раздается, и сальникъ и кишкы тягостію своею вонъ выпадаютъ. Сихъ погрѣшностей, которыя подъ именемъ килы заключаются, различности и лѣченія въ другомъ мѣстѣ я прополкую. Въ ятрахъ придавленныхъ и тяжко зашибенныхъ также дѣлается вожженіе, загнаиваніе, Антоновъ огонь, скирръ, саркоцеле [мясная кила], водяная кила [идроцеле], о которыхъ также ниже напишу.

§. 719.

Досажденные части глазами видѣть можно, хотъ на кожѣ цвѣтъ перемѣняется. (712) Приключается также

также жесткость. Иногда мѣсто ушибенное, гораздо мягче бываетъ цѣлаго мѣста. Первое дѣлается, ежели стекающіяся влажности въ маленькія пасоки опредѣленныя жилы быющіяся переливаются; ежели же кровь изъ порванныхъ жилъ быющихся и жилъ кровезовращательныхъ въ жиръ выпустится, то опухоль обыкновенно бываетъ мягче, и отъ перста удаляющаяся, когда опухоли подъ плотную и жилочувствительную перепонкою не будетъ.

§. 720.

Разсуждать надобно и о стрѣлѣ, которою человѣкъ ударенъ, и пошъ ударъ, какъ бы ни приключился, былъ ли гораздо тяжель, или не очень (531).

§. 721.

О внутреннихъ мѣстахъ ушибенныхъ и поврежденныхъ, достовернѣйшихъ знаковъ мы не имѣемъ, кромѣ тѣхъ, которые человѣку обыкновенно случаются, (533 до 536, 629 до 632, 655, 656, 660 до 669). Оное же знать еще должно, что въ головѣ (511), въ груди и въ брюхѣ не рѣдко бывающіе внутреннія части и самыя внутренности или потрохъ сильно повреждены, съ мѣстѣ пронупы, а иногда порваны и разодраны, хоть снаружи, или никакого знака, или только что маленькое синево казаться будетъ.

§. 722.

Чего же отъ досажденныхъ частей бояться и надѣяться можно, оное изъ теперь сказанныхъ разумѣется (712 до 719). Большую бѣду оказывающіе въ себѣ, части къ жизни человѣческой нужныя, ежели тяжко ушибены будутъ, понеже ихъ не легко дѣлать можно.

§. 723.

§. 723.

Досажденные и багровыя части такимъ же способомъ лѣчить надобно, какъ вожженные. Если кожа ушибена будѣтъ, и покажется, будто бы надобно бояться синева *εκχιμωσις*, оную отвратить можно тѣми средствами, которыя выше я предложилъ (62 до 64, 76 до 78). А гдѣ уже синевы [*εκхимосисъ*] здѣлалось, то средствъ сихъ не употреблять, а употреблять должно разбивающія (56 до 70, 79 до 83). Гдѣжъ опухоль очень жестка будѣтъ, или надлежащаго мягче, шупъ лѣкарства различно смѣшиваются, и тѣ, которыя мягчатъ, и другія, которыя разбиваютъ (80). Которая опухоль къ загноенію клонящаяся покажется, и уже въ ней нѣсколько гною будѣтъ, къ той умягчательныя требуются (89 до 101). Какія вещи на желѣзѣ ушибеныя прикладывать должно, о тѣхъ также въ другомъ мѣстѣ (113, 89 до 99) донесено.

§. 724.

А гдѣ синевы (*εκхимосисъ*) будѣтъ глубокое и великое, а особливо съ раною, шупъ должно ножъ употребить. Понеже надобно кожу разрѣзать, и стоящую кровь вонъ выпустить (477). Гдѣжъ подъ кожею, или и подъ другою и жильночувствительною перепонкою кровь скопится, оную опухоль разрѣзать, и кровь выцедить (521, 522).

§. 725.

Если внутренностныя части внутрь тѣла повреждены будутъ, оныя такимъ же способомъ лѣчить должно, какъ поступающъ съ пользою въ опивращеніи вожженія. Кровепусканіе, да и не единожды повтораемое (62 до 69) а при томъ, сверхъ голодности, воздержаніе за первыя лѣкарства почишающся.

Т ш

ОТІОКЪ

О Т Ю К Ъ.

Э Д Е М А.

§. 726.

Когда о многихъ опухляхъ съ вожженіемъ бывающихъ все сказано, теперь уже я перейду къ другимъ родамъ опухолей, которыя отъ древнихъ холодными называны были. Начну же я отъ Отѣка (эдемате) и отъ опухолей, которыя дѣлаются у тѣхъ людей, которыхъ вода межъ кожею бывающая больными дѣлаетъ.

§. 727.

"Оидѣма" имя естъ опухоли блѣдной, мягкой, холодной, и которая безъ боли и безъ знаковъ вожженія бываетъ. Ежели перстомъ подавишь, она вдавится, такъ, что по большой части ямка чрезъ нѣсколько времени на кожѣ останется. Отъ себя и отъ маленькаго чего нибудь обыкновенно начинается, долго и пошхоньку вырастаетъ.

§. 728.

Дѣлается, когда пасока или сукровица, сквозь невидимыя кожныя дырочки вонъ выпитишь намѣренная, или въ пасочныхъ да и въ сихъ еще маленькихъ жилахъ бьющихся и жилахъ крововозвращательныхъ, или въ сальныхъ ячейкахъ, или то, что во многихъ родахъ водяной болѣзни бываетъ, въ нѣкакомъ дуплѣ остановится. Понеже иногда самая кожа вспухаетъ, когда въ ее жилахъ бьющихся, сукровицу носитъ обыкшихъ, влажность останавливается. Того ради что бы кровному и пасочному жизненному движенію
и су-

и сукровицыну вонѣ испражненію ни препяпствовало, можетѣ отѣку случай подати (*).

(*) Отѣкъ [эдема] отѣ тѣхже самихъ причинѣ дѣлается можетѣ, отѣ которыхъ дѣлается возженіе. Понеже когда тѣлишка скрозь маленькія жилы бьющіяся кровеносныя протекающія, вовсе остановившя, и ежели кровь отѣ сердца въ движеніе приведенная съ великою силою къ сему мѣсту приступитѣ, она въ маленькія и для пасоки устроенныя, изѣ боку произведенныя жилы бьющіяся понуждаема будетѣ, дѣлается запорѣ, и подлинное да еще кровное возженіе (34). Ежели же текущія оныя тѣлишка въ концахъ жилъ бьющихся, которыя кровь принимаютъ могутѣ, не вовсе остановятѣ, однакожѣ гораздо не такѣ проворнымѣ движеніемѣ и остановивымѣ текущѣ, пасока отѣ крови отѣдѣляется, и большимѣ количествомѣ въ оныя маленькія жилы бьющіяся вбирается. А маленькія оныя жилы бьющіяся такѣ распянутыя отѣкъ дѣлаютѣ.

§. 729.

Чаще же отѣкъ дѣлается, ежели кровь не свободно скрозь жилы крововозвращательныя назадѣ течь можетѣ. Понеже всякой удѣ распухаетѣ, ежели великая жила крововозвращательная такѣ припискивается, что кровь хотя не вовсе остановившя, а однакожѣ скрозь ее трудно и больно будетѣ течь. Для такой причины у беременныхъ женщинѣ, у которыхъ подвздошныя жилы крововозвращательныя тягостію маткиною припискиваются, ноги пухнутѣ; тожѣ самое дѣлается и плѣмѣ, которые сидя въ каретѣ или на конѣ будучи путешествуютѣ, у которыхъ также крововозвращательныя жилы, по бедрамѣ въ низѣ расходящіяся, утѣсняются. Ежели къ костямѣ переломленнымѣ лубки и сукманы такѣ принаровлены будутѣ, что жилы бьющіяся приписнутся, такѣ опухоль дѣлается.

§. 730.

Какѣ же сіе случается, когда жилы крововозвращательныя къ возвращенію крови устроенныя, утѣсняются

ся такъ и отѣки дѣлаются , когда жилы кровевозвращательныя оныя маленькія , которыя пасоку въ себя вбираютъ , отъ какой нибудь причины припiskiваются и суживаются. Для того , ежели въ какой части желѣзы окруженныя , или также внутренности желѣзамъ подобныя пухнутъ , и скирромъ обовладѣваются , тѣло отъ такихъ опухолей не ровно бываетъ.

§. 731.

Однакожъ не отъ однихъ сихъ причинъ отѣкъ дѣлается , но почти чаще отъ испорченныхъ въ тѣлѣ соковъ , и предъ пропчими , отъ самой пасоки происходитъ. Понеже у которыхъ людей худое тѣла состояніе отъ желтой немочи , отъ гноя въ груди [эмпиэмы] , отъ великаго загноенія , отъ худыхъ и долговременныхъ болячекъ , также отъ самой чухотки , бываетъ , у тѣхъ сей опухоли родъ обыкновенно чаще случается. Оный также быть можетъ , когда тѣло долгою болѣзнію попорчено будетъ , или худыми и непристойными лѣкарствами отъ горячекъ , отъ короспы , и отъ другихъ немочей , иногда употребляемыми , изнурено , и преизлишнимъ кровепусканіемъ и другими вещми испражняющими , обезсилено и истощено будетъ , которое послѣднее въ огневицныхъ горячкахъ случается , когда съ излишествомъ кровь пускаютъ , и отъ того она алая крови часть пропадетъ , которая къ пріуготовленію и совершенію всѣхъ жизненныхъ соковъ весьма надобна бываетъ. Также какоюмѣ (худыхъ соковъ въ крови избыточность) и на послѣдокъ кахексія (худое тѣла состояніе) съ отѣкомъ дѣлается , когда какой человекъ чрезъ долгое время не воздержно , какъ въ кушаньѣ , такъ въ пишьѣ будетъ обращаться , и не-

обы-

обыкновенную и негодную пищу употреблять, повсядневно водкою крѣпкою, или сей подобными ликворами, которыми пасока понуждается, также много сырой и нечистой воды пить будетъ, и который повсядневно отъ печали будетъ мучиться и истаявать. Еще къ симъ опухольмъ предъ другими склоненъ бываетъ потъ, который тѣло свое лѣнностью и преизлишнимъ сномъ неповоротливымъ дѣлаетъ, и потъ, который потчасъ послѣ кушанья неумѣренно при свѣчѣ работаетъ обыкъ, у котораго ночью сыростью и мрачнымъ воздухомъ невидимая испарина сквозь кожу одерживается, и у котораго моча порядочно нейдетъ. Женщинамъ, у которыхъ мѣсячная кровь порядочно нейдетъ, и мужчинамъ, у которыхъ почечуй, кровью пещь привыкльй, незапно запирается; сіе раздупіе случается. Тѣло также пухнуть можетъ, ежели оно на сильномъ холодѣ, и на весьма великомъ морозѣ, которыми мокроты понуждаются, и сосуды перерываются, побудетъ.

§. 732.

Есть же въ потѣ нѣкоторое различіе. Опухоль, которая будучи перстомъ подавлена, ежели потчасъ опять приподнимается, значитъ, что влажность еще въ своихъ мѣстахъ и въ сосудахъ пасочныхъ содержится, ежели же опухоль мягкая будетъ, и которая перстомъ подавлена вдавливается, такъ, что обпекающая влажность, и то, что не давится, приподнимать будетъ, и ямка вдавленная долго останется, она показывается, что тѣ хранилища порваны, и влажность въ жирныя ячейки вылилась, который случай гораздо суровѣйшій есть. А весьма худый родъ есть, гдѣ по прорваніи тѣхже хранилищъ

Т ш з

вода

вода или въ голову, въ грудь или въ брюхо собирается, въ копорыхъ такъ колеблется, что стремление ся чувствовать можно.

§. 733.

Сии же опухоли, которыхъ всѣхъ общая есть преизлишняя влажности избыточность, различными именами разбираются, получаючи всякая себѣ имя отъ мѣста, въ которомъ она усилилась. Чаще всего ноги распухаютъ, понеже изъ нихъ жилами кровесовращательными кровь не безъ трудности въ верхъ поднимается, которыми опухольмъ настоящее и будто собственное имя есть опѣкъ (ѣдема). Ежели опухоль по всему тѣлу дѣлается лейкофлегматіа, и, ежели больше усилился, анасѣрка называется. Ежели голова распухаетъ, дѣлается ѡдрекѣфалон наружная, ежели внутрь въ голову вода скопилась, ѡдрекѣфалон внутренняя, ежели въ глазъ ѡдрекѣфалміа, ежели въ грудь, водяная болѣзнь грудная, ежели въ самое брюхо асцитисъ. Ежели въ пупкѣ вода стоитъ, ѡдрекѣфалон дѣлается, ежели же она подмошною шуляпкою спечется, и мѣсто ее будетъ межъ оными плевами, которыми ятра объемлются, оный порокъ ѡдрекѣфалон называютъ. Отъ сея опухоли отлична она опухоль, которая дѣлается тогда, когда самой шуляпкой мошонки плева клетчатая отъ шакогожъ скопища пухнетъ.

§. 734.

Много также несходства есть межъ опѣкомъ, который самъ отъ себя дѣлается, и межъ пѣмъ, который послѣ другой застарѣлой, тяжкой и сумнительной болѣзни приходитъ. Понеже опѣкъ, который самъ отъ себя начинается, и который отъ причинъ
мно-

многихъ случайныхъ , не весьма худыхъ дѣлается , часто самъ собою и безъ лѣченія проходитъ. И такъ у тѣхъ людей , которые сильное кровотеченіе претерпѣвши выздоровѣли , также и у беременныхъ , послѣ рожденія , безъ всякихъ хлопотъ исчезаетъ. Труднѣе же отъ него избавляться , ежели онъ съ другою тяжкою и долговременною болѣзнію т. е. съ изобильностію худыхъ соковъ въ крови [какохиміа] , съ худымъ тѣла состояніемъ [кахексія] , чахопкою [фпизи] , съ сухопкою [табе] , съ другими водяной болѣзнію родами , долгими и великими загнаиваніями бываетъ. Понеже безъ опасности сей послѣдній родъ испроверженъ быть не можешь , доколѣ излѣчена не будетъ оная болѣзнь , отъ которой онъ произошелъ. Ежели же болѣзнію прогнать не возможно , то и сихъ опухолей лѣчить ни какъ не можно , и для того оныя , когда чахопка и сухопка къ больнымъ придутъ , по большой части смертнѣ приближающейся предвозвѣстницами бываютъ. Отіокъ , который отъ лихорадки четверодневной худо лѣченной останется , прогоняется , ежели лихорадка опять возвратится. Ежели короста чрезъ употребленіе лѣкарствъ наружныхъ удержана , и отъ такого лѣченія здѣлался отіокъ , то наилучшій способъ есть , оную опять возобновить. Которые разслабленіе удовъ [арерипидемъ] наружными лѣкарствами лѣчить хотятъ , у тѣхъ гораздо часто опухоль остается никакимъ искусствомъ неиспощимая. Легче прогоняется отіокъ у людей молодыхъ , нежели у старыхъ , и лучше лѣтомъ нежели зимою. Часто оный отіокъ , который съ начала не трудно бы вылѣчить , ежели застарѣетъ , не безъ великаго труда прогоняется. Ежели при ранахъ случится , гной останавли-

вается .

васся. Никогдажѣ отѣкѣ кѣ хорошему загнаиванію не клонится, но въ немѣ, ежели его умягчительными вещьми лѣчипѣ будиѣ, дѣлаются худыя болячки и Анпоновѣ огонь.

§. 735.

А лѣчипѣ какимѣ способомѣ, оный по большой части отѣ познанія причинѣ производиѣ, на которыя потѣ, кто хочетѣ лѣчипѣ, завсегда смотрѣтиѣ долженѣ. Оный отѣкѣ, который отѣ причинѣ снаружи приключающихся начнется, никакого иного не потребуѣ вспоможенія, только то прикладывать, что обыкновенно прикладывается кѣ самой опухоли. А чтобѣ нѣги, по придавленіи жилѣ кровевозвращательныхѣ, не пухли, запрещается обвязка, и повелѣвается употреблять оный голенища родѣ, который уже (168) я выхвалилѣ. Сіе голенище также весьма способно и весьма полезно тѣмѣ, у которыхѣ нѣги послѣ великаго вожженія, послѣ рожи и послѣ залѣченія болячекѣ пухнутѣ. Понеже ослабляю кожу, надобно всю обвязкою хошѣ не очень, однако крѣпко стягиваѣ.

§. 736.

У шѣхѣ, которые водяною болѣзною подкожною Аназарка называемою, спраждиѣ, ежели она отѣ холоду здѣлалась, надлежитѣ надѣ лодышками кожу поразрѣзывать, довольно глубокими язвинами, дабы чрезѣ оныя завсегда вода вытекала. Прибавляѣ кѣ тому надлежитѣ нѣкоторые тѣлесныя труды, и особливо, потиранія повсему тѣлу сукномѣ окуриваемымѣ, и приличное кушанье, которыми всѣми тѣло по испражненіи воды укрѣпляется, доколѣ въ прежне состояніе придетѣ.

§. 737.

§. 737.

У которыхъ вода въ грудь, или въ брюхо собирается, и попрохи попортяшся, пѣмъ сей лѣченія способъ часто облегченіе дѣлаетъ, что человекъ, который безъ крайней трудности дышать не могъ, а выпустивши такъ воду, долго, иногда же чрезъ годъ и два въ сей болѣзни животъ свой продолжати можетъ. Часто мокрота такимъ же способомъ болячками выходитъ, копорыя сами собою и на ногахъ обыкновенно дѣлаются. Но въ такихъ случаяхъ, то спараніе употреблять должно, чтобъ болячки гніючи вдаль не зашянулись, и чтобъ послѣ ихъ Антоновъ огонь не приключился. И такъ, ежели усмотрѣно будетъ, что болячки ширѣ дѣлаются, прикладывать воду раннюю, смотря по обстоятельствамъ, смѣшавъ съ эссенціею янтарною. Ежели же черненко въ нихъ уже будетъ, и оная чернота помаленьку болѣ дѣлаться начнетъ, гнилое полегоньку сѣбѣдаетъ, аква фагаденика. Бываютъ же болячки сіи иногда и чисты, однако сънесперимую болью и свербежемъ. Тогда всего того, что бы ныскалось подавляющее и гнилое мясо сѣбѣдающее, не употреблять, а должно прикладывать пряжу сухую, и оную почаще перемѣняти, чтобъ отъ оной, которая уже мокроты напилась, болячки больше не рѣбли. А отъ великой боли, также нѣкоторыя лѣкарства боль ушояющія (парегорика) прикладывать можно.

§. 738.

Ежели кость переломлена будетъ, и удъ оный отсечетъ, то накладывать и принаравливать суконки и лубки, чтобъ жилы кровезовращательной не придавить. У раны отпѣкомъ запѣткой край должно поразрѣзывать, а прикладывать самыя сильныя вещи

У у

гною-

гноющія , утопрѣбляя припомѣ съверху вещи разби-
вающія , съ виномѣ хорошимѣ вареныя.

§. 739.

Отпѣкъ же , который отпѣ испорченой пасоки
дѣлается , прогоняется иными пособіями , которыхъ ;
какъ то мѣди и учанѣ , отпѣ нихъ спрашивать должно.
Ежели внипренности еще не повреждены , предѣ проп-
чими дѣйствительна бываетъ сквила , копорую или
съ селипрою сперши или съ виномѣ сваривши давать
можно. Въ семѣ также случаѣ пособствуютъ теплицы
Каролинскія , которыми сокъ истончается , и вонѣ
изгоняется. Ежели оный сокъ у женщины такой бу-
детъ , у которой мѣсячина не идетъ , или у мужчины
у котораго почечуй остановился , то должно оныя
здравія подапельныя испражненія возставитъ. Ежели
лихорѣдка , а особливо четверодневная , лѣкарствами
вскорѣ и не порядочно данными одержана , оную опять
какъ можно дѣлать , а по весьма хорошо можно
дѣлать , смѣшавши проносныя съ разрѣшительными
налить виномѣ , и его повседневно по спакану при-
нимать. Полезны также пилюли Бехеровы , которыхъ
нѣкоторое время понѣскольку глотать.

§. 740.

Кушанье должно быть сухое , безъ похлѣбковъ ,
хлѣбъ бѣлой сухой , или сухари , мяса жареныя , пря-
ношью , а наибольше инбиремѣ здобленыя. Больному
для утоленія жажды всякое питье запретить , а да-
вать понемножку вина , да и то хорошаго и крѣпкаго.
Сии злключенія особливо требуютъ , чтобъ не часто
пить и долго терпѣть , а много такихъ есть , ко-
торыя сами , вовсе не воздержны будучи , погибаютъ ,
шѣжѣ

пѣжѣ самыя, ежели бы по наставленіямъ медицинскимъ поступали, могли бы живы оспасться.

§. 741.

Ежели послѣ коросты наружными лѣкарствами удержанной, отпѣкъ останеся, оный излѣчить можно даваніемъ декоктовъ и лѣкарствъ кровечистительныхъ, и порошками изъ спитію діафоретико и сульфуре, отъ которыхъ короста опять приходиль.

§. 742.

Послѣ сильного крови печенія отпѣкъ наибольше пищею и похлѣбками излѣчивается, употребляючи при томъ пощираніе, и сколько мочи будетъ, нѣла движеніе.

§. 743.

Когда же такимъ способомъ оный порокъ, отъ котораго отпѣкъ здѣлался, поотвращенъ будетъ, коснуться надобно и до пѣхъ вещей, которыя снаружи приложены будучи сѣи опухоли излѣчивають. Но противъ таковыхъ весьма надобно жаркое употреблять. Ноги въ теплый песокъ, или въ теплыя опруби класть, и такъ по пѣ производить. Въ опруби примѣшивають можно корень бріоніе, травы абсинтіи, сабине, руше, персикарїе. Прикладывають также должно густыя припарки, но оныя должны быть суховаты; а не такъ какъ въ другое время мокроваты припарки обыкновенно дѣлаются. Составляють оныя можно изъ муки самой мѣлкой, изъ травы руше, персикарїе, сабине, агримоніе, ценнаурїи минорисъ, съ водою немореноизвѣстною. Ежели опухоль начнетъ уменьшаться, и кожа поослабнетъ, пушъ шереніе и обвязка пособствуетъ (168, 735) и прикладывають еще сверху суконки въ винѣ

У у 2

кра-

красномъ горячемъ , съ липпаргиріемъ съ смолами мирре, элеми, аниме, вареномъ, обмакивая и выжимая. Мокрота въ опіокѣ стоящая, ежели не весьма будетъ возбужденная, иногда расходуется, чрезъ потѣніе въ ваннѣ или банѣ сухой спиртомъ производимое. Сильно также сжимаютъ щеплицы Каролинскія снаружи употребляемыя. Или когда щолокъ потѣ, который послѣ оныхъ щеплицъ, какъ выдохнется, съ солью остаётся, въ полосканія ножныя примѣшивается.



ВОДЯНО-ГОЛОВНАЯ БОЛѢЗНЬ.

и дроцефалумъ.

§. 744.

Водяно-головной болѣзни [идроцефали] два главнѣйшіе сущаго рода. Понеже иногда кожа, которою голова покрыва, водою наполняется, и дѣлается опухоль, въ ужасную величину вырастающая, въ которой будто бы въ стеклѣ или въ рожкѣ, вода сквозь кожу свѣтлится (*). Рѣдко вода бываетъ межъ черепомъ головнымъ и плесою начереполовною; она ежели случится, то голова не весьма распухаетъ, но подавивши будто коженой мѣшокъ наполненный и крѣпко завязанный, отпрыгиваетъ.

(*) Сей родъ нарисованный смотри въ руишневомъ тез. Ц. таб. III. снес. стр. 23.

§. 745.

Ежели же въ самую голову вода скопится, она также распухаетъ, только съ нѣкоторою жесткостью лобъ поднимается, глаза страшны бываютъ, выпучены и гнойны (*). Иногда голова отъ опухолей не

не ровна бываетъ. Понеже въ мягкихъ оныхъ костныхъ ссечкахъ, а особливо въ той, копорая межъ запылкомъ и коспymi пѣмянными еспь, опухоли высоко поднимаются, копорыя такъ выроспаютъ, что напослѣдокъ опъ головы будупъ висѣть (**). Чаще же воды въ самые мозговые желудки скапливаются.

(*) Смотр. фигуру въ М. А. СЕВЕРИНЪ о Абсцессахъ весьма недавно примѣченныхъ гл. IX. стр 210.

(**) Смотри въ руиш. Примѣч. Анатом. Хирург. Прим. 52. стр. 69 фиг. 45.

§. 746.

Если вода внутрь самого мозга головного, и въ его желудочки соберется, то и жесткая мапь и съ нею перепонка начерепоголовная растягиваются, а припомъ и самая кожа приподнимается такъ, что водяно-головная болѣзнь [идроцефалумъ] будетъ казаться, будто бы изъ обѣихъ родовъ внутреннего и наружного составлялась.

§. 747.

При внутренней временѣ еще другой порокъ случается, то еспь спина двойная [спина бифида]. Понеже когда вода въ переднихъ мозговыхъ желудкахъ соберется, оная акведуктомъ Сувлевимъ въ третій желудокъ проходитъ, а изъ сего ежели ей никакого прохода скрозъ воронку не будетъ, скрозъ заслоночку большенскую мозговую продираясь въ четвертый просядетъ. На послѣдокъ изъ сего она себѣ всякими способами дорогу дѣлаетъ, въ оное позвоношное дупло, по которому спановая жила, совокупленная съ головнымъ мозгомъ, въ низъ проходитъ. Сие въ самыхъ родахъ случиться можетъ, во время которыхъ голова успѣетъ мапошнымъ крѣпко спискаивается (*).

У у з

трехъ

трехъ косточекъ состоить, а промежутки хрящиками спаиваются. Сверхъ же того назади на позвонкѣ хрящикъ есть, гдѣ у взрослыхъ людей отростки бывають, спинными или остистыми называемые. Сей молоденькой хрящикъ у ребятъ, и какъ кажется, еще и у незрѣлыхъ и въ маткѣ находящихся младенцовъ, отъ прибылой мокроты такъ давливается, что оныя молоденькія и восковыя косточки межъ собою раздвигаются, а кожа отъ мокроты, подъ нею находящеюся, приподнимается. Этоиъ случай такихъ опухолей первѣйшею причиною мнѣ показывается (**). А припомъ можно ли спинѣ разщепливаться, ежели младенецъ въ пѣсной маткѣ, такъ сложенъ, что какъ его часточки сѣдалищныя, такъ и ножки сильно сжаты бывають, сумнительно мнѣ кажется (***). Частю у ребятъ съ сими опухолями рожденныхъ, ноги бывають разслабленны, кривы и къ внутренней сторонѣ завернуты. А сіе и для того случается можетъ, что спановая жила, гдѣ изъ нее жилы чувствительныя къ членамъ нижнимъ принадлежащія выходятъ, отъ мокроты давимая, разслабленною дѣлается. Въ членахъ же разслабленныхъ, понеже не ровно роспуть, фигура дѣлается такая, какую можетъ быть онѣ отъ положенія, въ какомъ были въ маткѣ, и получають.

(*) Смотр. у руишя въ Епист. проблем. XII. стр. 24.

(**) Изъ сей опухоли, по прорѣзаніи, больше выходитъ мокроты много свѣшлой, а младенцы, по открытіи оной, скорѣе умирають. А что сей опухоли родъ дѣлается отъ преизлишества въ голову стекающихся водъ, потому можно знать, что весьма часто съ водяногловною болѣзью (идроцефало) бываетъ. А сверхъ того чрезъ опыты изслѣдовано, что тотчасъ много головной опухоли удавалось, когда опухоль на поясницѣ прорѣзывана и вода выпускаема была. По залѣченіи же опять оной раны, головная опухоль подѣ

подлѣ глаза выросла. Смотри. ЮГ. Корн. бруннера Прим. въ Ефем. Н. К. Деят. III. А. 1 Прим. 152 стр. 149 и далѣ. Снес. также Деят. II. А. 2 Прим. 158 стр. 363; а другія многія, въ тѣхже книгахъ находящіяся примѣчанія оставляю. Изъ сихъ весьма видно, что сія опухоль съ водяногловною болѣзнію (съ Идрокцефаломъ) бываетъ. Рисунокъ оставили ТУЛПІЙ примѣч. въ кн. III. гл. 30. ФАНЪДЕРЪ ВІЕЛЬ Сопп. II. Прим. 34. РУИШІЙ Прим. Анат. 34, 35, 36, фиг. 36, 37. Онъ такіяжѣ опухоли и на запятыи и на самомъ кончикѣ кости крестцовой видѣлъ. БИДЛОО о кости рѣшетчатой и жилахъ чувствительныхъ обонятельныхъ поврежденныхъ въ Опп. стр. 187. АПІНЬ въ Ефем. Н. К. Деят. III. А. 9 и 10. Прим. 180. и Кар. Фридер. ГИШТЕТЕР. тотже случай описываетъ, въ Диссер. оспинѣ раздвоенной въ Аалсдорфѣ 1703 изданной. Многія также и симъ подобныхъ опухолей и рожденій чудесныхъ изображенія находятся въ ТИТСИНГІЕВЫХЪ и УЛГОРНІЕВЫХЪ писаніяхъ. Сюда принадлежатъ ЮГ. САЛЗМАННА рѣчь о опухоляхъ нѣкоторыхъ сукровишныхъ наружныхъ. Въ Аргенш. 1719 года.

(***) Великому здорѣю объ этомъ дѣлѣ межѣ собою имѣли два Амстердамскіе Лѣкари АВР. ТИТСИНГЪ и ГЕНР. УЛГОРНЪ. Нѣчто въ томъ причиняющъ можетъ положеніе младенцовъ въ маткѣ, а частѣйшая сего порока причина есть вода въ голову или въ хребетную кость всакинувшая. Многіе, матери беременной мечшани и привидѣнія въ мысли ихъ вперившаяся, будто бы единственною причиною признаваютъ. Недомыслимыхъ же и непостижимыхъ причинъ изслѣдываніе тогда вовсе бываетъ излишнимъ, когда очевидная, и должноствовало бы еще изслѣдовать, уже наружи явственная.

§. 748.

А голова надувается, ежели кровь жилами кровесовращательными сдавленными возвращаться назадъ не можетъ (729), или также, ежели внутри воронка и другіе пасочные пуши какимъ ни будь образомъ засариваются (728). Сей же болѣзни родъ только что младенцамъ приключается, у которыхъ ежели мозгъ отъ мокроты растягивается, черепа головного кости, мягкія спайки имѣющія, раздаваться могутъ, и такъ вся голова раздуется. А у взрослыхъ отъ тойже самой причины дѣлается черная немочь, поспрѣль, [апоплексія], лешаргъ [сонъ глубокой съ

сѣ горячкою и бреженіемъ]. Также еще жилы крове-возвращательныя яремныя не рѣдко пуповиною въ маткѣ запрягиваются. А то обычно случается, ежели устье узкое матошное младенца раждаемаго шѣйку перехватитъ. Пасока же порпится, когда мать шѣла худое сложеніе имѣетъ, ежели отъ преизлишней жадности, больше, нежели бы надлежало, л кушаніевъ, которыя хорошихъ соковъ въ себѣ не имѣютъ, и густую мокроту производятъ, жрѣтъ (*).

(*) Водяно-головную болѣзнь [идроцефалумъ] у дѣвочки 14 лѣтъ здѣлавшуюся отъ мазанія на головѣ шолудѣй мазью составленною изъ мышьяка и изъ сѣры, смотр. въ Ефемер. Н. К. въ Сопн. I. и II. Ярим. 157 стр. 323. у дѣвочки 4 лѣтъ, которая изъ мольки на полѣ головою уронена, водяно-головная болѣзнь [идроцефалумъ] здѣлалась, и послѣ какъ умерла, проѣзавши опухоль нашли черепъ головной проломленъ. Смотр. ИДО ВОЛФІЕВО Примѣч. XIV. стр. 47. опухоль также, которая водяно-головною болѣзнию показываться можетъ, дѣлаетъ обыкновенно дѣлаетъ безбожные обманщики Смотр. ГИЛДАНА Сопн. III. Прим. XVIII стр. 199.

§. 749.

Водяно-головной болѣзни наружной, и отъ причинъ наружныхъ обыкновенно случающихся, произшедшей, при самомъ началѣ лѣченіе весьма не трудно. Ежели же болѣзнь будетъ застарѣлая, и сѣ худымъ шѣла соспояніемъ, оной лѣчить ни какъ не возможно. И внутренняя водяно-головная болѣзнь лѣченія не требуетъ.

§. 750.

Лѣченіе оныхъ наиболее отъ Медиковъ зависитъ. Гдѣ же что здѣлать возможно, потчасъ въ томъ пособствовать должно. Младенцамъ давать можно оксимель сквиалипикумъ, который шѣмъ по-собитъ, ежели онъ блеваніемъ много мокроты вонъ вы-блуетъ.

блаеть. А для проноснаго дается радикс ѱялле , съ киселькомъ или съ кашкою смѣшавши , или резина ѱялле съ мигдадами стертая , также сиропъ де спина цевина , де скорзонара кумъ рабарбаро , которыя почаще и не пропускаючи многихъ дней употреблять должно. А во дни протчія непроносныя , въ кушаньѣ прикладывають можно радицемъ ирсосъ флорентине. Всѣ также вещи мочу гонющія , понеже соки попорченныя испончевають , туть полезны. Для ипого дають можно , воду петрозелини , фрагорумъ , пакожде и сокъ миллепедарумъ сивьвестріумъ , съ виномъ размѣшавши.

§. 751.

Между же симъ умѣренность во всемъ употреблять , чтобъ сила сохранена была. Кушанье дають надлежитъ безъ вещей жирныхъ , клейкихъ , пучащихъ и скисающихся. Наилучшими признаваются похлѣбки мясныя съ сухарями бѣлыми , и пиво , много хмелю , въ себѣ имѣющее. Для питья также полезенъ декоктъ лигни санкти ; а жажда предъ прочими туть весьма надобна.

§. 752..

Когдажъ опухоль убавляться начнетъ , повседневно дѣлають переніе по нѣсколько разъ днемъ холстинами горячими и накуреными. Можно также въ винѣ красномъ и крѣпкомъ варить коренья ирсосъ флорентине , бріоніе , траву абсинтіумъ , рупамъ , мабранама , серпиллумъ , пулегіумъ , росъ маринумъ , и въ ономъ суконки обмочивши и выжавши на голову прикладывають. А къ концу къ симъ прибавлять еще можно , подавляющія , и между оными корень торментилле , биспорте , траву , алхимилламъ , миллефоліумъ. Многие все

ф ф

сіе

442 ВОДЯНО-ГОЛОВНАЯ БОЛѢЗНЬ.

се въ щолокѣ варящѣ сѣрномѣ , но оное мнѣ не безопаснымѣ показывася. Кожу также обвислую весьма хорошо прижимаетѣ и черепа головногогѣ кости вмѣсто свдигѣ оная обвязка , въ два свитка скапаная , голову туго обнимаетѣ , а Капелюшѣ называся.

§. 753.

Ежели же сими средствами опухоль не разбиваетѣся , то употребить въ дѣйство и ножѣ. Запылокѣ прорѣзывается , или желѣзомѣ разкаленнымѣ прижимается. Однакожѣ всего лучше въ прорѣзаную кожу , чѣтобѣ она не очень скоро вмѣсто сошлась , нипку въ нѣсколько разѣ сложивши , и плотно въ мѣстѣ ссучивши продѣть , и подважды въ день передергивать , отѣ которой чѣтобѣ изѣ раны и вода выпекала и гной дѣлался. Смотрѣть же должно , чѣтобѣ Анипоновѣ огонь въ болячкѣ не дѣлался , и чѣтобѣ оный сѣ погибелью вдаль не расходился.



ВОДЯНО - ГЛАЗНАЯ БОЛѢЗНЬ.

ИДРОФТАЛМІА.

§. 754.

Водяно-глазная болѣзнь [идрофтальміа] дѣлается , ежели въ глазѣ жилочки кровевозвращательныя чистый и свѣтлый сокѣ поглощающія засорены бываютѣ. Глазѣ распухаетѣ , да еще сѣ нѣкоторою болью , такѣ , чѣто онѣ вѣками закрываться не можетѣ. А то дѣлаться можетѣ отѣ многихѣ причинѣ , наипаче же отѣ тяжкаго удара , и ежели лѣкарства подавляющія чрезѣ долгое время прикладываны будутѣ. Глазѣ надобно проколотѣ иглою , ножечкомѣ обоюднымѣ

или

или другимъ инструментомъ , который пробочку имѣетъ къ себѣ принаровленную , скрозь каковую у спраждающихъ водяною болѣзнью вода изъ брюха выпускается (прескваръ). Оный же инструментъ , который плену матерую и ягошную проходить долженъ , къ тому мѣсту приставить и въ глазъ опускать надлежитъ , скрозь которое иглу просавывають , когда сю подпѣкъ лѣчимъ бываеъ. Оное мѣсто естъ почти на срединѣ межъ пленою роговою и угломъ къ виску близкимъ , однакожъ къ пленѣ роговой поближе , и нѣсколько пониже. Вода выпускается , и какъ когда глазъ опадѣтъ , то промежъ вѣками опустить можно , пузыря часпачку съ нѣкоторою мастью (323) , къ которой еще прибавить можно жиръ яхиднинъ [акзунгіамъ виперинамъ]. А снаружи надлежитъ глазъ нѣсколько потуже приписнуть , или наложенными многими суконками и обвязкою , или орудіемъ въ другомъ мѣстѣ уже отъ меня предложеннымъ фиг. XIII. (589). Надобножъ еще , и по залѣченіи раны , глазъ чрезъ долгое время такъ завязанный содержать , чтобъ опухоль опять не возвратилась. Съ ними давати должно лѣкарства мочу гоняща , а особливо сокъ миллепедарумъ , силвеспріумъ съ крѣпкимъ и хорошимъ виномъ , накрожде яинъс и поклѣбки виперарумъ.



П Р О Б О Д Е Н І Е

П А Р А Ц Е Н Т Е З И С Ъ .

§. 755.

У которыхъ брюхо отъ воды напрягается у
 лѣхъ оная вода иногда между брюшиною и между
 Ф ф 2 мыш-

мышками, брюшными, бываетъ. Сей родъ больше боли въ себѣ имѣетъ, а не такъ худое тѣла состояніе бываетъ какъ въ водяной болѣзни, внутри брюшной. У женщинъ часто пухнушъ, яишники или яишныя гнѣзда, послѣ котораго порока обыкновенно, водяная болѣзнь, внутри, брюшная [асцитисъ] слѣдуетъ (*). Чаше же множесиво, воды въ брюхо собирается, копорая, водяная болѣзнь асцитисъ называется. Иногда сію излѣчить можно, выпусценіемъ воды. Не всѣжѣ въ сей болѣзни, такимъ образомъ, вылѣчиваются, но только люди сильные, и которые во все горьки не имѣютъ. Ибо, у которыхъ печонка и другія, внутренности повреждены бываютъ, и худое тѣла состояніе и испорченъ желудокъ, такіе къ сему лѣченію, неспособны, и лѣченіе, часто, поскорѣе, смерть, имъ, приключаетъ. А то наи омыне, опъ того случается, когда болячка будучи въ той, части, по приключеніи, скрозъ, зѣланный, прорѣзъ, воздуха, начнетъ, рѣпъся. Однакожъ иногда, ежели, брюхо, такъ, велико, вздуется, что, надобно, опасаться, дабы, по, пресѣченіи, всего, движенія, прсграды, грудобрюшной, больной, со, всѣмъ, не, задохся, оно, нѣкопоре, облегченіе, бѣдному, больному, зѣлаетъ. Да, и у, сильныхъ, людей, водяная, болѣзнь, брюшная, не, однимъ, симъ, дѣйствіемъ, вылѣчивается. Понсже, выпущеная, мокрота, не, болѣзнь, вовсе, искореняетъ, но, лѣченію, мѣсно, дѣлаетъ, копорому, она, будучи, въ, брюхѣ, препяисивуетъ.

(*) Смотр. рѣчъ ЮСТА, ОЕОЛОРА ШОРКОПФА, о водяной болѣзни въ Яишникѣ женскомъ, въ базил. 1685 году. АДАМА БРЕУДЕЛІА, о водяной болѣзни въ Яишникахъ женскихъ, въ Витеб. 1701 года. ЮГ. ГУЛДРИКА, ПЕЙЕРА, о Яишникѣ, водяно-болѣзненъ, въ мѣртвомъ тѣлѣ, дѣвическомъ, найденномъ, въ базил. 1719 года. ПОЛИКАРПА ГОТЛІБА, ШАХЕРА, о дѣвицѣ, водяною болѣзвью, страждущей, послѣ, прсводенія, брюха, ватрянисью, зловердною, [пурпура, малигна] умершей, въ Липси, 1725 года, и НИКОЛАЯ ВИЛЛІА, о ужасной брюшной величинѣ, въ базил. 1731 года.

§. 756.

Предъ симъ хирургическимъ дѣйствіемъ, нѣсколько во-поработать должно больному. Легонькое похаживаніе, ношеніе, громкое читаніе, за работу почитается. А ежели человѣкъ частокашляетъ, лѣченіе бросить должно. Понеже опасаться надобно, чѣмъ послѣ выпущенія воды, во время кашленія духъ не вышелъ. Лѣченіе такъ распоряжается: больной навзничъ, на постелѣ ложится, такъ, чѣмъ на потѣ, который прокалывать бѣтъ, нѣсколько наклонился. Инструментъ, который въ брюхо впускается, имѣетъ трубочку серебряную, изъ которой оное шило острое въ ней находившееся вонъ вынимается, а сама трубочка въ брюхѣ остается, чѣмъ чрезъ нее вода выпекла. Должно предъ почитать Инструментъ потѣ, который не очень толстъ, но нѣсколько поплоче. Прокалывается жѣ обыкновенно въ потѣ мѣстѣ, гдѣ середина между пупкомъ и между остью верхнею коси: подвздошной находится. Понеже не надобно повредить мышкѣ прямой, подъ которою жила бьющаяся верхбрюшная, и которая изъ плотнаго и жильноувеличеннаго пространства мышечнаго сосиситъ, итакже и черты бѣлой, и оной жилы сухой, которая межъ полого идущими и прямыми мышками находится. Также прилжно смотрѣть, чѣмъ инструментомъ какой жилы кровезовращательной не проколеть, которая темную кровью начиненная свободно видѣть можно. Инструментъ въ то время, когда къ кожѣ прикладывается, нѣсколько къверху должно наклонить, а когда снѣтъ уже проколеть, тогда его полгоньку повернуть, и такъ отвезти надобно, чѣмъ онъ больше на нѣтъ часи оперся.

§. 757.

Многіе лѣченіе раздѣляютъ , и не всю воду разомъ выцеживаютъ , но трубочку въ ранѣ оставляютъ , и оную пряпочною запыкаютъ. Понеже опыты научили , что у копорыхъ вся вода выцеживается , а особливо ежели оной великое множество будетъ . иногда въ самомъ дѣйствіи обмирая умираютъ. Но сіе отвращается такъ , когда воду выпускаютъ , брюхо обвязкою спягиваютъ. Обомлѣваетъ же больной для того , что духу въ себя втягивать не можетъ , понеже по выцеденіи воды чревные мышки весьма расслабляя внутренноспей припискивать не могутъ , и преградъ грудобрюшной въ движеніи пособствовать. Также большія жилы бьющіяся и жилы кровевозвращательныя , по брюху внизъ сходящія , водою сильно давленныя , также разшириваются , копорые всѣ дыханію препятствуютъ , и соковъ окружное печеніе удерживаютъ. Но ничего опасаться не должно , ежели нѣблго обнятою холстиною сжимается (*). Однако , ежели больного человека малосиліе не позволяетъ , чтобъ вся вода выпущена была , то потчасъ и трубочку вонъ вынуть , и на рану обмоча и выжавъ въ водѣ ранной пряжу обвязать должно. А завтрашняго дня опять инструментомъ съ трубочкою въ другое мѣсто проколотъ , и ежели еще нѣсколько тамъ воды оспалось , вонъ выпустить можно. Ничегожъ хуже не находится , какъ то , ежели воздухъ сквозь трубочки до внутренноспыхъ частей пройдетъ , который внутреннимъ частямъ незнакомъ и вредителенъ. Обвязку также послѣ лѣченія долго носить надобно , а припомъ употреблять теренія , холстинами накуреными. Что еще къ лѣченію надобно , оиѣ Медиковъ того можно научиться.

(*)

(*) Смолр. ІО. ГЕНР. ШУЛЬЗЕ, Диссерт. о механическихъ мышцахъ чревнойъ, въ Галѣ, 1736 году §. 24 стр. 20.

(**) Особенную обвязку описалъ и фигуру напечаталъ АЛЕКСАНДРЪ МОНРО въ тѣхъ Медицалъ Ессайсѣ Вол. I. стр. 214.

ОПУХОЛИ, КОТОРЫЯ ВЪ СВОЕЙ ОБОЛОЧКѢ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ.

ТУМОРЕСЬ, КВИ, ТУНИКА СУА ИНКЛЮДУНТУРЪ.

§. 758.

На головѣ, на вѣкахъ и на всякой почти плесной часточкѣ дѣлаются шишечки и опухоли, которыя отъ маленькаго начинаются, и долго по маленьку распухаютъ; почти безъ всякой боли бываютъ, и въ своей оболочкѣ заключаются. Мѣсто имѣютъ въ оболочкѣ сальной и клетчатой; чего ради за рубкосиль почесать нельзя, что онѣ и во внутреннихъ мѣстахъ и во внутренностяхъ дѣлаются.

§. 759.

Имѣютъ межъ собою различности, но посредственные, для чего различными и именами означаются, однакожъ не различно-родно лѣчатся. Опухоль мягкую и уступчивую, въ которой мокрота мягкая или жидкая, воску или меду подобная, и копорая отъ придавленія кругомъ отекаетъ, мелжигу имануюнѣ. Ежели въ опухоли жесткой и упругой матерія будетъ больше сѣдшаяся и на кашу нѣсколько похожая, а иногда и жеще, атерума называется. А Σтеатомата слывутъ, въ которыхъ нѣчто тучное держится, такъ что и кожа надъ шюю матерією кажется похлябываетъ.

§. 760.

Въ сихъ опухоляхъ временемъ и иное нѣчто бываеѣ. Находяся въ нихъ пузырьки мокротою не такъ густою, которая отъ огня расплавляется, исполненные, которыхъ *удатида* обыкновенно называютъ. Иногда въ плѣнчкѣ подлинный жиръ бываеѣ. Иногда въ такой же шишечкѣ или пухлинкѣ на кашку или на кисель схожая и густая мокрота и жирная содержитсяъ, или изъ двухъ родовъ, изъ аэромы и спептомы составлена бываеѣ (*). Нахаживаны также были иногда нѣкакія несродныя вещи, войлоки, камушки, волосы, кости и другое (**).

(*). Я нѣкогда гораздо немалую видѣлъ такую шишку у молодца шестнадцатилѣтняго. Она на лопаткѣ сперва началась, сколько я выпросить мѣлъ, отъ людей, которые наружными лѣкарствами согнаны были. Опухоль, которую съначала разными лѣкарствами лѣчить покушались, какъ съ жулакъ величиною выросла, и безъ всякой трудности могла бы искоренена быть, поручена въ лѣченіе мужику деревенскому и отважному тупцу. Тотъ пахарь сказалъ, что опухоль сѣю расмягнуть должно, которую очъ безъ сумнѣнія за чирей безвертущешной почелъ, и прикладывалъ къ ней чрезъ гораздо долгое время ветчину. Между же тѣмъ какъ опухоль весьма велика выросла, то онъ склонять началъ, что ужъ время опухоли прорѣзать. И для того съ нижней стороны въ опухоль всадилъ ножъ превеликой, и какъ очый вонъ выпадалъ, эдѣлось превеликое крови теченіе, отъ котораго оной же бездѣльникъ испужался. На послѣдокъ кровь остановилась, и меня позвали. Я пришедъ нашелъ человека отъ теченія крови ослабѣлаго, и опухоль ужасной величины, которая не только одну лопатку, но почти весь хребетъ обняла. Не трудно было сказать напередъ, что будущее лѣченіе суетное будетъ, и бѣдный человекъ, понеже онъ неправильно съначала лѣченъ, ужъ вылѣченъ быть неможеѣ. Другихъ лѣченію вданный больной спустя нѣсколько времени издохъ умеръ. А понеже мѣсто, гдѣ онъ жилъ, за нѣсколько верствъ отъ нашего города отдалено было, прислали ко мнѣ опухоль отъ тѣла отрѣзавши. Хотя же изъ него почти вся мокрота выдавлена была, однакожъ въ ней всеѣ было одиннадцать фунтовъ. Внизу мокрота сварившаяся была и подлинная аэрома, а сверхъ этой матеріи, и подъ кожей была другая, въ толщину около четырехъ перстовъ, на сало тутъ же весьма похожая.

(**)

(**) Смотри межъ другими РУИШЯ о ЛѢРОМЪ желудочной. Противъ. Анаш. Десят. III. стр. 1. и ПОЛИКАРПА ГОТЛИБА ШАХЕРА Программу о ЛѢРОМЪ кашышками начиненой въ лишникѢ 1735 года.

§. 761.

Рождаются сїи опухоли, когда прїятелища, пасокѢ и другимъ сокамъ успроенныя, распухаютъ. А сїе случается, когда мокрота отъ какого нибудь случая въ нихъ взвалывается и згущивается, для того ее и жилы кровезовращательныя поглощаютъ немогутъ. И то кажется правда, что аѣеромы и идапида мѣсто обыкновенное естъ наипаче въ венахъ пасочныхъ, о которыхъ знаемъ, что перемычками раздѣлены, также и въ желѣзахъ, подъ кожею обрѣтающихся, и которыя, какъ тѣло отъ холоду продрогнетъ, глазами раздѣлить можно. Меликерисъ кажется бывающъ въ желѣзахъ отъ Анапомиковъ салными называемыхъ, а сѣеапомою ячейки пучныя обвемлемы бывающъ. Всякому же извѣстно, что почти во всѣхъ внутренностяхъ и во всѣхъ мѣстахъ тѣлесныхъ сопы ячекъ слеемъ изнаполненныхъ имѣются, потому въ нихъ и сихъ опухолей родъ иногда дѣлаться можетъ. Понеже возвращательныя жилы пасочныя и прїятелища, и желѣзныя оболочки, когда отъ мокроты внутри содержимой упѣсняются и растягиваются, дѣлающъ оную покрывку, въ которой ссѣдшая мокрота заключается. И понеже сквозь спѣсненныя кровезовращательныя жилы, кровь проходить не можетъ, то оная матерія съ дня на день прїумножается, и оболочка растетъ, и самыя кровезовращательныя жилы сквозь самую внутренность опухоли идущія, гораздо разшириваются. Жилыжъ быющіяся, которыя кровь приносятъ, понеже не подалеку спѣсняются, по большей части малѣхонкія бывающъ.

Х х

§. 762.

§. 762.

Сіи опухоли не трудно отъ другаго опухоли рода, отъ аневризмы, отъ чирья безверхушешнаго, отъ скирра и отъ отіока, распознавать. Понеже въ сихъ ни боль, ни цвѣтъ, ни жилъ бьющихся удареніе не чувствуется. Однакожъ временемъ также въ загнаиваніе приходятъ, и прорвавши кожу матерія внутри скопившаяся вонъ вытекаетъ. Если же оная оболочка отъ кожи и отъ мяса подъ нею лежащаго не будетъ отдѣлена и вся вонъ вынута, чпо дѣлать можно или рукою или лѣкарствами, болячка не заживетъ, но когда гнилое мясо выростетъ, дѣлается дикое мясо (саркома) или грибъ (фунгусъ), и вся болячка неровна бываетъ, и въ подлинную карциному обращается.

§. 763.

Спекатома иногда будто сумочки въ себѣ имѣетъ, въ которыхъ, когда она сама собою, или ножечкомъ отворится, матерія получая воздухъ гнетъ, и плевы сбѣдаетъ. Отъ чего не рѣдко опухоль внутри и въ срединѣ пуста бываетъ, а подъ кожей и кругомъ гораздо вырастаетъ.

§. 764.

Дѣлаются сіи опухоли, когда жизненные тѣлесные соки испорчены бываютъ. Чего ради часто рождаются, ежели короста, шолуди и другія сыпи, подавляющими лѣкарствами остановлены случаются. А иногда кажется мнѣ дѣлаются, ежели оныя пріятелища попорчены, давлены или пришибены бываютъ. А припомъ и отъ такихъ случаевъ, отъ какихъ скирры дѣлаются, какъ выше показано (256, 257), иногда сіи опухоли дѣлаются.

§. 765

§. 765.

Которая опухоль еще свѣжа нежесточка, невелика, временно въ разрѣшеніе приходитъ. На ней имѣть должно завсегда пластырь, діакхилонъ симплексъ, діакхилонъ композиумъ, съ пластыремъ діафоретикумъ называемымъ, смѣшенный. Также галбанумъ въ уксусѣ распустивъ на тѣло кладутъ и сверху того покрывашку, или суконочку горячую накладываютъ. Есть нѣкоторые люди, которые припарку изъ уксусу, изъ урины и изъ напашыря весьма хвалятъ. Припарки густыя шутъ употребляютъ не надлежитъ, понеже гораздо волокна расслабляютъ. Никогда не должно до того доводить, ни сими ни другими лѣкарствами, чтобъ опухоль сама собою прорывалась. Ибо опасаться надобно, чтобъ изъ нее дикое мясо не выросло, и саркома не здѣлалась (762), понеже она оболочка не отдѣлилась.

§. 766.

Однако ежели опухоль какимъ нибудь случаемъ прорвется, и гной вытечетъ, то тогда вонъ оболочку оную взять должно. Наилучшее есть дѣло, отъ кожи и отъ мяса подъ нею лежащаго ножечкомъ ее оплунить. А понеже часто се трудно бываетъ здѣлать, употребить надобно лѣкарства, которыми оболочка она выйдется. Но гораздо къ тому надобны весьма дѣкія лѣкарства. Ибо ежели внутрь въ мѣшечекъ будучъ ввергаться только что гной производящій, то опасаться надобно чтобъ дикое или безчувственное и гнилое мясо не выросло (762). Ежели нѣкоторая частица отъ той оболочки останется, то или похъ самое здѣлается, или хотя болячка и заживетъ, опухоль въ скоромъ времени опять здѣлается.

452 ОПУХОЛИ КОТОРЫЯ ВЪ СВОЕЙ ОБОЛ. И ПРОЧ.

Между жѣ лѣкарствами предъпропчими способенъ лаписъ инферналисѣ , спиртѣ нашатырной сѣ извесью немореною [спиритусѣ салисѣ аммоникаци кумѣ калце вива]. Сии кѣ оболочки оной прикладывать должно , а сверхѣ эпихѣ еѣ по жѣ самое время и гной производящія , прикладывая. Когда же все ненадобное выправлено будетѣ , рану должно залѣчить. Ежели плева нѣсколькѣ жестка будетѣ , то лучше оную прежде ножичкомѣ понадрѣзать , а потомѣ лѣкарство приложитѣ. Спиритѣ нашатырной прикладываютѣ или кисточкою , или указкою , которая обернуша будучи шерстью въ ономѣ обмакивается.

§. 767.

А всего лучше такія опухоли вонѣ вырѣзывать. Кожу впрямь такѣ разрѣзываютѣ , чтобѣ оболочки оной , въ которой матерія содержится , не повредитѣ. Ежели опухоль будетѣ велика , разрѣзать кожу должно въ двѣ линіи на крестѣ , какѣ буква Х. пишется , тогда опухоль или ножичковымѣ череномѣ , или перстами отѣ кожи и отѣ здоровыхѣ частей отлупить должно , такѣ и цѣлюю вонѣ вырѣзать. Гдѣ жѣ гораздо крѣпко прикрѣпляется будетѣ , употребитѣ можно и ножикѣ , но всегда смотрѣть должно , чтобѣ чего отѣ оболочки не оспалось , и чтобѣ по прорѣзаніи опухоли , скипѣвшаяся мокрота не выскла. Ежели и кожа повреждена будетѣ и ожесточится , то и оную ширѣ разрѣзать должно , когда то надобно. А что рану прежде полно дѣлать , а послѣ заживлять надлежитѣ , всякому челѣвѣку изѣ прежде предложенныхѣ видѣть можно.

§. 768.

Когда опухоль такѣ отлупляючи вонѣ вынимается

мается и вырѣзывавшися, рѣдко опасное кроветеченіе случается, понеже бьющіяся жилы, опухоли пропитаніе дающія, стягоспыю ся придавливаются и зажимаются; а жилы кровесвозвращательныя обыкновенно большія бывающѣ. Ежели же великія жилы бьющіяся и жилы кровесвозвращательныя подъ опухолью лежать будутъ, или желѣзы въблизи будутъ, и оныя уже распухнутъ, ежели больной горячкою, или сухоткою будутъ боленъ, или сильной поносомъ его, будетъ мучить, то хирургія сія, и особливо ножъ, безъ худаго воспослѣдованія употреблены бытъ не могутъ.

§. 769.

Когдажъ безчувственное и гнилое мясо уже сверхъ кожи выростетъ, и оно съ прищеватинами возгрявыми и съ вонью негладко будетъ пухнуть, оно обыкновенно грибомъ называютъ, который весьма легко карциномою дѣлается. Сіе злоключеніе очень трудно лѣчить. Понеже хотя и ножикомъ вырѣзано бываетъ, однако по болѣйшей части, уже и зажили, опять приходишъ, и не рѣдко причину къ смерти дѣлаетъ. Ежели же надежда естъ, что оно безбѣдно вырѣзать можно, то кругомъ всего кожу разрѣзать, и опухоль выпаскиваячи и подрѣзываячи вонъ вырѣзать. Однакожъ оная опухоль по большой части, будто бы коренья распускаетъ, и гораздо крѣпко придерживается, или къ сухой жилѣ или къ другой жильночувствительной части. Сію также опустивши ножъ глубже крестъ на крестъ разрѣзать, а прищомъ сухія жилы перерѣзать, не отменно надобно. И ежели въ семъ случаѣ не будетъ такъ поступлено, то чрезъ опыты мы научены, что опухоль опять дѣлается.

Г Р А Д Ъ. Х А Л А З І О Н Ъ.

§. 770.

Очень не рѣдко на вѣкахъ бугорки такіежъ дѣлаются, которые будучи жестки *chalasia* называются. Они такимъ же способомъ и вырѣзываются только съ тою отмѣною, что ежели подѣ кожей будутъ, снаружи, ежели подѣ внутренней вѣка плесою, съ внутренней стороны то дѣлать должно. Смотрѣть же надобно, чтобъ поперегъ не перерѣзать той мышки, которою верхнее вѣко въ верхъ приподнимается (581), для чего сіе вѣко впрямь, отъ самага верху ямы глазной до самага хрящика внизъ разрѣзать должно. Ежели случится, что нѣкоторая часпица отъ оболочки останется, то должно тушъ приложить вѣди прижигательныя (766), однакожъ и тушъ крайнее прилѣжаніе употребить надлежитъ, чтобъ весьма ѣдкими вещми глаза не повредить, который сперва легкими лѣкарствами помазать должно.

П Л А Д А Р О Т И С Ъ. П Л А Д А Р О Т Н Σ.

§. 771.

Pladartus называется опухоль мягкая, на грибъ похожая, которая внутри на вѣкѣ рождается (*). Она ножницами прорѣзывается, мѣсто ножичкомъ разрѣзывается, и въ глазъ пуцается мазь изъ шуціи [жагры] съ шматочкомъ пузыря тонкохонькаго.

(*) Вѣденіи, которое особенно ГАДЕНУ приписывается гл. XVI. Т. 2. стр. 390.

ГАН-

Г А Н Г Л И Й.

ГАНГЛІОНЪ.

§. 772.

Не очень отлична есть опухоль другая жесткая отпрыгивая, которая также безъ вожженія и безъ боли бываетъ, и особливо на сухихъ жилахъ мышечныхъ случается, которую γαγγλιον называютъ. Въ свѣжей опухоли, мокрота обыкновенно бываетъ отъ побужденной пасоки бѣловата, да еще и сквозная, почти на бѣлокъ яичный похожая. Ежели же Гангліонъ худыми лѣкарствами попорченъ будучи такъ выросшетъ, что уже прорвется, то мокрота, будто бы въ мошоночкахъ содержащаяся, получивъ воздухъ, портился, и въ острой и смрадной полугной, а не въ гной превращается.

§. 773.

Мѣсто его бываетъ на сухихъ жилахъ, и особливо на сухой жилѣ мышцы превознесенной, или прободенной перстной, а иногда въ сухой жилѣ мышцы протягательной общей. Дѣлается, кажется, отъ того, ежели мокрота на салоходящая, сухія жилы и ихъ влагалища подмазывающая, на сухихъ жилахъ, или и межъ сухою жилою и влагалищемъ ея скипится. А то случается обыкновенно, когда отъ сильнаго дѣйствія и надсяданія гораздо спягиваются, или не умѣренно выпягиваются (*), и оныя прозрачныхъ соковъ прѣислища перерываются.

(*) Не очень давно Гангліонъ необычайной величины я видѣлъ, отъ котораго доброй и честной челоѣкъ умеръ, понеже онаго вылѣчить было не можно. Тотъ челоѣкъ, за нѣсколько лѣтъ напередъ изъ кареты или коласки выскочилъ, выскочивши почувствовавъ сильную боль въ томъ мѣстѣ, гдѣ великая она сухая жила попро-

попросту Ахиллесовою щетивою называемая, лежитъ , однакожъ оная боль вскорѣ и опять миновала. Черезъ годъ или черезъ два опухоль родилась подъ оною щетивою , промежъ щетивы и двумя костями голенными. Опухоль же, которой средину сухая жила придавливала, съ обѣихъ сторонъ сухой жилы будто бы приподыматься начала , однакожъ съ начала ходить давала. Въ то время онъ мнѣ опухоль показавъ , я посмотрѣвши увидѣвъ , что уже она такъ велика выросла , что лѣкарствами ее разбить не возможно , а ножикъ употребить въ такихъ сокровенныхъ и чувствительножилыхъ мѣстахъ безъ крайняго опасенія не лзя , не велѣвъ ее трогать. Между тѣмъ какъ случилось благовременно знающему въ наши времена лѣкарю въ городъ нашъ прѣхать, то мы и его въ совѣтъ призвали, однако и онъ въ дѣйствіе сіе вступити не посмѣвъ. И для того уже намъ въ то время не трудно было предусмотрѣть , что когда нибудь а надобно будетъ голень у ногѣ отнять. Больной не могши долго дожидаться разные пластыри и другія лѣкарства прикладывать началъ. Также бѣдилъ въ другія мѣста къ великоименитымъ людямъ , изъ оныхъ нѣкоторымъ , какъ мнѣ напоследокъ объявилъ , казалось матерію згущенную растворити и въ созрѣніе привести должно , что самое съ самаго начала я отсвѣтывалъ. Напоследокъ , какъ то обыкновенно дѣлается , добрый человекъ за всякія лѣкарства , какія бы ни попались , ухватился , которыхъ немалое число люди неопытные и весьма несмысленные глупцы безразсудной отваги преисполненные , ему представляли. Но отъ всѣхъ ихъ опухоль поднималась, такъ выросла, что не меншеголовы человеческой дѣлалась. Напоследокъ кожа истончившись, мокнуть начала и въ больномъ горячка появилась, которая отъ больного безпрестанно не отставала. Когда въ это время я еще къ нему по прѣзбѣ прѣтелей призванъ и пришелъ , нашелъ сную мѣю надежду , которая мнѣ всегда одна и оставалась , то есть ногу отнять , уже также въ крайней опасности , понеже тѣло уже высохло , а при томъ худыми соками и горячкою небольшою испорчено. Однакожъ оное , будто бы единственное хоть и сумнительное предложилъ. Но больной на сіе послѣднее ни когда отважиться не хотѣвъ , когдажъ кожа въ разныхъ мѣстахъ прорвалась , то почти чрезъ четыре мѣсяца невѣроятное множество мокроты острой и гораздо смрадной текло. Опухоль по исчезеніи и разстаніи изгнившаго всего того , что внутри ни находилось , пуста дѣлалась , а окружность ея гораздо довольно прибавилась , такъ что не много до того не дшло ; что и спереди голень обнала. Между тѣмъ горячка прѣумножилась , превеликая сухота дѣлалась , человекъ напоследокъ долговременными мученіями измученъ будучи умеръ. Я не думаю , чтобъ гнѣтъ былъ когда такой , котораго бы мнѣ и величина и мѣсто необыкновенными показались.

§. 774.

Гангліонъ , ежели не гораздо выросетъ и не очень ожесточетъ , иногда безъ всякаго пособствования расходитъ , а наибольше ежели его или перстомъ сильно придавливать , или кулакомъ и деревомъ постукивать будущъ , и оная плева , въ которой онъ заключается , прорветъ . Что здѣлавши надлежитъ и мѣсто гораздо перетъ , и на него бляшечку свинцовую наложитъ , и ее покрѣпче придавитъ . Позволяется еще и лѣкарствъ отвѣдать тѣхъ , которыя отъ многихъ похваляются . Пласпырь діафоретикумъ минсихти кумъ діахилю композию , масло лумбрикорумъ террестріумъ , скорпіонумъ . Надобно сіе отвѣдывать , а припомъ и посматривать , чтобъ отъ нихъ опухоль не размягчилась , и гораздо не пріумножилась .

§. 775.

Ежели же его такимъ образомъ разбить не возможно , то надлежитъ вырѣзать . И въ семъ родѣ оболочки повреждать не должно , а должно со всѣмъ лѣкомъ , что внутри будетъ , онъ выбросить . Однакожь , ежели иногда онъ съ внутренней споронъ отъ сухой жилы будетъ держаться , то крайнее прилѣжаніе прилагать , чтобъ его ножичкомъ не повредить , который случай великую боль и вожженіе произвестъ можетъ .



КАРАКАТИЦА ВЪ НОЗДРЯХЪ.

полипусъ нариумъ .

§. 776.

Временемъ въ той плевѣ , которою внутри ноздри

Ц Ц

оболо-

оболочены, и копорая отъ мокроты въ ней отдѣляющейся имъ себѣ имбующая, родящаяся мясика, копорая на послѣдокъ великими опухолями дѣлаются, и называются каракапицею [полипусъ]. Сии опухоли, по большой части въ самыхъ глубокихъ ноздревыхъ частяхъ держатся, то иногда къ губамъ вырастаютъ, ноздри исполняютъ, и великое безобразіе причиняютъ, иногда назадъ проходятъ сквозь нѣ дыры, копорыми духъ изъ ноздрей къ гортани проходитъ, гдѣ шакъ велики вырастаютъ, что ажъ изъ подъ языка видны бываютъ, и человека на послѣдокъ задавливаютъ. Онѣ завсегда безболѣзненны бываютъ, ежели другое какое приключеніе худое не воспослѣдуетъ.

§. 777.

Однакожъ между ими различіе есть. Понеже иногда опухоль очень широкимъ корнемъ рождается, и дѣлается круглою, на женскую шишку схожую, который родъ нѣкоторые отъ каракапицы отдѣляютъ и саркомною называютъ (*). Каракапицажъ съ начала бываетъ мясо въ низу подлѣ плевры, на которой держится тоненькое надъ плевою ширѣ, которое вырастаючи многія будто корешки или хвостики въ плеву врастающія дѣлаются, отъ которыхъ и имя ей воспослѣдовало.

(*) Смотри ГЛАНДОРПА о Каркашцѣ Гл. III; ВИЛАРСЪ т. 2. Арш. VIII, стр. 334.

§. 778.

Цвѣшомъ также разнствуются. Понеже каракапица иногда бѣла бываетъ, а иногда красновата. Опухоль, особливо, ежели отъ безчувственной и ослаблѣ плевры начало свое имѣетъ, гораздо вырастаетъ, а въ другое время опять умалается. Первый при-

припадокъ тогда обыкновенно случается , когда много возгрей печетъ къ сей перепонкѣ.

§. 779.

Сии опухоли отъ различныхъ случаевъ рождаются. Если много мокроты въ ноздри будетъ печь , и сквозь оную плеву (776) произойдетъ возгрей протекашь , то сія плева разслабѣваетъ , распухаетъ , и дѣлается оный опухоли родъ , который почти со всѣмъ кругъ бываетъ. Случись также можетъ , что въ оной плевѣ , которая множество желѣзъ въ себѣ имѣетъ , скірръ дѣлается , къ которому возгри , понеже отъ жару густѣютъ , весьма способны. Случается сіе , ежели какъ нибудь превеликое кровопечение изъ носа , прикладываніемъ вещей останавливающихъ , и прижигающихъ , купюроса и сему подобныхъ , безвременно будетъ остановлено , и сими весьма крѣпко матерія задержится. Иногда отъ другой , и особливо отъ французской болѣзни , тоненькія въ ноздряхъ косточки и хрящики портятся , и дѣлаются худыя болячки , и сапъ , на которыхъ безчувственное и гнилое мясо вырастаетъ.

§. 780.

Каракатица , тоненькими хвостиками придерживающаяся , мягкая и безъ боли бывающая , при которой никакого другаго порока нѣтъ , а впрощемъ у человѣка здороваго , искореняется. Которая жъ будетъ неровная и жесткая , и болитъ , оная почти всегда излечима бываетъ , оной и трогать не надлежитъ. Если отъ каракатицы , или лѣкарствами , или ножичкомъ лѣченой , корешокъ останется , оная опять вырастаетъ. Если ее инструментами вынимаютъ ,

Ц ц 2

по

по иногда кровь очень опасно течетъ, отъ котораго теченія человекъ умереть можетъ.

§. 781.

Ежели опухоль будетъ круглая, и отъ разслаблѣннѣ оболочки начинающаяся, еще мягкая, и не очень великая, по всего лучше оную ноготкомъ прорѣзать. Понѣже, доколѣ рана лѣчится, плева она спрутомъ заволочется (*).

(*) Смотри ПАЛФИНЪ Анаст. Хир. Т. 1. стр. 406.

§. 782.

Лѣкарствами прижигательными развѣ потѣ только каракашицы родъ лѣчить можно, которая бываетъ мягка. Понѣже пѣ, которыя жестки, отъ употребленія прижигательныхъ лѣкарствъ обыкновенно Каркинодисъ дѣлается. Прикладывать же оныя можно, но полегоньку, и опускаючи лѣкарство скрозъ трубочку, лаписъ инферналисъ, буширумъ антимоніи, и другія прижигательныя. Однакожъ завсегда въ томъ прилѣжну быть, чѣмъ лѣкарство коснется или хрящика не сѣло, которыя очень лѣчить трудно.

§. 783.

Нѣкоторыя около каракашицы ноздри пластывремъ обкрываютъ, и къ корешку самому верхнему кисточкою прижигательное лѣкарство прикладываютъ, которое, ежели сей корешокъ проѣдетъ, то и опухоль засохнетъ. А чѣмъ оное лѣкарство не расшлось, потчасъ теплою водою ноздрю вымыть.

§. 784.

А гдѣ должно инструменты употребить, то человека, въ свѣпломъ мѣстѣ, пропивъ себя на стул посадить, голову назадъ загнувши, велѣть служи-
телю

пелю сзади придерживать. Лѣкаръ орудіе или щипчики [волзелламъ], на то адѣланныя, въ ноздри опускивши, опухоль съ верхней стороны захватываетъ, и какъ хорошенько захватитъ, то полегоньку оповодитъ и шацинъ, припомъ перебирая перспами оную завертываетъ, такъ, что никакой силы для посиженія употребить не надобно, и напослѣдокъ оную вонъ выпаскиваетъ. Ежели опасность будетъ, чтооъ кровь сильно не попекла, то дѣйствию сіе раздѣлитъ надлежитъ, и опухоль повсядневно побольше и побольше къ себѣ припаскивать. Ежели каракашица будетъ за языкомъ, то щипчики, которыми оную захватитъ, должны быть продолговаты, съ концомъ закорюченымъ. Сии щипчики въ ротъ вкладываются. Нѣкоторые, чтооъ лучше ухватить было можно каракашицу, сперва раздѣываютъ завѣсу поднебенную, отъ чего дѣлается, чтооъ человекъ, какъ надлежитъ глотать, бываетъ не въ состояніи. Къ тому способъ признается ланцетъ обоюдный пряпочною обверченный.

§. 785.

Ежели кровь не будетъ опасно печь, то се вскорѣ удерживать не надлежитъ; а ежели опасность есть, чтооъ человекъ отъ сильнаго печенія кровью не изшелъ, то поненькую шпалочку вощанкою [цереусъ] называемую съ ниткою сквозь горланъ въ ноздри продѣть. На ниткѣжъ привязаны бываютъ пряжи или кнопочки продолговато-круглые ссученые, не подалеку одинъ отъ другаго распоянѣтъ. Вощанку шпалочку захватываютъ, и нитку продѣваютъ, и въ самую глубину ноздрей придавливаютъ первую подушечку, которая обыкновенно изъ пряжи сухой и чистой дѣ-

Ц Ц З

ластъ

лаешся. Ежели же кровь еще не остановится, то другую подушечку должно обмочить и выжать въ какомъ ликворѣ къ удержанію крови способномъ, наприкладъ въ спиртѣ, чтобъ припаянувши побольше нитку, а припомъ и первую подушечку, сія на края жилъ кровевозвращательныхъ, изъ которыхъ кровь печетъ, легла. Въ ноздри также карпію сухую, или въ такомъ же лѣкарствѣ обмоча положить можно. Нѣкоторые края у жилъ кровевозвращательныхъ желѣзомъ каленымъ скрозь дудочку опустивши прижигать велятъ, однако такая поступка какъ трудна такъ и небезопасна мнѣ кажется. Когда кровь остановится, язвину лѣчить должно лѣкарствами, къ мѣстамъ жильночувствительнымъ приличными. Весьма хороша вода ранная, въ которую не множо эссенція янтарной примѣшена.

§. 786.

Иногда вся и опухоли взять не можно, но перерѣзавши ее, корень оуѣ нее оставить надобно. Къ сему кореню прикладывать должно лѣкарства, которыя бы помаленьку его сѣбѣдали, прибавливая къ онымъ нѣсколько лѣкарствъ, гной производящихъ. Сіи лѣкарства на нитку въ нѣсколько разъ сложенную, такъ будипобы одна была, намазывать. Нитка сія также въ ноздри продѣвается, и въ роту оставляется. Оную повсядневно такъ перемѣнять должно, чтобъ новая часть лѣкарствомъ намазанная, на то мѣсто пришла, гдѣ вчерашняя была. При такомъ лѣченіи способъ трудномъ, гнусности и досады преисполненномъ, такъ долго оставаться, доколѣ оуѣ опухоли ничего не останется (*).

(*) Смотри ле Дранъ Прим. VI. VII.

§. 787.

§. 787.

Когда перстѣ, инструменты такожде и лѣкарства, въ ротѣ кладутся, смотрѣть надлежитъ, чтобъ не придавливать задней части языка и не досаждалъ. Понеже всякому извѣстно, что отъ того рта подымается.

КИЛА ИЛИ ГРЫЖА.

Г Е Р Н І А.

§. 788.

Кила или грыжа [гернія] въ старину безчестнымъ именемъ почиталось, а въ нашемъ вѣкѣ безъ всякаго зазрѣнія оно произносятъ, и признаютъ за общее различныхъ опухолей имя, на брюхѣ случающихся, въ прошемъ и мѣстѣ и свойствомъ и происшествіемъ, не мало между собою разнствія имѣющихъ.

(*) ЦЕЛЬСЬ Кн. VII. гл. XVIII.

§. 789.

Двѣ жилы: быющія и одна жила крововозвращательная, въ младенцѣ упробномъ начинающіяся, и къ мѣсту младенческому принадлежащія у онаго младенца, какъ долго онъ сокомъ матернимъ питается, кровь въ себѣ имѣютъ, а у взрослыхъ связками дѣлаются. Сии жилы: быющія и жила крововозвращательная, покрываются плевою брюшинною, которая въ томъ мѣстѣ удвоена. Сии же связки, совокупясь еще съ другою ураховою отъ пузыря происшедшею, подлѣ пупка вмѣсто сходяпся, покрываются и обѣмлются оболочкою, отъ плевы брюшины полу-

полученною. Съ сею продѣваются въ кольцо жильно-чувствительное или сухожильное, на спезѣ бѣлой общею всѣхъ мышекъ чревныхъ сухою жилою почтипающеюся находящееся. Отъ кольца же сего пупокъ начинается, который у младенца упробнаго къ мѣсту младенческому проходитъ, и послѣ рожденія перерѣзывается. Въ этомъ мѣстѣ ежели помянутое оное кольцо въ сухой жилѣ находящееся отъ какой нибудь причины опустился и ослабнѣлъ, то внутренности чревные плеву брюшинную давить начнутъ, а понеже она не въ состоянїи кишекъ одна удержать, обремѣняется, раздѣется, и отъ напорыванія какъ сальникова такъ и кишкина врознь растягивается. Ежели же она плева напряжена будучи кожу и самый пупокъ приподниметъ, оный безобразно торчитъ, и такой порокъ общимъ именемъ *εξόμφαλος* или *εξόμφαλον πάθος*, или *ομφαλικήλη* называется. Ежели въ опухоли одинъ сальникъ будетъ находиться, именуется *επιπλόμφαλος*, ежели одна кишка, *έντερόμφαλος*, ежели же обое и то и другое *έντεροεπιπλόμφαλος* называться можетъ (*).

(*) Смотр. въ ГАЛЕНОВЫХЪ Дефин. Том. II. стр. 274.

§. 790.

Есть другой еще родъ килы, или грыжи, который въ разныхъ мѣстахъ на брюхѣ дѣлаться можетъ, и о которомъ, за рѣдкостію у писателей мало объявляется, ибо они чего знать не могли, того и не писали; называютъ ее килою брюшною [герніамъ венп-ралемъ], которая дѣлается въ пѣхъ мѣстахъ, гдѣ въ мышкахъ поперешныхъ брюшныхъ волокна одно съ другимъ не плотно лежатъ. Ежели въ такія мѣста, гдѣ жиръ родится, отъ какой нибудь причины брю-

брюшина придавлена будучи ворвется , и памѣ будучи распялился , шуда дорогу находящѣ и сальникѣ и кишка. Можетѣ же сей порокѣ и отѣ раны брюшной , наскрозѣ мышки до самой брюшины проходящей , дѣлаться , понеже мышки сей плевѣ закрыть не могутѣ ; а она отѣ внутреннихѣ частей будещѣ разшириваться. Тожѣ самое еще и другимѣ образомѣ обыкновенно случается , гдѣ брюшина съ мышками вмѣстѣ прорѣзана бываещѣ , и по залѣченіи раны струпѣ не весьма окрѣплый отдавленѣ будучи отѣ напуги внутреннихѣ частей растягивается , и опячь прорывается.

§. 791.

Вѣ каждомѣ паху надѣ костью , подѣ лономѣ поперегѣ лежащею , гребнемѣ называемою , у мужчинѣ низходящѣ сосуды сперматическіе комплотомѣ клетчатымѣ объемлемые , который они получаютѣ себѣ отѣ комплота подѣ брюшиною находящагося. Сей комплотѣ , который вѣ другое покрывало яперное или вѣ оболочку влагалищную превращается , по просту отпросткомѣ брюшиннымѣ называютѣ , однакожѣ изѣ сихѣ можно разумѣть , что онѣ отѣ подлинной брюшины отличенѣ. У женщинѣ къ краямѣ частей натуральныхѣ тоюжѣ дорогою низходящѣ также не большія жилы чувствительныя и жилы крововозвращательныя , которыя такимѣ же комплотомѣ клѣпчатымѣ одѣтыя , и чужимѣ а не своимѣ имянемѣ связками мапошными круглыми называются. Сіи сосуды у обоего пола вѣ брюхѣ подѣ самую подлинную брюшиною находящѣся , которою всѣ части къ дѣтворженію служащія , покрываются ; подѣ оною плевою къ дирѣ продолговато-круглою , вѣ сухихѣ жилахѣ мышки косой наружной , и косой внутренней

Ч ч

имѣю-

имѣющеся проходящѣ. Ибо отъ сей послѣдней сужой жилы, а временемъ и отъ мяса мышцы попеременной, у мужчинъ начинается оная мышка пустая подѣмлющая ятерная [кремастеръ] называемая, претью оболочку япру, или оболочку багряную [туникамъ эрипроидеамъ] дѣлающая. А дира оная, кольцомъ называемая, фигуурою на дугу походитъ, которой концы на кости гребнемъ называсмой и на ее среднемъ переднемъ хрящикѣ опираются. Сія дира часто растворяется, и скрозь ее на низъ опускается распянутая брюшина, въ которую и сальникъ и кишка отъ шягоспи своей выкапываются. Какъ долго опухоль въ паху бываетъ, и походитъ на бубонъ (127) βυβωνικὴ называється. Ежели же оныя части, которыя подъ сими лежатъ, также внизъ сильно понуждены будучи какъ ни будь выпадутъ, оныя у мужчинъ мошонку шуляпную нѣсколько распяливаютъ, такой порокъ εχεοκὴ именуется. У женщинъ отъ такогоя случая гораздо распухаютъ срамнаго удагубы, толькожъ оный родъ килы у нихъ особливаго имени не имѣетъ. Однакожъ у обоого полу каждый родъ килы отъ задержаннаго въ опухоли сальника ἐπιπλοκὴ, и отъ заключенной кишки εὐτεροεπιπλοκὴ называется. Ежели же обое и то и другое въ опухоли будетъ, оноε εὐτεροεπιπλοκὴ отъ многихъ называется.

§. 792.

Жилы быющіяся, и жилы кровевозвращательныя подвздошными [иляце] называемыя, изъ брюха къ бедрамъ и къ ногамъ низходящѣ, и именуются бедерными [круралесъ]. Оныя изъ брюха выходя костью подвздошною, которая въ томъ мѣстѣ съ костью гребенною совокупляется, и бываетъ жолобовапа, подъ дер-

держиваются. Жилыжъ быющіяся и жилы кровсвозвращательныя по мышкамъ ловческой и подвздошнымъ .
проходятъ , и покрываются нѣкоторою связкою отъ
изобрѣдательей ФАЛЛОПІЕВОЮ (*), или ПОУПАР-
ТІЕВОЮ (**), называемою. Связка оная дѣлается
изъ пропяхенія мышешнаго , или изъ сухой жилы
мышки наискось идущей наружной держащейся бстей
верхней и нижней на подвздошной кости имѣющихся
и выпуклины на кости гребенной находящейся. Оная
сухая жила внутри будто бы загибаются , и съ сухою
жилою мышки наискось идущей внутренней совоку-
пясь , толстѣетъ , а припомъ же еще дѣлается. И
такъ подъ сею связкою , или какъ другіе (***) ду-
маютъ , подъ мышешною сухою жилою и пропяхе-
ніемъ мышешнымъ крѣпкимъ , къ которымъ еще при-
бавляются волокна отъ повязки широкой , выходятъ
оныя жилы быющіяся и жилы кровсвозвращательныя
великія. И въ этомъ мѣстѣ , ежели обьявленная связка
отъ напуги раздирается или ослабнетъ , то брю-
шина растягивается ; и такъ сальникъ и кишка на низъ
вонъ выходятъ. Такой припадокъ Килою голенною или
[герніамъ круралемъ] *μυρομήλην* новѣйшіе называютъ.

(*) ФАЛЛОПІЙ въ Примѣч. Анат. стр. 91 и въ насшавл. Анаш-
сѣ начала.

(**) Смотр. И. К. А. Наукъ 1765 года стр. 64.

(***) МОРГАГНЬ не признаетъ въ Противн. III. разсужд. 1.
КОВЕРЬ въ міотоміи стр. 2. Таб. XIV, XV. ГЕЙСТЕРЬ въ со-
сражд. Анат. примѣч. IV.

§. 793.

Къ симъ еще приданъ быть можетъ рѣдкій
килы родъ , когда часть пузыря въ томъ мышке на-
искось идущей лучокъ , (791) или какъ просто гово-
рятъ , въ колечко выходитъ , и въ пахуль торчитъ ,

или оболочки яперныя раздвинувъ въ мощну шуляп-
ную опускается.

(*) Смотри. Комм. К. А. Наукъ 1713, года стр. 146 РУИШЕВО
Примѣч. Анапом. Хирург. XLVIII. Ю. САЛТЗМАННОВУ Диссерт.
о Килѣ пузыря уриннаго въ Аргент. 1732. года.

§. 794.

Во всѣхъ килахъ этихъ сплошъ брюшина рас-
спягивается, и гораздо распяливается, а рѣдко проры-
вается. Однакожъ временемъ и то случиться можетъ,
а особливо, когда по тому мѣсту, гдѣ кила, сильно
ударено, бывашъ.

(*) Понеже въ старину думали, что сія оболочка или брюши-
на часто во время килы прорывается, то у Нѣмцовъ произошло
слово *дербъ брухъ*. Однакожъ многие тому противятся, а межъ ими
РУИШЕЙ, объявляетъ въ Прот. Дес. 2 стр. 9, что брюшина никогда
не прорывается, а ГАРЕНЖОТЪ изъ примѣчанія ПЕТИТОВА утвер-
ждаетъ, что то дѣлается. Опер. т. 1 гл. 7 Арт. 4 Прим. 16.
стр. 329; и какъ кажется, или поюже самою, или сей подобною,
исторією САЛТЗМАНЪ въ Диссерт. о килѣ пузыря 21 стр. 34.
человѣка килою страдающаго, лошадь убрыкнула, отъ чего тотчасъ
оболочка у килы или брюшина прѣснула, и великое множество ки-
шекъ вонъ вышло.

§. 795.

И такъ ежели имя кила или грыжа значитъ
опухоль, которая дѣлается, когда части мягкія поло-
женіе свое неспорячнымъ дѣлаютъ, и въ разныя
мѣста выпадаютъ, то сіи всѣ теперъ помянутыя ви-
ды собственно килами или грыжами называются.
Симъ же словомъ кила abusive самопроизвольно по-
нѣкоторому только причію и другіе опухолей
роды названы, которыхъ къ киламъ такъ только при-
числяются.

§. 796.

Пупокъ иногда распухаетъ, ежели водою распи-
рается, что за часпую въ водяной болѣзни брюшной
[инѣ]

[инѢ асципте] обыкновенно случается, когда оное сухожилъное кольцо (789), стягоспѣю водяною ушѣ-снено будучи, распускается. Часто также въ пупошной килѢ [инѢ омфалоцеле] (789) въ расширенную брюшину вода скапливается, и въ томѢ мѣстѢ сѢ сальникомѢ и кишкою находится. Сей опухоли родѢ *ὄζου Φαλλο* называютъ, который кажется сѢ тѢми пороками и бываетъ, а самѢ опѢ себя не можетъ дѢлаться. ЧтѡбѢ *πνεύματος Φαλλος* дѢлаться могла, или одинѢ духѢ въ распученную брюшину вкрадывался, кажется, многіе опѡмѢ сумнѢваются (*). Часто на пупкѢ мясо вырастаетъ, иногда цѢлое, а иногда карциномѢ т. е. раку подобное, сей болѢзни родѢ *σαρκόμ Φαλλος* называется.

(*) ПримѢромѢ хотѢ утвердилъ, однако не очень явственнымѢ ГЕЙСТЕРЪ во второй книгѢ Наставл. Хирург. Част. 5. гл. 114. §. 2 стр. 784.

§. 797.

Вода скапливается въ ящйки второй оболочки, ядро обѢмляющей, и влагалищною называемой. Вода по большой части межѢ среднюю и внутреннюю оболочкою, или межѢ бѢлошною и влагалищною бываетъ, а иногда межѢ верхнюю, которая эрипроидеа называется, или межѢ мышкою ятроподѢмляющею [кремастерѢ] по латинѢ называемою и среднюю. КакѢ вода прибудетъ, и среднюю плену прорветъ, то въ обоихѢ мѣстахѢ разлиться можетъ. Случается, что ежели въ паховокильѢ или въ подпаховокильѢ [инѢ бубоноцелѢ или осхеоцелѢ] внутрь выпадетъ сальникѢ и кишка, а брюшина распянутая и длинная и въ кольцо вышедшая оставлена будетъ, и снаружи приложенною обвязкою придавится, то также въ сѣю плену, или какѢ обыкновенно называютъ въ мошну,

Ч ч 3.

вода

вода скапливается , и что иногда плена въ верхней самой своей части сжимается и запирается. Сей болѣзненный случай *ὄζουρ Φαλου* называютъ.

(*) смотр. лѣ дрань прим. LXXV. Том. II. стр. 162.

§. 798.

Также самое ядро твердѣетъ , и въ немъ скирръ дѣлается. Или межъ оболочками , и на самыя яйки быющіяся и жилочки крововозвращательныя , изъ которыхъ ядро состоитъ , мясо (796) нарастаетъ. Оное Греки *Σαζοκῦλον* называютъ.

§. 799.

Кромѣ сихъ пороковъ , также во всѣхъ оболочкахъ и ядрахъ , теперъ помянутыя жилы быющіяся и жилы крововозвращательныя , къ ядрамъ принадлежащія , распухаютъ , кошорыя будто бы закручены и сѣгромаждены бываютъ , и которыхъ видѣть можно , не ровны , и какъ перстомъ подавишь опскакиваютъ , сей опухоли родъ *κιστοκῦλον* называютъ.

§. 800.

Сія опухлей роды рѣдко одни бываютъ , но всегда одинъ за другимъ слѣдуетъ , изъ того многія имена и лѣчащимъ великія затрудненія производятъ.

и : ~~~~~ и

ПУПСШНАЯ КИЛА ИЛИ ГРЫЖА.

ЭКЗОМФАЛОСЪ.

§. 801.

Въ сей килѣ , ежели кишка выходитъ , то опухоль обыкновенно бываетъ , ни жестка , ни мягка , кошорая по удержаніи внутрь себя духа приподнимается

ся

ся, когдажъ человекъ навзничъ лежишъ, то она или сама собою опадаетъ, или подавивъ перстомъ звучишъ, и буди по бы съ нѣкоторою воркошнею внутрь уходишъ. А гдѣ сальникъ выпадшій бываетъ, прочее слово въ слово находяшся, однако опухоль мягче, и прескопни въ ней не чувствуется. Гдѣжъ оба и то и другое бываетъ, шамъ и знаки смѣшаны бываюшъ.

§. 802.

Сей порокъ обыкновенно у младенцевъ часто случается, у которыхъ пупокъ послѣ перерѣзанія, не хорошо залѣченъ, или обвязкою не довольно спянушъ бываетъ. А кромѣ того, когда у нихъ пупокъ вожженіе имѣетъ, и въ него вода скапливается, отъ чего оноо кольцо ослабляется. Не мало къ тому причины подаетъ дѣтской безмѣрной плачь съ крикомъ. Женщинамъ также сіе отъ беременности, и отъ родовъ приключается. У мужчинъ сей родъ килы рѣдко бываетъ, однакожъ и у нихъ слово въ слово, какъ у женщинъ оный дѣлается, когда брюхо сильно бываетъ придавлено или зашибено.

§. 803.

Пупошная кила не безъ бѣдствія случается: Ибо, когда кишка выдетъ, то временемъ шуда и калъ проходитъ, отъ онаго кала и отъ спершагося внутри духа, онаа очень широко раздувается, и вожженіе получаетъ. Приключаются боль, рвопа, горячка, и на послѣдокъ по приумноженіи вожженія и по приключеніи Антонова огня человекъ умираетъ ежели малѣхонько лѣченіемъ не поспѣшатъ. То рѣже случается, чпобъ сальникъ вожженіе получалъ, ежели онъ одинъ и великое его количество въ оноо кольцо выходилъ, и онымъ давилъ.

§. 804.

§. 804.

Ежели вышедшія части , внутрь не вправятся , и плотно обвязкою вокругъ обвязанною не удержатся , то также опасаться должно , чшобѣ оное часто помянутое кольцо и напряженная брюшина , или бы брюшина , кишка и сальникѣ вмѣстѣ не срослись . Ибо такое приключеніе во всякой килѣ бѣдства пріумножаетъ , понеже все что такѣ ни сроснется , безѣ употребленія ножичка одного опѣ другого опвесить , и назадѣ внутрь вправить не возможно .

§. 805.

А припомѣ обовсякомѣ родѣ килѣ , гдѣ кишка и сальникѣ въ какія мѣста ни выходятъ , то памятовать должно , что онѣ у младенцевѣ , у копорыхѣ пѣла подрастаютъ , излѣчиваться могутъ однимъ только обвязываніемъ . У взрослыхъ же людей чрезѣ обвязываніе болѣзнь не излѣчивается , только опѣ онаго облегченіе имѣютъ ; и ежели хорошо принаровлено будетъ , то человѣка вовсе безопаснымъ дѣластѣ .

§. 806.

Того ради , ежели у ребѣнка будетъ пупошная кила или грыжа [экзомфалусѣ] , онаго навнѣчь положить должно , и вышедшее перстомѣ подавивъ въ брюхо опять вправить . На пупокѣ же и въ лунку въ пупкѣ находящуюся , положить воскѣ шарикомѣ или пулечкою здѣлавши , круглою стороною въ пупокѣ , а широкою къ верху . Сверхъ этого наложитъ пластырь и прикрѣпитъ суконочками поспешенно сложенными . Всежѣ сіе обнять обвязкою , въ кругѣ брюхо нѣсколько пугонько обвиваючи . Надлежитъ же сіе
чрезѣ

чрезъ нѣсколько мѣсяцовъ завязанное носить , и когда потребуется обвязку развязывать , спараться должно , чпобъ выправленныя части въ брюхо опять не вышли.

§. 807.

А взрослымъ надобенъ ремень или подпруга съ пришивымъ клубкомъ или мячикомъ изъ пробошнаго дерева изъ [эксъ субере] , изъ тряпокъ или изъ войлока здѣланнымъ , и замшею обшитымъ , который послѣ выправленія въ брюхо всѣхъ частей , и какъ уже опухоль упадетъ , на мѣсто оное накладывается. А понеже сіе когда долго приложенное носится , обыкновенно потомъ марается , а кожа осыпается , то межъ мячикомъ и кожею тряпочку чистенькую , или компресецъ четырехугольный класть должно. Обвязка или подпруга лучше держитъ , когда къ ней пришиваются двѣ лямки на переди и назадъ съ праваго плеча на лѣво проходя съ лѣваго на право. У весьма полстыхъ людей иногда не опмѣнно надобно бываетъ еще съзади межъ ногами подпругу продѣвать , и съ первою сшивать. Однакожъ всего лучше , вмѣсто обвязки , полобруча изъ снани , съ пришивымъ мячикомъ здѣлать , къ брюху прямо и съ разсмотрѣніемъ принаровить , и оный ремнемъ спягивать.

§. 808.

Которыхъ же кишекъ и сальника , ни въ брюхо вправить , ни такою обвязкою удержать , не возможно , оныя почти всегда вожженіе себѣ получаютъ. А сіе случается послѣ спужи , или когда на низъ очень великой запоръ будетъ , или бѣства и питье употребленное , будетъ холодить и пучить , и желудку не будетъ свойственно. Такого приключенія знаки сіи суть : боль и рѣзъ въ животѣ , крайнее пученіе , частое

блеваніе, и когда испражненія, ни въпровѣ на низѣ произходитъ не будетъ. На послѣдокъ приходитъ блеваніе желчное, смердящее, а иногда и самый калъ ртомъ выходитъ, который болѣзни родъ ѣлебу медики называютъ.

§. 809.

А чтобъ все оное, вышедшее, растянутое, и вожженное, внутрь вправить, то весьма много пособствуемъ, ежели человекъ прямо будетъ лежать. Оному навзничъ лежащему какъ голову такъ и сѣдалище служители въ верхъ приподнять должны (*), а подвздошныя части другой служитель съ обѣихъ сторонъ давить долженъ. Опухоль впрямь перешама въ брюхо давить надлежитъ такъ, чтобъ прежде то вошло, что послѣ вышло. Послѣ того положеніе перемѣнить надлежитъ, и брюхо полегоньку спрягнуть должно.

(*) Сіе надобно другимъ людямъ дѣлать, и чтобъ мышки больного человека, а особливо прамыя и другія чревныя всякаго дѣйствія лишились.

§. 810.

Ежели же оныхъ частей въ свой мѣстѣ возвращить не возможно, а пробовать надлежитъ лѣкарствованію. На опухоль прикладывать можно густыя припарки изъ хлѣба бѣлаго съ молокомъ и съ елеемъ. Или въ молоко варящъ корень алшейной, рожной, траву мелилупную, цвѣтки самбуковы вербасковы, сѣмя лняное, доколъ густою припаркою здѣлается, къ той припаркѣ примѣниваютъ елей. Также полезна шерсть въ маслѣ обмоченная и выжатая (*). Это все теплое прикладывать должно. Вредна быть можетъ излишняя мокрость и холодность. Однакожъ приизлишняя и горячесть вредитъ, и волокна больше ссѣдаются принуждаемъ.

(*) Нѣкоторые кожу заячью, или пучокъ льну въ тепломъ молокѣ съ масломъ помачиваютъ, выжимаютъ и прикладываютъ.

§. 811.

§. 811.

Межѣ пѣмѣ брюхо мазать можно масломѣ розовымѣ. А внутрь можно спавить клистеры, какѣ умягчательныя такѣ нѣсколько и поострѣе. Оныя же клистеры хопя ничего на низѣ не произведутѣ, да и сами внутри останутся, однако опять повпорять должно. Не рѣдко и дымѣ пабашный пособствуеѣ, когда онѣ трубкою на шо здѣланною въ брюхо впускается.

§. 812.

Сѣ сими въ одножѣ время давать можно масло миндальное свѣжее, смѣшавѣ сѣ пивомѣ и сѣ сѣменемѣ кминнымѣ, мѣлко спертымѣ. Многіе вино Малватское сѣ масломѣ мѣшаютѣ, и онаго по стакану больному даютѣ. Временемѣ, когда все напрасно употреблено бываеѣ, пособствуеѣ довольно кровопусканіе. И такѣ изѣ вышереченныхѣ уже видѣть можно, что всѣхѣ внутрь принимаемыхѣ вещей жарѣ причиняющихѣ, также и ознобѣ и пученіе дѣлающихѣ, и изѣ спирта виннаго состоящихѣ, употреблять не надлежитѣ.

§. 813.

Ежелижѣ салыникѣ и кишка вожженныя отѣ сихѣ припарокѣ на свой мѣстѣ припять не возмогутѣ, то надобно будетѣ немедленно опухоль прорѣзать. Однакожѣ сѣ дѣйствіе тщетное бываеѣ, ежели въ оныхѣ часпяхѣ Анипоновѣ огонь будетѣ. Онаго приключенія знаки такіе: опухоль бываеѣ мягка такѣ, что лунка перстомѣ вдавленная остаеѣ, кожа сиза и боль по большой части безѣ облегченія пропадающая и великая слабость (привнес: 172, 173).

Ш ш 2

§. 814.

Гдѣ всѣ части внутри хорошо будутъ вправлены, боль и вожженіе и другіе знаки худые тотчасъ сами пропадаютъ. Временемъ хоть кажется все пропало, однако боль и горячка, которыми человекъ мучится, и которыхъ бояться можно (804) не перестаютъ, но безперерывно продолжаются. Что самое не только во время сея грыжи, но во всѣхъ другихъ случиться можетъ. Случается же сіе обыкновенно для того, что въ кишкахъ уже сильное и гораздо обширное вожженіе будетъ, или что кишка, которая отъ сильного спясенія и блеванія перекручивается, сама въ себя входитъ, и будто бы обвернута бываетъ, которое мѣсто новѣйшіе волвулумъ т: есть сверткомъ называютъ, или что она кишка брюшинною вытянутою пленою, съ которою она внутри вправлена, шуго захватывается и запыгивается (789, 791, 792) И нелегко найтить можно примѣты такія, которыя бы показывали, отъ какой причины кишки болятъ. Однакожъ знать можно, что вожженіе не въ той только части кишекъ состояло, которая выпала, но гораздо далѣе распространилось, ежели все брюхо болитъ, и все гораздо вспучилось. Ежели кишка сама въ себя вошла, оное заключенія мѣсто положи на брюхо руку найтить можно, понеже будетъ болѣть, и отъ перста не будетъ подаваться. Когдажъ кишка брюшинною оболочкою давливается, то въ то время, какъ въ брюхо она рукою вправляется, не звѣнитъ, и на кожѣ надъ пупкомъ, также надъ кольцомъ мышки наискось идущей и надъ связкою Фаллопиевою, будто нѣкая ямка глубокая бываетъ, которую и перстомъ оцупать не трудно. Ежели
перво

первое прилучится, то человѣка отъ смерти избавить не возможно. Въ другомъ случаѣ пробовать надлежитъ все то, что медики къ лѣченію кишечнаго свертка [илеи и волвули] предписали; изъ всегожъ того рпуги великое множество глотать велятъ, котораго тягостью кишки расправляются. Въ послѣднемъ случаѣ неопшѣнно надобно бываетъ ножъ употреблять.

(*) Смотр. ЛЕ ДРАНЪ Примѣч. 58 Т. 2 стр. 18.

§. 815.

Котораго человѣка надобно ножичкомъ дѣлать, онаго навзничъ и на коженой подушкѣ такъ положить, чтобъ грудь и лядвіи нѣсколько въ низъ опустились, а пупокъ въ верхъ приподнялся. Онаго также двое весьма сильные служители, на груди и на ногахъ лежучи, держать должны. На опухоли разрѣзываютъ распяленную кожу прямою линією, а ежели опухоль будетъ велика, то въ двѣ линійки на крестъ. Однакожъ притомъ великую умѣренность употреблять надлежитъ, чтобъ одну кожу вскрыть. Понеже иногда хотъ гораздо рѣдко, ежели брюшина прорваная бываетъ, подъ нею и подъ жиромъ потчасъ кишка случается. Ежели же брюшина цела будетъ, то по прорѣзаніи усматривается нѣчто, будто бы клетчатое, которое кажется не иное что быть, какъ только плева клетчатая, брюшину покрывающая, со всѣмъ тонкая, однако уже попорченная, надушая и распухая, въ которой не рѣдко и вода скопившаяся бываетъ. Сію оболочку очень полегоньку прорѣзывать должно, и рану прилѣжно, прошиву полагаемою теченію крови карпією, или губкою обпирають надобно, чтобъ лѣкаръ не ошибся, и неповредилъ подъ симъ находящейся кишки.

Ш ш 3

§. 816.

А потѣмъ , какъ до самой нижней оболочки , и до самой брюшины дойдетъ , то и брюшину прорѣзать должно. И такъ крайнюю умѣренность употребивъ , оную оболочку перстами захвативъ , приподнявъ , и надрѣзавъ , сперва немножко проколотъ надлежитъ , послѣ того опустивши спичку жолобоватую , ножичкомъ или ножницами кривыми , тупой конецъ имѣющими , ширѣ разрѣзать должно. Такимъ порядкомъ прорѣзавши опухоль , все вонъ выпавшее внутрь вправливается (687, 688). Ежели же нѣкоторая часть сальника попорченная или окрѣплая найдется , оную отрѣзать должно. А ежели сальникъ , или кишки къ брюшинной оболочкѣ , или и все сіе на циркулѣ будетъ лежать , и съ нимъ срастутся (804) , то надобно одно отъ другаго , не такъ ножичкомъ , какъ перспомъ , или ножичковымъ черенкомъ , разобрать. Не рѣдко же и то случается , что кишки и брюшина выпянутая нѣсколько припискиваются , ежели не вправивши сальникъ и кишку обвязка накладывается. Ежели же не опмѣнно надобно будетъ ножичекъ въ дѣло употребить , то какъ возможно брюшину отъ кишекъ отводить. Весьма способенъ быть можетъ къ сему дѣйствию ножикъ Пепиговъ , который востреетъ имѣетъ не очень востреетъ (698).

§. 817.

Иногда не обходимо надобно бываетъ , самой (789) весьма зжатой кружокъ разрѣзывать , для многостова вонъ вышедшихъ кишекъ и другихъ внутренностей. А то можно дѣлать оными орудіями , о которыхъ выше я (689, 690, 691) предложилъ , примѣчая все то , что обѣлченіи ранъ брюшныхъ уже я сказалъ (692).

§. 818.

§. 818.

Вправивши все, что надлежитъ въ брюхо, на рану положитъ должно мячикъ, или шаръ, изъ карпии зѣланной (21. фиг. 11): Сверхъ того накласть суконки, а на оныя обвязку манпильею называемую, съ лямкою (623, 639, 700). Надобно же больному себя покойно содержать, и навзничъ лежать. Припомъ должно кровь пускать, воздержносъ имѣть, и клистеры слабительные употреблять. Всякія вещи брюхо дующія весьма вредительны, а очень полезны предъ другими вещами похлѣбки овсяныя, яшныя и симъ подобныя съ пшизаномъ.

§. 819.

Привсемъ же помъ уже чрезъ опыты изслѣдовано, что всѣ пѣ, у которыхъ во время этой грыжи и въ другихъ килъ родахъ весьма много сальника и кишекъ вонъ выходилъ, рѣдко вылѣчиваются, хотя бы казалось, что лѣченіе хорошо происходило, и все безъ всякаго вреда внутрь вправлено было. Понеже всѣ чревыя внутренности оныя не обыкновенной тягости угнетаются и худо повреждаемы бывающъ (*).

(*) Гаренжотъ оп. Т. 2. стр. 359.

§. 820.

А хотя и все лѣченіе окончано будетъ, и рана съ шрудомъ заволочена была бы, однакожъ не со всѣмъ еще страхъ пропалъ. Понеже не рѣдко вправленныя внутренности, опять въ оной кружокъ выходятъ, прорвавши не весьма крѣпко заросшій стрѣкъ, для того на пупъ надобно мячикъ и обвязку наложить. Иногда же, а особливо человеку уже пожилому (805), оную обвязку во весь вѣкъ свой имѣть не оптѣнно надобно (806, 807). Но по не до одной килы или

или грыжи пупошной касаются, но до всѣхъ родовъ грыжъ, ежели салникъ и кишки выпадутъ, и прорѣзавши кожу на мѣсто свое опять будутъ вправлены.

КИЛА ИЛИ ГРЫЖА БРЮШНАЯ. ГЕРНІА ВЕНТРИСЬ.

§. 821.

Эта кила неискусныхъ людей легко обманывать можетъ, и заставитъ думать о себѣ, будто бы о чирѣ безверхушешномъ, а въ самомъ дѣлѣ какъ начинаніемъ такъ и многими признаками, при грыжѣ случающимися весьма немало разнствія имѣетъ. Понеже гдѣ кишка вышедшая будетъ, оная престокою боль въ брюхѣ причиняетъ, а припомъ и желудку досаждаетъ такъ, что какъ сѣдое и спитое, такъ желчь, а на послѣдокъ, когда немочь усилится, и калъ ршомъ вонъ выходитъ. Опухоль по большой части бываетъ невелика, а дѣлается иногда, ежели внутренняя самая чревная плсва отъ сильного удара отъ задержанія нѣсколько подолѣ въ себѣ духа или подъ тяжкимъ обвязаніемъ и другимъ случаемъ прорывается или разрывается. Сію килу или грыжу въ нѣкоторыхъ мѣстахъ бывающую, а временемъ и отъ раны однѣхъ мышекъ чревныхъ, а иногда и съ брѣшиною раненыхъ дѣлающуюся, уже выше (790) я представилъ.

§. 822.

Сей порокъ такъ лѣчится. Когда опухоль не опадаетъ, и будетъ съ вожженіемъ: то неотмѣнно надобны жидкія припарки (810), и надлежитъ навзничъ и прямо человека положить (687, 809) опухоль перспами подавливать, и внутрь вправлять.

§. 823.

§. 823.

Ежели же опухоль гораздо туга будетъ , то кожу съ жиромъ и мясомъ разрѣзать должно. А внутреннюю плеву , или расслаблую брюшину въ которой кишка и салникъ одержались непрогашъ , и отдѣля отъ нее жиръ и мясо , со всѣмъ тѣмъ въ ней задержаннымъ , внутрь вправить. Рану затворить , и къ ней принаровить обвязку (805 , 806). Ежели опухоль въ томъ мѣстѣ здѣлается , гдѣ напередъ сего рана была , тутъ оной внутренней оболочки подъ низомъ не будетъ , ежели нѣкогда брюшина ранена была , то тотчасъ подъ мясомъ кишка будетъ лежать , или салникъ. Того ради , ежели надобно опухоль прорѣзывать , то съ немалою осторожностью оное дѣлать должно , и руку на легкѣ держать , чтобъ кишки не повредить.

(*) ГАРЕНЖОТЬ ОП. Т. I. Арт. 6. стр. 368.



ПАХОВАЯ КИЛА ИЛИ ГРЫЖА.

б у б о н о ц е л е .

§. 824.

Сія грыжа кила (791) почти всѣхъ чаще случается , а особливо у мужчинъ. А дѣлается , ежели человекъ въ кричаніи и преизсбиліи или подъ какою нибудь тягосіею жилился , или когда человекъ всѣмъ тѣломъ налягается въ ворочаніи и ношеніи тяжкихъ бремени , ежели въ работѣ и въ игрушкѣ преизлишне надсядается , въ трубу трубитъ , ежели блюетъ , ежели сухъ будучи , на низъ густо испражняется , и когда женщина при рожденіи напуживается. Дѣлаютсяжъ килы и отъ упаденія съ вы-

Щ Щ

сокаго

482. КИЛА ИЛИ ГРЫЖА БРЮШНАЯ.

сокаго мѣста, и ежели отъ онаго бедра или спѣгна широко одно отъ другаго разшириваются, и оныя мышечныя протяженія и брюшина (791, 792) разслабляются. А еще, ежели чревныя внутренности, отъ наружнаго удару, отъ упаденія съ вышины, отъ стремглавнаго паденія, и отъ какой бы нибудь поворотливости, сильно содрогаются, ежели грудь и брюхо шнурованіями и брусками и узкими плащями стягивается. Хоть рѣдко, однакожъ примѣчено, что килы отъ нечаяннаго и спужанія бывають (*). У таковыхъ больныхъ причиною естъ слабосиліе, и у людей малосильныхъ, толстыхъ мокрошныхъ водяною болѣзною страждущихъ, и у тѣхъ которые повседневно много молока, еля, и масла коровья употребляютъ, или которые теплой воды много пьютъ, часто тупъ и индѣ на брюхѣ кишки и салникъ вонъ выходятъ.

(*) руишій. Прим. Анат. Хир. стр. 98.

§. 825.

По большей же части сія кишка и салникъ сперва въ пахи выпадываютъ у которыхъ и кишка сначала маленька будучи на бубонъ походитъ (123). Сія шишка вувонокеле п: е. паховая кила или грыжа называется, какъ я выше объявилъ (791). А чтобъ отъ надсады выпавшее ни было оную дорогу которою оно вонъ вышло, опчасу поширѣ и поширѣдѣлаетъ, а на послѣдокъ и въ плены шулятныя прохотъ получаетъ. Однакожъ случится можетъ, что ежели бы сильно человекъ понатужился топчасъ широко оныя протяженія мышечныя плевы и брюшина раздаются и въ то самое время кишка въ мошонку шулятную выходитъ.

§. 826.

§. 826.

Что же до примѣтъ общихъ во всякой килѣ бывающихъ принадлежатъ, оныя уже я объявилъ (601). также и чѣмъ паховая кила, онѣ паховика или бубона разнствуютъ (*) (123). Невесьма изъяснено различіе килы паховой и килы голенной. Только то чрезъ примѣчаніе открыто, что паховая кила у мужчинъ, а голенная кила у женщинъ чаще случается. Паховая кила ближе къ срамотамъ бываетъ, и въ паху нѣсколко пониже. Грыжа голенная бываетъ нѣсколко выше, и почти надъ бедрою высавывается. Онѣ чего, ежели вожженіе приключается, то сія кила больше болитъ, когда берцо згибается. Понеже ту же натягивается повязка широкая, подъ которою мускулы нѣсколко подвержена бываетъ (561).

(*) Межъ другими признаками и сей представится можетъ: Велѣтъ человеку кашлять, а межъ тѣмъ руку къ опухоли приложить. Ежели будетъ бубонъ, то въ опухоли почти никакого движенія не бываетъ слышно, а въ килѣ великое чувствоваться будетъ.

§. 827.

А что кишка въ опухоли будетъ, оное потому познавается, ежели кишка нѣсколко побольше персту сопротивляется. Также, когда вожженіе къ ней присунется, то гораздо боль сильнѣе бываетъ, частыя рвоны и нанизъ испражняться хочется, а самымъ дѣломъ ни калъ, ни вѣшры не выходятъ.

§. 828.

Ежели же салникъ будетъ, то опухоль обыкновенно мягче бываетъ, а при томъ и испраженіе нанизъ дѣлается. Однакожъ рвота понѣсколку бываетъ, понеже салникомъ натягивается желудокъ.

§. 829.

Усмотрѣножъ что иногда не вся кишечная труба въ опухоль опускается, но только одна да и та

Щ щ 2

нижняя

нижняя часть ея, которая тяжеснѣю кала помаленьку расцѣпляется и длиннѣе дѣлается, такъ что буди по бы нѣкоторымъ привѣсочкомъ и убежищемъ бывающъ; а понеже въ немъ калъ и съ нимъ въпры спираются, а припомъ и оно сплскивается, по оно и вожаеніе получающъ (*): дѣлаются боли великія и частыя блѣванія, и другія знаки худыя, однако на низѣ испражненіе бывающъ, понеже калъ надъ пѣмъ привѣсочкомъ къ низу проходить можетъ.

(*) Смотри у руишія въ Анат. Мышекъ стр. 63 фиг. 3. у негожъ въ Тез. 7 стр. 10 Т. 7 фиг. 2. и 3 въ Ист. К. А. Наук. 1700 году стр. 384.

§. 830.

Ежели какъ въ паховой такъ и во всякой килѣ вонъ вышедшее, внутрь назадъ не будетъ вправлено, то по времени Аншоноу огонь дѣлается, отъ котораго человекъ въ короткомъ времени, при холодномъ попу и жилъ чувствительныхъ распяженіи умирающъ. Но большее обдствіе бываетъ, когда одна кишка въ грыжѣ находится, да и та по полученіи въ себя кала гораздо ширѣ распухаетъ, нежели когдабъ съ кишкою и салынкъ вонъ вышелъ. Понеже гдѣ и кишка и салынкъ будетъ, по кишка свободнѣе въ брюхо спрячется можетъ. А гдѣ одинъ салынкъ выходитъ да и попу приискивается, блѣваніе и боль не такъ человека мучаетъ, и вожаеніе не такъ скоро приходитъ, но по большой части исподтиха, которое также смернѣю оканчивается, ежели оный салынкъ не будетъ вправленъ.

§. 831.

Того ради все намѣреніе пуда склонять должно, чтобъ выпавшее все, въ брюхо вправить. Не опмѣнножъ надобно, кожу надъ опухолью по прилѣженію
общес-

обпереть. Понеже когда она влажна и мокра будеть, то около опухоли перстами свободно дѣйствовать не возможно. Обперши хорошенко, приказати больному помочиться и лѣчѣ навзничѣ, бедрами высоко, голову же и грудь не самѣ больной (809) но слуга нѣсколко приподнять долженѣ. Также бедру, надѣ которою опухоль, лѣкарю должно согнуть, а другому слугѣ подвздошныя мѣста съ обѣихъ сторонѣ къ верху тискать. Тогда перстами подавивши наобѣно опухоль, чѣмѣ воздухъ, въ рознь разсыпался, ежели сего путь нѣсколко будеть. А на послѣдокъ, вышнюю самую макушку опухоли наискось да къ верху, и къ сторонѣ спези бѣлой, въ оную мышечную дыру, или какъ то называютъ, въ кольцо подавливанъ пакъ, чѣмѣ завсегда первѣе вправлена была та часть, которая послѣ вышла. Которыя части такимъ образомъ вправлены, то наложивши другой руки персти еще придавить, доколѣ все то что торчало спрячется. Ежели то будеть кишка, то юркнетъ (809).

§. 832.

Ежели же выпадшія части вожженіе уже получили, и понеже гораздо разлучились внутрь не возвращаются, что ошѣ различныхъ причинъ приключается, какъ я выше (808) объявилъ, то потчасъ за лѣкарства, которыя смягчатъ, которыя на самой опухоли приложены бывають (810), которыя въ нижней проходѣ впускаются (811), и которыя ртомъ берутся, принимаются (812) должно. Понеже опасаться надобно, чѣмѣ у того чловека, у котораго долго и вообще перстами опухоль перебирана, смертельное вожженіе не причинилось.

Щ щ 3

§. 833.

А чтобъ вправленнсе изъ паху и опъ мошонки шуляпной опяшь невыпало и въ брюхѣ остались, надобна тупѣ обвязка. Такихъ повязокъ, которыя пегимата называются различные манѣры бывають и почти каждый лѣкарь по своему обычаю дѣлають. Къ тѣмъ, которыми брюхо опоясывается, пришивать должно мячь, и его самого накладывать на оное мышкы наискось идущей колцо, и такъ удерживать, какъ кишку, такъ сальникъ, также и оную распяленной и протяженной брюшины плену или мѣшокъ, въ которомъ оныя заключены. Мяча онаго верхняя часть нѣсколько опереться можетъ на нижней оспи кости подвздошной и никакой другой части, ни кости гребенной, такъ крѣпко прижимать не должно, какъ теперь описанное мѣсто. Къ сему мѣсту мячь такъ принаровить должно, чтобъ оное не только прямо спюючи, но и при всякомъ тѣлесныхъ частей згибаніи ровно и безпрестанно давилъ. Понеже весьма опасаться надобно, чтобъ во время бедернаго згибанія, когда человекъ стоимъ, на лошади или въ коляскѣ, ѣдемъ, получа нѣкоторое межъ пахомъ и мячемъ разстояніе, кишка опянь не выпала. Того ради многіе люди упоиребляють поясъ изъ желѣза скованной, и кожею обшивають, и къ оному мячь придѣлываютъ побочный имѣющій, или маленькой блочекъ имѣющій, чтобъ и при зжиманіи бедеръ, мячикъ могъ въ пахъ уходить. Подпруги холстяныя, или изъ кожи дѣланныя, не крѣпко держають, и прикаждомъ тѣлѣ движеніи растягиваются. Къ тому жъ пришивають еще ремень или подъ пружку, для продѣванія межъ ногами, копорая всѣмъ, а наипаче женщинамъ, весьма

ма

ма полезна бываеѣ. Также ничего вредителнѣе и погубелнѣе не признавается, какѣ, ежели подѣ связкою не хорошо принаровленою, оныя часпи, копоры уже назадѣ вправлены были, нѣсколько выползываютѣ и мячикомѣ припискиваются, а не придерживаются. Отѣ того произойтиѣ можетѣ вожденіе, и: дѣлаѣ, что оныя часпи, такимѣ порядкомѣ, какѣ выше (804) я предложилѣ, межѣ собою сроснутѣ, и другѣ на дружкѣ лежатѣ будучѣ, и послѣ назадѣ внутрѣ вправитѣся не возмогуѣ. Лѣченіе такое употребивѣ ребята: пакѣ выздоравливаютѣ, что безѣ всякаго вреда: обвязку по времени покидаютѣ, а сѣ взрослыми: и сѣ стариками: не: пакѣ дѣлается, какѣ о шомѣ индѣ сказано. (803)..

§. 834..

А ножемѣ дѣйствующѣ тогда, ежели выпадшія: и: вожденіе имѣющія: часпи будучѣ, а внутрѣ вправитѣся не могуѣ, или: когда попадетѣ вѣ кишку калѣ и вѣтры и отѣ того она весьма: широко будещѣ пучиѣся, или: когда: кишка: и: сальникѣ а припомѣ брюшинина плена, также: брюшина: и самое кольцо межѣ собою: сроснутѣся.. Тутѣ: поспѣшно: дѣлаѣ надлежитѣ, да и: дѣлаѣ надѣ свѣжимѣ приключеніемѣ, а не тогда какѣ у человекѣ вѣ кишкѣ Анпоновѣ огонь и крайнѣе: безсиліе будещѣ и икота, помягота, потѣ холодный, и другіе худые знаки: значаѣ, что уже кѣ концу: пришло. (813)..

§. 835..

Сперва надлежитѣ слабительный клистерѣ поставить, кровь: жильную: пуститѣ, помочитѣся и пахѣ, ежели: опдоенностью: прикрывѣ, обрить. Ежели же: надобно: пахѣ: разрѣзать, должно: человекѣ: навзничъ: поло-

положить , такъ чтобъ голова въ низъ опустилась , а сѣдалище въ верхъ приподнялось , и такъ его помощникамъ держаць. Однакожъ бедру , на ксторой опухоль кому нибудъ приподняць должно. Лѣкаръ и помощникъ перспами надъ опухолью кожу захватывають въспло складываютъ , приподнимають , и скрозъ се ножечкѣ прямой , оборотя сбухомъ къ опухоли просасываютъ , такимъ образомъ оную и разрѣзываютъ. А когда кожа опѣ вожженія очень попорчена , и приподняць ее не возможно , оную съ внѣшней стороны къ низу осторожно разрѣзать можно. Разрѣзавши кожу , жиръ , копорый иногда очень жестокъ бываетъ , не такъ рѣзатъ какъ инструментомъ и ножечкомъ туповатымъ (дешоссеръ) раздвигатъ должно , покуда не дойдетъ до грыжной оболочки , опѣ брюшины до самого низу продолжающейся. Понесъ я уже сказалъ , что она хотя рѣдко , а бываетъ прорвана , и подъ нею потчасъ кишка случается (794). При котормъ случаѣ ежели кровь пещь будетъ оную корпѣю , или губкою захватывать и обипиратъ , ежели же бьющаяся жила перерѣзана будетъ , оную завязатъ.

§. 836.

Оболочку брюшинину , просто мѣшкомъ называемую , держа въ рукѣ ножичекъ весьма легко , кончикомъ , не такъ рѣзатъ , какъ помаленьку поскабливать , и такъ вскрывать , чтобъ кишки подъ нею находящейся не повредить. Прорѣзавши самую маленькую дырочку ножечкомъ , ножницы туда опустивши по персину оную ширѣ разрѣзатъ. Тутъ по большой части мокрота вонъ выходитъ , изъ копорой , ежели будетъ хороша , не сизовата , и не дурно воняюча ,
можно

можно надѣяться, что человекъ выздоровѣетъ. Ибо, ежели все выпавшее суховаго найдется, то догадываться можно, что всѣ оныя части съ пленою брюшинною срослись. А чѣмобъ хорошенько кишки внутрь вправлены быть могли, то ежели онѣ гораздо раздулись, нѣсколько ихъ къ себѣ попристянуть, дабы чрезъ то спершійся вѣтръ, и прошедшій туда калъ пространнѣе разошлись (688). Ежели же оное кольцо сожмется, и ради того кишкамъ вправиться въ брюхо невозможно, то должно его надрѣзать, и ширѣ разширить. Для того помощникъ выпянуныя кишки долженъ приподнять, чѣмобъ онѣ всегда отъ ножика подалъ были. Къ сему руководствію предъ другими способнѣйшимъ находился оный ножикъ, копорый ЛЕ ДРАНЪ вымыслилъ. Однакожъ употребляемы быть могутъ и другимъ манеромъ ножики и орудія здѣланные (690). Разрѣзывать же должно оное кольцо называемое къ спезѣ бѣлой на верхнюю сторону, чѣмобъ жилы бьющейся верхобрюшной не ранишь (692).

§. 837.

А сальникъ хотъ одинъ, хотъ съ кипкою выпадетъ, и никакого вреда у себя имѣть не будетъ, также полегоньку рукою вправить можно. Ежели же онѣ ожесточѣетъ или вожденіе будетъ уже имѣть, то лучше оный не опуская времени нипкою завязавъ перерѣзать, наблюдая все то, что я выше приказалъ (683): Ежели что съ брюшиною сроснется, или оная надъ кольцомъ держаться будетъ, оное ножикомъ не перерѣзывать, но черенкомъ его, перстомъ или ножикомъ ПЕТИТОВЫМъ (690) раздѣлить должно (816).

Въ

§. 838.

§. 838.

Нѣкоторыя брюшинную плену, въ томъ мѣстѣ, гдѣ она на яву здѣлается, не приказываютъ прогнать, но цѣлуютъ ее, и все что ни выпадетъ вонъ, опять на задъ вправляютъ велятъ. Но лѣченіе такое не всегда безвреднымъ мнѣ кажется. По меньшей мѣрѣ, когда опухоль велика будетъ, какова въ ошечелѣ ш. е. въ килѣ шуляпной обыкновенно часто случается, и когда плены отъ застарѣнія и отъ частаго вожженія окрѣпли, или, когда брюшина къ кольцу, кишки и салникъ къ брюшинѣ прироснутъ, и когда попорченная саніасъ, гной и другое нѣчто несвойственное подъ шѣмъ будетъ, оное пособствовать не будетъ, но всегда повредитъ.

(*) Смотри. ГАРЕНЖОТЪ Т. I. стр. 311.

§. 839.

Все внутрь вправивши, оное сухожильное кольцо, особливо, ежели оно гораздо будетъ ослаблено, можно ножкомъ понадрѣзать, чтобъ чрезъ оный способъ спрутъ здѣлался. Къ ранѣ прикладывается мячъ помянутый (21. фиг. 2), а сперва его въ лѣкарствѣ къ тому способномъ обмочить. Больше въ обычаѣ имѣется янцо въ судно выпускать, и прилизъ немножко спирту горючаго разбавливать, и сею смѣсю мячъ или карпію обмачивать. Прикладываются сверхъ того сукончки многія, одна другой побольше, и сверхъ того завязываютъ обвязкою, которая въ паху колосъ изображаетъ, отъ чего и имя себѣ имѣетъ. Оспергаться же должно, чтобъ сосудовъ сперматическихъ мячомъ и суконками не давило.

§. 840.

§. 840.

Надобно больному навзничь, на другой бокъ наклоняся, приподнимя нѣсколько бедръ лежать, воздержному быть. Вовсемъ осторожно поступать, будто бы около тяжко раненаго человѣка. Весма полезны клистеры слабительныя часто наставляемыя. Ежели особливый какой случай не востребуесть, обвязанія до трехъ дней не развязывать, да и въ то время крайне спараться, чтобъ внутрь вправленныя части опять назадъ не поворотились. Связкажъ и по залѣченіи раны больному весьма надобна (833).

§. 841.

Случится можетъ, что по открытіи опухоли при разрѣзаніи брюшинной плены кишка уже повреждена, и Антоновымъ огнемъ зараженная найдется, что уразумѣть можно по цвѣту, и ежели изъ раны калъ съ смрадомъ будетъ ишить. Тутъ по большой части смерть не подалеку бываетъ. Иногда избавиться отъ смерти человѣкъ можетъ томъ, у котораго мѣсто пороченое прочь отрѣзываютъ, и верхній конецъ кишки, къ ранѣ пришиваютъ * (697).

(*) Смотр. что къ §. 674 прибавлено. Прибавъ еще ЛАВР. ГЕЙСТЕРА Дисс. о килѣ перехваченной заткнувшейся часто не смертоносной бывающей. [Дисс. Де Гернта инкарцерата суппурата септонъ летали,] въ Гельмстад. 1738 году. который еще представляетъ, что такъ и килу излѣчить можетъ, Лбкаръ, который мягкостью опухоли и мнѣніемъ о злобѣ обманется. Два примѣра также приводитъ САМУИЛЬ ШАРПЪ въ же Траитезе оу те Операционсъ оффъ Суттери Гл. 3 стр. 16.

КИЛА ИЛИ ГРЫЖА МОШНО- ШУЛЯТНАЯ.

О СХЕОЦЕЛЕ.

§. 842.

Но ежели у кого кишка и сальникъ въ мошонку шулятную выйдутъ (791), и оная мошонка распухнѣтъ, то чѣшбъ такой случай не почѣсть за мясную или водяную килу [сарко или гидроцеле] называемую, надобно подлиннѣшею примѣтою апробовать. По-неже великое разнствіе въ начинаніи и причинахъ состоитъ, о которыхъ выше (824) я предложилъ, когда что осхеоцеле дѣлается по большей части изъ вувонокеле (825), или пожѣ самое толькожъ рѣже случается, отъ сильной всѣмъ тѣломъ насады и движенія, или когда придавлено брюхо будѣтъ. Сарко-келе ш. с. мясная кила шулятная отъ вожженія япра остается а Идрокеле ш. с. водяная болѣзнь шулятная, по большей части, когда сильно придавлена будѣтъ мошонка шулятная. Ежели подъ опухолью будѣтъ кишки и сальникъ, оныя, когда человекъ на-заничь ляжѣтъ (831), въ брюхо оныя входятъ могушъ. Хотя же и не всѣ то, что выпало, войдѣтъ за тѣмъ, что брюшина надъ кольцомъ будѣтъ лежать, однако большую выпавшихъ частей половину перспами внутрь вправить можно. Въ саркоклѣ ш. с. въ килѣ мясной шулятной опухоль жеспка какъ камень, а въ Идрокелѣ ш. с. водяно шулятной грыжѣ, опухоль отъ перста опдвигается, а когда перстъ опнимѣшь, то потчасъ приподнимается. (сюда слѣдуютъ 801, 827, 828).

§. 843.

§. 843.

Къ лѣченію способъ такой же, какъ лѣчена бываеѣ вувонкеле ш. е. паховая кила. Однако нѣкоторыя примѣчанія неопмѣнно надобныя имѣются. Не надобно смѣло или отважно къ дѣйствию ножемъ покушаться, когда все то, что ни выпало, можно вправить, и наложивъ обвязку, къ которой мячъ пришилъ (833) внутри удержалъ. Также гдѣ гораздо много кишекъ и сальника выйдѣтъ, и для того великая опухоль будетъ, обыкновенно такъ великой страхъ бываеѣ, чтобъ вожженіе не здѣлалось, что по большой части кольцо разпустившееся и гораздо разслаблѣе бываеѣ. Въ семъ случаѣ также рѣзаніе не весьма безопасно, но за сумнительное лѣкарство признано, какъ то уже вовсе извѣстно. Поневже прорѣзавши кожу хотя все въ брюхо и вправлено будетъ, и безъ поврежденія спрячано, однако необычайная оныхъ частей тягость кажется сильно мучить человѣка можетъ, да такъ, что не рѣдко въ короткомъ времени и нечаянно можетъ умереть (819).

§. 844.

Но ежели брюшина съ кольцомъ срослась и затѣмъ назадъ вбратъся не могутъ, то больной въ здравіи очень опасенъ, понеже такой опухоли подвѣмячъ подпрятать нѣсколько не возможно (804). Однако въ временѣ то здѣлаться можетъ, какъ то отъ опытовъ наученось, ежели оба и кишка и сальникъ въ кольцо выйдутъ, кишку внутри вправить можно, а сальникъ съ брюшинною пленою или съ мѣшкомъ сросшійся, въ паху останется, и оттого наипаче опухоль великая оспается. Ибо ежели обвязка такъ положится, чтобъ кишка въ мошонку шулятной

В В 3

выско-

494 КИЛА ИЛИ ТРЫЖА МОШНОШУЛЯТНАЯ.

выскочила, а сальникъ маленько и не крѣпко приписнеп-ся, по человекъ почти безъ всякой опасности быть можетъ (*).

(*) Смотр. у шарпа въ показ. м. стр. 15.

§. 845.

Ежели въ килѣ шулятной [осхекилѣ] великая часть сальника, и съ нимъ совокупся кишки выпадшія будущъ, и онѣ ни изъ мошонки исключишся и внутрь вправившся, ни приложеніемъ мяча удержаться не могушъ, по больному много облегченія здѣлаешъ, обвязка отъ лѣкарей суспензоріумъ т. е. поудѣлкою называемая, которою великая оная кила поднимается, и покойно держишся (132).

§. 846.

А въ той шулятной килѣ, которую ножикомъ должно лѣчить, тамъ опухоль разрѣзывать отъ паха или отъ кольца къ низу до самаго яйца. А припомъ и до брюшининой плены или до мѣшка, чтобъ ножикъ доспалъ, толькожъ мѣшокъ такъ прорѣзывать должно, чтобъ кишки, которая обыкновенно подъ нимъ бываетъ, не повредитъ. Изъ прорѣза обыкновенно выпекаешъ мокрота, которая внутри въ брюшинину плену по большой части собралась, и оная, ежели будетъ хороша, не сизовата или худо не воняетъ, надежду представляетъ (836). Впрочемъ ничего новаго къ лѣченію не пребуется (приложи сюда 835, 836, 837). Завсегда оболочку брюшинину прорѣзывать надобно (838), а обвязку (839) принаравливать такую должно, чтобъ на ней и мошонка шулятная повѣшена была. Ежели же лѣченіе и благополучно окончится, однакожъ завязки (833) во всю жизнь больному опкидывать не надобно.

§. 847.

§. 847.

Временемъ случится можетъ, что перерѣжется бьющаяся жила надчревная (692, 836), изъ чего великое крови теченіе и опасность крайняя къ смерти слѣдуешь. Понеже оной завязать хорошенько не можно. Того ради пряжу въ ликворѣ вяжущемъ (411, 412) обмочивъ, и выжавъ къ жилѣ бьющейся приложитъ, и оную чрезъ нѣсколько часовъ перстами равномѣрно прижимать (407) надлежитъ.

§. 848.

Кила голенная (792) часто бываетъ у женщинъ, у которыхъ опъ беременностей и опъ родовъ брюшинная плева обыкновенно, а особливо въ томъ мѣстѣ, гораздо распяливается, и ослабѣваетъ (826). Ежели кишку нанизъ вышедшую внутрь вправлять должно (831), то движеніе дѣлать надобно такое, чтобъ ее наискось, къ верху, и къ спезѣ или черпѣ бѣлой, подавливать. Понеже при вправленіи килы паховой опухоль внутри подавливать на внѣшнюю сторону и къ кости подвздошной (809, 831).

§. 849.

Гдѣжъ на опухоли воженіе будетъ, и выпавшихъ частей въ оной стоящихъ внутрь вправить не можно, то оную опухоль, какъ и другія килы безъ изыятія, надлежитъ разрѣзать. Многіе велятъ опухоль поперегъ рѣзать, а другіе объявляютъ лучше рану дѣлать впрямь нѣсколько наружу, чтобъ опухоль къ низу прошла, съ прибавленіемъ такимъ, что де опасность есть поперегъ рѣзучи не перерѣзавъ бы жилы бьющейся надчревной (692, 836, 847) или жилы крововозврательной берцо-плюсенной, ибо по анапоміи знаемъ, что онѣ тутъ близко лежатъ.

Повре-

Повреждены также быть могутъ желѣзы въ паху, и подѣ опухолью лежащія жила быющая и жила кровезовращательная голенная. По отвореніи опухоли, прилѣжно объ ней разсудить должно, новая ли она, и не приключилась къ ней другой порокъ отъ застарѣлости или отъ ношенія сперва пояса желѣзнаго или наکیلника. Если она не очень давно здѣлалась, то не всегда нужна бываетъ, оболочку брюшинную или мѣшокъ (838) прорѣзывать, должно то дѣлать, когда уже она плена отъ спарости отверденѣла, или если она ужъ туга стала и давишь кишку, (814) или, если въ нее уже много мокроты скопилось (838).

XX

ПУЗЫРЯ УРИННАГО КИДА.

ЦИСТОЦЕЛЕ.

§. 350.

Чтобъ пузырь уринный въ опухоли килы паховой, или мошонкошуляпной былъ, рѣдко случается (793). Оное познать можно потому, что человекъ не подавивши снаружи опухоли сцать не можетъ. Сей порокъ такимъ же способомъ лѣчатъ. Крайнее попеченіе и умѣренность приложить должно, чтобъ при разрѣзываніи опухоли, пузыря не повредить, вѣдаемъ бо, что онъ не въ оболочкѣ брюшинной, но вблизи подъ кожей лежащей плеснѣ жирной или клещеюй бываетъ.

§. 851.

бросить надобно оный подлый неискусныхъ бродягъ лѣченія способъ, которые при всякой паховой килѣ и мошношулятной килѣ япро отрѣзываютъ, и вонъ вынимаютъ. Да и другіе способы къ лѣченію, по которымъ многіе поступаютъ, безопасны больнымъ быть не могутъ.

ВОДЯ-

ΥΔΡΟΜΦΑΛΟΣ.

§. 852.

(*) См. фигуру в пурманновой Хирургии курьозной, Гл. 7: стр. 330.

~~~~~

ΣΑΡΚΟΜΦΑΛΟΣ.

§. 853.

На пупкѣ иногда мясо нарастаетъ , которое  
часто подобно будучи раку , съ опасностью поль-  
зуется.

зуются. Обыкновенно то случается у ребятъ, у которыхъ при рожденіи пупокъ слабо бываетъ завязанъ. Иногда худое мясо глазами и обстоятельно видѣть можно, и съ вредомъ подрастаетъ, а иногда оно подъ кожей бываетъ, и не ровно вспухаетъ. Временемъ мѣсто мягко, а временемъ жестко бываетъ, которое прогаячи у нѣкоторыхъ болитъ, а у нѣкоторыхъ не болитъ. А опухоль, какъ челоуѣкъ навзничъ лежитъ, никогда, хоть кишка внутрь впадетъ, не опадаетъ, и хоть ее подавишь, не подается, худое мясо въ тойже фигурѣ ее оставляетъ. Иногда пупъ и многіе пороки случаются, что и кишка и сальникъ выпедшія бываютъ, и съ ними вода оболочку брюшинную распяливаетъ, а припомъ на перепонкахъ дикое мясо наростаеъ. Если опухоль съ худымъ чирьемъ и очень жестка будетъ, съ великою болью, оная опъ всякаго лѣченія, а особливо опъ прикладыванія лѣкарствъ прижигающихъ, хуже спановится. Онуюжъ не безъ опасности и ножичкомъ можно рѣзать. Если же опухоль нехуда, оную иногда обоими способами лѣчить можно (\*). Также мясо подъ кожей выросшее, прорѣзавши кожу, прочь отдѣлить и вонъ вынуть должно.

(\*) Смотр. ЮВА МЕЕКРЕНСКАГО въ примѣч. Гл. 47 стр. 266.

## МЯСНАЯ КИЛА.

ΣΑΡΚΟΚΗΛΗ.

§. 854.

Сего порока два рода я объявилъ (798). И оба дѣлаются, когда или ядро, или къ нему принадлежащія



жациа жилы быющіяся и жилы крововозвращательныя и перепонки, которыми си часпи объемлются, приписуны, досажены и возжены бывають, особливо ежели япро отъ сихъ или другихъ причинъ, отъ нечистаго блудоубѣянїа и отъ удержанной гонорей (129) возженное будучи, не хорошо будетъ лѣчено (254, до 258) (\*). Примѣчаніе научило, что япро пухнуть, и саркокеле дѣлаться можетъ отъ такой же причины, отъ какой другїа и настоящїа килы дѣлаются, ежели удержавши въ себѣ духъ или тяжелую фашину или въ другомъ случаѣ человѣкъ сильно и долго надсядается, или онъ же высоко плянуци на всмяку опускается (\*\*). Очень рѣдкостью почестъ можно, что япро костяное бываетъ (\*\*\*)

(\*) Мясную килу [саркокеленъ] отъ иглы въ япро у младенца узвизшей описываетъ САВІАРДЪ въ Примѣч. 56 стр. 253.

(\*\*) Смотр. ЛЕ ДРАНОВО Прим. 75 Т. 2 стр. 132. Когда брюхо надуется и при сильномъ жиленїи мышка наискось идущая вышняя чревная напрягается, и кольцо сжимается, которымъ отроетокъ брюшинной, или сосудовъ сперматическихъ покровъ, который отъ оболочки клещетой брюшинной онъ имѣють, притискивается. Въ писанїи или скакантїи борзомъ случиться можетъ, что отъ кишки ободочной каломъ густымъ изнаполненной и надменной брюшина надъ кольцомъ ушибется, и возженїе получитъ. Си приключенїа, ежели дѣлаются, препятствуютъ крови жилами крововозвращательными маленькими проходить, а при томъ распухаетъ и загорается япро. Сей случай я не очень давно самъ утвердилъ самимъ дѣломъ, понеже, чтоо въ водяную килу [идрокеле] излѣчить гораздо протѣжно, разбѣзалъ оболочку влагалищную. Понеже на томъ япрѣ великое возженїе дѣлалось, въ опухолью не для какой иной причины, только что отъ возженного онаго сосудовъ сперматическихъ покрова притиснулись жилы крововозвращательныя, и что кровь оными протекаетъ не могла.

(\*\*\*) Смотр. Ист. К. А. Наукъ 1700 году стр. 47.

#### §. 855.

Ежели япро затвердѣло, то лучше не употребляя ножа сперва попробовать лѣкарствъ, которыя

способными къ разбиванію опухолей желѣзныхъ и скирровъ я выше представилъ (113, 267). А при нихъ весьма надобна обвязка [фасція], которую я лямкою назвалъ [суспенсоріумъ] (845), которою ядро подхвативъ завсегда поддерживать должно. Лѣкарства ртомъ принимаемая мало пособствуютъ. Пища должна быть тонкая и умѣренная, а припомъ и слабительныя употреблять.

#### §. 856.

По употребленіи же сихъ лѣкарствъ чрезъ нѣсколько времени, ежели опухоль ничего не убавляется, и у больного ядро безобразно, или еще и съ болью будетъ висѣть, положено послѣднее сіе отвѣдать, ядро вырѣзать. Но съ самаго начала разсудить и бережливонько перстомъ должно освѣдомиться о жилахъ быющихъ и жилахъ крововозвращающихъ, гдѣ оныя изъ такъ названнаго колечка выходятъ, и къ ядру проходятъ. Онѣ ежели будутъ гораздо распухлы и жестки, по хирургіи, въ которой много родовъ и временъ опасныхъ бываетъ, безъ вреда здѣлать не уповательно, понеже ихъ безъ опасенія ни перерѣзать, ни завязать не возможно. Нѣкогда и другой порокъ пушъ же бываетъ, по есть въ разслаблѣнное кольцо какъ сальникъ такъ и кишки выходятъ, и на жесткомъ и распухломъ ядрѣ лежатъ. Оное попому познавать можно, что въ паху, гдѣ предсказанныя жилы быющія и жилы крововозвращательныя выходятъ, опухоль будетъ, не очень пугая, а побольше равная, и ежели навзничь человека положивши часть нѣкоторая въ брюхо уходящъ, или ежели подавивши назадъ вдавливаясь. И сей случай лѣчить можно, выра-

вправить все вонѣ выпавшее , жилѣ бьющихся и жилѣ крововозвращательныхъ канзтикѣ нишкою крѣпко завязать , и япро вонѣ вырѣзать.

## §. 857.

Ежелижѣ въ такомѣ случаѣ ножичкомѣ дѣйствовать надобно , то человекѣ чрезѣ нѣсколько воздержаніемѣ опѣ кушанья и опѣ вина приготовить должно , чтобѣ больной понемножку и здороваго кушанья употреблялъ , а пилѣ пшизанѣ. Кромѣ того кровь пустишь и слабительное дать изѣ лѣкарствѣ довольно сильныхъ , но не острыхъ (83). Въ самый потѣ день , пахѣ , ежели волосами обросѣ , выбрить , человекѣ навзничѣ положить , и разрѣзомѣ пахѣ и мошонку шуляпную съ верху до низу отворить. Ежели сіе не дѣлается такѣ , то опасаться надобно , чтобѣ чего крови запекшейся въ мошонкѣ шуляпной не оспалось. Ножикѣ прямой такѣ употребить должно , чтобѣ онѣ обухомѣ былѣ къ сосудамѣ сперматическимѣ , и имѣ сперва одну кожу рукою лѣкарскою и помощниковою вдвое схваченную и приподнятую съ жиромѣ прорѣзать (835). Когда же до оболочки , сосуды оныя покрывающей , дойдешь , тогда конецѣ ножиковѣ наклонить должно , чтобѣ и ее прорѣзать. Однакожѣ ножикѣ весьма легкою рукою держать надобно , и крайнее сипараніе употреблять , чтобѣ жилѣ бьющихся , жилѣ крововозвращательныхъ и жилѣ чувствительныхъ не коснуться (836). Прорѣзѣ дѣлать должно небольшою , только чтобѣ перстѣ пройти могѣ. По сему персту въ рану всунутому , рану ножницами свободно ширѣ разрѣзать можно. А припомѣ ежели кишки вышли , и на япрѣ лежатѣ , то больше осторожности имѣть должно , чтобѣ чего изѣ выпавшихъ частей не досадишь.

днѣ. Оныя ежели въ виду здѣлаются , поспѣшѣ  
внутри въправить надлежитъ (836); а сальникъ завязать и отсѣзать можно. Однакожъ прилѣжно раз-  
смотримъ , чтобъ въ сальникъ какой кишки, а особ-  
ливо слѣдной кишки привѣсочки завернуто не было ;  
а то можетъ случиться , ежели кила съ праваго паху  
будетъ производиться (683 , 837).

#### §. 858.

Открывши сѣи всѣ части , въ первыхъ не давно  
помянутый оболочки клетчатой отпросокъ , который  
по большой части жестокъ и распухъ бываетъ , отъ  
канатика сосудовъ сперматическихъ отдѣлить , и нип-  
кою воцанною особенно отъ другихъ къ кольцу при-  
вязать должно ; а другою нипкою надобно завязать  
канатикъ сосудовъ сперматическихъ пѣхъ , отъ ко-  
торыхъ ядро зависитъ. Нипку вчетверо сложить  
должно изъ пряжи несученой , бокъ съ бокомъ скла-  
дывая , и промежки воскомъ такъ свощить , чтобъ  
они песѣмочкою казались. Концы нипки одинъ съ  
другимъ сведши , въ первый разъ простымъ узломъ  
завязываютъ , и затягиваютъ ; а потомъ , нипкою  
обхватя въ другой разъ канатикъ , завязываютъ двой-  
нымъ узломъ , какой по большой части у Лѣкарей въ  
употребленіи есть. А притомъ межъ концами нипош-  
ными , покуда еще не запянутся , класъ надобно при-  
давочки маленькія изъ холстины воцанной , чтобъ чрезъ  
то нипка покрѣпче на мѣстѣ легла , и чтобъ жилы  
бьющейся и жилы кровезовращательной не перерѣзала.  
Концовъ въ ранѣ не оставлять , но на ружу выстав-  
ливать должно. Сіе все здѣлавши , ядро отъ оболоч-  
чекъ перстомъ , череномъ ножиковымъ и инструмен-  
томъ способнымъ отдѣляется. Ежели опухоль без-  
мѣрно

мѣрно велика будетъ, то и изъ мошонки шулятной нѣсколко вырѣзывается. На послѣдокъ оный канатикъ, на которомъ ядро виситъ, ножичкомъ перерѣзываютъ, около чешырехъ перстовъ отъ завязаннаго мѣста отступя. Перерѣзываютъ также оный покровъ, который другою ниткою былъ завязанъ, на два перста отъ себя отступя, и все ядро отнимаютъ. А кольцо еще ширѣ вновь разрѣзать должно, чтобъ по приключеніи вожженія пухнуція жилы быющіяся, жилы кровеовращательныя и жилы чувствительныя, съ симъ покровомъ, который съ сосуды отъ оболочки клещевой имѣютъ, малымъ и шуго замянутымъ кольцомъ не задавились.

§. 859.

Въ рану пряжу такъ долго класть должно, пока она со всѣмъ не закроется, и не наполнится, но и оной не припискивать, только излегка накладывать. Прочее что къ лѣченію принадлежитъ, оное выше (834, 839, 840) представлено. Гдѣ опасность будетъ, чтобъ мочою человѣческаго обязаніе не замочилось, и рана не разбередилась, принаровить можно къ мошонкѣ шулятной покрывку изъ вошанова холста.

§. 860.

Къ сему лѣченію спѣшить никакъ не прилично, для того, что оно опасно. Да и не во всякомъ порокѣ отвѣдывать оное должно. Ибо если жилы быющіяся и жилы кровеовращательныя сперматическія, отъ которыхъ яйцо зависитъ, затвердѣли, оныхъ завязать не возможно (856). Понеже когда ихъ ниткою повыше и въ самомъ брюхѣ замянешь, обыкновенно слѣдуетъ въ брюшинѣ, или по крайней мѣрѣ въ оболочкѣ клещевой, которая подъ нею, вож-

женіе

женіе , опѣ котораго человѣкъ всегда погибаетъ. Также слово въ слово лѣчить должно ятро , когда опѣ сильно зашибности , или опѣ другаго случая , будетъ рѣшиться , и къ Антонову огню склоняться (133). Оносѣ лѣченіе за суетное почитается , ежели поздно начнется , и гдѣ уже жилы быющіяся и жилы крове-возвращательныя часто помянутыя , опѣ которыхъ яцо зависитъ , Антоновымъ огнемъ уязвлены будутъ. Однакожъ иногда и отважное лѣченіе пособствовало (\*).

(\*) Смотр. ле дранъ т. 2 Примѣч. 74 стр. 149.



## ВОДНАЯ КИЛА.

У Д Р О К Н А Н.

§. 86г.

Влажность , которая почти всегда межъ среднею , попросу влагалищною называемою , и самую внутреннюю ятерною оболочкою или бѣлошною бываетъ , (\*) выходящъ изъ прорванныхъ пасокъ опредѣленныхъ венъ. Также скапливается , какъ кажется , ежели влажность , которою оныя части , чтобъ одна съ другою не срослись , влажнѣютъ , опять своими жилочками маленькими не поглощается.

(\*) Я разсуждаю , рѣдко случается , чтобъ влажность находилась между плевою Эриероидею т. е. краснообразною и влагалищною. Смотр. кто презрѣдно кажется о водной килѣ писалъ. Шарпъ С. Трактате онъ же Операціонсѣ. Гл. 11 стр. 32. Мнѣ кажется , что многихъ Авторѣвъ заставила думать о сей килѣ опухоль , которая въ пленѣ влагалищной и въ клѣточкѣ влажностію стекающеюся разширеной дѣлается , и гдѣ влажность , будто бы въ своей покрывкѣ и въ коробочкѣ заключенна , межъ пленою влагалищною и Эриероидею т. е. краснообразною. Но ежели сіе случится , то по большой части будетъ влажность межъ ятромъ и влагалищною пленою. Я уже выше объявилъ , что въ кишечной и салнишной килѣ не рѣдко въ брюшинную

шинную плеску или мѣшокъ вода протекастъ (836). А вода подѣ самую внутреннюю или бѣлопную ятерною плескою быть не можетъ разѣ ятро будестъ поврежденное и окрѣплое, каково обыкновенно въ мясношуляшной килѣ бываетъ. Водяную шуляшную килу, въ которой вода въ трехъ мѣстахъ найдена, описываетъ ЛЕ ДРАНЪ Т. 2 примѣч. 75 стр. 159.

## §. 862.

По вышеписаннымъ и по особенно неложнымъ признакамъ (842) познать можно, что шупѣ вода. Если воду перстомъ подавишь, то она, или кругомъ будестъ обтекать, или, если сильно пріумножится, то опухоль будестъ ошпрыгивать, какъ коженой мѣшокъ водою наполненной и крѣпко завязанной, однако же въ ней ятра по большой части ни глазами видѣти, ни осязаніемъ чувствовать не возможно. Опухоль никакой болѣзни въ себѣ не имѣетъ, которая хотя временемъ и невелика бываетъ, однако ни когда вовсе не пропадетъ, и когда давишь, не опадаетъ. А въ паху и въ томъ мѣстѣ, гдѣ жила бьющаяся и жила кровезовращательная, ошѣ которой ятро зависитъ, изъ кольца выходятъ, опухоли или ничего нѣтъ, или не много, прошивъ величины оной, какою внизу мощна шуляшная распялена. А припомъ, если вода внутри находящаяся, гораздо пріумножится, а никакой бѣды съ собою не принесетъ, она въ шуляшной мощнѣ будто бы въ стеклѣ или бы въ рогѣ видна: а которая будестъ навозиста, сильно густа, цвѣтомъ очень блѣдна и черна, оной такъ распознать не возможно. Кромѣ того причины, ошѣ которыхъ различные килѣ и опухоли роды происходятъ, также признаки различныхъ видовъ, выше я показалъ (842).

В ъ

§. 863.

## §. 863.

Имѣются другіе признаки, которые мѣсто показывающѣ, гдѣ вода. Понемногу не мало разнѣствуютъ водяная болѣзнь шуляпная, отъ водяной болѣзни ятерной: Ибо ежели оболочка оная клѣтчатая, копорая подъ мошонкою шуляпною, и копорая оную перепонку, копорую дѣлѣи называющѣ, съ обѣихъ сторонъ прикрѣпляютъ, водою напряженна, мошонка шуляпная безъ морщинъ бывающѣ гладка, обложена и больше: всякой часи своей распухла. Порокъ сей по большой части съ водяною болѣзнию во всемъ мѣстѣ начинающаея обыкновенно бывающѣ. Опухоль мягкая, копорую какъ персню придавишь, уступаетъ, и какъ персню опнимешь, не скоро приподнимается. Опухаетъ также кожа на удѣ дѣтородномъ мужескомъ, надъ пѣшикою находящаяся, такъ, что оною спволъ уринный заперся. Въ водяной болѣзни ятерной [индурцелъ] опухоль давящему больше уступаетъ, а какъ персню опнимется, по потчасъ приподнимается. А мошонка шуляпная морщиновата, удѣ дѣтородной маленькой и свѣженной, копорый весь почти подъ опухолью спрятанъ. Опухоль только что въ одномъ боку мошонки шуляпной по большой части случается.

## §. 864.

Вдрокеле т. е. ятерная кила дѣлается, когда вены насочныя прорывающа, или, когда придавлены и спянушы бывающѣ проходы кровные, по влажность свободно назадъ возвращаться не можетъ. И такъ, ежели ятро, что сядящимъ на лошади, или на борзой лошади вѣздящимъ, иногда случается, подъ



подъ бедру попадеѣтъ , и оноѣ отъ сего или отъ другого случая и отъ удару сильно придавится : Ежели на жилу бьющуюся и на жилу крововозвращательную , отъ которыхъ ядро зависѣтъ , нѣчто наляжетъ , и онѣ отъ выпавшихъ вонѣ кишекъ и отъ окрѣплаго салника , отъ платья или завязки , ради паховой килы наложенной , давятся ; ежели иная опухоль отъ опсѣкилы или саркокилы здѣлавшаяся , отъ нихъ зависящая , ихъ гораздо сволакиваетъ , и жилы крововозвращательныя спѣсняетъ , сей порокъ обыкновенно дѣлается . Изъ сихъ можно разумѣть , что иногда яперная кила сама отъ себя дѣлается , а иногда она съ другими родами килъ бываетъ .

## §. 865.

Сей родъ болѣзни неболенъ , и почти небѣдственъ . Ежели вода гораздо накопится , то иногда она скрозъ разпннутыя перепонки прорывается , и вонѣ выходитъ ; а какъ рана заживетъ , опять около яща она скапливается ; тогда самое дѣлается , гдѣ и прорѣзываючи опухоль воду выпускаютъ . Удрокеле не такъ спрашна та , которая не весьма къ Анипонову огню и къ другимъ вредностямъ , больше опасностей въ себѣ имѣющимъ , склонна . А приномъ она не препятствуетъ людямъ до самой старости доживать , только чѣмъ опухоль на обвязкѣ подвѣшена была . Въ пѣлѣ худого сложенія , или ежели мокрота внутри отъ смѣшенія съ кровью гнилая будетъ , она ядро и кожу испочить можетъ , такъ чѣмъ худые чирьи и свищи временемъ дѣлаются могутъ .

## §. 866.

Лѣкарства съ наружи прикладываемыя , по большой

В Ъ 2

часпи

части излишних могутъ быть почтены, ежели вода глубоко скопится. А чтобъ опухоль не весьма велика дѣлалась, тому препятствовать можетъ обвязка (132, 845). Дѣйствіе ножичное тутъ надобно, и воду выпускашь должно, однакожъ чрезъ такое лѣченіе болѣзнь не вовсе искореняется, но только на время человѣку облегченіе дѣлается, понеже опухоль со временемъ обыкновенно опять отпрыгается. Опухоль многіе отворяютъ тѣмъ инструментомъ, которымъ у страждущихъ внутреннюю водяною болѣзнию воду выпускаютъ (756). Но лучше употреблять ланцетъ такой, какимъ изъ жилы кровевозвращательной кровь пускаютъ. Лѣкаръ лѣвою рукою опухоль взять долженъ такъ, чтобъ воду, какъ возможно, сверху и отъ ягря въ самой низъ согнать, и послѣ того смѣло попережныя плены рѣзать такъ долго, покуда до воды не доспадутъ. Рѣзать начинать должно снизу и съ наружной стороны опухоли, чтобъ не повредить оной плевы шуляпной, которая ягря раздѣляется, и которую въ шуляпахъ линѣйка гаФѣи: ешовъ называемая, показываетъ, ибо въ ней жила быющая включена, изъ которой кроветеченія опасаться должно. А какъ вода вся выпечетъ, то корпѣю до тѣхъ поръ набивать, чтобъ рана закрылась, а потомъ оную рану заживлять.

## §. 867.

Ежели же паче чаянія или ланцетомъ перерѣжется или перервется быющая жила, и кровь стремительно печь будетъ, который порокъ аймалюхъли нѣкопорые называютъ, то не продолжая времени воду всю выпустить, рану пошире разрѣзать, и вычистить, чтобъ перерваную жилу быющую глазами видѣть было.

было можно. Кровь чрезъ зашиваніе и припѣсненіе жилы быющіяся, или приложеніемъ лѣкарствъ удержанъ, и рану лѣчить должно. Ежели же она оставалась не будещъ, или ятро ударомъ, или иною какою вещью, такъ повреждено будещъ, что сохранитъ его не возможно, что видѣть можно изъ вытекаемой мокроты, ежели она черна, мутна и вонюча будещъ, то жилы быющіяся и жилы кровезовращательныя, изъ которыхъ она течетъ,ковытати, и ихъ ниткою завязать и перерѣзать, и ятро вонь вырѣзать должно (857, 858, 859).

## §. 868.

Ежели прорѣзавши верхнія плевры вода не вся вытечетъ, и оной еще больше подъ низомъ будещъ находится, то ланцетъ поглубже опустишь, дабы чрезъ то между среднею и внутреннею пленкою скопившаяся вода, также вышла. Прибжно смотрѣть должно, чтобъ рѣзаніемъ какого бѣдствія не здѣлать; а то здѣлаться можетъ, когда съ водою и кишка подъ низомъ будещъ, которая безъ худаго слѣдствія ранена быть не можетъ.

## §. 869.

Ежели же послѣ выпущенія такимъ образомъ воды здравіе совершенное не воспослѣдуетъ, и вода опять опродился, и лихое лихимъ надобно избывать, то и мы въ книгахъ нашли, что и лѣчащіе къ лѣченію шому различные способы сыскали. Нѣкоторые велютъ иглу съ ниткою изъ многихъ нитокъ сложенною и ссученною скрозь опухоль продѣвать, и нитку оную въ ранѣ оставляемую подважды днемъ передергивать такъ, чтобъ въ опухоль приходила верхняя часть.

А припомѣ прибавляють , что нитку какою нибудь помазывать надобно масью , состоящею изъ такихъ вещей , которыя жескость сѣбѣдаютъ , и изъ другихъ , которыя гной производятъ. Ибо чрезъ произшествіе гноя плевы яперныя , твердость въ себѣ имѣющія , очищаются , твердость въ разрѣшеніе приходитъ , и оное теченіе водное на послѣдокъ переспасетъ.

## §. 870.

Другіе тоже записываячи опухоль сперва гораздо прорѣзавши , рану и онѣ паха до внутренности самой шуляпную машину разрѣзываютъ , плевы яперныя или ножичкомъ или лѣкарствами прижигательными , какъ кому понравится , чирьеватятъ , а на послѣдокъ гной производятъ. Обое же и тѣ и другіе усмотря , что изъ чирья чрезъ многіе дни ничего уже не печетъ , да и онѣ засыхаетъ , то на чирей струнѣ наводятъ. Имѣютсяжъ и такіе люди , которые думаютъ , что не ланцетомъ , но прикладывая вещи прижигательныя опухоль отворять должно , понеже при тѣхъ пощасъ и гной произведенъ быть можеть.

## §. 871.

Лѣченіямъ же симъ затрудненіе причиняетъ опасность вожженія великаго. Понеже не только въ разрѣзанныхъ и въ чирьеватыхъ плевахъ , но и къ самому япру послѣ обыкновенно прикидывается огонь , который ежели будетъ боленъ и съ горячкою , то больного въ худомъ состояніи будетъ значить. Япро будучи съ вожженіемъ распухаетъ , какъ мнѣ кажется , для той причины , которую выше я представилъ (854). А то значитъ въ поясницѣ ломъ , хотя бы больной и на мягкомъ лежалъ , дѣлающийся , который  
ежели

если часто будетъ учащать, то весьма худо будетъ значить. Какимъ же способомъ тому пособлять, оное въ другомъ мѣстѣ я предлагалъ (130 до 133), гдѣ еще показалъ, если мошонка шуляпная вожженіе будетъ имѣть, какія къ тому лѣкарства способны (134).

## §. 872.

А гдѣ опухоль гораздо широко разрѣзана, притомъ же край будучи чирьеваты, копорый случай безъ опаснаго вожженія быть не можетъ, и гдѣ рана безпрестанно мокнетъ, много пособствуютъ густыя припарки и пластыри, по большой части гораздо мягчительныя и гной производящія (91, 92) чрезъ долгое время и безперерывно наверхъ прикладываемыя. Понеже оныя припарки и пластыри иногда въ томъ мѣстѣ, гдѣ водѣ проходѣ имѣется, новую опухоль и боль дѣлаютъ, и загниваніе возбуждаютъ, и благополучное въ лѣченіи окончаніе показываютъ (\*). При всѣхъ же лѣченіяхъ родахъ корпью полегоньку прикладывать, да икакъ чирьѣ оною жилы бьющейся и жилы кровевозращающія не придавить (132, 854, 855). Человѣкъ больной завсегда навзничъ на кровати лежать долженъ, и опухоль обвязкою, или подцепкою подвязана быть должна.

(\*) Прикладываніемъ припарокъ и пластырей не только для вожженія но и для произведенія гноя въ разрѣзанной широкой ранѣ, не очень давно яте. ная водяная болѣзнь [Удрокеле], изъ которой уже дважды вода опасно выпускана, излѣчена была. Кила эта случилась отъ прилиску крѣпкого въ паху туломъ, изъ котораго стрѣлы пуцаютъ.

ВОДЯ-

# ВОДЯНАЯ БОЛѢЗНЬ МОШНО- ШУЛЯТНАЯ.

идропсѣ скроти.

§. 873.

Къ опухоли мошношулятной (733, 863), ежели она съ водою будещѣ у взрослога челоуѣка, употреблять надобно пѣ лѣкарства, о которыхъ нѣкогда я уже сказалъ (739 до 743), и о которыхъ Медики внушаютъ. Ежели опухоль прорѣзывать должно будещѣ, чѣобѣ вода вытскла, употребить къ тому ножичекъ тонкой и весьма острой. Послѣ того гораздо спараться должно, чѣобѣ Антоновъ огонь не приключился, а то можещѣ обыкновенно и дѣлаться, ежели вода сама собою скрозъ испонченную кожу проросещѣ, или оную сѣбещѣ.

§. 874.

И когда дѣти родятся такіе, у которыхъ мошна шулятная бываещѣ распухлая, а то случаетсѣ, какъ мнѣ кажется, когда младенецъ въ маткѣ такъ сложенъ, что части срамотныя списнуты будущѣ. Опухоль часто сама собою проходитъ, пособствуя же и прозябающія, въ разрѣшеніе приводящія [резолвенція] и разбивающія [дискуціэнція], (79) съ виномъ краснымъ, или съ водою съ уксусомъ крѣпкимъ смѣшанною, вареныя, въ которомъ взварѣ суконки обмачивая крѣпко выжимаются и теплыя прикладываются. Полезны также пластыри, де кумино, дѣафоретикумъ, примѣшавъ нѣсколько пластыря де мелилопо. Но кожа тонкая часто не можещѣ на себѣ пластыря шерпѣть, что ежели усмотрѣтся, топчащѣ пластырь отбросить.

ЖИЛО-

## ЖИЛОНАПРЯЖНАЯ КИЛА.

К І Р Σ О К Н А Н.

§. 375.

Еще осталось о нѣкоторомъ родѣ болѣзни ска-  
зать , которую въ старину Греки κιστική , Ла-  
пины рамокъ (\*) называли , шажъ самая поруски жило-  
напряжною килою назвашься можетъ. Понеже иногда  
жилы кровезовращательныя да и часпо помянутыя ,  
пахомъ къ япрамъ нѣходящія разпухаютъ , и буд-  
то бы скапавшіяся какъ пахи , пакъ мошонку шуляп-  
ную наполниваютъ. Ихъ глазами видѣть можно ,  
или , хотя будучи гораздо скрыты не подлинно вид-  
ны , однако нѣсколько опухоли на себѣ имѣютъ въ  
разсужденіи оныхъ жилъ кровезовращательныхъ ; ко-  
торая опухоль , какъ подавши , не подается. Порокъ сей  
раждается , ежели кровь въ шѣлѣ будетъ худая , густа ,  
черная и скупѣвшаяся , какова иногда обыкновенно бы-  
ваетъ у охотниковъ къ ученію , и у которыхъ по-  
печеніе объ ученіи шѣлесное лѣченіе и движеніе опни-  
маютъ. Не рѣжежъ того случается и у шѣхъ людей ,  
у которыхъ все шѣлесное состояніе цынгою , кахексією  
и другими долговременными болѣзнями бываетъ истор-  
чено. Не рѣдко также жилы кровезовращательныя  
разпухаютъ и у шѣхъ , которые очень похотливы ,  
или которые въ ражженныхъ мысляхъ о дѣлахъ блу-  
додѣйныхъ всегда пребываютъ. Разпухаютъ же иногда  
сїи мѣста и отъ приключившагося удара , или когда  
жилы кровезовращательныя поясомъ желѣзнымъ и  
другою обвязкою придавлены бываютъ.

(\*) Смотр. о семъ словъ у Юг. БЕВЕРОВИЦА въ Епископальныхъ  
вопросахъ стр. 29.

Ъ Ъ

§. 376.

## §. 876.

Сей порокъ съ начала легче можно отвратить , нежели застарѣлый излѣчить. Начальное причины разсужденіе иногда въ ни во что обратить можетъ. Ежели порокъ во всемъ шѣлѣ будетъ находиться , и кровь будетъ изобиловать , оную пуспитъ , и при шѣлесномъ движеніи весьма жидкое и холодное питье употребитъ. Обыкновенно такимъ людямъ гораздо пособствуютъ воды минеральныя [рудныя]. Другимъ въ кушаньѣ и питьѣ призапретитъ , а кушанье дасть такое , которое мало сытоспи дѣлаетъ. Сихъ также увѣщавать должно , чтобъ попеченія о дѣлахъ любопытныхъ не имѣли. Ежели же кровезовращательныя жилы отъ застарѣнія уже окрѣпли , такой порокъ легко излѣчить не возможно. Многіе совѣтуютъ жилы кровезовращательныя распухлыя и окрѣплыя прорѣзывать , и кровь ссѣдшуюся изъ нихъ выпускаетъ , а раны опять залѣчиваютъ. Но сего безъ опасенія дѣлать не возможно , ежели жилы кровезовращательныя нѣсколько обвислы и слабы не будутъ : Ибо въ другихъ , которые уже окрѣпли , рѣзаніе не небѣдственно бываетъ. Также опасаться надобно , чтобъ отъ раны оставшійся струпъ жилъ кровезовращательныхъ больше не связалъ и не возпрепятствовалъ , чтобъ въ нихъ кровь свободно протекать могла.

## НЕЗАЛУПА.

Θ Ι Μ Ω Σ Ι Σ.

## §. 877.

Ежели плѣшка дѣтородоудная такъ закрыта ,  
что



что обнажиться не можетъ, Фимотис [незалупа] называется, которой порокъ иногда путь уринный запираетъ, а припомъ еще чаще не даетъ лѣкарства межъ конечною плотью и плѣшкою пропускать, ежели оныя надобны бывають. Сіе иногда у дѣтей натурально и отъ рожденія бываетъ. А впрочемъ похъ самое у шѣхъ, которые большую и пространнѣйшую конечную плоть имѣють, зачастую отъ другихъ случаевъ дѣлается, особливо, когда или сію конечную плоть или плѣшку оный ядовитыхъ болячекъ и бородавокъ родъ, отъ болѣзни любодѣйной раждающійся, осыпаетъ. Понеже сими жестковатыми бородавками, и отвердѣлостію устьевъ болячныхъ, ежели въ нихъ мозоль натерта будетъ, придавливаются жилы крововозвращательныя по кожѣ идущія, чтобъ оными влажностъ возвращаться назадъ не могла; а то иначе случается, ежели болячки на уздочкѣ и на самомъ верхнемъ плѣшкиномъ кружкѣ подѣлаются. Кромѣ того острая и гноеватая мокрота, которая у страдающихъ гонореею изъ протока уриннаго течетъ, ежели между плѣшкою и конечною плотью соберется, то части сіи сѣдаетъ, вожженіе производитъ, и болячки дѣлаетъ. Не дивно, что и отъ другой мокроты жирноватой, которая изъ желѣзъ въ округъ плѣшки лежащихъ выходитъ, и которою кожа и самая плѣшка натурально обмазываются, ежели она, отъ застарѣлости или отъ ядовитости венерической, остра дѣлается, свербяція болячки, а иногда и Фимотис раждается (\*). А еще въ примѣчаніяхъ означенное мы начинали, что въ томъ же мѣстѣ, межъ плѣшкою и кожею ея, многіе камушки скипѣлись, и лежучи на эпихъ часпяхъ вожженіе причинили, и порокъ сей нанесли (\*\*).

(\*) Есть особенный родъ гонореи, когда попорченная мокрота въ рѣдкой и въ густѣ подобной плѣшкѣ бываетъ, и изъ плѣшки будто бы потомъ производить. Смотр. у БЕРЕГЛАВ. въ предисл. на Афродизіака, т. е. на безразсуднаго и огненною любовью раженнаго человека къ полюбившицѣ и у Славн. АСТРУККА о болѣзняхъ венерическихъ въ Кн. 3, Гл. 3, § 2, стр. 190.

(\*\*) Смотр. въ И. К. Ак. Наукъ 1706, стр. 30.

#### § 878.

Иногда сей порокъ лѣкарствами отвратить можно. Мягчительныя травы варить въ молоко, и пѣнѣ деконтаемъ теплымъ припаривать дѣшгородный удѣ. Сверхъ того еще суконки обмакивая въ сѣмъ молоко, и выжимая на верхъ теплымъ прикладывать. Онымъ же молокомъ почаще мѣжъ кожу и плѣшкою сифономъ спринцовать. Человеку должно садиться въ теплую воду съ травами мягчительными вареную. Понемногу чрезъ сіе можеть здѣлаться, что ослабляя и изнѣченная кожа можеть залупиться, тогда самое нѣсколько и силою дѣлать отвѣдывать должно. Когдажъ залупится, тогда прикладывать надобно лѣкарства болячки залѣчивающія, о которыхъ тогда скажу, какъ до болячекъ дойду.

#### § 879.

Ежели же отъ сихъ средствъ мало успѣху будетъ, и кожа не будетъ залупаться, таковое зло, которое лѣкарствами не повинуется, рукою лѣчить, и плѣшку ножикомъ открыть должно. Нѣкоторые кожу на плѣшкѣ находящуюся прищипываютъ, и вытягиваютъ, и одну со всѣми ножницами отрѣзываютъ. Но гораздо лучше кожу съ нижней стороны впрямь къ вѣнчику плѣшкину разрѣзать, и такъ плѣшку обнажить. Ктому годенъ небольшой и весьма тоненькой ножичекъ, да и потъ нѣсколько кривой. Сему ножичку на кончикъ наплывающъ воскъ, дабы чрезъ

чрезъ по безъ всякаго вреда между кожею и плѣшкою до самаго вѣнчика плѣшкина допустить ся могъ. Какъ жпо дѣлается, кончикъ пониже наклоняютъ, чтобъ онымъ скрозъ воскъ просунувши поперстную кожу отъ самаго вѣнчика плѣшкина до самаго конца разрѣзать. Тожъ самое очень хорошо дѣлается и ножницами такими, у которыхъ одна половинка концѣмъ пупой имѣетъ. Но докуда еще рѣзать не станутъ, очень надобно, чтобъ пособникъ кожу дѣтеродоудную перспами захватилъ, и сколько возможно къ кореню дѣтеродоудному натягивалъ, чтобъ чрезъ по во время сего рѣзанія вся плѣшка оголилась.

§. 88а.

Обыкновенно жъ кожа разрѣзывается въ томъ мѣстѣ, гдѣ затвердѣла. Ибо жесткость показываетъ, что въ томъ мѣстѣ наибольшее болячки имѣются, которыя и разрѣзать очень способны. Если же снизу кожа разрѣзывается, то плѣшка не съ вѣмъ оголится можетъ. Лучшій успѣхъ бываетъ, когда верхняя кожа разрѣзывается, однако жъ и тамъ надобно опасаться великаго кровотеченія, которое утопить не весьма способно бываетъ. Для того способѣе кожу съ боку разрѣзывать. Если нѣкоторыя плевочки препящивовать, пому будучи, чтобъ кожа отъ плѣшки не оплуплялась, оныя ножичкомъ отдѣлить, пока вся плѣшка окажется. А при томъ чтобъ приживантіи раны кожа съ плѣшкою не срослась, перекладывать межъ ими корпю, которая до того не допустить.

В В 3;

## ОТІОКЪ КОНЕЧНОПЛОТЪНЫИ.

ЭДЕМА ПРЕПУЦІИ.

§. 881.

Сей порокъ , который другіе опухолью или пузыремъ хрустальнымъ называютъ (\*), и который зачастую при первомъ порокѣ случается , отъ такихъ же причинъ дѣлается , когда пасока [лимфа] сквозь опредѣленные ей вены въ другія крови принадлежащія возвращаться не можетъ. Оный порокъ, ежели въ самомъ скоромъ времени захваченъ не будетъ , къ Анпонову огню склоненъ бываетъ. Пропивъ же того пособіе состоитъ также въ вещахъ мягчипельныхъ , изъ которыхъ жидкія и густыя припарки дѣлаются , и къ припариванію употребляются. Ежелижъ опухоль Анпоновымъ огнемъ будетъ ужъ заражена , то вещи мягчипельныя , въ водѣ съ извѣстною немореною постоянной варить , и къ нимъ еще можно прибавливать къ очищенію болячекъ способныя вещи , корень Іреосъ флорентине , арисполохѣ , права рута и пельнь. Всякихъ вещей пасоку возбуждающихъ употреблять не надлежитъ , а особливо спирта съ камфорою.

(\*) Смотр. у Преславн. АСТРУККІА въ помянут. мѣстѣ въ Том. 1 , К. 3 , Гл. 8 , стр. 361 издан. новаг.

~~~~~

ЗАЛУПА НЕЗАЛУПНАЯ.

ПАРАФІМΩΣΙΣ.

§. 882.

Напротивъ того , когда плѣшка натурально длиннѣйшею , но очень узкою , кожею будучи покрыта такъ оголится , что оной кожи опять навесѣть будетъ

дѣтъ не возможно , такой порокъ параФімуѣс называется. Обыкновенно бываетъ съ великимъ вожженіемъ , отъ котораго всѣ части гораздо распухаютъ , особливо , ежели уздочка вожжена будучи , или оная плевочка , которою конечная плоть къ уду дѣтородному съ низу приспягивается , удъ дѣтородный скорчивается , или ежели онъ по раздутіи тѣлѣ печуриспыхъ отъ непрестаннаго стоянія трескается.

§. 883.

Оный порокъ отъ многихъ случаевъ дѣлается , а чаще когда отъ жару удъ дѣтородный раздувается или напрягается , и конечная плоть , которая иногда у молодыхъ людей очень тѣсна бываетъ , насильно за плѣшку залупается. Вожженіе часто дѣлается , когда болячки или на плѣши и далѣ ея на самомъ удѣ , или на самой задней части конечной плоти , бывають , и оныя поширѣ и поглубже распространяются.

§. 884.

Ежели удъ дѣтородный отъ непрестаннаго стоянія раздуется , то иногда весьма скорое тому лѣченіе бываетъ , отъ приложенія на него холодной воды , или ежели нечаянно челоуѣку поясницу холодною водою обольютъ. При сихъ и плѣшѣ и кожу масломъ намазавъ , и оную кожу кругомъ плѣши или перстами , или обвязкою соединительною , обхвативъ , и опять на плѣшку натягивать должно. Ежелижъ болячки или на плѣши или на кожѣ будутъ , такимъ же способомъ (878) употребивъ молошную припарку и острую мокроту очистить. Не не полезно есть сочиво изъ сѣмени цидоніорумъ и псилліи (173 , 288).

§. 885.

Ежели же удъ дѣтородный сильно отъ вожженія

женія раздусся , можно кровь пуспитъ изъ жилы кровевозвращательной , сверху похребту уда дѣтороднаго идущей , и которою кровь изъ тѣлѣ печуристыхъ возвращается. Ежели же и такимъ способомъ зло побѣждено не будетъ , то вдалѣ не откладывать , но потчасъ разрѣзать кожу въ томъ мѣстѣ , въ которомъ она удѣ дѣтородный пуже обняла , и будто давишь , такъ что кожу , сколько возможно , къ лунѣ натянуть сперва. Рану такъ залѣчивать должно , чтобъ кожа выросла , и широкость спрупа довольная къ покровенію здѣлалась ; а припомъ смотрѣть надлежитъ , чтобъ кожа съ плѣшкою не срослась (880). Во всѣхъ такихъ лѣченіяхъ неопмѣнно надобно питье весьма жидкое , и кушанье съ голодомъ пополамъ. Удѣ дѣтородный также завсегда къ верху и къ брюху привязывать должно.

БОРОДАВКА.

В Е Р Р У К А.

§. 886.

На многихъ тѣлесныхъ мѣстахъ , а особливо на лицѣ и на рукахъ , бородавки иногда бываютъ , которыя различными именами называются. *Ахгохордѣа* называютъ , когда шишечка бываетъ жесткая , и шароховатая , къ кожѣ тонка , а къ верху широка. *Ахродѣіа* называется , которая къ кожѣ ширѣ , въ верху уже жестковата , а на самой верхушкѣ весьма шароховата , и на которой цвѣтъ по большой части похожъ на цвѣтокъ пиміанной. *Мурмѣа* невысокія и жесткія бываютъ , у корня широки , а въ верху тонкія

тонки (*). Прегадкі бородавки въ безстыдныхъ мѣстахъ раждаются отъ блудодѣйной болѣзни. У нѣкоторыхъ оныя поррами называются, часто раскалываются, и нѣсколько крови испочаюти.

(*) Смотр. у ЦЕЛЬСА въ Кн. 5, Гл. 26, §. 14.

§. 887.

Раждаются изъ сосочковъ жильночувствительныхъ въ кожѣ, на губахъ и въ плѣшкѣ дѣтородоудной находящихся, когда онѣ распухнутъ, и одеревенѣютъ. Сіе, кажется, дѣлается, ежели ихъ коренья какимъ нибудь случаевъ такъ припискиваются, что сокъ, которымъ онѣ питаются, возвращаться назадъ не можетъ. У людей любодѣйною болѣзнію немоществующихъ сіе чаще случается на плѣшкѣ дѣтородоудной, въ которой премножество и весьма ошмѣнное чувствительныхъ сосочковъ изнаполнено; или что тонкая и клетчатая плена на плѣшкѣ дѣтородоудной подъ кожейю находящаяся, и которою сосочки прикрываются, острымъ сокомъ сѣбѣдена будетъ (*); или что коренья сосочковъ ядовитую мокроту прижгущая (**). А что и на кожѣ язва дѣлается, въ томъ мы не споримъ. Изъ сихъ разумѣть можно, для чего вырѣзанныя также и лѣкарствами прижженные или выправленные бородавки вновь раждаются, ежели все корешки искоренены не будутъ, которые иногда глубоко опускаются.

(*) Смотр. у БЕРГААВА въ предисл. на Афродизіака.

(**) Пресл. АСТРУКЪ въ пом. м. Кн. 3 Гл. 9 стр. 280.

§. 888.

Иногда бородавки сами отъ себя пропадаютъ, отъ чего дошло до того, что многіе лѣчители такія и другія пособствія объ нихъ преднаписали, чтобъ

2 а

боль-

больше видно было, что кто отомъ думаетъ, нежели чѣмъ до самаго дѣла точно касалось, открытъ; искореняются онѣ, сперва употребивъ переніе, ножикомъ скоблются, и подрѣзываются, а припомъ и корешки вырѣзываются, на рану же такую прикладываются лѣкарства прижигательныя. Изъ такихъ лѣкарствъ числа предъ другими предпочитается лаписъ инферналисъ: употреблять также можно бутирумъ антимоніи, и спиртъ випріоли нитри. Если бородавка нѣсколько будетъ жестка, такая иногда соку эзуле и хелидоніи повинуется. А чѣмъ въ округъ лежащія мѣста не ранились, оныя покрыть можно пластыремъ, прорѣзавъ на срединѣ дырку, чѣмъ изъ нее бородавка торчала. Также спараться должно, чѣмъ прижигательныя вещи иногда подъ низомъ лежащія части, а особливо сухихъ жилъ не повредили, и великихъ вожженій не произвели, чего наипаче опасаться надобно на вѣкахъ, которыя сами въ себѣ очень тонки (*).

(*) Какъ долго прикладывать къ вѣкамъ сіи лѣкарства будутъ, то въ глазъ пускать надобно сало или жиръ, чѣмъ чрезъ то плены сохранены были. Человѣку должно на брюхѣ лежать, чѣмъ лѣкарство слрое межъ вѣками не расплылось. Смотри исторію не-благополучнаго лѣченія въ БИДЛОВОЙ Екзерциц. Аватом. и Хирург. въ Оп. стр. 144.

§. 889.

Нѣкоторые бородавку на кожѣ бывающую чрезъ нѣсколько дней ипрутъ, и на нее пластырь накладываютъ, и такимъ образомъ размягчиваютъ, послѣ того кожу кругомъ прорѣзываютъ, и шпичку щипчиками захвативъ вонъ вынимаютъ, чѣмъ и корешокъ выщелъ, однакожъ рану вещьми прижигательными намазываютъ. *Ахрѣхордоу*, ежели ниткою шуго пере-
шля-

тянешь, замираетъ. бородавки отъ любовѣйной болѣзни раждающіяся, хотя вылѣчиваются, однако опять приходятъ, ежели порчи изъ соковъ тѣлесныхъ пристойными лѣкарствами не истребишь. Къ великому и къ застарѣлому злу больше и силы прикладывать должно. А по излѣченіи болѣзни блудѣйной къ истребленію бородавокъ и легкія лѣкарства поспособуютъ.



МОЗОЛЬ.

КЛАВУСЪ.

§. 890.

Мозоль наибольше на ногахъ дѣлается, которая идущему человѣку несперпимую боль причиняетъ, и корень она имѣетъ, который иногда такъ глубоко низходитъ, что до самыхъ перстныхъ сухихъ жилъ и до оболочки наkostной проходитъ. Дѣлается отъ того, когда ноги и ножные персты тѣсными и жаркими башмаками давятся. Понеже на кожѣ, на сухой жилѣ, или на плевѣ костной приписнувъ такимъ способомъ малѣшенькія дирочки сокъ скрозь оныя назадъ возвращаться не можетъ, но вытекаетъ, и межъ маленькими волокнами жестѣетъ. А сему отъ давленія, ежели продолжится повседневно, и прибывать будетъ и большая жесткость воспослѣдуетъ такъ, что на послѣдокъ давя жилъ быющихъ и жилъ кровезовращательныхъ кожу, сухая жила и перепонка костъ покрывающая вожженіе получаетъ, и пресильно болѣть будетъ. А понеже самая мозоль не болитъ, но, что ся корень по большой части въ сухую жилу

2 2 2

или

§. 891.

у л ь к у с ъ.

§. 892.

HB

ни кровь , ни гной хорошій не печенѣ , но другая мокрота испорченная печенѣ , и которою мокрошю части плосныя съ болячкою совокупныя истачиваются , а напослѣдокъ и жидкія части въ тѣлѣ находящіяся порпяшся. А топѣ сокъ поврежденный не попускаетъ , чшобѣ болячка сама собою , какъ рана , заживашъ могла , для шого болячка иннаго лѣченія требуетъ. Сіе всякому изъ преждеписанныхъ видно бытъ можетъ (336).

§. 893.

Болячки на всѣхъ частяхъ тѣлесныхъ дѣлаются ; На костяхъ же оныя другими именами называющся : а особливо онѣ мѣсто себѣ избираютъ въ пукѣ , и въ шой оболонкѣ клепчешой , въ которой не шолько мяса , но также мясныя волокна , жѣлѣзы и другія части содержащся.

§. 894.

Болячки по большой части бывають , когда тѣло худаго сложенія , и въ немъ соки повреждены. И шакъ оныя сами опѣ себя въ чловѣкѣ раждаются , которой цынгою , блудодѣйною болѣзнію , будетъ зараженъ , какою-имѣи ш: е. худыхъ соковъ въ тѣлѣ , и кахексіи ш. е. худаго сложенія тѣла различные роды , да и воду подкожную , будетъ имѣть. Дѣлаются же болячками раны и открышые безверхушешныя чирьи. Сіе случитъся можетъ въ чловѣкѣ безвредномъ и прездоровомъ , когда малѣйшія раздранныхъ жилъ быющихъ и жилъ кровевозвращательныхъ успыща снаружи прикладываемыми вещьми шакъ перемѣнятся , что изъ нихъ ни кровь ни гной хорошій иппи не можетъ , но сантѣсб или будетъ иппи , да жидкой , и кожу и другія съ нею

совокупныя части испачивающій , или густой да клейковаѣйшій. Ибо такой сокъ неспособенъ , чтобъ отъ него рана склеится или наполнится или къ струпу и заживленію привеспись могла (348 , 359).

§. 895.

Небреженіемъ же лѣчишелей это дѣлаться можетъ , когда приложенною корпѣю и кнотами , также обвязкою туго обвязываючи , раны и чирьи безверхушешныя крѣпко придавливаются : ежели къ ранѣ разшибеной еще чрезъ загнаивающія лѣкарства неочищенной , будуще прикладываться бальсамы , или спиртъ , также ежели на какую нибудь рану будуще прикладываются вещи излишне оспрыя и ржавыя : ежели гной , который отъ тѣлеснаго жару и отъ воздуха порпится , не выпирается , да въ ранѣ остается ; всѣми таковыми и другими , жилъ быющихся , сквозь которыя сокъ жизненный протекаетъ , кончики затягиваются. А гной густой и клейкой бываетъ , ежели лѣчащіе при употребленіи лѣкарствъ такихъ долго остаются , которые матерію растворяютъ , и гной производятъ , также и при употребленіи припарокъ , которыми части вмѣсто совокупныя , и наипаче оныхъ жилы быющіяся , разслаблыми дѣлаются. Въ тѣлѣжъ испорченомъ и худосложномъ надобно , чтобъ испорченной и сокъ въ рану текъ , который натурално какъ отъ тѣлеснаго жару , такъ отъ воздуха , гораздо оспрѣ бываетъ (Смолр. 336 , 340 , 348 , 389 , 390 , 391 , 392 , 402). Всѣ вещи , которыя въ ранѣ или въ чирьѣ безверхушешномъ , ежели долѣлежащаго будутъ гной производить , то новое воженіе дѣлаютъ , и обыкновенно причиняютъ , что въ раны пресмыкающіяся претворяются.

§. 896.

§. 896.

родовъ же и именъ болячекъ премножество имѣется. Многожъ между собою разнствуютъ, въ разсужденіи мѣста, на которомъ случаются, ежели на кожѣ волосами закрытой, въ пукѣ, въ желѣзахъ, мышкахъ, сухихъ жилахъ, связкахъ, сосудахъ или въ какомъ глубокомъ мѣстѣ; бывають также около глазъ, ушей, горпани, миндалинъ, языка, поднебенья, деснъ, губъ, шипекъ, афедрона, дѣтородностей и проч. а припомъ нѣчто въ фигурѣ и въ величинѣ есть, когда онѣ глубоко проходятъ, или неглубокія бывають. Также нѣчто и время приносятъ, въ разсужденіи котораго болячка обыкновенно застарѣлая или свѣжая бываетъ. Болячки, которыя уски, хотя прямы, или излучиною и виниповаты бывають, внутрь проходятъ, и часто на многія раздѣляются. Пазухами или болячками пазушными называются, ежели же припомъ да и твердость въ нихъ будетъ, оныя фистулами (свищами) именуются. Сверхъ же того болячки и другими именами называются, ежели онѣ отъ нѣкоторой въ тѣлѣ находящейся вредности начало свое имѣть будутъ, на примѣръ отъ болѣзни блудодѣйной, цынготной, какоюхимической. Нѣчто причиняетъ мокрота, изъ болячекъ сихъ выпекающая, которой ежели будетъ много, то болячка мокрою; ежели немного и клейковата, то болячка заскорболоу и жесткою называется. Также мокрота тонкая, клѣкая, густая, бѣловатая, на возгри схожая, сизая, блѣдная или черная, будто бы мазистая, а припомъ и вонючая. Временемъ и другой порокъ въ болячкѣ случается, гдѣ кость червоточная въ ней бываетъ. Иногдажъ болячка неровна бываетъ, и на ней дикое мясо нарастаетъ.

спасть. Болячка злая, называемая *κακοῦδης δυσάπλωτοι* а по Латинѣ хироніумъ (*) и телесфіумъ (**) весьма трудно залѣчивается, затѣмъ что или соки въ тѣлѣ испорчены, или что волокна какъ около болячки такъ во всемъ тѣлѣ, слабы и недействительны; такая болячка почти опчаятельна, и она обыкновенно временемъ у старыхъ людей бываетъ; есѣкоторые зломъ смертельнымъ называютъ. О каркиномѣ м. с. ракѣ открытомъ, который болячекѣ презлой родъ, и въ желѣзахъ особливо случается, выше я объявилъ.

(*) Смотр. у ЦЕЛСА въ Кн. 5 въ Гл. 18 §. 5.

(**) ГАЛЕНЪ о Способѣ лѣченія Кн. 14 Гл. 17 Т. 10 стр. 339. Смотр. и у ПЛИНІЯ И. Н. Кн. 25 Гл. 5 Т. 2 стр. 365.

§. 897.

Также истекающей изъ болячки мокроты родъ, учить, какія части тѣлесныя оною пробдены. Мокрота оная тонкая и ѣдкая обыкновенно бываетъ тогда, когда она изъ кожи чирьеватой выходитъ. А болячки, на поверхности кожи бывающія, невысоки но широки завсегда бываютъ, которыя соленнымъ своимъ свербежомъ досадны, и часто получа вожженіе разордѣваются. Изъ мѣстъ, въ которыхъ много да и еще жирной пасоки бываетъ, какъ то въ волосахъ головныхъ, а особливо младенческихъ, также на лицѣ и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ множество желѣзъ тучныхъ находится, прыщеватость возгriвая обыкновенно бываетъ, и мокрота прегустая сгруппьями жирноватыми еростается, которые къ верху приподнимаются, временемъ мокнуть, чаще же сухи бываютъ. Ежели болячка до жиру коснется, который главнѣйшимъ и завсегдашнимъ мѣстомъ я назвалъ (893), масло ржавое бываетъ и ѣдкое, и которое шонко, бѣловато, будто

будто бы мазисто, тучностью на масло бѣлое похожее, изъ болячки выходипѣ; которая болячка по большой части во многія части и глубоко проходипѣ, а не рѣдко въ пазухи раздѣляется, которыя, ежели отъ застарѣнія крѣпки здѣлаются, то въ фистулы превращаются. Ежели болячкою слина въ желѣзахъ, къ отдѣленію ея опредѣленныхъ, попортится, то мокроты премножество жидкой и весьма ѣдкой съ великимъ зудомъ и болью будетъ печь, которая какъ желѣзы такъ и совокупныя съ ними части бѣстъ и болячки глубокиа, *какойъ* *ея*, мозолистая дѣлаетъ. Когда въ мясѣ болячка бываетъ, она обыкновенно гнила бываетъ, и худо пахнетъ: Ибо кровь испортившись эотъ духъ производипѣ. Ежели болячка на составѣ будетъ, мокроты густоватой, бѣловатой, на бѣлокъ лишней похожей, много печетъ (Снес. 357). Несносная вонь бываетъ отъ болячки, въ которой кость въ низу повреждена, которую и почувствовать можно, спичкою пощупавъ; а припомъ вынувши спичку, по ней видѣть можно, то, ежели она серебряная, отъ поврежденной мокроты почернѣетъ. Гниль костную по какимъ примѣшамъ узнать можно, о томъ ниже объявлю.

§. 898.

Болячки на наружныхъ мѣстахъ бывающія, глазами видѣть свободно, въ нихже еще и спичку впускать можно, чрезъ которую познавается, куда онѣ идутъ, и какъ глубоко проходяпѣ. Изъ остановки спички, а припомъ и изъ самаго мѣста видно, до какой части она дошла.

§. 899.

Всѣмъ болячкамъ общее есть, что онѣ сами отъ себя не скоро заживають, а сверхъ того гораздо
Ю ю труд-

шрудные , нежели раны залѣчиваются. Ежели онѣ отъ худаго пѣлеснаго состоянія и отъ худыхъ соковъ пѣлесныхъ , отъ болѣзни прелюбодѣйной , цынготной , кахекпической т. е. худосложно-пѣльной , дѣлаются , онѣ никогда безъ затрудненія не залѣчиваются ; ежели поврежденной сокъ , внутри вредъ дѣлающій , пристойными средствами не исправился , и въ пѣлѣ перемѣны не дѣлается. Ибо въ пѣлѣ попорченѣ , хотя бы чрезъ силу болячка и залѣчена была , однако она или прорывается , или болячка подлѣ той дѣлается. Много также въ болячкахъ худаго приключается , когда онѣ спары бываютъ , и онѣ уже быть привыкли , а особливо въ пѣлѣ человѣка спараго. Ибо не только оныя лѣчатъ шрудно , но когда и до того дойдетъ , что зажить надобно , толькожъ оное заживаніе безъ великой опасности проходить не можетъ (*). Ибо есть нѣкоторая польза пѣлу человеческому и отъ болячекъ , а того насъ учатъ болячки нарочно дѣлаемыя , о которыхъ вскорѣ скажу. Не безъ опасностижъ лѣчатъ болячки у женщинъ , у которыхъ плотное не бываетъ. Чрезъ употребленіе видно , что у которыхъ худыя и застарѣлыя болячки такъ бывали заживлены , другими да и тяжчайшими болѣзнями , черною немочью [апоплексією] , одышкою и насморгомъ задохлымъ , вожденіемъ внутренностей начинали спрадать , а не рѣдко незапно и умирали. Такаяжъ смерть или сильная къ смерти опасность спарикамъ предвозвѣщена быть можетъ , ежели болячка прежде , или во время самой болѣзни , дѣлавшаяся , нечаянно суха , или поблѣднѣлая , или сизая дѣлается (**). Болячки на кожѣ , на перепонкахъ и на сухихъ жилахъ ; а припомъ на

со-

составахъ бывающія , также которыя въ другія дуплястыя мѣста проходящія , какъ напримѣръ въ грудь , въ сосисавъ , гораздо трудно заживающія. Болячкижъ и заживить не можно , ежели часть спржадущая удержана , и въ покоѣ оставлена не будетъ. Въ пѣлахъ безвредныхъ и здоровыхъ , но непрестанно въ работѣ упражняющихся , иногда болячки да еще застарѣлыя очень скоро , и почти сами собою заживающія , ежели только покойно будучи себя содержать , а это самое обыкновенно больше на берцахъ случается , которыя предъ другими большаго покоя пребываютъ , и чѣмъ больной въ постелѣ лежалъ. А впрочемъ мокрота изъ болячки вытекающая показывается , чего надѣяться можно. Весьма худая преизлишне пекущая или жидкая и ѣдкая , или густая и клейкая , цвѣтомъ сизая , черная , и худо смердящая ; каркинома ш. е. ракъ открытой , никакого лѣченія не пріемлетъ , какъ я выше объявилъ , развѣ вырѣжется. Когда болячки на костяхъ поврежденныхъ дѣлаются , и тѣ залѣчиваются не могутъ , ежели кости прежде не выздоровѣютъ. Которыя будто бы здоровы и покажутся , однако опять растворяются. Понеже болячки сѣи часто не отъ кожи , но отъ внутреннихъ частей и отъ перепонки на костной начинаются.

(*) Смотр. ГИЛДАНА Сопн. 3 Прим. 29; ЛЕ ДРАНЬ Т. 1 Прим. 33.

(**) ИППОКРАТЬ Предвозв. част. 4 Т. 1 стр. 450, и въ Коакахъ стр. 57, ЦЕЛСЬ Кн. 2 Гл. 6.

§. 900.

Болячка не залѣчивается , доколѣ не будетъ такъ чиста , будто бы свѣжая казалась , что ежели

Ю ю 2

здѣ-

здѣлается , то она какъ и другія раны наполняется , а на послѣдокъ на ней и сгруппъ дѣлается. Очищается же болячка , когда какъ внутри даваемыми , такъ снаружи прикладываемыми , лѣкарствами здѣлаемъ , чпобъ хорошій и къ наполненію раны способный сокъ изъ разорванныхъ бывающихъ жилъ въ нее текъ.

§. 90г.

Ежели же отъ первыхъ начать , то не всякому больному одно и тожъ самое лѣкарство прилично. Прилѣжно разсматривать должно человѣка и все пѣлесное его соспояніе , оособливо , когда болячки отъ внутри произшедшей худобы дѣлаются : Ибо предразсуждать надобно лѣчащему , что оно такое , около чего онъ работаетъ. Ежели тѣло будетъ здоровое , и болячка здѣлается отъ приложенныхъ непристойныхъ лѣкарствъ , то внутри принимаемая лѣкарства почти излишними почестся могутъ , и употреблять только воздержность и покой. Ежели же другой порокъ , болѣзнь прелюбодѣйная , цынготная , кахексія въ сокахъ есть ; ежели у женщины мѣсячина , у мужчины почечуй , прежде текали , а остановились , то надобно давать лѣкарства , къ излѣченію сихъ болѣзней способныя ; Ибо послѣ облегченія тѣхъ болѣзней болячки очень легко залѣчиваются. Также прилѣжно разсматривать должно , чпобъ даваемыми для очищенія крови сильными лѣкарствами , крови въ преизлишнее движеніе не привесть , и вожженія не здѣлать , отчего болячка иногда гораздо разбаливается. Не рѣдко оно дѣлаютъ лѣкарства , весьма жаркія , горячія , или болѣзни , отъ которой болячки здѣлались , несвойственныя. Проносныя прежде не бывають полезны , какъ только тогда , когда надобно преизлишнее въ бо-

Болячку соковъ припеченіе прочь отвратишь. Оныя вредны бытъ могутъ въ то время, въ которое гной производными вещьми болячку очищать надобно. Частожь лѣкарства отъ Медиковъ для исцѣленія болязни подаваемыя, болячки раздраживаютъ, а за- всегда да и много пособствуютъ покой и воздержаніе, а припомъ когда больной не много будетъ пищи употреблять, и отброситъ все острое, соленое, кислое, а припомъ мясо и всякія похлѣбки, воздержится также отъ вина и отъ всякаго сильного пипья, и будетъ воду или пшизанъ или (сюда привнеси 402).

§. 902.

Всежъ сіе въ пищѣ и въ лѣкарствахъ внутрь даваемыхъ примѣчать надлежитъ; а припомъ собственнаго и неменьшаго благоразсмотрѣнія пребудутъ лѣкарства, снаружи къ болячкамъ прикладываемыя. Ибо употребленіе показало, что часто болячки отъ прикладываемыхъ лѣкарствъ сильныхъ и изъ многихъ вещей составленныхъ разбаливаются, и больше рдѣютъ, такъ, что глубже и ширѣ разходяпся, копорыя послѣ, хотя бы какая сила ни прикладывана была, не заживаютъ, а чрезъ неприкладываніе никакихъ лѣкарствъ, или прикладывая да только легкія лѣкарства, которыми болячка будто ублажаенія, сами собою заживаютъ. А что болячки очищать должно, о томъ выше я предложилъ (900). Что же снаружи дѣлается, ежели очистится все, что въ болячкѣ нечистое есть, и что маленькихъ жилокъ быющихъ устья заслоняетъ, и шѣмъ препятствуетъ, чтобъ изъ нихъ хорошій и къ питанію мяса способный сокъ не выходилъ. Смотря по состоянію онаго сока, копорый въ болячкѣ держится, и лѣкарства употреблять надлежитъ: Ибо

Ю ю 3

сже-

ежели кѣ неважной болячкѣ да важную силу употребишь , и кѣ болячкѣ не весьма чистпой приложишь сѣбѣдающія и прижигающія сильныя вещи , то онѣ глѣбже и ширѣ , а сверхъ того вѣ неповрежденныя мѣста проходяшъ , еще же не рѣдко и новое воженіе причиняютъ , отъ котораго болячка завсегда больше рѣбепѣ , такъ , что около летащія части распухнутъ . Также посойснговать не могутъ и симъ пропивныя лѣкарства , ибо , ежели болячка худая и застарѣлая будетъ , и весьма нечистая , весьма легкія лѣкарства , копорыя не довольно очищаютъ , ни пренятснговашъ не могутъ , чпобѣ болячка подѣ сими оспалась .

§. 903.

Также и то напередъ знать не отмѣнно надобно , что не довольно на самыя лѣкарства качества смотрѣть , но еще какъ смѣшиваются-тѣ вещи , копорыя изъ нихъ бывають : Ибо великое разньствіе вѣ томъ , когда острое , ѣдкое и жгучее лѣкарство , сухое исполченное и спертное на болячку присыпается , когда такое лѣкарство разжидитъ могучи , на болячку кладется , или лѣкарство на короткое время на ней оставляется , и гдѣ прижжено , опять прочь опинимается ; ежели болячка водою , или иннымъ ликворомъ , вѣ которомъ такое лѣкарство распущено , вымывается , или , когда сильное лѣкарство сѣ другими смѣшанное , и сѣ масломъ , саломъ и воскомъ совокупленное намазывается ,

§. 904.

Не толькожъ вѣ лѣкарствахъ и вѣ смѣшеніяхъ различныхъ еспѣ различіе , но также и вѣ самихъ мѣстахъ , кѣ копорымъ оныя прикладываются . Ибо ежели мѣсто жильночувствительное будетъ , тому больные бу-

будетъ отъ сильныхъ лѣкарствъ , которыми ежели раздражнися болячка , то больше разорѣется. Ежели болячка на кожѣ будетъ или на желѣзахъ , тутъ пребываются лѣкарства выѣдающія , но такія , которыя то и уничтожаютъ. Ежели мѣсто мясистое будетъ , прикладыватъ можно съ свѣдающими и съ жигающими лѣкарства гной производящія , чтобъ съ гноемъ все то , чемъ болячка испорчена , вонъ выпло. Ежели все сіе мало дѣйствуетъ , то весьма скорѣйшій и полезнѣйшій способъ , болячки , гораздо нечистыя , твердыя и застарѣлыя , до самаго мяса живаго вонъ вырѣзать , и вырѣзавши болячку , прикладыватъ лѣкарства въ ранѣ гной производящія и рану наполняющія. Ежели всей болячки вырѣзать не способно , понадрѣзывать край мозолистые. Ежели въ болячкѣ будетъ нѣчто жесткое и высунувшееся , оное также ножикомъ изрѣзать , и приложитъ лѣкарство блаторастворительное и гной производящее. Особливо къ тому способенъ пластырь діакхилонъ композиумъ. Древніе еще болячки огнемъ прижигали , которая поступка безчеловѣчна , и нашему вѣку неприлична кажется.

§. 905.

Болячкажъ , въ тѣлѣ бывающая , или на мѣстѣ мясномъ , и которая ни очень нечиста ни мокра , у человека здороваго другаго лѣченія не требуетъ , какъ только такого , какое къ ранѣ ушибеной , или къ чирью подкожному отворенному способно. Довольно успѣха дѣлаютъ вещи , гной производящія , блаторастворительныя , и такимъ образомъ чистительныя , а напоследокъ наполняющія. Все съ прилѣжаніемъ дѣлать надлежитъ , что я при лѣченіи ранъ приказалъ (385 до 402).

§. 906.

§. 906.

Къ болячкамъ же весьма скареднымъ употреблять надлежитъ лѣкарства , которыя для очищенія нѣсколько были бы посильныя , каково почитается , когда корень аристолохіе , ари , иреосъ флорентине , трава агримоніе ; скордіи , абсинтіи , сабине , пети съ водою варятся , и болячка этимъ декоктомъ , а особливо ежели она глубока и дуляста , выласкивается. Къ сему декокту безпрепятственно медъ примѣшивается , ежели болячка въ частяхъ мясистыхъ да и суха будетъ. Ежели болячка мокра будетъ , употреблять надлежитъ къ декокту воду съ извѣстною немореною зѣланною.

§. 907.

Ежели же болячка такъ нечиста будетъ , что ни прикасанія , ни лѣкарствъ къ ней прикладываемыхъ , чувствовать не будетъ , къ той еще силнѣйшія лѣкарства потребны. Способны тутъ соли , купоросъ жженой , квасцы , ярь мѣдянка . Также не неприличны изъ сихъ солей ликворы , флегма випріоли , или алюминисъ . Другіе ликворы гораздо больше прижигаютъ чрезъ науку химическую приготовленные , олеумъ и спиртъ випріоли , нипри. Къ очищенію болячекъ мозолистыхъ и самихъ фистулъ наибольше способенъ спиртусъ салисъ армоніаці , который приложенъ будучи , боль потчасъ да и сильную дѣлаетъ , но вскорѣ переставшую , а изъ другихъ лѣкарствъ , и особливо изъ сочиненій маслей , боль долѣ пропьягивается. Въ сіихъ ликворы , которые сильно жгутъ , спичку обвертая пряжею помакивать , и на болячку и надъ ея мозолью поддерживать должно. Изъ весьма часто употре-

бляемыхъ составленій имѣющихся Унгвенкумъ Египціакумъ и Апостолорумъ, копорыя въ мѣстахъ жилищно-чувствительныхъ и желѣзистыхъ почти вовсе негодны; а понеже много смѣси въ себѣ имѣютъ, по и болячки смрадными дѣлаютъ. Собственножъ худыя болячки прижигаютъ, и на нихъ будто бы огнемъ прижженные струпы дѣлаютъ, лаписъ кавспикусъ хирургорумъ, копорый изъ извѣсти живой и изъ наштапырю состоишь, и копорый наибольше дѣйствителенъ, лаписъ инферналисъ. И сѣи такъ употребляются, что къ болячкамъ и къ ихъ краямъ мозолистымъ на короткое время припыкаются, и держатся, а не прикладываются. Струпы отъ прижигательныхъ вещей спадающіеся, приложеніемъ маселъ гноепроизводныхъ опдѣляется, копорый собою оптаскиваетъ, что бы ни было поврежденное такъ, что одними только язвину наполняющими лѣкарствами залѣчиться можетъ.

Новый способъ для прижиганія не только болячекъ мозолистыхъ но и самъ хъ скировъ предложилъ ЭДУАРДЪ ВАРРЕИ въ те Медикаль Эссаисъ офъ Эдимбургъ Вол. 4 Примѣч. 4 стр. 30. На мѣстѣ великъ спрва положиъ лапидемъ инферналемъ, однако не долго, и по прошествіи сѣ минути времени оное, что тѣмъ лѣкарствомъ прижжено, обтереть олео витріоли, копорое масло взявъ спичку желѣзную, и обточивъ въ немъ приложитъ можно. Онь говоритъ такъ, мѣ сп. собомъ мѣсто довольно прижжется, а въ болѣзни шотчасъ облегченіе дѣлается.

§. 903.

Къ болячкамъ же возгривымъ, копорыя отъ прелюбодѣйной болѣзни дѣлаются, больше употребительны вещи, изъ липтаргирія сочиняемыя. Весьма легко сѣбдаетъ меркуріусъ дульцисъ, ежели имъ пришыплетъ. Сильнѣйшагожъ дѣйствія есть и больше приличенъ меркуріусъ преципитатусъ руберъ; но имъ

А я

не

не присыпáть , но сѣ мастью или сѣ мазью смѣшавѣ прикладывать надобно. Онѣ нѣсколько умирятся , ежели спиртѣ на него нѣсколько разѣ наливаючи и зажигаючи надѣ нимѣ выгоритѣ. Гораздо тяжелѣе пожѣ самое дѣлаетѣ ртутѣ сублиматусѣ , онѣ , понеже между острѣйшими и сильными ядами считается , то не весьма безѣ опасности кѣ болячкамѣ прикладыванѣ быть можетѣ , понеже чрезѣ такіе случаи и раны вѣ пѣлѣ нашемѣ ядовитыя дѣлаются. Ежели же иногда надобенѣ покажется сулема ртутѣ (сублиматусѣ) , однако его употреблять надлежитѣ вѣ умѣренность приведши , и очень рѣдко. Мышьякѣ (арсеникумѣ) , который больше ядовитѣ , никогда безѣбд-ственна кѣ пѣлу прикладыванѣ быть не можетѣ (488).

Смотр. ДЕГНЕРОВО объявленіе о случаѣ особенномѣ , вѣ ко-торомѣ объявляетѣ , что онѣ сулемы вѣ пластырѣ приложенной смерть челоѣку послѣдовала.

§. 909.

Изѣ всѣхѣ сихѣ вышепомянутыхѣ то накрѣпко памятовать должно , что по величинѣ болячки и части испорченной смотря силу , прикладывать , и не прежде за оныя составленія хвататься , которые сильно сѣбѣдаютѣ , но только тогда , когда сильнѣйшія понадобятся. А припомѣ какѣ скоро все то , что было испорчено , отдѣлится , и болячка чиста здѣлается , то сіи лѣкарства отспавить должно. Ежели какая жила чувствительная или жила сухая обнажена будетѣ , оную надобно или одною пряжею , или помазавѣ мастью , прикрыть , чтобѣ ее пѣми лѣкарствами не прижечь. Ежели сими не тотчасѣ все , что нечистое есть , отдѣлится , и за чувстви-тельностью боли , или за опасностію возженія , сильныхѣ лѣкарствѣ прикладывать не возможно , то лѣч-

лѣченіе распредѣлитъ на такія , которыя умѣренно сѣѣдають , а припомѣ и прижигаютъ , и на такія , которыя тной производятъ , доколѣ болячка очистишся . А знаки у болячки чистой такіежѣ , какіе и ураны (396). Надобножѣ , чтобѣ она ровна была . Ибо когда болячка не ровно вездѣ очищена , и не вездѣ краснѣется , и по природѣ своей чувствуеѣ , наполнятельными лѣкарствами лѣчится , по гнилое мясо нарастаеѣ , подѣ кошорымѣ обыкновенно болячка далѣ разпростираеѣ .

§. 910.

А до удержанія вырастающаго гнилаго мяса , и кѣ сѣѣденію его весьма способны соли пѣ (907) , а больше купоросѣ женой , также прижигательныя , межѣ которыми первымѣ почестъся можеѣ камень адской (лаписѣ инферналисѣ) . Также полезенѣ естѣ соспавѣ , камнемѣ божественнымѣ (лаписѣ дивинусѣ) называемый (314) . Иногда такой силы надобно и не бываеѣ , а то , что выросло , искореняеѣ аква фагаденика хирургорумѣ . Начать надлежитѣ отѣ того , какѣ надобно больному себя вѣ кушаньѣ и питьѣ содержать , больному надобно отѣ кушанья силу дающаго , а особливо отѣ мяса , и отѣ всѣхѣ похлебокѣ воздержатъ . На болячку также накладывать должно довольно суконокѣ и обвязку употреблять , которая бы ничему не досадила , а однако довольнобѣ придерживала , и сколь возможно , прикрѣпчивала . Всѣ лѣкарства , которыя вѣ раствореніе приводятъ , а припомѣ которыя и мясо выращиваютъ , вѣ семѣ случаѣ негодны , что изѣ прежде реченнаго разумѣть можно .

§. 911.

Кромѣ всего того , что вѣ болячки вливается и вкладывается , естѣ еще нѣчто , что на верхѣ мѣ-

ста того класъ должно, которое къ благополучному
лѣченію много пособствовать можетъ. Ибо ежели
мѣста около болячки находящіяся, нѣсколько за-
рѣзавъ будуще, онымъ надобно пособить, и матерію
пуда спекающуюся отвратить, прикладывая на верхъ
лѣкарства разбивательныя. Мѣсто вдвое и втрое
сложенными суконками въ спиртъ камфарной обмо-
ченными покрывать надлежитъ, или прикладывая
можно жидкія припарки изъ произрастающихъ былій
горкихъ (79). Пластыри, отъ многихъ употребляемые
не такъ способны, хотябъ съ ними и камфара смѣ-
шана была (76). А при этомъ воздержность и спо-
койность въ первыхъ не ошибно потребны. Ежели
гной произвести надобно, а изъ болячки мокрота те-
четъ жидкая, то больше пособствуютъ пластыри
(385), которые и гной производятъ, и воздуха прочь
отвращаютъ (402). Прилѣжно приметъ разсуждать
должно, какъ всего тѣла, такъ жилъ чувствительныхъ
и мѣста на которомъ болячка, состояніе. Ибо ежели
мѣсто ноздреватое опухшее и почти безчувствен-
ное, кожа также ослабая будетъ, что самое и гла-
зами видѣть и перстомъ пощупавъ, чувствовать
можно, кромѣ лѣкарствъ нѣхъ, которыя укрѣпляютъ
и придавляютъ, еще обвязкою обвязать такую,
которую не только болячка, но со всѣхъ сторонъ
весь удъ объемлючи понѣсколько прижимается; а
обвязка, ежели болячка на голеньхъ будетъ, предъ
прочими употребляема бываетъ (168, 735). Ежели
же около мѣста нѣчто жесткое будетъ, чему по-
натуральному быть должно, прикладывая вещи мяг-
чительныя (91), и особливо оныя пластыри (168, 386).
А обвязкою такъ обвязывать, чтобъ ею все нало-
жен-

женное на рану только держалось , а крѣпко не прижималось. Прочее , что надлежитъ до наполненія и до заживленія , оное прилично къ ранамъ , и выше объявлено. Сіе все прилѣжно разсмотрѣваючи , по большой части благополучно производилъ лѣченіе. Однакожъ иногда болячки трудность дѣлаютъ людямъ врачующимъ , и съ трудностью залѣчиваются , а сверхъ того и неизлѣчимыя имѣются.

§. 912.

Но всѣ сіи болячки общія объявлены , а собственное ничто въ болячкахъ на ногахъ случающихся невидѣть надлежитъ , гдѣ за частую болячки бывають. Оныя особливо на кожѣ ширѣ расходятся , и для того требуютъ лѣкарствъ нежирныхъ , но такихъ , которыя полегонку очищаютъ , и при томъ умѣренно присушиваютъ. Очень прехорошее составленіе есть аква фагаденика хирургорумъ , ежели немножко сулемы съ водою извѣстною сопрешъ , и послѣ съ болышею частію воды простой смѣшаешь. Сею пряжу намоча прикладывать , въ неежъ прибавить можно еще нѣсколько эссенціе сукцини , или мирре. Также нѣкоторыя пастиллумы т. е. яблоко пахучее составляютъ изъ лапиде каламинари и Липаргиріо , оныя съ масломъ деревяннымъ варятъ , и послѣ олибонумъ и маспихенъ прибавляютъ. Сіе пастиллумъ , отъ нѣкоторыхъ за пластырь почитаемое , надлежитъ наливши теплою водою прежде разжидить и размякнутьъ , и такъ на болячку приложитъ , оное придавливаясь , и очень болячкамъ мокрымъ пособствуетъ. А прежде всего знавъ должно , что человеку на ногахъ болячки имѣющему , такъ себя содержать надобно , чтобъ онъ на кровати лежалъ , и ногъ

не ворочалъ, ни съ кровати не свѣшивалъ. Ибо обыкновенно опъ покойства великая помочъ бывастъ (899).

§. 913.

Ежели же болячки на какой часпи будутъ *κακο-
ηθέα*, и которыхъ никакъ залѣчить не лзя (896), или которыя залѣчивать не безъ опасности (899), одна-
кожъ и оныя повседневно очищать надобно. Къ онымъ
прикладывать должно лѣкарства легкѣя, изъ которыхъ
числа вода оная фагаденика почти первую почищается
(912). Къ ней также ежели болячка гнилая будетъ,
и изъ нее мокрота вонючая печь будетъ, или аква
вулнерарѣя, или эссенція, мурре или сукцины без-
вредно прибавляется. Болячка такая, ежели суха
дѣлается, чпо иногда обыкновенно случается, ежели
въ пѣлѣ крайнее безсиліе начнетъ дѣлаться
(899), возобновить надобно и расправить, чтобъ
опять изъ нее мокрота потекла. А то дѣлаютъ
корень эллебори альби, иреосъ флорентине, аристо-
лохіе ропунде и кантаридесъ. Оныя всѣ или сухіе
присыпаются, или съ медомъ и съ гноющимъ лѣ-
карствомъ смѣшавъ, намазываются. Способны также
пластыри (385), а припомъ и жидкія припарки. А
припарки сіи быть должны изъ горкихъ разбивающихъ,
съ виномъ вареныхъ. Ежели изъ тяжкихъ болячекъ,
которыя уже застарѣлись, или которыя не радиво
лѣчены, или въ пѣлѣ худаго сложенія, мокрота печь
будетъ вонючая, употреблять надлежитъ спиртъ и
лѣкарства, которыми бы гниль удерживалась.

§. 914.

Не рѣдко болячки дѣлаются въ роту на тон-
силлахъ или миндалинахъ, что за частую у пѣхъ
бывастъ, у которыхъ соки опъ болѣзни блудодѣйной
испор-

испорчены. Симѣ кромѣ того, что къ очищенію соковъ и къ исправленію пѣлеснаго состоянія пре-
буется, приуготовлять должно для полосканія рта
декоктъ изъ правы агримоніи, салвіи, изъ цвѣтковъ
хамомилле, гиперіци, изъ дерева сассафрасъ, изъ
кореня пимпинелле албе. Пособствуєтъ также медъ
сѣ розою, къ нему прибавитъ можно, ежели болячки
возгрівы будѣтъ, нѣсколько отъ вещи крѣпчайшихъ,
алюмине усто, флегмате алюминисъ, аква вириди
гаршманни. Сличку пряжею мяконькою обернувши
въ шакое лѣкарство обмакивать, и болячки помазывать.
Когда же болячки начнѣтъ чисты дѣлаться, прибавлять
можно къ нимъ помаленьку балсами перувіани, въ
тожѣ самое время пособствуєтъ эссенція сукцини и
пимпинелле, ежели накапавъ на кусочекъ сахару въ
роту держашъ будѣтъ.

§. 915.

Почти пѣмижѣ самыми лѣкарствами болячки на
языкѣ лѣчатся. Однакожѣ оберегаться надлежитъ отъ
вещи ѣдкихъ, понеже не рѣдко болячки на семъ мѣ-
стѣ, ежели отъ недоразумѣнія лѣчащаго разберед-
ялся, опасность рака откровеннаго наносятъ (260),
котораго ни какъ залѣчить бываетъ не возможно.
Ежели сѣ боку на языкѣ болячки здѣлаются, и долго
продолжаются будѣтъ, то смотрѣтъ надлежитъ, не
острѣ ли зубъ какой противъ того мѣста, который
заживать мѣшаетъ болячкѣ въ томъ мѣстѣ, и для
того надобно згладитъ или вонъ его вынуть.

§. 916.

Ежели же злая болячка поднебесную перспонку
изѣѣсѣтъ, а припомѣ и косѣ попортитъ, что не
рѣд-

рѣдко у больныхъ блудодѣйною болѣзнію страдающихъ случается, къ очищенію пюй болячки пособствуютъ лѣкарства тѣ, которыя къ попорченной кости полезны, эссенція мурре, смѣшанная съ эссенціею аристолохіе, и съ нѣкоторою частицею олеи каріофиллорумъ. При употребленіи сихъ лѣкарствъ такъ долго оспать, пока чешуйка отъ кости отлупится, и кость цѣлою здѣлается. Ежели гниль костная глубоко пройдетъ, что гораздо часто случается, кость попорченная отъ другой кости цѣлою отдѣляется, и пазуха послѣ того оспается. Смотришь надлежитъ, не можешь пазухи оной, которая глотанію много препятствуетъ, мясомъ исполнить, что иногда самую вещь бываетъ, когда оная великая бываетъ (*). Ради того край оной часто надрѣзываютъ, и лѣкарствами мясо питательными изъ мурры и изъ другихъ вещей составленными помазываютъ (389). А ежели пазуха останется, что еще гораздо чаще случается, заслоночку, изъ золота или изъ свинцу, здѣлавъ, въ нее вставишь, которая и голосу и глотанію пособствуетъ (**).

(*) Что самое здѣсь въ Адмиралтейской госпитали 1757 года у одного Магизинъ ахтера, и у другаго матроса здѣлано.

(**) Смотри. ГАРЕНЖОТА д-съ инстру. Т. 1 стр. 387, ПУХАРДЪ Хирургень Дентисъ Т. 2 гл. 20 таб. 38 стр. 298.

§. 917.

На удахъ дѣтородныхъ у обоюго пола въ нынѣшнія времена худыя болячки отъ блудодѣйной болѣзни дѣлаются, которыя рачными [канкроза] называются. Сперва на плѣшкѣ, на кожѣ, которою она покрывается, также и на срамошахъ женскихъ, прыщи дѣлаются, одинъ, или много, на угри похожіе, бѣлова-

ловашье, и будто гноющіе, свербячіе. Когда же они прорвутся, внизу будто болячка возгнвая окажется, которая въ короткое время поширѣ раздася, и здѣлается жесткою, въ кругъ оной край шолсты и жестки будучи посиѣбуютъ. Сей порокъ, или потъ часъ послѣ нечистаго блудобѣянїя дѣлается, отъ того что оныя мѣста ядовитую мокроту орошены были, или дѣлается отъ порока, который уже по всему тѣлу расялся въ сокахъ человѣческихъ. Последній родъ трудные излѣчивается.

§. 918.

Ежели вскорѣ послѣ соитїя прыщѣ горючей на тѣхъ мѣстахъ здѣлается, то иногда можно бываетъ здѣлать, что болячка не будетъ, когда употребить припарку молодую свареную съ корнемъ алтея и съ травами смягчительными. Ежели же паче чаянїя болячка здѣлается, оная вещьми сѣбдающими (907, 908) и прижигательными лѣчится, которыми и край жесткіе искореняются. Такія болячки хотябъ чисты здѣлались, долго растворительными и гноепроизводными лѣкарствами лѣчить должно, а не потчасъ заживлять. Также и по залѣченїи болячекъ, а особливо ежели онѣ производятъ будуще отъ порока во всемъ тѣлѣ расыпавшагося и съ соками смѣшавшагося, человеку отъ болѣзни блудобѣйной безъ опасенїя быть не можно, ежели онѣ не будутъ принимать лѣкарствъ къ искорененїю ея способныхъ и сильныхъ.

ЛЪТУЧИЙ ОГОНЬ или ЗОЛОГУХА.

Е Р П Н Σ.

§. 919.

Кожа зачастую также различными прыщевъ родами бываетъ осыпана. Такія сыи различными именами называются, какъ ошъ. прежнихъ авиפורовъ пакъ. и ошъ новѣйшихъ, данными, въ которыхъ знаменованіи не есѣ они также и согласны. ѿбще почти всѣмъ сыямъ имя есѣ егѣтис, по Французски ле Дарпръ, а по руски лѣтучій огонь, понеже оныя болячки пощазываючи дѣлаются, такъ, чѣно иногда бывшія прежде болячки, заживають. Но и этой болѣзни различныя роды суть. Лѣтучимъ огнемъ просовымъ [герпешемъ миліаремъ] называются, въ которомъ маленькія и почти сплывшіеся прыщики на самой на кожѣ бывають жесткіе шероховатыя и свербячіе, изъ коихъ ни одного больше сѣмечка просоваго величиною не бываетъ. По прошествіи нѣсколько времени прыщики прорывающіяся, и будто бы чешуйка оплупливаются, какъ мука. А ежели пузырьки прорывающіеся нѣсколько побольше будутъ, то большая и скорлупка и будто бы струпикъ послѣ дѣлаются. Сей родъ уѣренно и на самомъ верху на кожѣ произходитъ. Въ близикѣ находящаяся кожа, на которой еще этой болѣзни надобно быть, завсегда припухлая бываетъ и красная. Иногда середка заживаетъ, когда по краямъ находящіеся прыщики, подалѣ разойдутся. А больше худова находится въ лѣтучемъ огнѣ номъ, который егѣпта ес Эіоревон Греки называютъ, понеже скоро распространяющіеся и углубляющіеся до самыхъ костей шло

ЛѢТУЧІЙ ОГОНЬ ИЛИ ЗОЛОТУХА. 547

пѣло сбѣдаетъ. Отнявши шушъ шелуху, вытекаетъ мокрота бѣловатая, отъ которой кожа больше осыпается. Къ тѣмъ же различнымъ видамъ нѣкоторыя также причисляютъ сыпь, которая съ рдѣніемъ сильнымъ и съ горячкою на брюхѣ дѣлается, и она ради того выше, гдѣ о рожѣ говорено, описана и прополкована (166). Ибо лѣтучій огонь отъ рожѣ въ томъ наипаче разнѣствіе имѣетъ, что въ этой болѣе рдѣніе бываетъ и горячка, а при томъ скорѣе проходитъ. А въ лѣтучемъ огнѣ кожа больше шероховатѣетъ, нежели въ рожѣ.

§. 920.

Сія пороки весьма трудно лѣчить. Ибо часто, и гдѣ состояніе пѣлесное испорчено, оное перемѣнять должно. Крайнеежъ прилѣжаніе прикладывашь надобно, чтобъ внутрь даваемыми лѣкарствами сыпь оной не раздражить; а то весьма часто случается, когда нѣсколько горячія лѣкарства, которыя для очищенія мокротъ способными признаются, пропивъ ее упоиреблять. И чрезъ употребленіе узвано, что не всякому человѣку пожъ самое лѣченіе пособствовать можетъ. Надобно часто слабительное больному давать, только лѣкарствами не оспрыми, однако гораздо сильными, межъ которыми считаются рабарбарумъ, тамаринди, меркуріусъ дульдисъ и манна. Можно давать декокты всякому человѣку смотря по состоянію его такія и сякія, которыя пособствовать могутъ болѣзни той, которую по подлиннымъ обстоятельствомъ въ сокахъ человѣческихъ находящуюся признавать можно. Употреблять же надлежитъ лѣкарства весьма легкія, и которыя по маленку вредный сокъ испражняшь могутъ. Иногда похлебки по-

Θ Θ 2

соб-

548 ЛѢТУЧІЙ ОГОНЬ ИЛИ ЗЛОТУХА

собствують, съ правами и кореньями кипому способными вареныя. Старому человѣку иногда пособуюють похлебки, съ ехидными вареныя. И въ такихъ лѣченіяхъ и въ пищѣ до нѣхъ поръ упражняться, пока не будетъ усмотрѣно, что кожа въ лучшее состояніе пришла, а особливо, ежели болѣзнь глубоко углубилась, и уже въ обыкновеніе пришла. Иногда человѣкъ цѣлительными водами вылѣчивается, а иногда и опѣ ослинаго молока легче бываетъ, которыми поймами нѣкошорые люди, будто бы со всѣмъ выполоскавшись, опѣ болѣзни свободжаются. Лѣкарства тупѣ мало пособствують, ежели при нихъ не будетъ употреблена воздержность и умѣренное тѣла движеніе, а сверхъ того въ пищѣ и пишь нѣсколько нѣжное наблюденіе.

§. 921.

Когдажъ тѣло переѣмнится, то злостъ она иногда безъ прикладыванія снаружи лѣкарствъ оканчивается. Легкіе прыщики, опѣ мазанія повседневно голодною слиною, заживаютъ. А впрочемъ прикладывать лѣкарства не оспрыгъ, но пакія, которыя будто бы зчестъ дѣлающія, подавляютъ. Такую силу въ себѣ имѣетъ креморъ семинисъ псилліи и цидоніорумъ, съ которымъ понемножку смѣшивать меркурій дульцисъ и церуссе. Также бѣлила въ водѣ розовой разбалпываютъ, и къ нимъ немножко прибавляютъ меркурія дульцисъ, и тѣмъ прищеватины мажутъ. Для подавленія и засушенія наипаче сильна она вода, въ которой не давно мыль бываетъ спѣиумъ діафоретикумъ. Также пособствуеетъ составленіе, лаписъ медижамепозусъ кроллій называемое, ежели онаго не множко въ довольномъ количествѣ водѣ распустивъ

пустивъ, будешь прикладывашъ. Нѣкоторые декоктъ лапаты акупи и хелидоніи превозносятъ, которымиъ больное мѣсто часто моютъ. Другіе сокъ ципронный и уксусъ винный, въ которомъ доволная часть липаргиріи распушена, по ровной части смѣшиваютъ, и гущу, которая изъ смѣшенія ихъ на дно осядетъ, къ мѣсту больному прикладываютъ. Сія гуща будучи нѣсколько времени приложена, какъ опадетъ, то больное мѣсто водою обмытъ и новую гущу свѣжую приложитъ должно. Много также пособствуетъ пластырь альбумъ коктумъ называемый, ежели онъ хорошо будетъ составленъ. У нѣкоторыхъ людей кожа вовсе ничего терпѣть не можетъ, и опъ всего, что ни прикладывается, рѣветъ. У такихъ чрезъ прикладываніе снаружи лѣкарствъ напрасно къ выздоровленію надежда имѣется, онъ употребляючи внутрь только лѣкарства и содержаніемъ въ пищѣ и пипѣ могутъ выздоравливать. А припомъ знатъ должно, что во всѣхъ такихъ порокахъ, какими кожа бываетъ уязвлена, прилѣжно наблюдать должно чистоту.

(*) Смотри. ВИЛАРСЪ Т. 2 стр. 47.

Ш О Л У Д И.

П О Р Р И Г О.


§. 922.

Шолуды [порриго], что нѣкоторые [тинеемъ, фавумъ, ахоресъ], называютъ, порокъ, гдѣ между волосами дѣлается будто нѣкоторая чешуя, которая иногда мокнетъ, а иногда сухая бываетъ, иногда безъ болячекъ, а иногда съ болячками. И онъ бываетъ

О О З

ис

не со всѣмъ у здороваго человѣка , и не у такоужь ,
 который бы вовсе нездоровъ былъ. Ибо часто , ежели
 у мокротныхъ людей случается , особливо на головѣ ,
 другая болѣзнь будеть , не бесполезно признается
 самую верхнюю кожу испортить , нежели то , что
 вредитъ , къ другой части гораздо нужнѣйшей обра-
 щить. Того ради гораздо лучше голову вычесывая
 гребнемъ чистить , нежели шолуди со всѣмъ , прикла-
 дывая составленія изъ ртути и сульфурѣ здѣланныя ,
 удерживать. Давать надлежитъ лѣкарства , которыми
 бы погрѣшность въ сокахъ имѣющаяся очистилась , и
 пасока удержалась. Снаружи ничего лучше нѣтъ ,
 какъ голову часто чесать , а припомъ спрунья тол-
 стыя такъ отскабливать , чтобъ изъ болячекъ кровь
 показывалась , и съ начала лѣкарствъ никакихъ не при-
 кладывать , а послѣ , которыя подавляютъ. Такія
 лѣкарства , кажется , съ начала нѣсколько пособляютъ ,
 ежели же хотя не много пособствовать будутъ , то
 употреблятъ оныя не переставать , понеже и въ сихъ
 случаяхъ доброе окончаніе отъ времени зависитъ.



МОЛОШНИЦА.

А Ф О А І

§. 923.

Молошница [аффе] называются болячки въ роту
 маленькія возгнвныя , бѣленькія , которыя дѣлаются
 тогда , когда маленькія скважинки , сквозь которыя
 всякіе соки въ ротъ текутъ , отъ неподвижной и
 испарченной мокроты разбѣдаются. Она не только
 въ роту , но въ гортань , въ горло , въ желудокъ

во всѣхъ кишкахъ бываетъ. Бываетъ иногда съ вожженіемъ , и съ худою горячкою , особливо когда въ желудкѣ и въ горлѣ вожженіе здѣлается , въ оныхъ случаяхъ чрезъ то смернь значить будетъ , а наипаче ежели на болячкахъ въ верхъ высокой струпъ здѣлается , и оный изъ самого горла будто выходитъ будетъ ; часто же она и съ другими горячками случается , также чахлыхъ или сохлыхъ и чахотныхъ не мало мучитъ. Ежелижъ онѣ другой цвѣтъ и темный получаютъ , тутъ будетъ значить , что Антоновъ огонь уже есть , который обыкновенно смерти предвозвѣстникомъ бываетъ. Не безъ опасности и та молошница бываетъ , которая прошедъ опять дѣлается въ корѣ. Ся болѣзнь обыкновенно въ мѣстахъ болотистыхъ , а наипаче въ Голландіи случается часто , и будто бы природная или общая бываетъ. Младенцы очень часто ею больны бываютъ , когда ихъ худымъ молокомъ кормятъ , и оно въ желудкѣ свернется.


§. 924.

Ежели молошница съ злою и огневишною горячкою случится , то прежде всего горячку лѣчить должно. Всѣ вещи наиболѣе пособивающія тѣ , которыя тѣлесные соки отъ преизлишняго жару въ движеніе пришедшіе разжиживаютъ и истончаютъ. Давать и часто въ роту держать должно декокты изъ вещей мягкихъ и изъ ячменю , въ оный прибавливать сыръ де алтея , віоларумъ и капиллорумъ венерисъ , или вмѣсто ихъ оксимель. Нѣкоторые рѣшу скобленую или на тѣркѣ тертую варятъ , очень хорошо даютъ кипѣть , и больному даютъ , а припомъ приказываютъ , чтобъ онъ прежде глотанія очень долго ее въ роту держалъ. Также ко-
ренъ

рень главу рризе , сассапарилле , праву капилли венерисъ , цвѣтки вербасци , малве въ водѣ или въ сывороткѣ молошной варятъ. Пособствуетъ также креморъ изъ миндаловъ и изъ сѣмени макова зѣланной , а сверхъ того спудень изъ оленья рогу вареная , въ которую предовольно соку кислаго класть надобно. Однакожъ всѣ Медики знаютъ , что спюдень въ горячкахъ не очень полезна.

§. 925.

Всежъ сіе только что смягчитъ въ себѣ силу жмѣютъ , и въ томъ пособствуютъ , когда въ роту долго держишь. Изъ нихъ также изрядно могутъ дѣлаться ропныя полосканія , а припомъ и клистеры. Межъ лѣкарствами почитается нипрумъ и саль прунелле въ водѣ довольной распушенные. Кромѣ того для вычищенія возгрей изъ рта очень дѣйствительное изъ моровъ или изъ орѣховъ рообъ діаморонъ и діанукумъ у насъ называемый ; оный съ медомъ розовымъ смѣшавъ , и обмакивая въ то кисточку болячки помазывать можно , и къ симъ очень можно прибавливать понѣскольку капелекъ спиритусъ випріоли , чтобъ къ очищенію сихъ болячекъ и къ смягченію возгrievedъ спрупиковъ лѣкарство сильнѣйшее было. Младенцамъ , ежели молошница безъ горячки будетъ , пособствуетъ ревень , и ежели содержание ссущаго младенца въ пищѣ перемѣнится.





БОЛЯЧКИ , КОТОРЫЯ ЧРЕЗЪ ИСКУССТВО ДѢЛАЮТСЯ.

ульцера . кве арте фіунтѣ.

§. 926.

Понеже чрезъ примѣчанія узнано , что иногда какъ
здѣлаются на ногахъ или на другихъ мѣстахъ че-
ловѣческаго мѣстахъ болячки , тогда многія и почли
опытныя болѣзни излѣчиваются , по наука и начала
слѣдовать естеству , и уставила наряднымъ дѣломъ
дѣлать болячки . А понеже старинные Медики сіе
больше желѣзомъ раскаленнымъ кожу прижигая дѣлали ,
оттуда сіи болячки и имя себѣ получили , которыя
у новѣйшихъ кавтерія п . е . предосторожностными
называются . Многіе изъ нашихъ оныя фонпикулами
п . е . источниками называютъ , ибо думаютъ , что изъ
нихъ , будто бы изъ источника , худая матерія вы-
текаетъ .

§. 927.

Не всѣхъ на мѣстѣ мѣста къ симъ болячкамъ ;
или источникамъ способны . Оберегаться надобно жилъ
крововозвращательныхъ и быющихъ , жилъ чувстви-
тельныхъ и жилъ сухихъ . Весьма хорошо оныя дѣ-
лать въ плевѣ жирной , которая между мясомъ мы-
шечнымъ лежитъ , и ихъ другъ съ дружкой связы-
ваетъ . Если же болячку на самомъ мясѣ здѣлаешь ,

V v

по

то часто она или заскарѣлая будетъ, или воженіе кругомъ имѣть будетъ. А припомъ мѣсто избирать, чипобъ человекъ оное рукою могъ доспаивать, чрезъ то онъ когда надобно будетъ перевязывать и вычищать болячку, не требовалъ бы отъ другихъ вспоможенія. Мѣстожъ между мышками лежащее среднее: зная можно по прилѣжному оныхъ при упражненіи въ Анастоміи: разсужденію и подвиженію, которое наложивъ руку лѣкаръ чувствовалъ можетъ, когда членъ движеніе будетъ имѣть. Ибо всякой мышкѣ мясо во время движенія, подъ давящимъ перстомъ движется, и будто разпространяется и опускается, а плевочная, между мышками по срединѣ лежащая, понеже не движется, то у лѣкаря щупающая до перстовъ не касается. Когда мѣсто найдено будетъ, оное чернилами назначить можно.

§. 928.

Болячкижъ сїи не однимъ способомъ дѣлаются. Такихъ очень мало находится въ нашемъ вѣку, которые бы кожу каленымъ желѣзомъ прижигали. Многие лѣкарство прижигательную силу въ себѣ имѣющее прикладываютъ, и оное на томъ мѣстѣ такъ долго держатъ, пока струя будто бы огнемъ сожженный не окажется; оный гноепроизводными вещами, масломъ коровьимъ сѣжимъ, унгвенпо аврео и еимъ подобными, прочь отдѣляютъ, а въ луночку горошинку, или другой какой деревянный камышокъ вкладываютъ, и оную положи сверху суконки, сверху же шѣхъ обвязку, или здѣланный для того поясъ, крѣпко завязываютъ. Изъ прижигательныхъ лѣкарствъ первымъ почитается лаписъ infernalisъ, и лаписъ каушикусъ хирургорумъ (97, 907). Эпи такъ къ кожѣ при-

прикладываются, что сперва на нее положится пластырь, дырочку на срединѣ имѣющей. Въ эту дырочку на кожу, помоча ее сперва слиною, лѣкарство кладется, которое другимъ пластыремъ прикрывають, и наложивъ суконки, обвязкою въ кругъ обвязать нѣсколько попухе, и закрѣпить. Сие около шести часовъ на мѣстѣ бывають, до колѣ струи на козѣ, будто бы огнемъ прижженный дѣлается. Сей струи послѣ того объявленными теперь лѣкарствами чрезъ нѣсколько дней помазывается, напоследкѣ опдѣляется. Когдажъ онъ прочь опдѣлился, тогда въ луночку горошенка или пулечка вкладывается.

§. 929.

Но гораздо способнѣйшая поступка, кожу тѣмъ часъ ножечкомъ разрѣзать, и въ ранку горошенку положить, а сверхъ того корпѣю и суконкою въ нѣсколько разъ сложенною прикрыть, и обвязкою нѣсколько попухе завязать, дабы ярезъ по краѣ у раны приписнулся, и горошенка въ рану вошла (895).

§. 930.

Сии же такъ называемые источнички иногда на самой верхушкѣ на головѣ дѣлаются, въ томъ мѣстѣ, гдѣ шовъ, отъ запылка по срединѣ головы идущій, въ лобномъ швѣ кончится. Сие мѣсто у рѣбячѣ источничкомъ или пѣмячкомъ [фонпанелла] называется. ибо тамъ костей нѣтъ, и мозгъ только одною перепонкою покрывается. Оное мѣсто сыскивать не прѣчно, оно нѣсколько впало, и можно опупать. Нѣкоторые для сысканія его двѣ линійки дѣлають, одну отъ середины уха одного до середины уха другого, а послѣ того отъ ноздрей до макуши

556 болячки , котор. чрезъ искусство дѣлаютъ.

головной , и гдѣ линѣйка линѣйку пересѣченъ , кожу прорѣзываютъ , или , которое гораздо дѣиспвишельнѣе , каленымъ желѣзомъ прижигаютъ , что шакъ сильно жгутъ , что и отъ коспи слоѣкъ отойдетъ. Сіе такъ сильное вспомогаельство иногда у нѣхъ людей дѣлаютъ , которые нестерпимою долговременною и почти опчаянною головою болѣзнію страдаютъ.

§. 931.

Въ запылкѣ еще лучшее мѣсто для сихъ болячекъ между вторымъ и третьимъ шѣйнымъ позвонкомъ. Смотрѣшь же должно , чтобъ ни желѣзомъ , ни лѣкарствомъ прижигательную силу имѣющимъ , ости позвоношной не прижечь. Чрезъ такіа болячки на этомъ мѣстѣ здѣланные иногда сохаютъ слѣпающіеся глаза , и всегда тонкою мокротою мокрые , а впрочемъ тѣхъ самые глаза сухи будучи , отъ самой маленькой причины красны бываютъ.

§. 932.

Часто на плечѣ дѣлается испочникъ , для котораго мѣсто наилучшее кажется то , которое между мышкою делтъ подобною и двоглавною естъ. Нѣкоторымъ мѣсто лучше кажется то , повыше немножко конца мышкы делтъ подобной , гдѣ она лилою сухою дѣлается. На бедрѣ повыше колѣна на четыре перста мѣсто пологое между мышкою обширную внутреннюю и истонченную , а на голени на четыре перста ниже колѣна между мышкою подошвенною и ножноикорною внѣшнюю.

§. 933.

Болячку повседневно перекладывать и вытирать должно , горошенку также , которая въ ней оставляется , обвязкою прижимаешь , и со дня на день пер-

рѣмбнятъ. Ежели же въ болячкѣ дикое мясо выростетъ, оно квасцами жжеными, или купоросомъ жженымъ весьма мѣлко спертымъ искореняется. Ежели болячка суха будетъ, должно посмотришь, не лежитъ ли подъ нею мышечное мясо; и ежели оно найдется, то гораздо лучше оную болячку залѣчить, и другую въ иномъ мѣстѣ гораздо способнѣйшемъ дѣлать. Ежели же отъ другой причины гной изъ сухой болячки шеть не будетъ, что человекъ будетъ боленъ горячкою и безсиліемъ, оный приличными лѣкарствами произвести надлежитъ. И для того въ болячку положишь надобно пулечку изъ дерева сассафрасъ выпоченную или ее осыпать порошкомъ изъ корня аристолохіе, генціане алѣе, изъ травы сабина называсмой, прибавивъ нѣсколько эуфорбіи или кантарионовъ хорошенько спертыхъ.

§. 934.

Не надобно жъ при сихъ болячкахъ и того позабыть, что онѣ ежели въ тѣлѣ застарѣютъ, не безбѣдственно ихъ залѣчивать (899). Для того какъ не надлежитъ ихъ смѣло дѣлать, такъ когда застарѣютъ, и въ обыкновеніе придутъ, въ чемъ вѣдаемъ, что великая сила состоитъ, увѣряясь полученіемъ отъ старой болѣзни облегченіе, легко залѣчивать. Ибо онѣ предъ прошлыми много пособствуютъ, ежели отъ какой благородной чисты и впервыхъ отъ мозгу или отъ глазъ стремленіе мокротное, которымъ спрядутъ, опознать должно. Кромѣ того, ежели на которой чисты, на примѣръ, на голняхъ худыя и мокротныя болячки долго продолжаться будутъ, а наислѣдокъ заживутъ, то источниками, ежели они вблизи дѣлаются, худой матеріи въ прежнія

времена печь, обыклой вонъ выходъ дѣлается. Однакожъ и оными вредная матерія испогчена быть не можетъ, ежели болѣзнь, какъ то мокроты густой печеніе въ глазахъ, долговременна будеть, и почти всю жизнь человѣческую испорчитъ, когда уже части страдающія ослаблы и безсильны дѣлаются; въ тѣхъ случаяхъ, ни источники, ни другое какое пособіе, ничего дѣлать полезнаго не можетъ (*).

(*) См. пр. Преслав. Фрид. ЮФФМАННА диссерт. о употребленіи медицинскѣхъ источниковъ въ Галѣ 1727 года. Снеси шутъ ГЛАНДОРПИЕВЪ Газофлуиумъ Полуфлуиумъ.

§. 935.

Древніе въ обычаѣ имѣли различныя мѣста на тѣлѣ человѣческомъ по единожды и подважды желѣзомъ раскаленнымъ прижигать, тоже самое въ нынѣшнія времена за лѣкарство больше уже не почиается, ибо многимъ оно крайне безчеловѣчнымъ кажется, живое тѣло огнемъ жечь. Между же лѣкарскою збуею такихъ орудій, различную величину и различное изображеніе имѣющихъ, довольно имѣется. Уже въ другомъ мѣстѣ объявлено (413), что никто не можетъ безопасенъ быть, когда жилъ бьющихся сильно кровь изпускающихъ устья желѣзомъ каленымъ прижжены будутъ. Ни болячекъ худыхъ, ни дикихъ мясъ и раковъ открытыхъ огнемъ лѣчить не безопасно, когда онѣ глубоко корни распустятъ, понеже примѣчено, что чрезъ то больше раздраживаются. Ежели же такіе пороки не весьма глубоко въ мясо подъ нимъ лежащее и въ другія части прошли, оныя способнѣе вырѣзать можно. Не пакъ тяжело, кости онѣ находящихся сверхъ ихъ болячекъ и фистулъ поврежденныя и гнилыя горячимъ желѣзомъ прижигать, по-

понеже онѣ какъ только, обрѣзавши мясо, спкроются, не чувствуютъ, о которыхъ довольно въ другомъ мѣстѣ объявлено. Дѣйствительное сіе лѣкарство въ древнія времена употребляли Медики и у другихъ долговременною болѣзнію немоществующихъ людей, особливо водяною болѣзнію страдающихъ, у которыхъ брюха и груди орудіями желѣзными горящими во многихъ мѣстахъ прижигали, и болячки долго не заживляли (*). Такое пособіе и въ нашемъ вѣку стариннаго вѣка люди употребляютъ, ежели членъ съ мѣста своего не совсѣмъ выскочилъ, однако маленько съ мѣста сдвинувшись повредится, такъ, что мокрота пуда набѣжитъ отъ чего кость помалѣхоньку изъ мѣста своего выжимается (**). Ибо ежели изъ этихъ болячекъ огнемъ издѣланныхъ много гною будетъ печь, оный иногда съ собою и потъ вонъ изводитъ, который внутри соберется. У человѣка тяжкою апоплексіею пораженного, который безъ чувства и будто спящій будетъ лежать, ноги и подошвы (***) или что еще нѣкоторые думаютъ, лучше швы на черепѣ головномъ прижигать (****).

(*) Смотр. у ИППОКРАТА о внутреннихъ Аффектахъ част. 27 Т. 2 Линд. стр. 229 Сюда присовокупи част. 6 Афор. 27 стр. 100.

(**) Смотр. о составѣ плечевомъ и бедрномъ у ПАВЛА ЭГИНЕТЫ Кн. 6 Гл. 114 стр. 102 и Гл. 118 стр. 103 Издан. Алд.

(***) Смотр. въ МИСТИХЕЛЛИНОМЪ трактатѣ о Апоплексіи, который упоминаетъ ГЕЙСТЕРЪ въ Хирург. въ част. 2 въ раздѣл. 1 гл. 22.

(****) О приизлишемъ жженіи употребленіи смотр. у М. АВР. СЕВЕРИНА въ Пурошехніи Хирургической.

§. 937.

Уже въ древнія времена предки наши кожу различными вещми, зажигаючи ихъ на кожѣ, прижигали (*). Воспочные народы нѣкоторой правы мошокъ, который

560 БОЛЯЧКИ, КОТОР. ЧРЕЗЪ ИСКУССТВО ДѢЛАЮТ.

порый моксою называютъ , перстами жмутъ , или мнутъ , кегелькою дѣлаютъ , и на кожѣ зажигаютъ , которое жженіе надъ людьми , членосоставною болѣзною страдающихъ , исполняютъ (**).

(*) иппократъ употреблялъ губку въ маслѣ обмоченную , о зрѣніи Т. 2 стр. 352. Ленъ сырой перѣ παῖδι разд. 30 и 32 Т. 2. стр. 180. Грибы перѣ τῶν ἐν τῷ παῖδι разд. 26 стр. 229, разд. 28 и вездѣ. Снес. сюда М. АВР. СЕВЕРИНА поман. мѣсто.

(**) Смотр. ТЕНЬ РГВНЕ де Ареритиде щ. е. о разслабленіи членосоставномъ стр. 86.

§. 937.

Болячки еще обыкновенно дѣлаются на кожѣ чрезъ прикладываніе шпанскихъ мухъ , которыя или съ шѣстомъ хлѣбнымъ , или съ какимъ нибудь пластыремъ смѣшиваютъ , и оное на шмапокъ лайки намазываютъ. Прежде же прикладыванія сего пластыря , который различной величины дѣлается , мѣсто холстиною подстою попересть надѣсно , и самую верхнюю кожу симъ тереніемъ размягчить , дабы чрезъ то въ нее способнѣе сила пластырная проходила. Пластырь по прошествіи шести или осми часовъ отнимается , самая верхняя кожица пузырьмъ приподнявшаяся , ножницами прорѣзывается , и мокрота , внутри скопившаяся , вонъ выпускается. На кожу такъ осадѣнную прикладываютъ масло коровье или масло деревянное. Иногда отъ сихъ болячекъ мало помочи бываетъ , ежели онѣ чрезъ нѣсколько дней не будутъ сохранены : Это дѣлается шпанскими мухами , оныя съ масломъ коровьимъ или съ саломъ смѣшавъ , повседневно къ болячкѣ прикладывать , то онѣ гной производятъ , который гной напоследокъ бѣлый и густый дѣлается , и изъ болячки течетъ (297). Эту гнойпроизводность такъ долго продолжать должно , пока

БОЛЯЧКИ, КОТОРЫЕ ЧЕРЕЗЪ ИСКУССТВО ДѢЛАЮТЪ. 561

пока болѣзнь, которой лѣченіемъ такимъ пособишь
хочемъ, не излѣчится.

§. 938.

Шпанскія же мухи на многихъ мѣстахъ тѣла
человѣческаго кладутся. Весьма же часто на запылѣхъ,
надъ обѣими опростками пишишными, на хребтѣ
между лопатками (297), на сосудахъ, на запястьѣхъ
и на икрахъ, а иногда и на локтяхъ. А пособ-
ствуютъ отъ глазной болѣзни и особливо отъ
той, которую мокрошною я назвалъ (277, 297) отъ
невсклоннаго сна, и ежели непреодолимый сонъ
человѣка клонитъ. Также ежели какія нибудь пѣпна,
съ горячкою рождающіяся, кроются, и не скоро на
ружу выходятъ, или нечаянно спрячутся. Вредны
бываютъ [инъ френипиде] ш. е. во время вожженія
перепонокъ головныхъ, когда человѣкъ будто бы отъ
пріумноженія и усилившейся горячки безумствуешь
или бредишь (*). Почки и пузырь повреждаютъ, и
для того ежели въ сихъ уринныхъ проходахъ камень
или болячка находится будетъ, то ихъ употреблятъ
не надобно. Ибо случается, что не только отъ
внутри данныхъ, но и снаружи приложенныхъ, и долго
не опнятыхъ, пузырь портился, такъ, что чело-
вѣкъ съ крайнею болью мочится, а иногда съ мо-
чою и кровь печетъ. Отъ такого случая пособіе
есть въ молокѣ парномъ, или въ миндалахъ и въ
сѣмени маковомъ, изъ нихъ съ водою полченныхъ сокъ
или какъ называютъ эмульсію, дѣлается (124) (*).

(*) смотри БАГЛАИВІЕВУ практику Мед. Кн. 1. въ Операкъ
стр. 102.

§. 939.

Заволока [сетацеумъ] имя себѣ приобрѣла отъ щетины, [а сеписъ] понеже въ спарину лѣкари волосы изъ хвоста конскаго къ тому употребляли. Она есть болячка, дѣлающіяся на кожѣ, которую или перстами или щипчиками приподнявъ, иглою широкою и плошною, вогнутою, или ножикомъ и другимъ инструментомъ наскрозь прокалываютъ. А продѣвать скрозь болячку надобно нитки шелковыя въ нѣсколько разъ сложенныя и такъ ссученныя, будто бы одною казались. Сія нитка такъ ссученая или потчасъ въ ту иглу, которою кожу прокалываютъ, продѣвается, или когда рана ножикомъ будещь прорѣзана, иглою тупою съ ниткою въ нее вѣштою скрозь рану уже совершенно здѣланную проволакивается. Мы въ книгахъ еще находимъ, что древніе къ тому желѣзо раскаленое употребляли (*). Нитку эту подважды въ день передергивать такъ, чшось въ болячку приходило мѣсто чистое, а другое гноемъ замараное мѣсто отрѣзывать должно. Оное мѣсто, которое въ болячку вдергивается, еще лѣкарствомъ обмазывать можно, къ произведенію гноя, а припомъ болячкѣ садно дѣлать, способнымъ. Когда вся нитка издержится, тогда къ самому концу старой нитки, новую свѣжую нитку привязать должно, или, новую опять иглою тупою продѣть.

(*) Почти до ГИЛДАНОВЫХЪ временъ. Смотри сто г Примѣч. 40; однако присовок. ГЛАНДОРПІЕВЪ Газофилаціумъ стр. 102.

§. 940.

Эти болячки по большей части на запылкѣ дѣлаются, а на другихъ мѣстахъ рѣдко. Нѣкоторыя иголку и нитку въ длину продѣваютъ, что кажется

болячки, котор. чрезъ искусство дѣлаютъ. §63

шрудно дѣлать да и больно, другіе поперегъ межъ зашѣйкомъ и впорымъ позвонкомъ. Третьи наискось (*). Доколь еще инструмента не вѣднeshъ, кожу перстами приподнять, и мѣсто чернилами назначить должно.

(*) Смотр. у ГЛАНДОРПА въ пмянут. мѣст.

§. 941.

Сіе лѣченіе, хотя сурово кажется, однако требуется при долговременной, и которой никакими иными лѣкарствами вылѣчить было не можно. Глазной болѣзни, также, когда отъ другихъ погрѣшностей, при начинаніи болѣзни подшюка, или темной воды, зрѣніе очей будетъ поршиться, сверхъ того отъ водяной болѣзни головной, отъ лешарга, т. е. не всклоннаго сна, и гдѣ мокроту и вредную матерію долговременнымъ и великимъ загнаиваніемъ испребить бываетъ надобно.

XX

СВИЩЪ или НОРА.

Ф И С Т У Л А.

§. 942.

Фистула, которая дѣлается изъ абсцесса т. е. чирья безверхушешнаго, есть болячка глубокая, узкая и мозолистая. Ибо болячка узенькимъ горлышкомъ начинающаяся глубоко проходящая, и внутри дупло свое разширяющая, ежели безъ мозолей будетъ, хотя многіе ее также къ фистуламъ причисляють, паухую [синусъ] или болячкою пазушистою [улкусъ синуозумъ] называется.

(*) Смотр. рѣчь мою о фистулѣ слезной 1724 года. Болячка великая, а не глубокая, однако же край жесткіе и мозолистые

А а а 2

имѣю-

имѣющая, болячкою мозолистою называется. Болячка безъ мозолей, по Гречески χαλπός, а ежели мозоль въ ней будетъ σιγίγγη называется. Смолр. у Горреа Тутъ же слѣжи ГЕНР. СТЕФАН. Экспоз. Вокаб. Мед. стр. 377 и 478.

§. 943.

Мозоль [калусъ] оболочка есть бѣлая, или бѣдная, жесткая, чувства въ себѣ неимѣющая, такъ, что и спичкою пронупая, боли не дѣлающая. Она родится отъ различныхъ мокротъ изъ болячки шепскающихъ, изъ оныхъ, ежели они не выпираются, и болячка не вычищается, будто бы иль осядаесть, и къ боляжѣ прилипаетъ, а на послѣдокъ толще и еще адѣлавшись въ мозоль припворяется.

§. 944.

Какъ фистулъ такъ и болячекъ (893) собственное мѣсто имѣется въ жиру. Однакожъ когда глубже и до другихъ частей пройдутъ, напримѣръ до мяса, до плевъ, до хрящей, до костей, то и оныя повреждаютъ. А впрочемъ многіе роды ихъ имѣются, которые межъ собою не мало разнспвія имѣютъ. Нѣкоторыя подъ кожею поперечно идутъ, другія прямо внутрь идутъ, нѣкоторыя недлины, другія длинны, и глубже проходятъ. Однѣ простыя или одинакія, другія многочасныя, которыя съ наружи одною дѣрочкою начинаются, а внутри на многія пазухи раздѣляются. Однѣ прямыя, а другія съ кривулинами и винповатыя. Однѣ внутрь жиру или мяса кончатся, другія до костей или до мяса проходятъ. Иногда внутрь, въ грудь, въ брюхо, въ кишку также въ составъ проходятъ, и дуплястыя сіи мѣста прорываютъ.

§. 945.

§. 945.

Когда спичку въ фистулу опустишь , то узнать можно , куда фистула идетъ , и какъ глубоко проходитъ. Ежели же фистула будетъ внутрь жиру и мяса проходить , надобно , чтобъ всѣ мышки подлѣ лежащія , недвижимы остались , когда спичкою проба дѣлается , а ежели будутъ дѣйствіе свое имѣть , то будутъ пазухи припискивать , и не допустяиъ , чтобъ въ пазухи спичка прошла. А понеже въ винповатыхъ фистулахъ часто различные выгибы находятся , которые лѣкаръ не скоро можешь изслѣдовать и сыскать , надобно въ то время , покуда изслѣдуешь , большого шакъ и внакъ класъ. Также знать можемъ по количеству гноя , какая фистулы величина , изъ которой ежели больше течетъ , нежели какъ бы изъ небольшой и проспой печь надлежало , потому великія и многія пазухи шутъ разумѣются. Еще и по количеству воды или другаго какого полосканья насосомъ въ фистулу впускаемаго , сколько въ нее входитъ , оной величину знать можемъ. Ежели пазухи подъ кожею идутъ , и мозоли имѣютъ , оныя приложатъ персты къ шѣлѣ чувствовать можно. Часто случается , что въ одинъ разъ фистулы изслѣдовать не можно , развѣ долго и нѣсколькократно будешь пробовать. Когда уже фистула будетъ разрѣзана , и пазуха открыта , а изъ нее другія пазухи , и будто ручейки будутъ производить , оное узнать потому можно , что очень маленькой и свѣтленькой нѣсколько приподнятой кружкѣ окажется , то будетъ новую пазуху значить. Такая пазуха временемъ такъ узка бываетъ , что ни весьма тонкой спички просунуть не можно.

А а а з

§. 946.

§. 946.

Также когда спичку въ фистулу опускаемъ , то и знать можемъ , какъ далеко она прошла , и по которое мѣсто можетъ вредить. Ибо ежели кончикомъ самимъ оцупается мягкое мѣсто , и немощной человекъ боль почувствуетъ , то порокъ между мясомъ находится , и мозоль еще неокрѣпла , которая больше отпрядывается и безболѣзненна бываетъ. Большая упругость бываетъ , когда фистула до кости проходитъ. Тамъ ежели спичка поскользнется , то кость еще плевою наkostною прикрыта , и еще червоточиною неповреждена , ежели же спичка съ мѣста не двигается , на которомъ остановилась , и ежели подъ кончикомъ ея не ровно и шероховато будетъ , то кость уже повреждена , и она уже червоточиною источена. А при томъ полугной [саніасъ] изъ фистулы текущей представлятъ намъ , какія части извѣдены (897).

§. 947.

Какъ на примѣръ изъ многихъ чирьевъ безверхушешныхъ и изъ ранъ болячки дѣлаются (894, 895) такъ глубокія пазухи и болячки , и особливо въ жиру бывающія въ фистулы претворяются , а то самое отъ подобныхъ себѣ причинъ случается ; Когда болячки не хорошо вычищаются , и въ нихъ или никакихъ , или легкія , или весьма острыя лѣкарства кладутъ , или къ нечистой болячкѣ прикладываютъ другія вещи изъ спирту составленныя , или край у болячки пряжею , кнопами , суконками и обвязкою припискиваютъ , фистулы дѣлаются. А еще худшія болячки бываютъ и съ большею трудностію очищаются , когда на тѣлѣ худого сложенія случаются , что

что изъ преждеписаннаго разумѣть можно (894) , оныя также скоро весьма фистулами дѣлаются.

§. 948.

Легко излѣчить можно фистулу свѣжую , простую , и которая подъ кожей проходитъ , а припомъ много пособствуетъ пѣлесное состояніе , ежели человекъ молодой , здоровой и сильной будетъ ; Ежели же фистула глубоко идетъ , и оная кость , хрящъ , плевы и жилы сухія вредитъ , или , ежели къ сосаву въ жилу обьющуюся , или въ жилу кровесвозвращательную въ желудокъ въ горло дыхательное , проходитъ , ежели въ дуплястое мѣсто , въ грудь или въ брюхо проникаетъ , съ трудностью немалою залѣчивается , а часто и неизлѣчима бываетъ . Не легко и ту можно залѣчить , которая въ мѣстѣ междупроходномъ оспается , послѣ вырѣзанія камня изъ пузыря . Также весьма худыя Фистулы , которыя въ кишкахъ проходятъ (§. 674 , 841).

§. 949.

И ихъ лѣчить такимъ же способомъ надобно , какъ болячки (900) . Гдѣ же очистишь надобно фистулу и раню свѣжею здѣлать , должно мозольность изъ нее изкоренить . Оная или ножикомъ вырѣзывается , или сильными лѣкарствами выправливается , пока болячкою чистую и со всѣхъ сторонъ ровною не здѣлается . Иногда , какъ выправить мозоли бываетъ не возможно , искореняется такимъ образомъ , ножечкомъ оную надрѣзываютъ , и прикладывая какъ бѣдія , такъ мягчительныя и гноепроизводныя вещи размягчаютъ .

§. 950.

§. 950.

Лѣкарства мозоль искореняющія , не другія какія , но сильнѣйшія изъ шѣхъ , которыми болячки очищаются (901 до 910). Между первыми почтищается спиритусъ салисъ аммоніаціи (907). Есть также другія нѣкопюрыя лѣкарственныя дѣйствительныя смѣшенія. Ко многимъ пластырямъ , на примѣръ дасульфурисъ руланди , спикшико кроллин , ярь , квасцы жженыя и другія сильно бѣдія примѣшивающъ , и оныя въ жару засушиваютъ , и скапываютъ. Гѣшпики сїи дѣлаютъ такъ , чтобъ съ одного конца былъ воспренекъ , а съ другого потолще , и оныя поненькимъ концомъ въ самую глубину фистульную вкладываютъ , тамъ онѣ мягки дѣлаются , и распаиваютъ и на послѣдокъ мозоль сбѣдаютъ. А понеже сїи лѣкарства , хотя распаиваютъ , но не всегда до самого дна фистульнаго и до другихъ глубоко проходящихъ пазухъ достаютъ , нѣкоторые лѣкари различныя ликворы составляютъ , и сифономъ или насосомъ въ фистулу вливаютъ. Есть и такіе люди , которые различныя составленія маселъ употребляютъ , и оныя намазываютъ на кноты и на пряжу въ фистулу вкладываютъ.

§. 951.

Ежели же фистула до кости какой прошла , и кость уже повредилась , все лѣченіе излишнее будетъ , ежели все то , что ни попортилось на кости , прочь не возмется. Сіе часто случается , когда поврежденное широко , или глубоко будетъ , и довольно его открыть не возможно , весьма трудно и ни когда никакимъ способомъ здѣлать того не возможно ; такія и Фистулы залѣчиваться не могутъ.

§. 952.

§. 952.

Гдѣ фистула до чувствительной жилы, или до жильночувствительнаго мѣста проходивъ, которое и по анатоміи и по мокрошѣ, изъ фистулы истекающей, и по самой больности знать можно, то опасаться надлежитъ, чтобъ отъ такихъ осипрыхъ лѣкарствъ оныя часпи бѣльшаго вреда не получили. Въ такихъ случаяхъ бѣдныхъ и свѣдающихъ лѣкарствъ употреблять не надлежитъ, а больше пособствующѣ лѣкарства, которые болячку сушатъ, аква калыдисъ, аква фагаденика, эссенція сукцины элемеи и маслихисъ. Сии смолы съ перпеншиномъ и съ желпкомъ лишнымъ смѣшиваются, и въ фистулу впускаются могутъ, и отъ оныхъ иногда мозольность, если невелика будетъ и неглубока, исчезаетъ.

§. 953.

Если фистула подъ кожей поперечно идетъ, и если длинна, а больной рѣзанія бояться будетъ, въ оную спичку можно всунуть, и фистулу въ другой сторонѣ надъ головкою спичкиною прорѣзать. Сквозь фистулу продѣть можно пряпочку лѣкарствомъ приспосабливаемую, которую повседневно и передергивать, доколѣ не здѣлается чирка пазуха, а какъ здѣлается чирка, оную, какъ рану, залѣчивать, (привн. §. 478). Къ сему дѣйствию способно есть орудіе Пепитово, которымъ и пазуха въ другой сторонѣ прокалывается, и пряпочка свободно продѣвается.

(*) Ле Троякаръ а Коштровертюръ См. ГАРЕНЖОТЪ т. стр. 391 ф. 2.

§. 954.

Однако въ рукѣ гораздо большее и извѣстнѣйшее вспоможеніе есть, нежели въ лѣкарствахъ, которые

порыя рѣдко въ самое дно Фистулы и въ тѣснѣйшія ихъ пазухи проходятъ. Ибо ежели фистула одними лѣкарствами чистится, и въ ней нѣчто испорченное ослѣпается, что часто и случается, оная или не можетъ заживать, или спирнувшись, хотя бы наведенъ былъ, вскорѣ опять прорывается. Того ради скорѣйшее и полезнѣйшее дѣло есть, спичку жолобокъ на себѣ имѣющую въ фистулу всунуть, и фистулу по этой спичкѣ прямо разрѣзать. Но должно всѣ пазухи изслѣдовать, и ежели оныя внутрь идутъ, и глубоко низходятъ, оныя также пошире на двѣ или больше линіи прорѣзать, чтобъ самое дно пазухи предъ глазами и предъ руками видно было, изъ котораго мозольность съ меньшимъ трудомъ и съ болѣею безопасностію истребить можно. Ежели фистула поперегъ идетъ, и на другомъ концѣ выхода не имѣетъ, въ оную впускаютъ спичку, кончикъ острый имѣющую. Сею спичкою на другомъ концѣ фистулы кожа прокалывается, и по той спичкѣ кожа и все мясо, свѣрху фистулы находящееся, ножичкомъ разрѣзывается. Изобрѣтены и другіе роды ножичковъ, между которыми и тотъ, который будучи скрывъ, съ боку выдвигается (*).

(*) Ле бистури каше у гернѣръ см. ГАРЕНЖОТЪ Т. I Гл. 7 Арт. 3 стр. 232 и 243 Сей ножичекъ нѣсколько переимѣнилъ СЕНФФІЙ, смотр. фиг. 17.

§. 955.

По разрѣзаніи же фистулы мозольность также вывести должно, которая изъ фистулы или со всѣмъ вырѣзывается, или ножичкомъ, а лучше ножницами надрѣзывается, понеже отъ сего болѣе воженіе и загниваніе произойдетъ, или лѣкарствами къ тому спо-

способными прижигается, или поменьку сѣдаешся. Скоряе лѣченіе производиѣ, когда ножемъ тупѣ дѣйство бываеѣ. Однакожѣ и лѣкарства употребляѣ не опѣвно надобно бываеѣ, ежели нѣкоторая фистула внутрь проходиѣ, куда ножикомъ достать безѣ опасности не возможно. Древніе мозольность раскаленнымъ желѣзомъ прижигали.

§. 956.

Мозольность хотя вырѣзана, хотя выправлена
будетъ, и кровь чистая покажется, однако въ па-
зуху клася надобно сухую пряжу, дабы при худомъ
лѣченіи край залѣчиваяся не срослись. Пазуха, какъ
другія раны, лѣчится; покуда струпъ не злѣзаетъ.
А припомъ надобно наблюдать и тѣ лѣкарства, ко-
торыя внутренніе соки тѣлесные очищаютъ. Сіи
лѣкарства особливо надобны, ежели фистула отъ
погрѣшности во всемъ тѣлѣ находящейся, злѣзаетъ,
или ежели она въ тѣлѣ худого сложенія случится.

[illegible]

СВИЩЪ СЛЕЗНЫЙ.
Фистула лакрималисъ.

§. 957.

Имѣются еще многіе пороки въ пѣхъ протокахъ, которыми мокрота въ ноздри протекаетъ такая, которою глаза натурально обмачиваются, чтобъ не сохли. Она мокрота изъ различныхъ источниковъ въ глаза выпадающая, въ глазу подъ вѣками скапливается. Тонкая самая испарина идетъ изъ слезной, которою и вѣки (*) и глаза и плена роговая (**) покрываются. Чистая самая, но гораздо

Б Б Б 2

изо-

изобильнѣйшая, мокрота изъ большой жалѣзы безъ-
имянной протекаетъ сквозь проведенныя, однако весьма
узенькія трубочки, которыя къ вѣку верхнему при-
лѣпляются, и до самаго хрящика его протягиваются
(***). Сія мокрота, ежели будетъ преизобильна, и по-
щекамъ попечетъ, именемъ слезъ называется. На-
плываетъ жиръ изъ желѣзъ подлѣ хрящевыхъ вѣко-
выхъ краевъ положенныхъ, которыя по имени изобрѣ-
шателя Мейбоміа, Мейбоміевыми и названы.

(*) См. у ВИНЗЛОВА въ Анат. Т. 4 Ч. 2 §. 216.

(**) у ВИНЗЛОВА тамже и въ Ком. А. Наукъ К. 1721 стр. 417.

(***) у ВИНЗЛОВА тамже §. 176.

§. 958.

А которая часть мокроты сей чрезъ испарину не
испражняется, та прямыми дорогами въ ноздри про-
ходитъ. Въ купкѣ глазномъ внутреннемъ подлѣ вѣ-
ковыхъ хрящиковъ двѣ точки видѣть можно; оныя
точки усыпица путей въ вѣкахъ находящихся, или
протоковъ слезныхъ; тѣ протоки въ купкѣ глазномъ
спеша въ пространнѣйшее пріятелище, которое
мѣшкомъ слезнымъ называется, впадаютъ. Въ сіе прія-
телище мокрота низпадаетъ движеніемъ и поворачи-
ваніемъ, какъ вѣковъ, такъ и самаго глаза, про-
гнанная и будто бы низверженная. Не мало сему
слезному движенію пособствуетъ мясо, между про-
токами слезными въ томже самомъ глазномъ уголѣ
лежащее, и къ которому передняя тоненькая пле-
ночка, будто бы луноватая, прицепляется. Ибо сіе
мясо не допускаетъ слезамъ во внутренній купокъ
глазной пещь, которое печеніе бываетъ, ежели оно
отъ болѣзни свѣдено будетъ, или чрезъ худое лѣче-
ніе вырѣзано. Мясо сіе жестко и волосато, воло-
сами

сами окружено, которыхъ волосъ должность есть, ежели бы нѣчто сухой и заскорблой мокроты въ глазу случилось, препятствовать, чтобъ оное на шѣ про- токи не попало, и печенію мокротному не воспре- пятствовало. Мѣшокъ слезный привязывается къ пе- рѣдней споронѣ косточки слезной, въ которомъ мѣ- стѣ оная косточка малѣхонкую мышку отъ кости ровной начинающуюся имѣетъ, которая дѣйстви- емъ своимъ кажется движенію слезному въ ноздри по- собствуетъ (*). Сія косточка будучи тоненькая и весьма сквозная, на двѣ части нѣкоторою линѣчкою и внизъ низходящею, раздѣляется. Часть косточкина задняя съ косточкою ровною кости рѣшетообразной совокупляющаяся, къ ямѣ глазной принадлежи- ть, а въ перѣдней жолобоватой, мѣшокъ слезной лежи- ть, который къ показанной линейкѣ, буди бы связками нѣ- какими, пленою наклонною привязывается. Сіе прѣ- пелище слезное, будучи въ томъ мѣстѣ пространно, о- нятъ уже дѣлается, и закорючившись и назадъ нѣ- сколько склонившись, на низъ опускается. Назы- вается онъ же каналомъ носовымъ, который въ диру подъ костью челюстной съ нижней спороны ямы глазной находящуюся въ ноздрю проходи- ть, гдѣ подъ костью вихорною нижнею кони- тся.

(*) КОРНИЛІЙ В. РЕВЕРГОРСТЪ описываетъ въ Диссер. о Эгилопе, изданной въ Лейденѣ 1738 году, что оную мышку нашелъ ЛѢКАРЬ ДЮ ВЕРНЕЙ.

(**) Смощр. АНЕЛ. методъ де герирѣ ле фистюль лакри- маль у БІАНХА дикшосѣ лакрималесѣ новосѣ, и его критику, на МОРГАГНОВУ Прот. 6; присовокупилъ о фистулѣ слезной Диссер- таціи ЛАВРЕНТІЯ ГЕЙСТЕРА, о способѣ лѣченія фистулъ слез- ныхъ издана въ Амст. 1716 году; мою въ Липси 1724 году ЮГ- КАСП. ШОЛИНГЕРА въ базил. 1730 году.

§. 959.

Отъ многихъ причинъ дѣлаться можетъ , что слёзы по эпимъ дорогамъ итии не могутъ. Иногда клѣйкая мокрота въ нихъ оспанаавливается , иногда каракатица [полипусъ] ноздрю наполняющая , внутри мокротъ низпекающей препятствіемъ бываетъ (*).

(*) Смотри у ЛЕ ДРАНА т 1. Примѣч. 6 стр. 42.

§. 960.

Однако гораздо чаще случается , что сіи слезные протоки отъ вожженія распухаютъ , и тѣмъ , чтобъ слёзы не протекали , препятствуютъ: Ибо они будто бы изъ двухъ оболочекъ составлены , между которыми плева клѣпчатая имѣется , и внутри желѣзы имѣются (*); который случай не мало къ тому причины подаётъ , чтобъ и сіи части къ вожженію были склонны. Чаще оное вожженіе претерпѣваютъ люди такіе , которые плоскія и поклѣпья ноздри имѣютъ.

(*) Смотри у ВИНЗЛОВА тамже §. 349 и у РЕВЕРГОСТІА тамже гл. 1 стр. 19.

§. 961.

Многія имѣются причины , отъ которыхъ вожженіе происходитъ можетъ. Чрезъ опыты познано , что сіи пороки часто послѣ воспы и послѣ глазной болѣзни дѣлаются. При начинаніи воспы и кожа и глазъ самый почти всегда вожженіе имѣютъ и рдѣютъ ; а при худой воспѣ обыкновенно случается ѣдкая саніэсѣ , которая какъ другія мѣста , такъ и сіи пути свѣдаетъ , и въ болячки приводитъ. Въ болѣзни глазной гноющей тожъ самое дѣлается отъ слезы горючей и ѣдкой , которою иногда плотная на щекахъ кожа свѣдается , и отъ которой оныя шоненькія пленочки вожженіе получаютъ (289). Иногда же

поль-

только рѣдко отъ сихъ причинъ въ оныхъ проходахъ извѣденыхъ мясца на грибъ похожія раждаются, которыми они пѣсны дѣлаются. Всѣ сии приключенія наиболѣе усиливаются, когда человекъ худого сложенія бываетъ, и онъ французскую или цыганскую болѣзнь имѣетъ. Ибо предшествовать имъ на самой нивѣ и отъ самыхъ косей начинается, ежели около косей смрадные болячки бываютъ да и пѣ попорченныя, какія обыкновенно случаются, когда въ ноздряхъ сашъ (озена) бываетъ. Въ кожѣ также надъ прѣислицемъ слезнымъ случаи быть могутъ, ибо различные волдырки, вереды, чирышки безверхушешные, опухоли въ плень собственной своей заключенныя (758) раждаются, ежели рожа или сама отъ себя, или иногда у людей путешествующихъ отъ нестерпимыхъ жаровъ дѣлается. Ежели отъ какого ни будь удара снаружи приключившагося сии мѣста досажены бываютъ, и вожженіе получаютъ, и отъ того прѣислице слезное угнетается. Ибо слезы, которыя въ ноздрю прошли не могутъ, въ мѣшечкѣ остаются, и напоследокъ по природѣ своей и отъ пѣлесной теплоты портятся, остры дѣлаются, плевывы сѣдаются, и болячки производятся.

§. 962.

Знать же можно, что сии протоки такъ заражены и вожженіемъ или другою причиною спѣснены и сжаты, ежели сквозь точки слезныя мокрота съ флегмою смѣшанная, въ глаза, да притомъ непрестаннымъ мокрая течетъ, и будто бы съ стремленіемъ выскакиваетъ. Это само собою обыкновенно бываетъ, когда ея великое множество въ прѣислице слезное спечется, или когда она остра дѣлавшись, онос

оное прїятелище кусаетъ. Ибо отъ сихъ случаевъ нижняя оболочка, а можетъ быть, и маленькая она на ней лежащая мышца (958) скорчиваются, которыми мокрота она сюда спускающаяся вонъ вытѣвается. Также часто сіе случается, когда больной кашляетъ или чихаетъ. Крокъ шого мокрота изъ прїятелища слезнаго перстомъ выдавливается, ежели имъ кожу съ наружи нѣсколько посильнее подавишь: ибо ежели порокъ или порча не далеко прошла, она глазами невидна, понеже ни опухоли нѣтъ, ни кожа не попоршилась, ни болящій боли не чувствуетъ.

§. 963.

Прилѣжно разсматривать надлежитъ мокроту оную, которая изъ глазъ, или изъ почекъ выжимается. Ибо она, ежели на слезы походитъ, понка немножко, а припомъ съ бѣлою флегмою смѣшана, то разумѣется, что болѣзнь еще начинается, и слезные пухи излегка болятъ, а еще не сильно повреждены. А ежели мокрота печетъ, все противное прежнему имѣющая, она показываетъ, что оное зло уже глубоко и широко разошлось.

§. 964.

Не весьмажъ и трудно сей порокъ лѣчить, и ежели онъ свѣжъ и одинакъ ежели всякому вреду и болѣзни подлинное и собственное имя дать, и онъ еще фиснулою названъ быть не можетъ (941), послѣ какъ АНЕЛЛЪ спичку и сифонъ нашелъ, которыми все то, что въ сихъ пухахъ залегло, очистишь можетъ, уже дѣйствіе ножемъ не нужно спало. А гдѣ съ начала не хорошо, съ нимъ поступлено бываетъ, и болячка застарѣется, она мѣшечекъ слезный сѣбѣдаетъ,

сбѣдаеиѣ , ширѣ распространяется , а напослѣдокѣ мозольноснѣю обводится , и вѣ подлинную фистулу претворяется. Кость подѣ симѣ лежащая , иногда отѣ худой болячки гниѣ начинается. Очей зрѣніе также напослѣдокѣ тою острою матеріею , которая вѣ почки вытекаеиѣ , немало повреждается.

§. 965.

И такѣ лѣченіе сперва начинается , вѣ одно устьице или какѣ говорятѣ вѣ одну почку слезную спичку какѣ я сказаѣ , АНЕЛЛОМѣ сысканную , опустить. А спичка , которую вѣ почку слезную опускать , должна быть серебряная нѣсколько закарюченая , гладкая , сѣ одного конца потолще , а сѣ другого потонѣ , и сѣ маленькою головочкою , чѣтобѣ пушей оныхѣ непопоршила.

§. 966.

Человѣка на скамѣчку посадить. Лѣкарь одною рукою большимѣ и указательнымѣ перстами вѣка распялитѣ и ихѣ нѣсколько кѣ вискамѣ поотведетѣ , такѣ чѣтобѣ оныя почки или устьица , глазами видѣть можно. На верхнемѣ вѣкѣ вѣ почку , хотя проходѣ ся длиннѣе , но излучина меньше , легко спичка вставляеиѣся. И для того вѣ оный проходѣ не такѣ силою , какѣ поварачиваніемѣ , и клоненіемѣ во всѣ стороны спичка впускаеиѣся. Когдажѣ до мѣшечка слезнаго придетѣ , оную спичку нѣсколько наклонить надобно , отѣ чего она скрозѣ пѣсный проходѣ вѣ ноздрю идущій пройдетѣ. Ежелижѣ что нибудѣ внутри препятствоватѣ будетѣ , то спичку нѣсколько посильнѣе посунуть , чѣтобѣ скрозѣ ноздрю прошла. Ежели путь будетѣ свободенѣ , побольшой часпи нѣсколько возгрей а иногда и крови изѣ ноздрей печетѣ.

В в в

§. 967.

§. 967.

И такъ отворивши путь спичку нѣсколько разъ надобно подернуть, и оляпъ вонъ вынуть, а въ почку слезную принаровить и всѣпавить маленькую насосную шрубочку. Онымъ насосомъ въ прѣстелище слезное впускается ликворъ, которымъ мѣста болящія въ немъ имѣющіяся опаласкиваются. Ликворы похваляющіе писатели такіе и другіе, кто что упоиравлялъ и чѣмъ кому вылѣчить удалось. Хорошо дѣйствуетъ соль пещичная съ водою желѣзноправною [саль термарумъ кумъ аква вербене] разпущеная. А гдѣ болячки бывающіе гнусныя въ такомъ случаѣ употребляется вода извѣстная съ еблипрою, камфорою и съ сахаромъ разведенная. Надобножъ чѣмъ ликворъ былъ очень свѣтлой и жидкой, чѣмъ онъ могъ пройти въ шрубочку маленькую; а наконецъ нѣсколько примѣнивать можно воды ранной [акве вулнераріе]. Кажется мнѣ, что лучше ликворъ въ почку нижнюю вѣка впускать, чѣмъ онъ не внизъ но будто бы поперегъ въ почку слезную проходилъ. Въ то время какъ ликворъ изъ насоса выдавливается, что указательнымъ перстомъ дѣлается, мизинцомъ и перстнѣвымъ перстомъ на щекѣ опереться. Такое лѣченіе нѣсколько разъ въ день повторять, и такъ долго покуда болячки не засохнутъ, и никакая мокрота изъ путей слезныхъ, хоть бы перстомъ подавилъ не поидетъ.

§. 968.

Сей лѣченія способъ, отъ многихъ презираемый; въ сихъ случаяхъ опробовать должно, ибо въ немъ рѣдко и развѣ только неискусные или мало въ дѣлѣ своемъ упражнявшіеся, обманываться могутъ. И
боль

боль не великую причиняетъ , ежели съ благораз-
смотрѣніемъ и съ прилѣжноспію надлежащею спичка
опускаема будетъ , чтобъ ею пушей по копорымъ
опускается не оцарапать. А ежели иногда дѣло и не
такъ благополучно дѣлается , что у людей носъ
поклопой и весьма плоской имѣющихъ обыкновенно
случается , однако бѣдствія ни какого опасаться
ошного не должно. Но сего лѣченія опытовъ дѣ-
лать не надлежитъ у человека немощнаго и уко-
порога худое пѣлесное сложеніе , и доколь глазная
боль [офтальміа] сапъ [озена] , или другая болѣзнь
отъ которой сей вредъ родился , со всѣмъ не будетъ
излѣчена. За презлишнѣе я поспавляю шупъ при-
совокупить то , будно къ сему нужное , что пищу
и пишіе употреблать порядочно , умѣренню , и въ
которомъ ни чего бы остраго не было.

§. 969.

Но гдѣ слезное пріятелище не проходно съ на-
ружи опухолью подымается , тамъ другимъ способомъ
лѣчить надобно. А что мѣшокъ слезный распухъ
и не одна кожа , оное по неложнымъ примѣтамъ
узнать можемъ. Ибо опухоль по большей части безъ
вожженія бываетъ , оная опухоль какъ перспомъ по-
давши , опадаетъ , и немножко слезы съ флегмою
смѣшанной изъ точекъ слезныхъ выходитъ ; но въ
короткое время опухоль опять подымается. Нѣко-
торые сей родъ болѣзни килою , водяною болѣзною
мѣшка слезнаго называютъ , ежели на пупи въ ноздрю
проходящемъ , нѣчто препятствовать будетъ , и отъ
того и отъ скопленія мокроты пріятелище слезное
раздуются (*). Ежели такая опухоль будетъ съ вож-
женіемъ и къ загноенію клониться будетъ αυχίλωψ

В в в 2

назы-

называется , но такая опухоль обыкновенно жестка бываетъ , и отъ перся давящаго не подается. Случиться также можетъ что въ кожѣ надъ мѣшкомъ слезнымъ пухлякъ заѣлается , которая получивъ вожженіе и напнявъ кожу , оный сильно давитъ , такъ что поутѣсенному пути слезы течь не могутъ.

(*) Смотри. АНЕЛ. де л' гидропизі дю кондюитъ лакрималь.

§. 970.

А что , и прѣтелище слезное не засорилось проходъ имѣетъ , хоть оно и распухнетъ , знать можно , ежели слезимъ ничто не мѣшаетъ въ ноздрю протекать. Тожъ самое и спичкою можно узнать , ежели ни вочто она не будетъ опираться , когда всавывается. И потому знать можно , что плены онаго прѣтелища , или мѣшечка отъ удара наружнаго или отъ другой какой нибудь причины , заѣлались слабы. Въ такомъ случаѣ очень прилѣжно разсматривать должно самую опухоль , цѣлала она и съ кожей сходна , или испорчена , и жестка заѣлалась. Ежели не будетъ кромѣ того ничего попорченнаго имѣть , отъ оной иногда можно избавиться однимъ придавленіемъ. На такую опухоль бумага разжеванная сбрая , а на нее толстыя и многія суконки накладываются сверхъ же того кладется обвязка , или орудіе къ тому выдуманное (*); это все чрезъ нѣсколько дней на ней оставлено быть должно. Но въ такой поступкѣ умѣренность знать надобно , чтобъ излишнимъ давленіемъ вовсе слезъ не останоить , и не причинить бы худшаго зла , когда плевы одна съ другою сроснутся , и заслѣпяся пути по которымъ слезы напередъ того хаживали. При всемъ томъ

шоп-

потчасъ сприцовать насосомъ въ пути сіи : аква веронице вербене , гиссопи , и инными , которыя по нѣскольку вякутъ.

(*) смотри диссертацию мою о фистулѣ слезной фиг. 3.

§. 971.

Ежели же мало успѣху такимъ образомъ здѣлается , то опухоль въ прямъ , но немножко , разрѣзать надлежитъ. Оное свободно здѣлать можно по всунутой въ точку слезную спичкѣ маленькой (965) и ножичкомъ маленькимъ серповиднымъ ; а припомъ въ то время какъ ножечкомъ рѣзать начинается , надъ опухолью на вѣрка положишь можно перстѣ руки лѣвой , чтобъ мокрота не поворожилась , и вся въ глазѣ не вытекла , и чрезъ то опухоль не опала. Рану прикладывая удобныя къ тому лѣкарства заживляють такъ , чтобъ плены отъ онаго спрупа сволоклись , и пріятелище ссѣлось. Однакожъ стараться надлежитъ , чтобъ оный протокъ очень тѣснѣ не здѣлался , и чтобъ слезное теченіе чрезъ то не пресѣклось. Наипаче тутъ пособствуетъ спичка , которая потчасъ тутъ всавывается , и обвязка , или оная машина , къ писанію мѣшечка изобрѣтенная (970) , снаружи накладываемая.

§. 972.

Не другимъ какимъ способомъ лѣчить , и то когда слезное пріятелище дикимъ мясомъ , или мясцомъ заростетъ , (960) или , когда что нибудь другое заляжетъ , и будетъ препятствовать спичкѣ , туда пройти. Ибо и въ такомъ случаѣ мѣшечекъ прорѣзывать должно , и спичку прорѣзанною раню въ проходъ оный , который изъ мѣшечка въ ноздрю

В в в 3

про-

проходишь , воспалявать. А когда мясик испразднен и свѣдены будутъ , тогда рана залѣчивается.

§. 973.

Но ежели уже слезные пути избѣдены , то въ ближнихъ частяхъ болячка , а по приключеніи мозольности , подлинная фистула дѣлается. Да и фистулы сѣя многіе виды имѣются. Ибо иногда болячка подъ кожу еще цѣлою бываетъ , иногда оную въ уголкѣ открытую глазами видѣть можно , и сей послѣдній родъ *αγγίλωψ* собственно называется. Иногда другое , а особливо въ костяхъ поврежденіе , то есть гниль , случается. Толькожъ по количеству и качеству , оной мокроты , которая сама выходитъ , и перстомъ выдавливается , и по опущенной , Анелловой сичкѣ , или въ природныя оныя сихъ путей устья , или въ отворенную болячку , узнать можно , какъ широко распространяется болячка , заѣдалась ли уже въ ней мозольность или нѣтъ , а припомъ кость въ низу находящаяся по свѣденіи плевы накосной испортилась ли.

§. 974.

Подлинной же Фистулѣ слезной пособить не возможно , ежели не употребивъ въ ней труднаго онаго дѣла и сомнительнаго лѣченія , чрезъ которое прятельще слезное вынуть , болячку очистить , и проколовъ и сохранивъ новый въ ноздрю проходъ , слезы въ него провесить надлежитъ. Но сіе лѣченіе ни молодому , ни старому , и никакому человеку , который боленъ и худого сложенія не годится да и отвѣдывать покушаться не должно , ежели больной застарѣлую , сильную , и ежели острую и почти не-
пре-

престанную въ головѣ боль, имѣетъ, и ежели глазъ гноемъ заплываетъ. А припомъ у всякаго человѣка къ дѣланію такой операціи спѣшитъ отважное дѣло кажется, ибо конечно не рѣдко она обманываетъ, и послѣ того дѣйствія у нѣкоторыхъ изъ глазъ слеза всегда бѣетъ. А что передъ дѣйствіемъ онымъ, за нѣсколько дней больного кушаньемъ, кровопусканіемъ, и слабительными пригошовить должно, изъ вышереченныхъ разумѣть можно. Въ прочемъ же все то тутъ надобно, что сильно раненымъ принадлежитъ (389, 390, 399, до 402).

§. 975.

Лѣченіе такимъ образомъ производить: суконку обмоча въ ликворъ выде отъ меня показанный (292), положить на оба глаза, и обвязкою обвязать. Человѣка посадить въ свѣшломъ мѣстѣ, пропивъ свѣта, такъ чтобъ дѣйство дѣлающій медикъ пропивъ больного нѣсколько выше сидѣлъ. Съзади пособнику сильному руками велѣть голову держать, чтобъ она не шаталась. Кожу рѣзать на луну серповидную похоже, чтобъ рога къ глазу торчали. Начинается рѣзаніе у кореня носоваго надъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ сухая жила мышки круговой къ кости, а особливо къ тому отростку, который отъ кости челюстной къ бокамъ носовымъ идетъ, приростаетъ, оканчиваетсяъ разрѣзъ на половинѣ вѣка нижняго. Кожу лучше рѣзать, какъ ее перстами другой руки натянешъ и выпялешь. Но какъ возможно стараться должно, чтобъ часть нѣкоторая кожи, въ уголѣ, гдѣ вѣка одно съ другимъ сходятся, цѣла осталась. Ибо ежели оную перерѣжешь, прижжешь, или лѣкарствами справишь, дѣ-

дѣлается *ἐκ τῶ πινυ* (582), чего ни чѣмъ вылѣчить не возможно. Этой ошибки опасаться не должно, ежели сухую жилу мышки круговой перерѣжешь. Не надобно повредить жилы кровесовращательной, въ углу внутреннемъ глазномъ у корня носоваго идущей. Ежели же се повредишь, или паче чаянїя изъ раны много крови печь будешь, то дѣйство свободно остановить можно, и кровь, приложя пряжу и обвязку остановить.

(*) Смотри. ВИНЗЛОВЪ о жилахъ кровесовращательныхъ §. 88.

§. 976.

Когда же кровь остановится, все прїятелище слезное разрѣзать, и сколько возможно вснѣ вырѣзать. Ибо, ежели поврежденное тушъ оспанется, то случится можетъ, что мокрота послѣ лѣченїя въ него будетъ скапливаться, въ немъ будетъ стоять, и испортившись, около лежащаго мѣста, опять будетъ свѣдать и болячки дѣлать. Счень хорошо ежели вовремя вырѣзыванїя его, спичка Анеллова въ точки слезныя вставится такъ, чтобъ ея кончикъ въ рану вышелъ. А прїтомъ слезное прїятелище, лапиде infernali, выправлено быть можетъ, однако смотрѣть надлежитъ, чтобъ другихъ частей, а особливо самаго глаза онымъ не повредить и оныхъ проходовъ ушнїца заживляючи не затворить.

§. 977.

На послѣдокъ раздвинувши кожу, а прїтомъ и плеву оную, которою кость покрывается, кость ногтевую, въ томъ мѣстѣ, гдѣ я сказахъ, мѣшечекъ слезный лежитъ (958), проколотъ надлежитъ, и пушъ слезамъ дѣлать, по которому бы въ ноздрю протекать могли. Всякимъ орудїемъ или желѣзомъ,

ко-

конецъ умѣренно толстенькой наподобіе свай заво-
стренный имѣющимъ, кость прокалывать можно. Спо-
способенъ къ тому буравокъ, которымъ другія кости
обыкновенно просвердливаетъ (592, 2), также спичка
завостренный жолобокъ имѣющая (953). Орудіями,
нѣсколько толстыми, и не острыми, и другими отъ
нѣкоторыхъ похваляемыми, ежели кость будетъ про-
калывана, то она, понеже тонка и рѣдка, вся раз-
ламывается, такъ, что и плева, копорою ноздри
изнутри прикрываются, очень раздрается. Опасатьсяжъ
должно, чтобъ въ сихъ мѣстахъ, а особливо въ ямѣ
глазной, которая великимъ жиромъ изнаполнена, ве-
ликое вожженіе не дѣлалось. Ибо какъ много гною
дѣлается, то мокрота внутрь ямы глазной оседаетъ,
въ жиру далѣ проникаетъ и въ близи лежащая части
еще здоровыя избывая пазушитъ, что иногда и глазъ
лопается. И для того не надобно употреблять
оныхъ орудій туповатыхъ, и вновь описанныхъ, ко-
торыми вся кость ногомная не такъ прокалывается,
какъ въ ширину разламывается (*).

(*) Между сими то есть, что въ Дисс. о фистулѣ слезной
иногда я нарисовалъ вѣлѣбъ фиг. 6. Также клѣщики кривыя ЛА-
ЖОРИЕРОВЫ см. въ I. К. А. Наукъ 1729 году стр. 590.

§. 978.

А въ прочемъ когда орудіе въ дѣйствиіи будетъ
находится, поварачивать его должно чтобъ оно спе-
реди къ отростку кости челюстной, съ боку у носа
идущему, и чтобъ позади кости слезной къ части
ровной кости рѣшетчатой не прошло. А при-
томъ орудіе такъ клонить должно, чтобъ оно
наискось внизъ и къ зади внутрь шло, ибо опасаться
надобно чтобъ имъ перегородки носовой и костей въ
Г Г Г носу

носу находящихся губковатыхъ, какъ верхнихъ, такъ нижнихъ не повредишь. Ежели орудіе въ прямъ на низъ пустишь, онымъ въ пазуху челюстную попасть можешь (*). А что кость прокололась, поному узнать можно, что нѣсколько крови изъ ноздри потечетъ.

(*) Смотри. что мужъ весьма ученый АЛЕКСАНДРЪ МОНРО представилъ и фигуру представивши изъяснилъ въ те медикал. Эссейсхъ Кн. 3 Примѣч. 15 стр. 293. Онъ еще думаетъ что кожу не надлежитъ такъ широко разбѣзывать, но потчасъ ее съ костью поднею лежащею онымъ инструментомъ прокалывать велитъ, или гораздо не большой разбѣзъ дѣлавши. Онъ также замѣлившее признаетъ кость сперва снимаючи съ нее перенюку на костную обнажать. Но я признаю что кожу нѣсколько пошире разбѣзывать конечно надобно, ибо рана по долъ быть можетъ, и что въ маленькую рану лучше все можно видѣть. А при томъ послѣ раздранія плесы на костной, опасаться надобно, чтобъ отъ того великое поврежденіе не произошло.

§. 979.

Проколовши кость, шпиринки колющія всѣхъ которыхъ отъ кости отдѣлились, потчасъ вынуть должно, и рану пряжею и губкою вычистить. А при томъ, когда въ ноздрю проходъ такъ дѣлается, смотрѣть надобно, чтобъ оный такъ и осипался, который мясомъ и мозолью вырастающею, ежели не будучи припискиваны въ скоромъ времени обыкновенно зарастаетъ. Въ семъ же лѣченіи какъ я вижу Медики по разнымъ дорогамъ разбрелись. Одни маленькую трубочку золотую или свинцовую, въ диру оную вставляющыи, чтобъ она на кости оперлась. Смотрѣть же надлежитъ, чтобъ она, будучи тутъ осипавливаясь, не препятствовала ранѣ заживать, и для того она быть должна не жесткая, и не очень вонъ высунувшись. Другіе чрезъ все то время кнотъ, свѣчку вошпаную, или что почи за наилучшее по-

чи.

чищается, деревянную чурочку, на подобіе кегля, съ одного конца полстенькую, съ другаго очень тонкую, въ рану вставляють, и такъ долго въ ней держатъ, покуда въ кости края дирочкины кругомъ не окрѣпнутъ. А между тѣмъ болячку вычищать должно, и пазухи, ежели онѣ на многія части раздѣлились, поразрѣзывать и также вычистить надобно. Ежели свинцовая, или золотая трубочка въ диру вставлена бываетъ, то болячка очищенная по ней скорѣе залѣчивается. Однакожъ крайнее стараніе употреблять, чпобъ скрозь отворенныя оныя пути слезы въ сію трубочку пропскали, для того почаще спичкою просавывать. А гдѣ чурочку деревянную, или свѣчку воцаную лѣкари употребляютъ, тамъ рану до тѣхъ поръ отворенную хранить должно, пока края у дирочки совсѣмъ не заживутъ. Ежели въ глазу вожденіе появилося, должно употреблять припарки (292) и всѣ то, что опъ вожденія наибольшіе пособствовашь можетъ. Чпю же къ кости обнаженной воздухъ и лѣкарства жирныя и мокрыя не годны и вредительны, опомъ ниже сказано будетъ. Тутъ крайне надобно употреблять маленькія спички (964, 965), чпобъ глазъ опъ непрестаннаго слезъ теченія не испортился, когда заслонялся оныя пути, которыми слезы текали, что ежели случится, тому никакъ пособить будетъ не лзя.

§. 980.

Такимъ же способомъ лѣчить надобно и Эгглопсъ, гдѣ фистула въ купкѣ открывая бываетъ. Прорѣзавши кожу, рану въ самое устье фистульное вѣлать должно, а припомъ и мозольность разрѣзать.

Г г г 2

§. 981.

§. 981.

Ежели же тушѣ найдется кость съ червоточиною , ибо порокъ сей или отъ самой кости начинается (961) , или , что плева коюрою кость прикрывается отъ худой болячки будетъ изѣдена , таковой случай гораздо пруденѣ . Оное знать можемъ , ежели изъ болячки вонючей полугной будетъ выходить , и ежели хоть оною маленькою спичкою въ точку слезную , или большею , въ открытую фистулу опустивъ , кость ощупается не гладкая и шероховатая , и ежели спичка съ мѣся , на которое попадетъ , не свернется , и на ней черноватость усмотрится .

§. 982.

Разумѣть припомѣ можно ; сколь много въ томъ надежды , или опасности , и по соку отъ шуду вытекающему , и по самому фистулы началу , причинѣ , величинѣ и застарѣлости . Ибо ежели порокъ въ уголку будетъ , оный лѣчить можно . Ежели же порокъ широко и глубоко разошелся , и гниль не только на кости слезной дѣлается , но и другихъ , близъ лежащихъ а особливо часточки кости рѣшетоподобной въ ямѣ глазной находящейся , коснется или въ ячейки ся придетъ , оное лѣчить весьма трудно , и побольшой части никакъ не возможно . Сверхъ того , ежели въ пѣлѣ испорченомъ сей порокъ ракомъ опухновеннымъ дѣлается , что жилы кровевозвращательныя напрягнутся , кожа жосипка , да и на отъ маленькаго прикосновенія саднѣетъ , оный лѣчить опасно , ибо отъ шого смерть по скорѣе воспослѣдуетъ .

§. 983.

§. 983.

Кость должно отъ всякой порчи очистить (899). Того ради мясо подрѣзать и косиь обножить должно, чинобъ все поврежденное глазами видѣть было можно. А червоточина и скореняется, когда кость, или скребелочкою, или лѣкарствами, оскоблишъ, или оню бурвчиномъ просвердлишъ, или прижжешъ. Ибо сими всѣмъ поврежденное или искореняется, или изсушается, такъ, чю высохши отъ того, что еще цѣло, будпобы чешуйка или скорлупка, отдѣляется. Ежели порокъ не глубоко еще прошелъ, оный не рѣдко такъ вылѣченъ бываешъ, когда кость такимъ способомъ какъ я выше сказалъ (515) просвердлился. Ибо отъ нее и чрезъ приложеніе лѣкарствъ чешуйка отлупляется. Безопаснѣе бо такимъ образомъ въ лѣченіи поступать, нежели прижигать. Ибо гдѣ каленымъ желѣзомъ кость прижигается, то опасаться надобно, чтобъ съ нею и путей слезныхъ не повредишь, а ежели прижгущся, запрутся.

§. 984.

Прижигать же надобно болячку, въ которой чернота и червоточину, которая по всей кости разошлась, и ежели много вонючаго полугноя изъ болячки течетъ. Когдажъ кто вознамѣрится сіе дѣйствительное лѣченіе испытать, неопмѣнно при себѣ имѣть долженъ 1) бляшку серебряную изнутри выгнутую, копорюю свободно глазъ закрывается (*), чтобъ огонь его не повредишь, 2) спичку коротенькую ровную, 3) желѣзо вороночкою здѣланное (**), и въ которое свободно вложиться можетъ, 4) другое желѣзо, которое разкаленное скрозь оное опускается (***). Си

Г Г Г 3

два

два инструмента, да и въ суденышкѣ холодной воды подъ руками быть должны.

(*) Смотри. въ Диссерт. моей "фиг. 10 и другой ея манѣръ у ГАРЕНЖОТА десть инструм. Т. 2 стр. 11 фиг. 1.

(**) въ Дисс. фиг. 11 у ГАРЕНЖОТА фиг. 3.

(***) въ Дисс. фиг. 12. у ГАРЕНЖОТА тамже стр. 28 фиг. 1.

§. 985.

А способъ лѣченія такимъ образомъ происходитъ: Глазъ здоровый завязываютъ, но какъ на пюпѣ такъ и на другой глазъ сперва кладутъ суконку обмоченную и выкашуютъ въ лѣкарствѣ, которое удерживать вожженіе, силу имѣетъ, и наибольше отъ вожженія поспособствуетъ (292). Глазъ который лѣчить надобно, сослуживель бляшкою оною выгнутою (984, 1) закрываютъ наложивъ на другую мокрую суконку. Въ устьѣ фистульное, или и въ рану ножечкомъ разрѣзанную, на кость гнилую ставится спичка (984, 2) будто бы дорогу показываючи, и сверхъ нея оной инструментомъ, который я вороночкою называлъ (984, 3). Сія на кости оспанавливается, и сквозь нее просавывается другой раскаленный инструментомъ (984, 4), который сначала самого нѣсколько высавывается. И такъ онымъ кость нѣсколько подолъ прижигается безперерывно разъ за разомъ, для чего сіи два инструмента подъ руками быть должны, чтобъ какъ одинъ остынетъ, другой раскаленный на то мѣсто поставить было можно. Когдажъ желѣзо вынимается, то надобно и вороночку вонъ вынимать, а чтобъ она не разгорячалась, потчасъ въ воду холодную опускать должно. Конецъ прижиганія бываетъ тогда, когда желѣзо сквозь кость пройдетъ и пройдетъ въ ноздри отворитъ, а то узнать можно, если зажавши

жавши ноздри и ротъ, духъ скрозъ рану пойдетъ. Прижигать же кость должно весьма осторожно, чпобъ носовой перегородки, и другихъ костей близъ лежащихъ не повредить (978). Кость такъ прижженная суха дѣлается, и ошъ нее то, что повредилось, оплупливается. Ежели же не все попорченное отдѣлился, то кость или скрестъ должно, или лѣкарствами отъ червотчины пособствующими, присыпать, или ояшь прижигать, доколѣ неисцѣлѣетъ остальное.

§. 986.

Когда все поврежденное отъ кости цѣлой отдѣлится, мясо наростаеъ и пазушку наполняетъ. И шунъ способомъ который я выше представилъ (979), проходъ сохранить должно для слезъ, чпобъ онѣ какъ помаленькимъ въ вѣкахъ учрежденнымъ дорожкамъ, такъ дирочкою въ кости оставленную, въ ноздрю проходить могли. Топчасъ внутрь въ ноздри пускатъ должно лѣкарства, къ лѣченію костей способныя. О всѣхъ сихъ, дошедъ до болѣзней, которыми кости спраждутъ, скажу.

§. 987.

А припомъ особеннаго пребуютъ благоразсужденія, оныя частопомянутыхъ путей сихъ верхнія устьяца въ вѣкахъ находящіяся, о которыхъ я выше объявилъ (959). Оныя кажется имѣють хрящевое маленькое колѣчко, отъ котораго дѣлается, чпобъ они за- всегда отверсты были и влагу въ себя принимали. А понеже и сіи устьяца прикрываются тоненькою пленю, оная иногда, ежели ни мало влаги въ проходы сіи прошекашъ не будетъ, засыхаетъ, и устьяца заслѣ-
пая-

пляются. Это часто случается у спеколниковъ, которые стекло при огнѣ духомъ разными фигурами дѣлаютъ, и у другихъ, которые разныя руды въ сильномъ огнѣ жгутъ и плавятъ. Ибо отъ огня вся влага скрозь протоки сіи обыкновенно текущая разливается такъ, что опасаться должно, ежели запрутся устья онаия, не спали бы глаза во весь вѣкъ человѣческой мочушъ. Однакожъ въ книгахъ мы начинали, что и сей порокъ, какъ лечитъ, найденъ (*). Разрѣзать должно снаружи слезное прѣстелище, или мѣшечекъ, въ него опустить сперва тоненькую спичку шупую и на концѣ головку имѣющую, а послѣ другую спичку оспроконечную. Оную посовывать должно къ верху и къ эшимъ устьицамъ, покуда она въ сіи устья не выйдетъ. Путь сей, ежели совершенно по прежнему отворенъ будетъ, часто просавывая первую спичку въ него, отворенный сохранить должно. Смотрѣть надобно, можноль будетъ по опытамъ дѣлать, что думать можно.

(*) Смотр. у МОНРО въ показ. мѣст.



ФИСТУЛА ЗАДНЕПРОХОДНАЯ.

ФИСТУЛА НИ.

§. 988.

Около задняго прохода дѣлаются чирьи безверхушешныя, болячки, и сверхъ того подлинныя и мольность имѣющія фистулы, которые пороки всѣ отъ многихъ Авторовъ подъ общимъ именемъ фистулы заднепроходной заключаются. Но оныя и родомъ, и способомъ леченія, между собою разнствуютъ (54, 892, 942).

§. 989.

§. 989.

Кишка заднепроходная или оходникъ , въ самый низъ опустившись , кончится афедромъ , который мышки имѣетъ сжимательную (*) и облегчательную , и оныхъ дѣйствіемъ калъ изъ кушанья вываренный какъ чрезъ сжатіе , такъ чрезъ расслабленіе кишекъ до сего мѣста протгнанный держится и по времени вонъ испражняется ; сжимательной мышки задняя сторона къ кости хвостцу , или близко , или на срединѣ съ связкою отъ кости сей производящею и въ жиру оканчивающеюся , соединяется (**). Передняя сторона у мушины , съ мышками попершными дѣло-родоудными , къ сухой жилѣ ихъ на срединѣ , а при томъ и къ мышкамъ ускорительнымъ ; у женщины съ устьемъ влагалищнымъ и съ мышками сжимательными срамноудными совокупляется (***) . Облегчательная мышка отъ нижней подчеревошной части отъ костей гребенныхъ и сѣдалищныхъ наченшись и широко разширившись съ кишкою заднепроходною срастается (****) . Не набюжь и того пропустишь , что сія кишка между своими плевами , особливо промежъ наружною и мясною много жиру имѣетъ , на ней же и снаружи жиру много бываетъ , отъ котораго мягче и порядочнѣе въ кишкѣ испражненіе дѣлается , что оная свободно разшириваться можетъ . Сіе у пѣхъ чаще случается , которые мало поила употребляючи , и отъ другихъ причинъ чрезъ нѣсколько дней на низъ не имѣютъ , что кишка каломъ набивая временемъ великимъ кузовомъ , и будто бы мѣшкомъ , показывается . Къ тому принадлежатъ жилы бѣющіяся , которыя двоякого рода бываютъ . Ибо однѣ производятъ изъ брыжешной нижней , † а другія изъ подбрюшныхъ †† .

А а а

Жилы

Жилы кровевозвращательныя , которыя идутъ къ подбрюшнымъ †††, нѣ называются наружными , а которыя къ брыжейшной нижней , пѣ называются внутренними ††††. Первѣйшими кровь рѣ жилу кровевозвращательную дупляспую , а послѣдними въ жилу кровевозвращательную воронную , печетъ. А при томъ въ прямой кишкѣ ложжинки нѣкоторыя находятся , изъ которыхъ жирная влага истекаетъ , каторою , будто бы саломъ , кишка изнутри помазывается †††††.

(*) Ся у ВИНЗЛОВА въ Экспоз. въ Т. 4 въ Ч. 1 §. 179. 180. 185 до 188 на три у АЛБИНА въ Истор. о мышкахъ въ Кн. 3 въ Глав. 91 и 97 на двѣ раздѣляется , сличн фигуры въ САНТОРИНОВЫХЪ Примѣч. Анаст. Таб. 2 ф. г. таб. 3 фиг. 5 и КОВПЕРОВУ мѣшом. Таб. 19.

(**) См. у САНТОРИН. тамже Т. 3 фиг. 5 О. слич. ВИНЗЛОВА тамже. 182.

(***) См. у САНТОРИН. ту же фиг. R. S.

(****) Смотр. фигуру ЕВСТАХІЕВУ таб. 37 КОВПЕРОВУ тамже.

† Смотр. у ВИНЗЛОВА въ Экспоз. Т. 3 §. 213.

†† Онѣ также двоякаго рода имѣются. Однѣ выходятъ изъ бѣдалицной , см. у ВИНЗЛОВА тамже §. 243, а другіе изъ срамной §. 247.

††† Тамже о жилахъ кровевозвращательныхъ §. 183.

†††† Тамже §. 262 и далѣе.

††††† Смотр. у МОРГАГНА въ Прот. 2 Примѣч. 6 стр. ко на Таб. фиг. 3.

§. 990.

А понеже у человѣка кровь сѣ трудностью жилами кровевозвращательными по кишкѣ въ низъ опущенной въ верхъ подыматься можетъ , по случается , что часто концы жилъ кровевозвращательныхъ напрягаются , и кровь изъ себя выпускаютъ. Которое

рое печеніе иногда очищеніемъ бываетъ , ибо онымъ временемъ тяжкихъ болѣзней избавляемся , а иногда болѣзнью дѣлается. Это же самое дѣло , и понеже крововозвращательныя жилы каломъ , ежели его въ кишкѣ заднепроходной будетъ много да и жоспюкѣ , давятся , случай даетъ къ воуженію. И пакѣ дѣлаются , маленькіе чирышки безверхушешныя , на вереды (102) схожіе. Изъ оныхъ ежели топчасѣ гной невыпустится , оный флокъ бываетъ , жирѣ сбѣдаетъ и чирышки безверхушешныя , въ болячки , а болячки въ фистулы , превращаетъ.

§. 991.

Въ гной произведеніе , сіе отъ различныхъ способовъ дѣлается. Оное дѣлается , когда лѣкарствами какъ снаружи прикладываемыми , такъ внутрь принимаемыми успѣя почечуйныхъ жилъ кровоточныхъ безвременно сжаты будутъ , ежели у чловѣка въ тѣлѣ кровь худая будетъ , прегустая и цвѣтомъ черная , какая обыкновенно бываетъ у больныхъ ипохондрическою и истерическою болѣзнью и цынгою страждущихъ , и у всѣхъ шѣхъ , которые мало пьютъ и мало въ движеніи упражняются. Къ гнойности сей и тѣ склонны бываютъ , у которыхъ соки прелюбодѣйною болѣзнью испорчены , пьяницы , которые за частую виномъ , а наипаче молодымъ , упиваются , у которыхъ испражненіе на низѣ густое дѣлается , и чрезъ нѣсколько дней не бываетъ , также и тѣ которые проносныя часто принимаютъ изъ сабура , [алое] чемерицы [еллеборо] райскаго яблока [колоцинпиде] составленныя. Оное также случается послѣ сильнаго жалѣнья ; когда при такомъ женщина

Д Д Д 2

мла-

младенца рождаеѣ , или съ шиковымъ обоого пола люди на низѣ испражняются , также когда оныя мѣста снаружи крѣпко придавливаются . Для чего такіе пороки получаюѣ предѣ прошчими шѣ , которые верхомъ на конѣ , или въ коляскѣ бѣдячи , много прысупся . Иногда сія болѣзнь и онѣ гонореи зловердной оспаеѣся , ежели худой маперіи пещеніе вяззиселными и изѣ горячаго балсама соспавленными лѣкарствами удерживаеѣся , и послѣ въ мѣсто между проходное и въ кишку склоняеѣся .

(*) Фистулу , которая онѣ косточки проглоченой и въ кишку заднепроходную прошедшей , здѣлавшуюся , описываетъ ЛЕ ДРАНЪ въ Т. 2 примѣч. 86. Я нѣкогда въ фистулѣ заднепроходной нашолѣ маленькой и кругленикой камушекъ очень крѣпкой . Онѣ не подалеку въ кишкѣ прямой здѣлалѣ себѣ пазушку жоспкою мозолистею окруженную . За д стовѣрное мнѣ показалосѣ , что онѣ здѣлался изѣ возгрей , которыми естественно кишки помазываются . Онѣ можетѣ быти въ лѣкошорой пазушкѣ , или луночкѣ въ жоспкости пришолѣ .

§. 997.

Когда же въ эпѣхѣ мѣспахѣ мокрота въ глубинѣ соберетсѣ , и въ гной претворитсѣ , оное по неложнымъ примѣпамъ узнать можно . Болѣ обыкновенно бываеѣ острая , тяжкая , и большая , нежели величина опухоли , подобна той , какая дѣлаеѣся въ версдахѣ , когда они въ гной приходятѣ , какѣ я выше сказаѣ (103). Снаружи кожа немножко рѣветѣ , а припомѣ маленько и горитѣ . Приходитѣ же и горячка съ жаждою и бессонницею . Въ глубинѣ въ жиру обыкновенно дѣлаеѣся бугорокѣ , который чуть перстомъ оцупать можно . Ибо иногда , ежели гной глубоко пойдетѣ , то ничего этого на кожѣ примѣнить не можно . Сія шишечка наибольше онѣ кишки не подалеку бываеѣ , и она перстомъ вся закрываеѣся ,
когда

когда масломъ ее помазавъ въ брюхо вправляющъ ; но ипо безъ великой боли челоуѣку зѣлано быть не можеть. Послѣ того , какъ гной созрѣетъ , то онъ чаще въ кишку прорывается , и съ великою вонью афедрономъ вытекаетъ , а болящая тотчасъ отъ оной претяжкой боли освобождается. Ежели же глубоко гной запрячется , и оной не прорвется , то возжигеніе поутихнетъ , а гной останется , который острѣе зѣлавшись , жиръ пробѣдетъ. Того ради дѣлается болячка , которая на многія пазухи раздѣляется и сверхъ того мозольностью наводитися.

§. 993.

А чпобъ гной кишки не прорвалъ , надобно поспѣшить , и опухоль хотя не зрѣлую отворить. Ибо въ такомъ случаѣ , и хотя гной глубоко опускается , не должно дожидаться зрѣлости , и сверху долго припарокъ густыхъ не употреблять , чпобъ чирей безверхушешный самъ собою открылся ; но хотя не созрѣлъ онъ покажется , не дозрѣлый въ глубину разрѣзать должно и гной вонъ выпустить (смотри. 96).

§. 994.

Для того болящаго напостелѣ положить должно такъ , чпобъ скорчивши колѣна , на самомъ брюхѣ съ боку прилечь , и чпобъ выпятивши жопу , больное мѣсто видно лѣкарю зѣбалось. Ибо такое положеніе во всѣхъ лѣченіяхъ сихъ , которыя въ болѣзняхъ заднепроходныхъ употребляются , способнѣйшее , нежели , чпобъ больной накомѣ , поперегъ кровати , тузю поднявши а голову внизъ спустивши лежалъ. Ибо , ежели первымъ способомъ положишься , мышки всѣ въ покоѣ находящія (945) , а припомъ ежели

А А А З

по

по случаю изъ перерѣзаной жилы бьющейся, кровь бѣдственна будетъ печь, то не надобно будетъ больного иначе перекладывать, но топчасъ можно употребить вспоможеніе, такое, которое опиъ кроветеченія наипаче пособствуетъ, (407 до 417) Ягодицы же служитель положа руки на нихъ, разведетъ, ножечкѣ обоюдный глубоко въ опухоль лѣкаръ опуститъ. А понеже она еще несозрѣлая разрѣзывается, то по большой части изъ нее много крови и немножко гною выпекаетъ (96) и ножечка топчасъ не вынимать, но рану поширѣ, на три или больше линіи разрѣзать, чѣтѣбъ самое дно оказалось. А чѣтѣбъ края вскорѣ опять не сошлись, надобно самую глубину пазухину пряжею и придавками, подушечками или кнопами, (20) одинъ на другой наклавши, да и оными сухими наполнить, коими еще и кровь останавливается. Рану очистить должно, потомъ исполнить, чѣтѣ всѣхъ изъ преждедеченныхъ видѣтъ можеть.

§. 995.

Ежели же кровь бѣдственна будетъ печь, употребить должно вспомошествованія тѣ, о которыхъ выше я представилъ (406 до 418). А понеже обвязкою эпи мѣста обвязывать пакъ не можно, чѣтѣбъ она съ довольною крѣпостью держать могла, часто при-нуждены бываемъ слугѣ приказывать пряжу и суконки на рану плотно наклавши, рукою безперерывно къ ранѣ припискивать,

§. 996.

Обвязка къ симъ порокамъ, какіе въ гузи или въ афедронѣ бывають, такая способна: въ самомъ низу по брюху крѣпко повязать должно широкой хол-
сти-

спинной поясѣ, къ нему пришить надобно длинненькую и широковапую пѣсму; которая отъ середины даже до задняго конца будучи не разрѣзана, подочпо тузюно ляжетъ, пѣсмѣ будпо бы суконкою чепыреугольною, оное покроспѣ. А съ низу пѣсма на двое разрѣзана, которые концы промежъ ногами напередъ къ брѹху проводятся, до помянутаго пояса и къ нему пришиваются. Чпо же оспальное у пѣсмы оспанетъ, оное по спинѣ пропшагаяся у большаго около головы обвертывается, а оспальные концы по прежнему съ переди къ поясу пришиваются. Нѣкоторыя пѣсму раздѣляющъ, чпобѣ одна была, которая въ пахахъ проходила, а другая черезъ плеча переходила.

§. 997.

Временемъ изъ такихъ чирьевъ безверхушешныхъ, ежели они не пошчасъ, какъ оказываются и не созрѣлые разрѣзываются, и мокрота, внутри собравшаяся, вонъ выпускается, болячки дѣлаются; а изъ сихъ, ежели ожестѣютъ, фистулы (99). Такихъ фистулъ три рода 1). Нѣкоторыя однѣмъ устьемъ въ кожѣ наченшяся не повредивъ еще кишки въ жиру останавливаются 2). Другія не къ кожѣ, но къ кишкѣ склоняющяся, и въ ней видимы бываютъ 3). Третий снаружи отъ кожи начинающяся и къ кишкѣ проходятъ. Не только же въ родахъ различіе есть, но и въ другихъ нѣкоторыхъ приключеніяхъ, какъ то говоря офиспулахъ въ другихъ мѣстахъ бывающихъ, я все сіе изобразилъ (944).

§. 998.

Познавать перваго рода фистулы скоро можно. А чпобѣ лѣкаръ совершенно зналъ, что кишка не повре-

600 ФИСТУЛА ЗАДНЕПРОХОДНАЯ.

вредна , въ скважинку спичку , въ задній проходъ перстѣ , въ масло сперва обмочивши ; а при томѣ обрѣзавши хорошенько ногти , всунуть долженъ , дабы чрезъ то знать могъ , куда фистула поидетъ , и какъ глубоко пройдетъ . Иногда надобно бываетъ пазуху поразширить , а то можно дѣлать или вновь разрѣзывать , или кладучи въ нее оный родъ кноповъ , которые изъ губки воскомъ напоенной , изъ рѣпы высушенной , и другихъ такихъ вещей мокроту изъ болячки выпивающихъ , дѣлаются (20).

§. 999.

А что болячка или фистула , внутрь кишки прошла , на то другіе знаки имѣются . Если болящій въ томъ мѣстѣ сильную боль съ другими вожженія знаками чувствовалъ , а боль незапно пропадетъ и въ то самое время , какъ она утислится множество гноя съ каломъ изъ гузна выпечетъ (992) . Также ежели иногда гной , или полугной , изъ гузна покажется . Ежели болящій въ томъ мѣстѣ боль , или свербѣжъ чувствуетъ . Должно также всунувши въ гузно перстѣ и спичку , поврежденную кишку изслѣдовать . Снаружи приложѣ къ кожѣ перстѣ , опухоль отъ прикосновенія глубже чувствуется , и ежели фистула мозольность имѣетъ , опухоль же еще будетъ , и отъ перста не будетъ подаваться .

§. 1000.

Третій родъ , и фистулу отъ кожи наченшуюся , до кишки прошедшую , показываетъ ликворъ насосомъ въ устье фистульное впущенный , ежели онъ въ гузно выйдетъ : Ежели нѣсколько калу скрозъ фистулу покажется ; ежели концомъ спичкинымъ въ фистулу вду-
ще-

ФИСТУЛА ЗАДНЕПРОХОДНАЯ. 601

щенымъ перстѣмъ въ гузно всунутый уколется. Не трудно скрозь пазуху фиспульную въ кишку продѣть не большую и тоненькую свѣпилилку воцпаную, и ее кончикъ всунутымъ въ проходъ перспомъ захватить и вонъ выпациить. Эта свѣпилина, ежели такъ оставится въ кишкѣ часто съ каломъ вонъ выходитъ, потому также узнать можно, какъ глубоко фистула прошла.

§. 1001.

Въ изслѣдованіи фистулъ великое прилѣжаніе требуется. Больнаго такъ положить, какъ я выше сказалъ (994), перстѣмъ которой нибудь руки въ проходъ, спичку въ фистулу вложить, и все примѣчать надлежитъ, что не подалеку (945), написано. Къ тому надобно, чтобъ прислужникъ ягодицы обѣими руками нарочно раздвинулъ. Не худо также, больнаго по такъ то иначе класть, и ягодицы, когда спичка впускается, прислужнику то раздвигать то опускать. Должно также пощуповать, небыстьсяль въ какомъ мѣстѣ жила. А припомъ покуда еще ни перстѣмъ ни спичка не вкладываны, должно больному на низъ испражниться, а ежели не хочется, то оное чрезъ клистеръ здѣлать.

§. 1002.

Отъ всѣхъ заднепроходныхъ фистулъ болшая и надежнѣйшая помощь въ рукѣ, нежели въ лѣкарствахъ состоятъ. Не такъ много труда бываетъ, когда онѣ не глубоки, одинаки, не заспаѣлы, и у человека здороваго бываютъ. А гдѣ тому противное бываетъ, и гдѣ фистулы глубоко, и какъ нибудь, куды ножикомъ безопасенія достать не можно къ пузырю, къ стволу мочеиспускательному, до брюха или до его плевры, то есть до брюшины, и у женщинъ

Е с с

до

до срамоты, также до костей крестцовой и хвостцовой, да еще и до поврежденных проходят, ежели въ многія стороны расходясь, и застарѣлы, припомъ ежели у человѣка стараго немощнаго и попорченнаго, будутъ, ежели кишка глубоко испорчена будетъ куда перстомъ достать не можно, оныя трудно лѣчить да и неизлѣчимыми находясь. Въ фистулахъ глубокихъ, когда ихъ разрѣзають, превеликая опасность въ томъ бываетъ, что кровью исходящъ. Фистулы, которыя послѣ худова лѣченія и удержанной гонореи, на мѣстѣ междупроходномъ дѣлаются, побольшой часи до желѣзы предшательной, и до нѣлѣ пещуристыхъ удныхъ и въ самой стволѣ мочепочный проходятъ, и трудно заживають. Рѣдко также фистулы у шѣхъ людей, которые Французскою болѣзнью брѣны бывають, излѣчиваются, покуда худоба, въ сокахъ находящаяся, не будетъ исправлена. Ибо, ежели такія одними наружными лѣкарствами лѣчатся, то рѣдко можеть случиться чтобъ онѣ не дошли до того, чтобъ въ нихъ дикое мясо не выросло (*). Что же до оныхъ фистульныхъ трехъ родовъ принадлежитъ (997), первый и послѣдній родъ, не такъ трудно лѣчить, какъ второй, въ которомъ ни кожа, да только кишка испорчена бываетъ.

(*) см. ле дранъ т. 2 примѣч. 84 стр. 216.

§. 1003.

А понеже теперь къ лѣченію должно приступить, то я сперва о томъ родѣ скажу, который снаружи отъ устья кожного начинаясь до кишки доходитъ (997, 3). Кровь изъ руки пускать, и приказашъ воздержаться, при томъ ослабить клистерами. Сверхъ
того

шого ежели фистульное устье очень узко будетъ, оное или разрѣзавъ крестъ на крѣспъ, или вложивъ knobъ изъ сушеной рѣпы, или изъ губки воскомъ на поенной поширѣ здѣлать должно. Надобно также больному, котораго рѣзать, приказать высцаться, и положишь его такъ, какъ я выше сказалъ (994).

§. 1004.

Ежели фистула мазолистая не глубоко прошла, да только при самомъ проходѣ въ кишку прорвалась, наискорѣйшее лѣчение есть, спичку на иглу большую схожую, свищовую, или серебряную гибкую въ фистулу вправить, и ее впроходъ выволочь. И оба конца гибкой иглы крѣпко вмѣсто спянуть, и кожу съ обѣихъ сторонъ по иглѣ оной въ двѣ линійки разрѣзать, и всю фистулу съ мозольностью и кожей, на фистулѣ находящуюся, вырѣзать.

§. 1005.

Ежели же фистула глубоко идетъ и приметъ внутрь кишки кончится, въ оную въ ложить можно спичку жолобковатую, да и ту не въ самое внутреннее устье фистульное которымъ она въ кишку отворилась, продѣвать, но повыше онаго нѣсколько поглубже сквозь кишку, въ которомъ мѣстѣ она цѣла. Проколовши такъ кишку, спичку въ проходъ вынуть и по ней ножикомъ прямымъ фистулу разрѣзать. А послѣ мозольность, ежели ее совсѣмъ вырѣзать не можно ножикомъ, въ доль исчеркать, и ножницами кривыми поперегъ изрѣзать, и положивши лѣкарства бѣдкія и гной производящія, испребитъ, а болячку какъ чиста здѣлается, наполняющими залѣчить. Ежели

Е с с 2

излу-

излучины и другія пазухи будутъ , оныя также спичкою изслѣдоваль и ножичкомъ поразрѣзывать. Толькожъ гораздо лучше по пошчасъ здѣлать , ежели болящаго малосиліе и кроветеченіе не возпрепятствуютъ. Ибо гдѣ въ болячкахъ тной начнетъ скапливаться , то пазухи и попочки въ стороны идущія , труднѣе сыскиваются тѣ , копорыхъ устья очень узеньки бывають (945). Болячка также , хотя пражею и наполнился , однакожъ побольшой части ссѣдается.

§. 1006.

Иныя орудія и ножиковъ роды изобрѣшены , которыми еще сіи фистулы вырѣзываютъ съ меньшою больному болѣю. Есть нѣкоторый ножичекъ , у котораго конецъ шупъ имѣется , по Французски Королевскимъ [регіосъ] называемый (*). Сей въ фистулу въспавливается и закарючивается , чтобъ конецъ въ задній проходъ вышелъ , оный пащучи къ себѣ , фистула и кишка , и все что бы между ими нибыло , разрѣзывается. Имѣютъ еще ножичекъ , у котораго къ шупому концу спичка серебряная гибкая придѣлана , эта спичка въ фистулу опускается и въ задній проходъ выпаскивается (**). Сей , котораго сирингопомомъ называютъ , къ тѣмъ фистуламъ способенъ , которыя глубоко и прямо внутрь идутъ и въ кишку въ верху проходятъ. Имѣются , еще Лѣкари , которые тѣмъ ножичекъ употребляютъ , который съ боку высовывается (954) , а чтобъ имъ прошивъ фистулы на другой сторонѣ кишки не поранить , сперва всавываютъ въ кишку инструментъ желобкомъ выкачаной (***).. Эпими всѣми фистула не съ великою болѣю разрѣзывается , но мовольность не вырѣзывается ,

да

да и болячка не довольно наполняется, пѣмѣ по-
лѣчащій и обмануться можетъ. Ежели же кто похо-
нѣлѣ бы нѣкоторый изъ сихъ ножей употребить,
тому должно поспѣшь, разрѣзавши Фистулу, ножни-
цами разрѣзать верхней оный кишки край въ томѣ-
мѣстѣ, въ которомъ ее худая матерія пробла, ко-
торое мѣсто хопъ мозолистое, хопъ попорченное
будетъ, ежели не будетъ выйдено, никогда не залѣ-
чится. Всѣ орудія какъ въ Фистулу, такъ въ задній
проходъ, вставляемые, масломъ обмазаны бывъ
должны.

(*) Бистори роалѣ. Смотри у ГЕЙСТЕРА Таб. 5 фиг. 3.

(**) Сей ножичекъ что выдуманъ отъ ЛЕМАРА Аргенторатскаго
лѣкаря первый описалъ Славн. ГЕНР. БАССЪ въ Диссерт. о благо-
получномъ лѣченіи фистулы заднепроходной, въ Галл 1718 года въ
президентство Фрид. Гоффманна предложенной. Тотъ же самой нѣ-
сколько переиженный смотр. у ГАРЕНЖОТА въ Том. 1 въ Гл. 9
въ Арт. 5 стр. 337.

(***) Каковъ онъ есть, то его нарисовалъ ГЕЙСТЕРЪ въ
Хирург. на Табл. 35 фиг. 2 онъ же при томъ различные орудія
и ножиковъ роды изобразилъ. ШАРПІЙ представилъ изображеніе но-
жницъ, которыми онъ фистулу заднепроходную рѣзывалъ смотр. Таб-
лето 2 стр. 31 В.

§. 1607.

Другой родъ фистулъ, которыя внутри прямо
идутъ, а однако кишка повреждена, да не такъ
(997. 1). Какъ я очирьхъ безверхушешныхъ сказалъ,
въ двѣ и больше линѣйки разрѣзать должно, чтобъ
самое дно оказалось (994). Когдажъ до самого дна
фистулы дойдешь, то мозольность или совсѣмъ,
вырѣзать, или надрѣзать и прижигательными вещьми
выправить должно. Ежели когда фистула еще въ
кишку не прорвалась, а однако шуда клонится, да
уже и близко къ ней, то много для поспѣшенія дѣ-

Е с с з

ласся

606 ФИСТУЛА ЗАДНЕПРОХОДНАЯ.

лается , что потчасъ опустя въ фистулу спичку оспрую въ заднѣпроходную кишку , провалакиваюиъ и по ней , и фистулу и кишку разрѣзываютъ.

§. 1008.

Третій родъ (997 , 2) , что кожа будетъ цѣла , а фистула въ кишку будетъ открыта , ту досаду дѣлаетъ , что ее сперва снаружи прорѣзывать надобно. Ибо гдѣ прикасаніемъ подъ кожей опухоль , или мозольность чувствуется , туиъ ножичекъ наставишь и пазуху разрѣзать. Это не такъ трудно дѣлать , ежели всунутый въ гузно перстъ къ фистулѣ загнешь и туда снаружи кожу подавишь , такъ чтобъ ее супротивъ перста разрѣзать. Ежели же пазуха въ кишкѣ не такъ пространна , чтобъ перстъ всунуть можно , то спичку свинцовую , или серебряную такъ согнуть должно и заднимъ проходомъ въ фистулу всунуть , чтобъ прошивъ ее конца кожу разрѣзать было можно. Какъ кожа будетъ проколота , то прошее въ лѣченіи слово въ слово такъ поступать , какъ я приказалъ поступать въ цомѣ фистулъ родѣ , которыя и съ наружи и въ кишку проходятъ (1003 , по 1005).

§. 1009.

А чтобъ при лѣченіи таковомъ всегда самое дно фистулы разрѣзаной видно было , оное пряжею наполнять и наложу суконки завязывать должно (*). Сіе все отнимать надлежитъ. Когда на низѣ испражненія похочется. А припомѣ послѣ испражненія болячку губкою или въ водѣ тѣплой , или въ винѣ обмоча и выжавъ , чисто начисто вытирать и опять свѣжею пряжею , которая и лѣкарствами намазывается ,
напол-

наполнять должно. А чтобъ въ первые дни, въ которые иногда опасаться должно, чтобъ кровь не пошла, болящій отъ испражненія нанизъ поудержаться можетъ, а испражниться прежде лѣченія, и больной похлебками кормленъ быть долженъ. Надобножъ еще знать, что человѣку такъ лѣченому въ первые дни часто нанизъ испражняется хочется, однако или понемножку испражняется, или ничего, побольшой части неиспражняется.

(*) Подушечки и пряжу такъ вкладывать должно. Лѣкаръ вставляетъ перстъ въ задній проходъ такъ, чтобъ имъ фистулу разбѣзаной пазуха прикрылась, между перстомъ и кишкою противъ фистулы лежащую самую глубину опускается пряжа, которая или подушечками или кнопками разнообразными 19, 22) складывается. Когда такая пряжа въ задѣмъ проходъ на самый конецъ фистулы опущена будетъ, то перстъ прочь вынимается, и онымъ пряжа въ фистулу пригибается, смотр. ЛЕ ДРАНЬ Прим. 83 стр. 214.

§. 1010.

Другія нѣкоторыя примѣчанія еще пусть весьма надобны. Если не будетъ вся мозольность вырѣвана, то надлежитъ употребить великое прилѣжаніе, чтобъ его ничего не осталось, чего ради и всавываючи въ болячку перстъ, и спичку, все часто и прилѣжно отвѣдывать должно. Прилѣжно также смотреть, когда болячка чиста покажется, сухая она, или мокра. Ибо по количеству гноя видѣть можно, ежели пусть многія пазухи имѣются, въ многихъ пазахъ больше гноя печетъ, нежели изъ одной. Мышку жмательную заднепроходную безъ опасенія, нѣсколько разъ можно рѣзать. Если же ея много вырѣжется, вещми прижигательными выѣстца, или отъ произведенія великаго гноя испортився, то она повредается, такъ, что иногда узка дѣлается, иногда

гда

608 ФИСТУЛА ЗАДНЕПРОХОДНАЯ.

гда также расслабляется, что по надлежащему и кала держашь, не можешь.

§. 1011.

Иногда случается, ежели фистула глубоко проходитъ, что какъ перерѣжется жила бѣющая, и жила кровѣвозвращательная, кровь сильно идетъ, и то дѣло не бездѣйственное есть. Того ради ежели опасность есть въ печенѣи, рану набить пряжею, которая ежели сухая не дѣйствительна будетъ, по ея спиртомъ, или другимъ ликворомъ вяжущимъ на мочить, и рукою сверху придержать должно. Иногда другой страхъ бывающъ, когда кажется уже и кровь остановилась, чтобъ она въ кишку не пошла, ежели ей нѣкуда шѣчь будетъ, а то узнать можно потому, когда у больного брюхо пучится начнетъ и рѣзъ въ животѣ здѣлается.

§. 1012.

Въ старину нитку въ фистулу продѣвши завязывали, которою помаленьку, и кожа и фистула разрѣзывались. Который способъ лѣченія просяженъ и досаженъ.

(*) смотр. ИППОКРАТА о фистулахъ Т. 12. стр. 680. ЦЕЛЬСА Кн. 7. гл. 5.

§. 1013.

Ежели, которая фистула внутрь проходитъ, куда ножикомъ безъ опасенія достать не возможно, или, ежели лѣпнѣ, и другія причины, оной лѣчиться препятствуютъ, тушъ надобно употреблять полосканье, отъ котораго она чиста здѣлается. Къ тому способны декоктъ травной, изъ палыню, изъ руты, изъ агримонѣи, шалфея и симъ подобныхъ. Также вода ранная смѣшанная нѣсколько съ эссенцією лянтарною (913).

ПО-

П О Ч Е Ч У Й.

ГЕМОРРОИДЕСЬ.

§. 1014.

Рѣдко случается, чтобъ изъ почечуйныхъ жилъ печеніе крови такое здѣлалось, которое надобно бы было рукою лѣчить. Ибо ежели кровь выходу эпими жилъ крововозвращательныхъ устьями не имѣетъ, что чрезъ многія примѣчанія примѣчено, то отъ вліянной во внутренности части матеріи, люди незапными и претяжкими болѣзнями поражены бывають. Ежели же изъ устьевъ жилъ крововозвращательныхъ, или часто, или бѣдственно, кровь печетъ, и человекъ отъ того печенія слабъ дѣлается, приказать ему воздержаться, покоиться, и пить весьма жидкое, и давать вещи такія, которыя отъ кровопеченія пособствуютъ, о которыхъ выше я объявилъ (417, 418). А припомъ ежели на низъ испражненіе заперлось и не порядочно, надобно чрезъ клистеръ съ селипрою здѣланный оное произвести. Не безъ опасности оспанавливается печеніе чрезъ приложеніе съ наружи вещей вяжущихъ, или ежели устья жилъ крововозвращательныхъ желѣзомъ каленымъ прижигаются, или нипкою запятиваются. Ежели устья жилъ крововозвращательныхъ, у кого торчатъ будто бы головочками напруглыя, и изъ нихъ кровь печетъ, то нѣкоторые приказываютъ, щипчиками или крючкомъ захватить, и ножницами, или ножечкомъ вырѣзать, чтобъ печеніе можно лучше удержать. Всѣ сіи пособія не тотчасъ исполнять, развѣ исомѣнная нужда до того доведетъ. Изъ сихъ шишечекъ часто худыя болячки и бородавки околороходныя [кондилома] родятся.

Ж ж ж

§. 1015.

§. 1015.

Гораздо же чаще случается, что онѣя жилѣ кровевозвращательныхъ устьѣ съ великимъ вожженіемъ и несносною болью распухаютъ, такой случай обыкновенно почечуемъ слѣпымъ [геморроидесъ цецѣ] называютъ. Случается шо обычно, когда крови выходу нѣтъ, также когда приметъ больной проносное острое, и которое много сабуру [алое] въ себѣ имѣетъ, еще ежели въ сокахъ отъ цынги и отъ болѣзней блудодѣйной порча, и ежели кровь весьма густа будетъ, какова обыкновенно бываеетъ у шѣхъ, которые мало движенія шѣлеснаго дѣлаютъ. Эта немочь и отъ другихъ болѣзней рождаешя, о чемъ выше я показалъ, говоря о чирьяхъ безверхушешныхъ около задняго прохода бывающихъ. (991) Лѣченія сихъ недуговъ у Медиковъ требовать должно. Слабишь на низѣ надлежитъ чрезъ клистеръ не острый, но изъ вещей мягчительныхъ, изъ молока и изъ масла составляемый, ежели изобильность крови будетъ, пускитъ, пить весьма жидкое и пищу съ голодомъ по поламъ приказавъ употреблять. Вино совсѣмъ запрешитъ, и все пряное, и оноего кровь играетъ или на низѣ запоръ дѣлаетъ, или брюхо пучитъ, а употребляя вещи другія, которыя отъ вожженія пособствуютъ (62, 64, 66).

§. 1016.

Снаружи на мѣсто больное прикладывать су-конки теплыя въ нѣсколько разъ сложенныя, въ молоко съ вещами мягчительными (91) вареномъ, обмакивающи и хорошенько выжимаючи (24), въ проходъ пускати можно: масло вербасково или обильнѣе, а ежели китка оспрою

острою мокрошою избѣдена и изранена, то къ нему прибавлять можно понемножку масли де линарія. Ибо ежели се одну въ кишку пускаешь, то примѣчено, что она подавлять великую силу имѣетъ. Много также пособствуетъ, когда лѣкаръ рукою масляною шишечки внутрь вправляетъ, а то неосмѣнно надобно бываетъ тогда, когда кишка нѣсколько слаба будетъ, весьма вредно, когда спиртъ камфарной, вода извѣстная, и дымъ дубоваго дерева, или жженныхъ мышей, [комбусписъ мурибусъ] такъ называемыхъ морскихъ, къ кишечкамъ эпимъ прикладываются.

§. 1017.

Сему почечую также пособствуютъ пѣявицы, къ шишечкамъ симъ припускаемыя. Лучшими признаются къ тому пѣявицы въ водѣ чистой собираемыя и избъ желта синей цвѣтъ имѣющія. А припомъ, которыя припускаются, должны быть голодные. Мѣсто къ которому припускать надобно, сперва хорошохонько губкою вышереть, и немножко молокомъ или свѣжею кровью помазать. Лѣкаръ пѣявицу, которую припустить хочетъ, долженъ взять въ руку тряпочкою обвернутую, или ее посадить въ прорѣзъ въ доль расколотую. Онѣ напившись крови, сами отпадаютъ, а иногда и насильно отнимать ихъ должно. Отстаютъ также когда золою, или солью на нихъ посыплешь.

§. 1018.

Почечуныхъ жилъ головки пухнуція, иногда ланцетомъ прорѣзываютъ, и кровь изъ нихъ выпускаютъ. Но это не всегда и не у всякаго человѣка

Ж ж ж 2

НО

но только у такого, который здоров и у котораго въ сокахъ никакой порчи нѣтъ, дѣлать, да и дѣлать тогда, когда всѣ способы къ лѣченію предложенныя, мало пособствуютъ, и гдѣ боль тяжчайшею болѣзнию грозя, сильно мучитъ.

О С К О Л О Т К И К О Н Д И Л О М А Т А.

§. 1019.

Часто же изъ почечуйныхъ головокъ, когда онѣ прорѣзываются бывають, или отъ прикладываемыхъ лѣкарствъ, и отъ удержанной матеріи ожесточють, шишки многогородныя родятся, которыми по фигурѣ, жесткости, и по другимъ причинамъ различныя и имена подаваны. Осколотки [кондиломата] называются, шишки большія, другихъ жестчайшія, которыя верхушку расщепляющую и гребень имѣють, гребнемъ отъ нѣкоторыхъ и называются. *Θύμιον* или *αχρὸς θυμίου*, родомъ бородавки, выше мною объявленный (886) также въ этихъ мѣстахъ рождается. Фига [фикусъ] есть шишка круглая у кожи тонкая, вверху широкая, не плотная и мягкая, съ которою почти во всемъ сходна винная ягода. Много къ симъ опухолей родомъ, причины подастъ то, когда человекъ поврежденнаго сложенія будетъ и худоба отъ блудной болѣзни по тѣлу разойдется, или, ежели въ этихъ мѣстахъ худыя болячки бывають, а ихъ ни какъ не дѣлають.

§. 1020.

§. 1020.

Эти шишечки не снаружи, только около прохода
 дѣлаются, но иногда ими кишка и далеко изнапол-
 нена бываетъ, такъ, что одна противъ другой тор-
 чаетъ, и всю кишку запираютъ, и не даютъ вонъ калу
 проходить, отъ чего бѣдные люди и умираютъ. Ибо
 ежели глубоко въ кишкѣ и далеко онѣ вырастутъ,
 то ихъ лѣчить не возможно. Отъ лѣченія они также,
 а особливо которые не болятъ, болѣть начинаютъ,
 и вырѣзанны будучи, иногда по залѣченіи опять вы-
 ростаютъ. Это часто случается, когда человекъ бу-
 детъ не здоровъ, спаръ, и худого сложенія, и ежели
 соки будучи не хороши, не будутъ пристойными лѣ-
 карствами и содержаніемъ въ пищѣ и питьѣ исправлены.

§. 1021.

И такъ сіи шишки вырѣзывать можно, которые
 снаружи, около прохода и въ проходѣ не далеко бы-
 ваютъ. Передъ тѣмъ на низѣ испражниться надобно.
 Послѣ того щипчиками, или перстами, шишечку за-
 хватить, пооттянуть сильно, и вырѣзать такъ,
 чтобъ нѣсколько съ кожей, и съ проходомъ самимъ
 въ рукахъ оспадось. Ибо предъ другими шишками оско-
 лопки [кондилома] корни свои глубже распу-
 скаютъ, которыхъ ежели не захватишь, то они
 опять вырастаютъ. Такимъ бо способомъ корни
 не съ великимъ трудомъ, и не такъ съ великимъ
 больному бѣдствіемъ, искореняются, какъ то,
 что многіе велятъ, вощами прижигательными ихъ
 замаривать. Ежели бы надобно было нѣсколько изъ
 прохода и мышцы жжимательной вырѣзать, то во
 время лѣченія въ проходъ вкладывать всдойкѣ кношь,
 , ж ж ж ж 3 чтобъ

чтобъ при залѣченіи въ ранѣ краевъ , проходъ гораздо пѣсенъ не дѣлался. Ежели много зжимательной мышки будетъ вырѣзано , то иногда больные бывающіе не въ состояніи въ себѣ держать (1010).



ПРОХОДЪ ВЫХОДИТЬ. А Н И П Р О Ц И Д Е Н Ц І А.

§. 1022.

Скучный также случай есть , когда задній проходъ иногда выходитъ. А это обыкновенно случается , и когда человекъ долго поносъ имѣетъ , въ то время много бѣднаго желчнаго испражняетъ , ежели часто проносныя крѣпкія принимаетъ , ежели въ кишкѣ глисты маленькія [аскаридесъ] , или худыя болячки , бывающіе , отъ которыхъ , также какъ и отъ камня въ пузырѣ уринномъ бывающаго , дѣлается жжение , а отъ того часто на низъ хочется , и болитъ , когда нѣсколько вымарается : Отъ всего этого , и ежели человекъ часто почечуемъ будетъ страдать , кишка на послѣдокъ разслабнетъ , и при маломъ жжении опускается и вонъ выходитъ. Временемъ и вожденіе приключается , которое дѣлается , ежели мышка зжимательная крѣпко сожмется , и то , что выпало , давитъ.

§. 1023.

Ежели причины извѣстны (1022) , оныя напередъ всего оповѣстать. Ежели полугноемъ оспрымъ на низъ человекъ будетъ мараться , можно въ проходъ пускать масло и клистеры изъ декокта овсянаго , изъ споденной жижи , изъ молока , съ которыми еще варить вещи

вещи мягчительныя. Червячки или глисты маленькіе [аскаридеcъ] умираютъ отъ масла, когда его въ проходъ впустишь, и сколько возможно поддержишь.

§. 1024.

Ежели же выпавшая кишка, будетъ вожжена, употребить надобно припарки и другое, что выше (1016) я приказалъ, и когда кишка нѣсколько опухнешь, оную перстами (1016) должно внутрь вправить, а послѣ того въ много разъ сложенными суконками прикрывъ обвязать. Прикладывать также можно вещи нѣсколько подавляющія [реприментесъ] вино хорошее, и съ виномъ хорошимъ варить можно корень биспорте, [змеевича или сабельникъ] шорментилле [дубровникъ] маликоріумъ [гранатное яблоко.] Хорошо также курить ладаномъ, мастикомъ, ягодами можжевельными.

§. 1025.

Ежели же человекъ нѣсколько будетъ малосиленъ, то ему никогда давать не надобно проносныхъ крѣпкихъ, а употреблять только слабительныя клистеры, чтобъ проходъ отъ великаго принужденія и жгленія не выпадалъ. По испражненіи на низъ также употребить можно другія вещи подавляющія (1024). Надобно припомъ чтобъ больной скорчивши, и связавши ноги сидѣлъ и лежалъ. Иногда этой болѣзни и лечь не возможно, а то обыкновенно бываетъ, когда она послѣ рѣзанья, боковымъ [латералисъ] называемаго остается, во время котораго камень пузырьный по способу чернца отца Іакова изобрѣтенному бываетъ вынутъ (989); ибо припомъ мышка облегчательная тузевная бываетъ разрѣзана.

АФЕ-

АФЕДРОНЪ НЕОТВОРЕННЫЙ.

А Н У С Ъ П Р Е К Л Ю З У С Ъ.

§. 1026.

Сему противный порокъ бываетъ, когда съ заднимъ проходомъ зарослымъ младенцы рождаются, а то по большой части въ маткѣ материней дѣлается. Если прошивъ кишки только одна плева бываетъ, то легко вылѣчить можно. Если же кишка глубоко и почти совсѣмъ вырослая будетъ, то отъ того только одною смертию избавляются. Иногда калъ нашедши дорогу какую ни будь, у дѣвушекъ, дѣпороднымъ удомъ, а у мальчиковъ пузырькомъ уриннымъ вонъ выходитъ.

§. 1027.

Если плевою только зароснетъ, то должно ее ножичкомъ обоюднымъ въ двухъ мѣстахъ поперегъ разрѣзать. И какъ калъ дѣпородный или матошной [меконіумъ] проскочитъ, то если за надобность покажется, прорѣхъ или вновь больше разрѣзать, или обмакнувши перстъ въ масло разширить должно. А припомъ очень хорошо, все то что еще отъ кала матошнаго останеся, клистеромъ какимъ ни будь вонъ испразднить. Въ жопкужъ вставить должно кнопокъ нѣсколько толстой и жоспкой, чтобъ края у раны заживаючи не срослись, и жопка очень не сбузилась. Кнопъ лѣкарствомъ струпъ наводить могущимъ (396), намазывать должно, и его такъ долго вкладывать надобно, покуда прорѣзъ струпомъ не покроется.

КО-

КОСТНЫЯ БОЛѢЗНИ.

оссиумъ морби.

§. 1028.

Кости , жесточайшія тѣлесныя части , состоятъ изъ тончайшихъ слоевокъ , маленькихъ и кружкомъ кончащихся дощечекъ или чешуекъ , и изъ волокъ , а сверхъ того изъ всѣхъ сихъ надлежащимъ образомъ вмѣсто спаянныхъ или слѣпленныхъ. Оныя , какъ слойки , такъ чешуйки , не только изъ волокъ состояются , но и посредствомъ другихъ волокъ поперешныхъ , или , какъ другимъ кажется закорюченныхъ , межъ собою связываются и вкупѣ соединяются. Слойки въ костяхъ плотныхъ и въ ихъ частяхъ , которыя большую жесткость имѣютъ , великіе и прямые бываютъ , и будто бы выскоблены , и одинъ съ другимъ связавшись плотно держатся , что самое очевидно видимъ на срединѣ въ круглопродолговатой кости бедерной. Въ костяхъ же мягкихъ и неплотныхъ не такъ многіе находятся слойки , да и тѣ гибкими и неровными показываются , а больше чешуекъ и волокъ бываетъ. Отъ нихъ производитъ то , что кость толстая будетъ мягка , не плотна и печурисна , какова есть бедро , гдѣ она на концахъ своихъ распуливается. Печурки сіи какъ фигурую такъ и величиною не одинаковы. А чѣмъ онѣ больше будутъ , тѣмъ сквознѣе , и мягче кость бываетъ. Ибо что въ костяхъ плотныхъ и жесткихъ и печурочки , хотъ не большія бываютъ , по мозгу изъ нихъ испекающему можно знать. Напоследокъ же въ костяхъ дудковатыхъ и во внутренней ихъ части неываютъ слойки и чешуйки , а многія въ длину , поперегъ и

З з з

наи-

наискось идущія волокна находятся, которыя будто бы нѣкоторое шло речетисное соспавляющъ къ содержанию жидкаго мозга костнаго опредѣленное. Между слойками, листочками и волокнами, жилы бьющіяся и жилы кровесвозвращательныя проникающъ, костямъ и другимъ частямъ пищу подающія.

(*) Смотр. КЛОПТОНА ГАВЕРСА Остеологию новую. ГАГЛАРДОВУ Анаптомію костную. ВИНЗЛОВУ Описан. Анат. Т. I §. 84. и далѣ.

§. 1029.

Кости всѣ, выключивши зубы, снаружи плевой оболакиваются шюю, которую накопьемъ называющъ. Оная плева гораздо къ нимъ плотно прироспаетъ, и не безъ труда отъ нихъ отдирается. Сказывающъ, что она начинается отъ жеспокой матеріи, съ которою въ ямахъ глазныхъ и другихъ головныхъ мѣстахъ соединяется. А что она жильно-чувствительна, оное по больности знать можно, когда ее досаждъ. Имѣются также жилы бьющіяся и жилы кровесвозвращательныя весьма многія, которыя изъ накопной плевы къ костямъ принадлежатъ. Междъ костью и перепонкою кажется есть плѣтушка каѣпчатая, очень тоненькая. Плева эта не ровную вездѣ толщину имѣетъ, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ тонка, а въ нѣкоторыхъ поплотще. Ибо съ нею и волокна отъ мышечныхъ сухихъ жилъ, и отъ костныхъ связокъ, на костяхъ прирастающихъ совокупляются, отъ которыхъ накопье толстѣетъ. Изъ накопья къ костямъ принадлежатъ и съ ними сростаются жилы бьющіяся, которыми сокъ ихъ питающій въ нихъ протекаетъ, къ нимъ же суть присроены и жилы кровесвозвращательныя. Также сверхъ
этой

этой плевы, которая гладка и смазка, мышки скоро-
движныя идути. Чѣмъ же ея надростки костьныя при-
держиваются, пошму можно знать, что они отъ
кости опшваливаются, когда накость сбѣдено бываеиъ.

§. 1030.

Другая плева есть, которою кости изънутри
прикрываются. Эта плева дѣлается изъ жилъ бѣ-
щихъ, жилъ кровезовращательныхъ и жилъ чув-
ствительныхъ, которыя скрозь дырочки проходятъ,
снаружи до самыхъ внутреннихъ частей костьныхъ
проникающія. Въ сей плевѣ не только великія и
мозгокостныя дупла включаются, но и пѣ пещурочки
кости дупляемыхъ и мягкихъ. Да и то правда, что
сія плева, или накость внутреннее, изъ двухъ
оболочекъ состоиъ, одною въ кости протекаетъ
поиъ сокъ, которымъ онѣ питаются, изъ другой, а
наибольше въ внутреннія ея части, въ дупло ко-
стяное и пещурочки можжечокъ идеиъ, и для различ-
ныхъ потребностей отдѣляется. Чрезъ опыты из-
сѣдовано, что когда кость повреждена бываетъ, то
плева накость наружная [періостіумъ экстернумъ]
очень болииъ, а внутренняя накость плева и мож-
жечокъ (*) [періостіумъ интернумъ и медулла] ни-
какой болѣзни не чувствуетъ.

(*) Смотр. въ Коментар. Корол. Акад. Наук. 1700 году стр. 252.

§. 1031.

Мозгъ костьный изъ остаточной крови жилъ
бѣщихъ къ внутренней плевѣ накостиной принадле-
жащихъ отдѣляется. Однакожъ въ немъ различіе
есть. Ибо нѣкоторый мозгъ жиренъ и масленъ какъ
настоящій жиръ, въ плевныхъ мѣшечкахъ содержится,

З з з з

ко-

которымъ наибольшія дупла костей длиннокруглыхъ исполняются. Онѣ тѣмъ плѣтнемъ рѣшетистымъ изъ волокъ костныхъ сплѣтенымъ, будто бы повѣшенный поддерживается. Другой мозгъ костный имѣется пожижѣ, и на пасоку и на сокъ похожій, которымъ тѣло питается, въ которомъ также много пищи есть, ежели его по повѣренному похлѣбою здѣлаешь. Оный мозгъ въ печурочкахъ костей не плотныхъ и мягкихъ отдѣляется. Однакожъ оный мозгъ, который изъ прекрѣпкихъ костей на солнце положа выплывается, этого мозгу гораздо тонѣ кажется, и оный въ наимагнѣшихъ и чувствомъ не постигаемыхъ сумочкахъ содержится я уже сказалъ. Всякой мозгъ костный, въ тѣлѣ здоровомъ, и не подвижномъ, жиренъ бываетъ и масленъ, а у челоука безсильнаго и худосложнаго, или стараго, также послѣ долгаго не ядѣнія и послѣ великаго въ движеніяхъ утружденія, онѣ тонокъ бываетъ полугноеватѣ бѣдокъ. У людей тѣхъ, у которыхъ любопытная болѣзнь въ сокахъ распространилась, кости безмозглыя и гораздо легкія бываютъ. Всякому видно, что отъ мозгу въ костяхъ находящагося дѣлается, чпобъ въ нихъ нѣкошорая гибкая мягкоснъ была, и не допускаетъ, чпобъ онѣ иотчасъ раскалывались и переламывались.

§. 1032.

Въ лѣченіи упражняющимся неоптѣнно надобно знать, что всѣ сіи костныя части отъ многихъ причинъ страдаютъ, и отъ тѣхъ многія и смертоносныя болѣзни обыкновенно родятся. Ибо ежели наружная плева на костная возжигается, возженіе же къ загноенію склоняется, то сія плева отъ ко-

сти

сти отходитъ и портится. Того ради костяная наружная спора, не получая отъ плевры наkostной никакого пропитанія портится и умираетъ, и кость гнилая бываетъ. Эпо также случается, ежели ударомъ какимъ, или другимъ какимъ случаемъ, плева отъ кости отдирается. Ежели соки, которые по костямъ, и по самымъ крѣпчайшимъ естественнo расходится, въ нихъ изъ пріятелищъ своихъ вытекаютъ и недвижимо споятъ, оными волокна костныя раздираются, и дѣлается опухоль, копорая *εξοστωις* называется. Ежели сокъ оный изъ сосудовъ своихъ вытеклый хорошъ будетъ, каковъ обыкновенно бываетъ, чрезъ посредство котораго переломленыя кости спаиваются, оный мозолью крѣпкою дѣлается, копорая мозоль на послѣдокъ въ кость превращается, и опухоль хорошая бываетъ (*). Ежели же другая погрѣшность подъ тѣмъ будетъ, и сокъ оный острый не только костяныя волокна межъ собою раздираетъ, но еще сѣдаетъ и портитъ, *Экзостозисъ* зловредная называется (**). Въ сихъ опухоляхъ временемъ гнилое мясо находится, которое обыкновенно родится изъ маленькихъ по костямъ расходящихся жилочекъ бьющихся, которыя, какъ будетъ сѣдена и истончена худымъ сокомъ костяная матерія, на подобіе грибовъ, вырастаютъ (***). Отъ такой же причины и худыхъ соковъ иногда не отъ часпи, но совсѣмъ тѣлая распухаютъ, который болѣани родъ *υπερστωις* отъ недавнихъ писателей называется (****). А еще временемъ кости такъ мягки бываютъ, что будто бы восковыя гнуться могутъ, которыя, какъ кажется, кислымъ сперва сокомъ размягченны будучи, какъ отъ дѣйствія мышечнаго, такъ отъ тяжести тѣлесной,

накривляются †. У другихъ дѣлается удивительная ломкость такая, что отъ легкаго прикосновенія и движенія, переламываются ††. Во всѣхъ сихъ порокахъ, съ прочими по всему тѣлу расплывшимися соками, и мозгъ костный испорченъ бываетъ. Который, ежели въ какомъ мѣстѣ, чаще же въ костныхъ частяхъ печуристыхъ и рѣдкихъ, а особливо близъ суставовъ, и въ надросткахъ костныхъ, отъ какой бы нибудь причины остановится и испортится, преужасный оный родъ болѣзни производитъ, который *пауда-Дрокану*, [спинамъ вентозамъ] оспью вътренною, мы называемъ †††.

(*) Смотр. у ПЕТИТА де. малахи де? Осъ Т. 2. стр. 380. и далѣе. Я имѣю въ хранилищѣ черепъ головной, на которомъ такая экзостозисъ есть на кости лобной, на лѣвой ее сторонѣ. Безъ всякаго сумнѣнія я уповаю, что человекъ сильно былъ зашибенъ, ибо не только наружная черепа сторона была разможжена и разломана, но и внутри слой щекальный разколошъ. Между обѣими же табличками и разломанными черепьями мозоль прекрѣпкая находится, отъ которой сія черепа головная часть гораздо и тяжела. Отъ того мѣста кости лобной начинается широкая щель, которая посрединѣ кости височной до самаго шва людеобразнаго проходитъ. На задней части кости тѣмянной кажется кость буравомъ была вытерчена, человекъ такъ тяжело былъ раненъ а выздоровѣлъ. Ибо и щель и дыра буравомъ пресвердлена мозолью исполнены были, которая по большой части и осѣдливъ маленькую щелку и маленькую дырочку уже прямою костью здѣлалась.

(**) Смотр. фигуры въ ХЕСЕАДЕНОВОЙ Остеографіи Таб. 42. фиг. 2. на челюсти нижней и Таб. 53.

(***) Это и отъ удара случается у ПЕТИТА тамже стр. 389. снеси сюда 4. 526.

(****). Смотр. у Славк. Аспрука тамже. Кн. 4. Гл. 3. Т. 1. стр. 416. снеси сюда фигуры въ РУИШЕВЦѢ Хранил. 10. Таб. 2. стр. 2. ХЕСЕАДЕНОВЫ Таб. 49. фиг. 2. Таб. 45. фиг. 1.

† Это у ребятъ рахитидомъ т. е. Аглинскою болѣзью страдающихъ часто бываетъ Смотр. фиг. въ К. Кор. Ак. Наук. 1704 года стр. 613. и далѣ у ХЕСЕАДЕНА тамже Таб. 52. Фиг. 3.

†† Смотр.

†† Смотр. ГЕНР. МЕЙБОМІА Экзерц. о состояніи костей естественномъ и престестественномъ, въ Гелмстадѣ 1668 году. и ВИЛТ-ГУЛАД. ВАЛДШМИДА Діамрибѣ или Спорѣ о Переломахъ костныхъ безъ всякой важной причины наружной въ Килѣ 1721 года. САВІАРА. Прим. 62. ПЕТИТЬ въ Комм. Кор. Ак. Наукъ 1722 года. стр. 311. и далѣе, котормъ эту болѣзнь новою почелъ. Но оспорилъ былъ отъ Автора книжечки (ФРАНЦИСКА ЮГАННА ГУНАУЛДА) въ Диссерт. хъ формъ де летрѣ о сюже десъ уфражъ де л' Оперѣ скорѣ де маладѣ десъ Осѣ и отъ АСТРУКА тамже стр. 418. которые Авторы многія Примѣчанія въ древнія времена изданныя представили.

††† Смотр. у ПАЛФИНА о вѣтренности хребетной кости [де Веншозиташе спина] и СЕВЕРИНА о Гнилости костей [петарезюмаде], въ Книгѣ о натурѣ чирьезъ безверхушешныхъ, и смотр. фиг. въ ХЕСЕЛАДЕНОВОЙ Остеографіи Таб. 45. фиг. 3. привнеси сюда о всѣхъ сихъ книгъу ГЕЙНОВУ о болѣзняхъ костныхъ.

§. 1033.

Кости также замираютъ, ежели сокъ, котормъ онѣ питаются, къ нимъ не доходитъ. Сіе случается, ежели жилы быющіяся нѣсколько великія въ самую внутренность костную проходящія, перерѣзаны и повреждены бывають, и плева накопная испорчена. Кости такія совсѣмъ сухи бывають, легки, и на извѣсть похожи, и безъ трудности соотрывающіяся. Я уже нѣгдѣ сказалъ, что очень опасно, ежели жилы быющіяся, сверху костей внутри идущія, въ шѣхъ дирочкахъ перерѣзываются. Ибо кровь, изъ оныхъ въ кость вонзенныхъ жилъ быющихъся итекущую, трудно удерживать, понеже приписнутъ ихъ хорошенько не возможно (248, 543).

§. 1034.

Но когда всѣхъ костей сіи потрѣбности не много отъ шѣхъ различія имѣють, которыя въ другихъ мягчайшихъ частяхъ обыкновенно случаются, то онѣ почти никакого и лѣченія требуютъ. Выше я пред-

я представилъ (35), что въ жилахъ бьющихся костныхъ отъ многихъ причинъ соки останавливаются, проходъ запирается, и дѣлается запоръ, а не вожженіе, ибо костныя волокна никакой жизненной силы не имѣютъ, которою бы сокъ, скопившійся, разогнанъ или въ большее движеніе приведенъ, или въ гной превращенъ быть могъ. Того ради, ежели мокрота въ самой кости, а не въ плевахъ ея, спойилъ, и она поршился, худыя болячки родятся, копорыя, какъ начнутся изнутри, послѣ по всей кости скрость плеву на костную, а на послѣдокъ, подѣлавшись тяжкія болячки и фиспулы, скрость кожу прорываются. И такъ Гниль костная съ болячкою и антоновымъ огнемъ, экзостозисъ и педарерокаце съ ракомъ пошасаннымъ (262) и съ ракомъ открытымъ, сравнена быть можетъ.

§. 1035.

Ещежъ и то должны мы знать, что въ костяхъ гнѣющихъ почти тоже случается что въ антоновомъ огнѣ бываетъ, какъ я выше (198) объявилъ. Ибо какъ на примѣрѣ въ эшомъ она гнилая и вонючая верхушка, по началіи межъ ею, имежъ пѣмъ, что цѣло и не вредимо, гноя, отдѣляется, такъ и тутъ, ежели у кости часть мертвая и испорченная будетъ, она также отъ неповрежденнаго отдѣляется, когда межъ цѣлою и мертвою частью мясо родится, которое то, что отдѣляется, вонъ извергаетъ, а изъ онаго мяса новая на костную плева рождается. Это умершей кости отъ живаго отдѣленіе, называютъ эксфолиаціею по русски будпо бы листовъ лишеніемъ, которое иногда само собою бываетъ, а иногда чрезъ употребленіе къ тому способныхъ вспоможеніи (*).

Одна-

Однако гораздо легче попорченное отъ цѣлаго отдѣляется, ежели оно сухо и заскорбло будетъ здѣлано. Однакожъ иногда и кость, попорченная, помаленьку и такъ отдѣляется, что гнилое, будто бы распустилось, и не видно какъ съ гноемъ изъ болячки выходитъ. Изъ сего явственно есть, для чего эпистлойка отдѣленіе труднѣе въ костяхъ ноздреватыхъ и печуристыхъ быть можетъ.

(*) у иппократа чешуйка, которая такъ отпупливается, называется *ἀποστράξις ὀστέου*. Смотри въ книгѣ о Головныхъ ранахъ §. 23 Т. 2. стр. 705.

§. 1036.

Сіе все предложивши, къ каждому виду особливо приступить надобно, и въ первыхъ что на костяхъ различныхъ родовъ опухоли дѣлаются. Временемъ одна плева снаружи разпухаетъ, когда подъ нею мокрота скопится. То случаться можетъ, какъ отъ сильного удара (522), такъ, ежели злая матерія какойнибудь болѣзни на кости падетъ, а то часто при подсыханіи воспы и кори, обыкновенно бывающъ. Однакожъ гораздо чаще отъ блудодѣйной болѣзни на костная плева разпухаетъ, когда подъ нее испорченной сокъ подойдетъ, онъ, какъ кажется, въ томъ нѣжномъ клѣпчестомъ плѣтнѣ (1028) стекается. Ежели отъ тяжкаго удара зашибена будетъ плева на костная, и подъ нею кровь скопится, то опухоль потчасъ здѣлается. Ежели злая матерія отъ другой болѣзни на кость падетъ, то мѣсто сперва будто бы не будетъ опухло, такъ что въ которое время снаружи опухоль усмотрится и перстомъ подавишь, то внутри обтекающая кругомъ матерія, кожу, ко-

И и и

по-

порую и надавишѣ , приподымать будетѣ . Третій родъ послѣ долговременныхъ и сильныхъ , а припомѣ ночью болыше дѣлающихся болѣзней , часѣ отъ часу помаленьку вырастаетѣ . Ежели опухоль прорѣжешѣ , то матерія выходитѣ жолтая , и буди по бы спюдень ссѣдшаяся , бываетѣ . Онѣ опухоли отъ блудодѣйной болѣзни наченшіяся , нѣкоторые другими именами называютѣ . Ибо ежели ихъ перстомъ подавишѣ , а онѣ опадають , то новѣйшіе смолами [гуммаша] называютѣ . Ежели онѣ гораздо жестки и отъ перста не подаются морскою пѣнкою [пофи] . А наибольшая жесткость бываетѣ въ Экзоспозѣ .

§. 1037.

Понеже кость умираетѣ , ежели отъ нее оподрана , или и повреждена будетѣ плева накопная (1028), то въ первомъ случаѣ , и хотя на головѣ , или на другомъ членѣ , сильно зашибеномъ , спрахъ есть , чтобѣ накопье не было повреждено , то надобно поспѣшить , и прилѣжность приложить , чемъ бы къ тому мѣсту скопленіе мокротѣ оператить . Того ради потчасѣ кровь пустить надобно , и все то здѣлать , что отъ воженія пособствуетѣ . Снаружи прикладывать можно припарки жидкія смягчительныя (91), чтобѣ чрезъ то мокрота могущая плеву опяготить , вонѣ вышла . Также хорошо кожу съ мясомъ до самой плевы накопной разрѣзать , гдѣ можно безъ опасности то здѣлать . Но должно стараться , чтобѣ накопная плева цѣла осталась (521. 724).

§. 1038.

Но гдѣ подѣ надкопьемъ ужѣ кровь скопится , тутѣ нѣтъ лучшаго лѣченія , что опухоль до самой
ко-

кости прорѣзать , и кровь выпустить (522). Кость обнаженную такъ лѣчить должно , какъ выше (523 , 524 , 525) я предложилъ.

§. 1039.

Ежели же отъ прошестья горячки , или отъ блудодѣйной болѣзни , накость съ болью распухнѣвъ , то воженіе рѣдко отвратить бываетъ можно. Не пособствуетъ въ случаяхъ сихъ кровопусканіе , развѣ больной отъ множества ся будетъ спадать. Ибо когда ее много выпустишь , то часто случается , что сила къ лѣченію надобная вовсе теряется. Однакожъ можно и то здѣлать , и кожу на опухоли разрѣзать. Больному надобно давать лѣкарства , которыми бы худоба въ сокахъ находящаяся , а особливо блудодѣйная болѣзнь , ежели болящій ею страждетъ , искоренилась. Гдѣжъ боль пройдетъ , а опухоль не уменьшася , и будетъ мягка , то можно думать что накостьная плева испорчена , кость гола , и гнила. Того ради надлежитъ кость опкрыть : и другими лѣченія способами , о которыхъ вскорѣ скажу , поврежденное исправить. Ежели кто ракомъ откровеннымъ , или цынгою будетъ боленъ , и у нихъ болѣзнь сильно и глубоко такъ укоренится , что накостьная плева попорщится , и отъ кости отдѣлится , тѣ люди отъ той болѣзни скоро умираютъ. У ребятъ , рахипидомъ или Аглинскою болѣзною , немоществующихъ кости , а особливо надроспки костьные , сперва распухаютъ , и послѣ того на срединахъ костьныхъ порокъ , или *пауаэзгоакѣ* внутренняя костьная гниль и червоточина родится , которыми кости , а послѣ того и плева накостьная сбѣдается.

И и и 2

§. 1040.

§. 1040.

А что накостьная плева болячками повреждена, и кость подъ пѣми пухлинами (1036) уже испорчена, попому знашь можно, ежели боль прежде сильная будучи, со всѣми вожженія знаками шопчасъ пропадеши, а больной тяжесть почувствуеши (85). Также глубоко подъ кожей и подъ мясомъ волнующуюся мокроту перстомъ почувствовать можно, и временемъ кожа перемѣнивши цвѣтъ свой приподымается. Ежели же, что на кости попорнившееся, и гнилость ежели обширна будетъ, а не шопчасъ разрѣзавши кожу и мясо искоренится, или, ежели болѣзнь глубоко, и въ такомъ мѣстѣ будетъ лежать, куда желѣзо безъ опасности дойти не можетъ, по тяжкія болячки и фистулы подѣлаются, которыя многочисленныя межъ мышками и въ ихъ плени клѣпчестой подойдуши, и далеко отъ начинанія пораспустятся, а послѣ того въ которомъ нибудь мѣстѣ прорвутся. Я уже выше сказалъ (899, 951.) что сіи болячки и фистулы, ежели кость не будетъ вылѣчена, не залѣчиваются.

§. 1041.

Экзостозисъ хорошая (1032) никогда не дѣлается напрасно, развѣ отъ удару, и ежели плева накостьная расслабнеши или повреждена будетъ, а припомъ и самая кость тяжко ушибена; чего ради чаще на головѣ и на берцѣ дѣлается, понеже эти кости одними перепонками покрытыя сплошь защищены бывають. Будто бы скирръ хорошій (262) почитается родъ сей опухоли, ибо въ ней остановившаяся маперія безъ всякаго опасенія быть можетъ. Одна

Однакожъ опухоль можетъ дѣлать нѣкоторую досаду, ежели она подъ мышками лежащъ будетъ, которымъ въ движеніи и дѣисвіи препятствовать можетъ (*). Ежели опухоль внутрь черепа выростетъ, то она мозгъ давитъ, и въ должноти его вредъ дѣлаетъ (**).

(*) Смотр. ПЕИТЬ тамже Т. 2. стр. 434.

(**) Смотр. примѣч. САЛТЗМАННОВО въ дѣлахъ Санктпетербургскихъ 1728. года. стр. 274. экзостозизъ хорошую на кости шланной описываетъ ПЕИТЬ тамже стр. 385.

§. 1042.

Изъ познанныхъ причинъ этой хорошей опухоли примѣны имѣть можемъ слѣдующія. Ибо дѣлается, ежели ударъ какой, или падежъ, плеву на костную сильно досадитъ, а особливо, ежели это случится у челоѡка здороваго, и хорошаго сложенія, и ежели, какъ вожженіе утолитъ а болящій отъ опухоли никакой боли не чувствуетъ. Да она хоть и застарѣетъ, лѣченія не требуетъ.

§. 1043.

Экзостозисъ зловердная иногда также отъ наружныхъ случайныхъ причинъ дѣлается, и ежели кость небольшая, или неплохая и печуристая сильно зашибена будетъ (*) (526). Но чаще отъ соковъ, которые отъ нѣкоторой болѣзни по всему шѣлу распространившейся попорчены будутъ. Она часто въ костяхъ жесткихъ и дудковатыхъ, а иногда и въ ноздреватыхъ дѣлается. Ибо нѣкоторое различіе въ родахъ болѣзней обыкновенно бываетъ. Ежели челоѡкъ цынгою гораздо будетъ зараженъ, и оная икакъ далеко дойдетъ, что кости и ихъ плевы заразятся, по большой части безъ опухоли отодравши и сѣвши

И и и 3

пле-

плесу на костную, сѣдаются и опадываютъ надростки и кости; которыя по естеству не плотны и печуристы, гнилы набиваютъ. Рахипидомъ то есть Аглинскою болѣзною больны бывають, у нѣхъ также надростки, и оныя неплотныя и печуристыя, а сверхъ того маленькія на перстахъ, косточки цѣлыя вокругъ распухаютъ. Экзостозисъ рѣдко послѣ хорошей воспы приключается а чаще отъ болѣзни блудоѣйной родится, и ежели она, по неразумію врачующихъ, и чрезъ худыя лѣченія, а особливо безвременно даванными лѣкарствами, изъ ртутіи [изъ меркурія] составленными, дражна будеть. Однакожъ часто одна болѣзнь къ другой приключается, какъ на примѣръ человекъ, которой прежде Аглинскою не могъ, а теперь цынготную или блудоѣйную болѣзнь будеть имѣть, въ такомъ случаѣ оныя опухли обыкновенно прегадки бывають. Не лучиѣжъ и у нѣхъ бывають, которые на какой нибудь шлессной части сильныя болячки, и ошворенныя раки имѣють.

(*) Смотр. достопамятный случай въ Ком. К. А. Наукъ 1706 году стр. 318, и у ПЕТИТА тамже стр. 388.

§. 104.

А что экзостозисъ зловредна, по той болѣзни узнать можно отъ которой она родилась. Припомъ же она чаще дѣлается на костяхъ, которые не многими мышками, да только одними перепонками, прикрываются. и воздушнымъ озлобленіямъ подвержены, чего ради на головѣ, на берцахъ чаще бываетъ. Опухоль сначала помаленку, и конечно меньше, нежели шюфъ, болитъ, болѣзнь же отъ всякой теплоты, ночью

ночью и опѣ теплоты поспѣльной сильная бываетъ. Боль такая бываетъ, какая обыкновенно случается, когда перепонка на костная повреждена бываетъ. Но послѣ какъ злая матерія кость всю сожретъ, боль, сдѣвши плесву, почти ушояется (1040).

§. 1045.

Подлинная экзостозисъ, а припомъ отъ влудѣйной болѣзни здѣлавшаяся, рѣдко лѣкарствами, да и самому меркурію повинуется, чего ради ежели она боли не дѣлаетъ, преизлишнее дѣло есть, еще же и вредное, различными лѣкарствами ее дражнить. Гдѣжъ великая боль дѣлается, то кость, ежели хорошо то здѣлать можно, надлежитъ обнажить, и все мясо посрѣзать и костную опухоль частіюхонько дирочками испровергнуть. А какъ глубоко шипикомъ и буравомъ просвердливаетъ должно, оное сокъ и опилки показываютъ. Подѣлавши дирочки, рѣзнымъ рѣзцомъ опѣ одной дирочки до другой, молоточкомъ пробивать, чѣмъ на серіодочка межъ обѣими находящаяся, вывалилась. А то, что еще останеся, ножикомъ выскрестъ, и все поврежденное искоренить должно такимъ способомъ, о какомъ пошчасъ, какъ до червотчины костной приду, предложу (*). Ежели же порокъ, и до другой костной части дошелъ, и все поврежденное, все цѣло взять вонъ не возможно, то по длинно онаго вылѣчить не возможно, но ежели опухоль въ составѣ будетъ, по излѣченіи первой болѣзни, членъ отрѣзать должно. Никакой надежды нѣтъ и въ другихъ болѣзняхъ, въ цынгѣ застарѣлой, и гдѣ цѣлая кость распухла (1032) или сверхъ естества хрупки здѣлались (1032). Пищею и лѣкарствами

ни

ни чего другаго не дѣлается , только что болѣзненное стремленіе протягивается.

(*) Лѣченіе такое предложилъ ПЕТИТЬ на вышепоказанномъ мѣстѣ стр. 388 и 518.

§. 1046.

Отъ сихъ же костныхъ опухолей близкой тогда переходъ есть къ червоточинѣ или гнилости костной. Гниль кость начинаеть , ежели плева , которою кость покрывается , отъ кости отдѣляется , или , ежели она какъ гной дѣлается , портится , а что это отъ многихъ болѣзней и отъ различныхъ причинъ случается изъ вышесказанныхъ (1032) явственно. Болѣзни , которою болящій страждетъ , и разсужденіе причины ея , съ другими знаками , показываетъ , что перепонка наkostная повреждена , а между первыми сія первую признавается , ежели мѣсто , которое напредъ того сильно и безпрестанно болѣло , перестанетъ болѣть (1040). Тоже значить кожа , ежели одупловата будетъ свинцовая , и мягкая , и ежели подъ нею мокрота отъ давленія волноваться будетъ , и ежели пиягоси матеріи и горячка небольшая а внутри нѣкоторыя покальванія , чувствуются.

§. 1047.

Гдѣ кость , отъ дѣлавшихся сильныхъ болячекъ , или фистулъ , повреждена , оное познавается по дикому мясу , которое нарастаетъ , и сквозь которое безъ прудности и безъ боли спичка проходитъ. Родится оно изъ жилъ быющихъ и жилъ кровообращательныхъ тѣхъ , которыя по естеству изъ плевы наkostной въ кость проходятъ , и которыя , понеже
кость

кость испорпилась отъ нее отдѣлились. Для этого дикаго мяса и для того, что какъ оно выростетъ, кожа вмѣсто сходитъ, край у болячки заворачиваются. Изъ нее печетъ полугной острый, сизый, черный, несносный и мертвопахнущий смрадъ отъ себя производящій (897). Ибо мокрота, какъ то о болячкахъ сказано (894), изъ поврежденныхъ жилочекъ быющихъ устьицевъ разорванныхъ испорченая выходитъ, а съ худой смрадъ, отъ испорченнаго и ржаваго мозга губильнаго костнаго приключается. Для этого ржаваго полугной прикладываемые пластыри, и опускаемыя въ болячку серебряныя спички чернѣютъ (574). Въ тойже самой избѣденной кости и кусочки ощупываются. Спичкою чувствуется кость шероховатая, неровная и на губку похожая. А что сѣ болячки и фиссулы прежде того не залѣчиваются, доколѣ кость здорова не будетъ, въ другомъ мѣстѣ показано (899). Такія болячки, ежели и здоровыми уже кажутся, прорвавши, наведенный на нихъ струпъ, опять отпрыгаются. Этотъ струпъ, подъ которымъ еще все невыздоровѣло, обыкновенно бываетъ мякоть, сквозенъ, и чуть только кожу прикрываетъ. А гдѣ струпъ на кости цѣлой здѣлается, шовъ плосенъ и жескъ бываетъ и впадиною.

§. 1048.

Костижъ испорченной скорое и непротяжное познаніе есть, ежели обнаженную ее глазами видѣть можно. Кости неповрежденной и живой цвѣтъ бываетъ изъ бѣла синеватъ, какой имѣетъ плена глазная наружная, который цвѣтъ въ младенческихъ костяхъ нѣсколько больше кровавъ. Ибо этотъ цвѣтъ кости получаютъ отъ крови жилами быющими и

і і і

жи-

жилами кровевозвращательными въ нихъ втекающей. Кости же иногда бѣлы бываютъ, на известъ похожи, когда онѣ отъ недостатка пропитанія своего умираютъ. Это случается, ежели онѣя жилы бьющіяся скрозъ дирочки большенькія въ кости проходящія, и костямъ и мозгу костному пищу и кровь дающія, перерублены будутъ, или, что чаще случается, отъ великой опухоли придавлены бываютъ. Впрочемъ же то, что въ кости умерлое находяща, бываетъ жирное и очень свѣтлое отъ мозгу костного, кооторой изъ нее выходитъ. Мозгъ костный, ежели очень испортился, и будто бы весь масляный ржавый бываетъ; напоследокъ черному кости дѣлаются съ безобразною и несносною вонью. Гниль въ кости также разширивается, какимъ образомъ выше о мертвости сказано (55). Всякая кость, своею плевою неприкрытая, какъ подъ перстомъ, такъ и подъ спичкою, шероховата и неровна чувствуется, ибо оное отъ худого и испорченнаго соку извѣдено и источено.

§. 1049.

Кости гниль начинаютъ отъ всего того, что плеву накопную, и самыя кости, и шѣ жилы бьющіяся и жилы кровевозвращательныя, кооторыя пищу костямъ даютъ, поршивъ (1032, 1033). Того ради, ежели мѣсто такое, подъ копорымъ кость лежитъ, больно зашибено, или глубокою и до самой кости проходящею ранюю, чирьемъ безверхушешнымъ, болячкою, фистулою повреждена будетъ и раскинется, кость гниль начинаетъ. Оное также случается отъ вреда по всему тѣлу разпространившагося, а особливо отъ блудѣйной болѣзни, копорымъ всѣ тучнѣйшія и масляныя части въ тѣлѣ портятся (*).

Также

Также гниль въ кости приноситъ цынга, ежели она застарѣетъ, и послѣ другой застарѣлой и блудобѣйной болѣзни придетъ, иногда также остропа, ежели она въ какой тѣлесной части, а особливо въ груди заведется, и тѣмъ ребры портятся. То также сплошъ случается, ежели отъ худой воспы злая матерія на надкостную плеву склонится. Рахипическія кости, ежели испортятся, то онѣ не такъ гниютъ, какъ остью вътреною [спина вентоза] болятъ (1039).

(*) Смотр. у БЕРГЛАВА въ Предисл. на Афродизіака.

§. 1050.

Легко гнилости костной избавляются люди, которая отъ причинъ бываетъ снаружи приключающихся, а отъ той гораздо труднѣе, ежели здѣлается отъ испорченнаго тѣлеснаго состоянія. Сноснѣе бываетъ, которая на крѣпкихъ костныхъ частяхъ случается и на верху, нежели та, которая на костяхъ неплотныхъ и печурисныхъ (1018) дѣлается, и глубоко проходитъ. Ибо въ костяхъ такихъ и въ печурочкахъ ихъ поскорѣе гниль расходуется, да и кость не легко сухою здѣлать можно; а то очень надобно, ежели испорченное отъ цѣлаго отдѣлить хочется (1035). А притомъ другой страхъ шупъ бываетъ, ежели такое зло въ костяхъ ноздреватыхъ не далеко отъ составовъ будетъ, чѣмъ испорченная влажность въ составы не запекла. Сверхъ же того близъ составовъ многія мышки и сухія жилы на костяхъ кончатся, и составы связками связываются и держатся, не безъ трудности можно кости открывать, для чего въ такихъ мѣстахъ гниль, ежели глубоко лежитъ, иногда неизлѣчимою бываетъ. Хрящъ также, ежели будетъ испорченъ, никогда не зарастаетъ

спаетъ ; а впротчемъ и отъ него высушеннаго , такъ какъ отъ кости высушенной чешуйка отдѣляется (1035).

§. 1051.

Младенческія кости особеннаго благоразсмотрѣнія требуютъ. У нихъ имѣются надроспки [аппендицесъ или эпифизесъ] и кромѣ пѣхъ , всѣ довольнымъ сокомъ изнаполнены , для того , хотя гнить начнутъ , хотя вредности внутри наченшейся , и гнилью внутрь костною заражены будутъ , гораздо скорѣе , нежели возмужалыхъ людей , поршятся. Если же накость и самая кость нѣкакъ бывають снаружи досажжены , а шло будетъ здорово , ежели прямо лѣченіе употребится , то иногда никакого слойка , какъ у другихъ , не оплупливается , но кость опять своимъ накостью потчасъ покрывается.

Больше знающіе въ дѣлахъ такихъ пусть рассмотрятъ , можетъ ли извинится ХЕСЕЛДЕНЪ въ томъ , что онъ написалъ , что у дѣвочки девятилѣтней , у которой буравомъ кость высвердена была , дыра почти въ десять дней костью заросла , въ Остеографіи гл. 1. который случай иначе представилъ инъ те Анатоми офъ те Гуман. Боди. Изданіе четвертое стр. 48. Ибо его крайнѣ уличаетъ ДУГЛАСЪ инъ те Анимадверсионъ онъ те Хеселденъ Остеографіа стр. 6.

§. 1052.

Ежели кости гнилью поврежденныя лѣчить хочется , завсегда мнѣніе свое къ тому склонять надлежитъ , чтобъ порокъ въ сокахъ имѣющійся , пристойными лѣкарствами испребить , и чтобъ все , что ниестъ въ кости испорченне , опняятъ , и отъ здороваго отдѣлить. Ибо ежели то , что останется , шло будетъ , то и кость новою плесвою покроецца , а ма оставшаяся костью исполнится.

§. 1053.

§. 1053.

Гниль костную отъ наружной причины полученную легко можно излѣчить. Въ такомъ случаѣ, ежели человекъ здоровъ, почти всѣ лѣкарства напрасны, только надобно пищу употреблять по немножку сухой, а не похлебошной, мяса неваренаго, но жаренаго. А при томъ лѣтъ человѣческія разсуждать должно. Ибо спарикамъ и сухощавымъ пищу употреблять надобно, въ которой больше сыпоссти находилась.

§. 1054.

Ежели же гниль костная отъ блудѣйной болѣзни произошла, то эту болѣзнь прежде всего лѣчить надлежитъ. Однакожъ знать должно, что и меркурій [ртуть] не всегда въ такихъ костныхъ поврежденіяхъ, ежели онъ глубоко будуще, и застарѣющъ, пособствуетъ. Да еще чрезъ примѣчанія открылось, что многія изъ меркурія приготовленія, для лѣченія прежде изобрѣтенныя, иногда сѣи костныя болѣзни въ худшее состояніе приводятъ. Въ одно время, хотъ этому противиться никто не спешитъ, внутрь даваемымъ, или снаружи мазаннымъ меркуріемъ по большой части оныя на костныя опухоли (1036) разрѣшаются, въ другое время также чрезъ такія лѣченія кость испорченная суха дѣлается, и отъ нее цѣлое отдѣляется (1035). Однакожъ гдѣ гниль или червопочина глубоко опустится, и будетъ вонять, то рѣдко лѣченіе благополучно бываетъ, ежели рукою тому не будутъ пособствовать. И для того оное лѣченіе часто обманывается, когда оныя ноздреватыя, какъ то поднебенныя, кость рѣшешообразная, слезныя, испорчены бываютъ. Въ

і і і з

гнило-

гнилости же внутренекостной [въ педарерокаце] эшопѣ способѣ лѣченія еще меньше пособствуеѣтъ, да еще иногда и смертоносенѣ бываетѣтъ. Не иалѣчи-
ваетѣтъ, меркурій и экзоспозесѣтъ. Однакожѣ иногда и между рѣдкостями примѣчено, что эѣтъ опухоли по-
слѣ испонченія крайняго шѣлеснаго чрезѣ саливацію
оспавались, но сухи, и злая матерія исцѣреблена, безѣ чувствія болѣзни (*). Когдажѣ человекѣ уже
долго и многими лѣкарствами изѣ ртути состав-
ленными мученѣ будешѣтъ, то я думаю саливацію
лучше чрезѣ мазаніе мастями, нежели внутрь дава-
емыми различными составленіями, производить, и та-
ковымѣ лѣченіемѣ выцѣдивѣ весь жирѣ шѣло испон-
чиѣтъ.

Смор. у ПЕТИТА въ вышепоказ. мѣстѣ.

§. 1055.

Дѣлаютѣ также пособіе иногда пійя, кото-
рая отѣ блудѣбной болѣзни просто похлебываются
и пьются: Однакожѣ въ случаяхѣ опчаянныхѣ, и
гдѣ лѣченіе сѣ ртутью не пособствовало, иногда
сказываютѣтъ пособствовалѣ декоктѣ крѣпкой изѣ де-
рева бакаупова. Надобно же, чтоѣ декоктѣ оный
очень силенѣ былѣ, и чтоѣ больной однимѣ имѣ
чрезѣ нѣсколько мѣсяцовѣ довольствовался, наблю-
даючи припомѣ крайнее воздержаніе. Ибо въ ку-
шаніѣ приличны сухари, и сухарная сѣ декоктомѣ
пюра. Однакожѣ больной можетѣ временемѣ нѣ-
сколько и изюмцу сѣ пюрькою или сѣ сухаркомѣ по-
кушать. Не опмѣнножѣ надобно, чтоѣ больной по-
вседневно въ сухомѣ жару т. е. въ ваннѣ спиртомѣ
нагрѣваемой потѣлѣ, да и предовольно. Ибо та-
кимѣ лѣченіемѣ способомѣ все мозгное и тучное, что
въ

въ тѣлѣ ни находится, и въ которомъ мѣстѣ зло оное обитаетъ, какъ я объявилъ (1049), растворяется, и вонь изводится, и все тѣло до самаго послѣдняго испощенія испощивается. Снаружи въ томъ же декоктѣ обмоченныя и выжатыя суконки теплыя прикладываются, быть могутъ,

(*) Смѣтр. ДЕ ГУТТЕНА о деревѣ Святомъ [бакаутѣ] въ Коллект. ЛУИЗИНІЕВЫХЪ стр. 273. и далѣ, и у БЕРГААВА въ Предисна поѣ. Но противъ обоихъ ихъ спорить. Пресл. АСТРУКЪ въ вышесказ. мѣст. Т. 1, кн. 2, гл. 11.

§. 1056.

Ежели же человекъ уже блудодѣйною болѣзнію одержимъ, а къ тому еще и цынга приключится, тушъ много труда требуется. А то можно знать пошому, ежели, съ другими худыми знаками, на болячкахъ не будутъ сгруппы, на возгри схожія, но цвѣтъ сизой, или черной имѣющія, ежели ихъ подраздеришь, и потчасъ изъ нихъ кровь будетъ печь, ежели зубы будутъ испорчены, а послѣ того худыя болячки на деснахъ подѣлаются, нѣсколько чистыя, но съ кровью, которая изъ нихъ течетъ, красноватая и черная съ вонью, и ежели по всему тѣлу пѣшна, также черная, разсѣяны будутъ. Въ этомъ случаѣ прежде о излѣченіи цынготной болѣзни стараться надлежитъ, которая ежели излѣчена будетъ, начатъ давать лѣкарства, отъ болѣзни блудодѣйной пособствующія. Изъ меркурія составленныя лѣкарства цынготнымъ больнымъ смертоносны бывають.

§. 1057.

Ручное же лѣченіе, которое къ гнилости костной требуется, также не одинаково. Ибо ежели отъ причины снаружи приключившейся нагнетная плес-

ва будетъ разодрана, къ тому способъ лѣченія отъ БЕЛЛОСТА (*) изданный и выше предложенный хорошъ, кошпорымъ дѣлается, что тотчасъ кость новою плесою изъ кости еще цѣлою одѣнется (524, 525, 1038). Ибо, при храненіи сего способа въ лѣченіи, не надобно, чтобы высушивши кость слоѣкъ оплуплялся.

(*) БЕЛЛОСТЬ хирургенъ д'опиталь гл. 12.

§. 1058.

Гдѣ же это не вскорѣ послѣ приключенія вреда дѣлается, и вышняя кости часъ уже воздухомъ, гноемъ, лѣкарствами испорчена будетъ, надобно чтобы слоѣкъ оный оплупился; и такъ слоѣкъ долженъ оплупиться. Къ его отдѣленію много пособствуютъ вещи сушашія. Первое есть, всячески стараться всякому воздуху (389), также водному и жирному, а припомъ и самому гною, не давать приходить, да такъ, чтобы кость всегда суха была. Можно посыпать ее мастиксомъ, колофонією, янтаріомъ, роснымъ ладономъ, галбаномъ, да и оными сухими и долго и мѣлко шерпыми. Сверхъ этого накладывать пряжу сухую, и спиртъ чистой кости неврежденъ, ежели онъ неводянь; въ немъ можно пряжу помачивать, выжимать и прикладывать. Все общее есть то, что я въ нѣкоторомъ мѣстѣ представилъ, однакожъ то дѣль весьма надобное, кость такъ обнаженную очень рѣдко (376), и великую употребляючи скорость, и подсыпавши жаровню, перевязывать належащъ, и все, что ни будетъ прикладываться, сперва на огнь погрѣть должно (390, 525).

§. 1059.

§. 1059.

Ежели кости нѣкоторая часть уже будетъ гнилью сѣбѣдена, и такое зло нѣсколько глубоко поопуститъся, тушѣ усиленнае лѣкарство прѣбуется. Ибо прѣжде всего надлежитъ кость обнажитъ, и ежели гниль будетъ болячки ширѣ, мясо подрѣзать, покуда со всѣхъ сторонъ она, и здоровыя костяныя края не окажутся, тогда все поврежденное лѣчить. А лѣченіе произходитъ лѣкарствами пристойными, рукою и орудіями. Между первыми не весьма крѣпкими считаются, эссенція аристолохіе, мірре, алоесъ, олеумъ лигни санкти, [бакаупное масло] каріофиллорумъ [гвоздишное]. Очень хорошо эссенцію аристолохіе смѣшивать съ масломъ гвоздишнымъ, которое составленіе также полезно, ежели кости нѣбныя сѣбѣдены будутъ (916). Сильнѣйшаго рода признается Евфорбіумъ, которою или тертою посыпають, или съ спиртомъ смѣшавъ, примачивають.

§. 1060.

А между тѣмъ весьма крѣпкими лѣкарствами поспавляются, которыя изъ ликворовъ, или называемыхъ спиртовъ кислыхъ состояются, спиртусъ випріоли, или сулфурисъ, флегма випріоли, и оное БЕЛЛОСТОВО составленіе, въ которомъ ртуть съ водою крѣпкою распускается, водою попутниковою разжиживается, и кисточкою помазывается (*). Все сіе прикладывать надлежитъ гораздо осторожно, да и такъ, чтобъ ими мяса, сухихъ жилъ, жилъ чувствительныхъ, и того, что еще отъ плевы на костной цѣлое осталось, не повредить, ибо такой случай и боль и великое вожженіе произведетъ.

К к к

всѣмъ

вѣсть можѣтъ. И не очень долго ихъ употреблять. Конечѣ же быть долженъ, когда до здороваго и неповрежденнаго дойдѣшь.

(*) Смотри. ле драгъ прим. Т. 2 стр. 201.

§. 1061.

Ежели же рукою дѣло дѣлать дойдѣтъ, надлежитъ все оное, что попортилось, скребкомъ (*) кѣтому способнымъ сскрѣсть, покуда до цѣлаго мѣста не дойдѣшь. Ежели гниль будѣтъ нѣсколько глубока, должно орудіе посмѣляе приписнуть. А пересѣпать, когда кровь покажется, и кость плотность имѣть начнетъ. Ежели кость по то мѣсту, покуда повредилась, выскребется, тогда ея посыпать должно лѣкарствами сушащими, шеперь предложенными (*).

(*) Смотри. у ГАРЕНЖОТА десь ист. Т. 2. стр. 96. Диссертация мои о фистулѣ слезной фиг. 18.

§. 1062.

Ежели кость крѣпкая и дудковатая, какъ напримѣръ берцо, повреждена будѣтъ, что гниль наскрозь пройдетъ и до самаго мозга: то гораздо лучше кость буравчикомъ, и ежели понадобится, здѣлавши много дырочекъ, вырѣзать, и послѣ того поосторожнѣе сскрѣсть, и другіе способы употреблять, которыми то, что испортилось, исправляется. Гдѣ гниль по всей кости разоидѣтся, или ежели вредность велика или обширна, или подъ мясомъ скрыта будѣтъ, и открытъ се не возможно, надлежитъ удѣ отрѣзать.

§. 1063.

Кости гнѣющія также раскаленнымъ желѣзомъ прижигаются, и чрезъ то скорѣе дѣлается, что поврежденное засыхаетъ, и отлупливается (1035). благопо-

тополучно это дѣлается, ежели гниль на кости крѣпкой дудковатой и глубоко пройдетъ, а припомъ мокра и вонюча бываетъ. Къ кости такъ прижатой не надобно ничего другаго прикладывать, только что пряжу сухую, или спиртомъ, въ которомъ нимаѣхонько воды нѣтъ, помоча, отъ чего чешуйка еще суше дѣлается.

§. 1064.

При всѣхъ лѣченіяхъ сихъ нѣчто примѣчать надлежитъ. Ежели лѣкарствами или раскаленными желѣзами кость прижигается, или хотя и скребкомъ выскребается, больше силы прикладывать на срединѣ болячки, нежели на краяхъ ея, чрезъ то вездѣ сила снаружи употребленная попорченое въ глубинѣ ероветъ. Желѣза, которыми кости неплотныя и печуристыя прижигаются, больше раскалывать должно, нежели тѣ, которыми крѣпчайшія. Выше (1050) я уже сказалъ, что весьма худой родъ гнилости въ этихъ костяхъ неплотныхъ и печуристыхъ, какъ напримѣръ въ грудной кости, и для того всѣ сіи помоществованія, хотя бы лѣченіе и хорошо удалось, рѣдко кость совершенно здоровою дѣлаютъ. Гдѣ отъ кости часть, или чешуйка, отдѣляться начнетъ, то она шатается, и больной боль почувствуетъ. Хорошо оное шатающееся, самою рукою полегоньку попрогивать, тѣмъ оно лучше отдѣлится. Кость потому узнать можно, что отъ всей вредности свободилась, ежели яма мясомъ настоящимъ и жесткимъ заростетъ, и сгрупъ на немъ дѣлается плотной и впулкой (1045).

§. 1065.

Слѣдуетъ теперь мнѣ сказать о внутрь костной гнилости или ости въпренной [педарѣрокаце, или спи-

на венпоза], о которой я (1032) объявилъ, что отъ испорченнаго мозга, костнаго, а особливо въ костяхъ ноздреватыхъ. Иногда случается, что сей вредъ отъ приключившагося снаружи досажденія дѣлается, ежели кость неплотная сильно зашибена будетъ, или расколется, что изъ перерванныхъ маленькихъ жилочекъ бьющихся и жилочекъ кровезовращательныхъ кровь въ костныя печурочки запечетъ, или, что въ наkostной плевѣ внутренней и въ другихъ плевахъ, которыми клепочки внутри одѣваются (1031). Возжигеніе дѣлается, которое, ежели къ загноенію склонился, эпою злою самой кости болячностію оканчивается. Того ради эпо также случается можетъ у взрослыхъ въ томъ переломѣ родѣ, въ которомъ кости самыя крѣпкія не такъ переламываются, какъ, только до самаго мозга костнаго раскалываются. Ибо эпою щелью повреждаются плевы, въ которыхъ оба мозга костныя, какъ оной густой, такъ и другой нѣжнѣйшій, содержатся (1031). Чаше же ость вѣтрена [спина венпоза] изъ испорченныхъ соковъ дѣлается. Рѣдко это случается у людей блудодѣйною болѣзнію страдающихъ, у которыхъ оныя вышеписанныя опухоли (1036, 1043) и гнилости (1046) обыкновенно чаще бываютъ. Но особливо въ нынѣшнемъ вѣку эпо болѣзнь ходитъ по костямъ у ребячьихъ и такихъ, которые рахитизмомъ мучаются.

(*) Смотри случай, выше § 526: мною представленный. На грудной кости это не рѣд о бываетъ (717). На берцѣ также, куда принадлежитъ повѣсть изъ ПЕТИНА, представленная (1042). Объ ономъ переломѣ родѣ, когда и великія самыя кости раскалываются, много написалъ ФЕЛИКСЪ ВУРЦЪ. инд. дер. Вунд-Арцней. въ г. 28 стр. 256. Также мозгъ костный повредиться можетъ, когда кость поперегъ переломлена. будетъ, а далеко разойдется, и прямо не

испра-

исправится. У меня есть берцо въ сохраненіи челоѣка взрослого. Оно давно съ дудкою поперегъ пополамъ переломлено было. Когда же кости переломлены не прямо на свои мѣста вправлены были, и концы тѣхъ у нихъ остры были, когдажъ другіе нѣкоторые обломки отъ нихъ отдѣлились, то родилась на томъ мѣстѣ превеликая болячка и фистула, которая чрезъ многие также года до самой смерти была. Уже кости тѣхъ, которыя не прямо вправлены были, наискось, а не напротивъ, межъ собою срослись, и на срединѣ крѣпкою мозолью скупѣлись, однако дыра осталась такая, которая внутри кости и до шутяго мозга костяного проходила. Ибо по середкѣ берцо переломлено. А что мозгъ въ кости испорченъ былъ, то и нынѣ по чернотѣ видѣть можно, въ берцѣ вдоль распиленомъ на нижнемъ концѣ въ ноздреватомъ мѣстѣ, куда испорченная мокрота стекалась.

§. 1066.

Уже я выше объявилъ, что въ семъ болѣзніи рѣдѣ, особливо, ежели отъ худаго въ шлѣбъ состоянія родится, портятся кости неполныя и ноздреватыя, а некрѣпкія и дудковатыя, какъ то въ вкзостозѣ отъ блудѣйной болѣзніи обыкновенно начинающейся бываеѣ. А понеже сіи вредности отъ самаго маленькаго начинаюся, по начинаніе ихъ и въ бѣльшее возвращеніе разсудить надлежитъ. Въ той силѣ я объявляю, что распухаютъ надроспки подлѣ составовъ и подлѣ другихъ костей, гдѣ онѣ по естеству бывають толще и внутри ноздреватѣе, особливо маленькіе перепные на ногахъ и на рукахъ. Боль въ самыхъ костныхъ мозгахъ начинается съ начала помаленьку, но таже самая потчасъ увеличивая опухоль, пріумножается, и почти непрерывно болянаго мучитъ. Въ это время костная плева еще испорчена не бываеѣ, и мышки и кожа невредимы. Но когда боль пріумножится, и почти нестерпимою здѣлается, тутъ больше худаго заключается, и изъясного будетъ значить, что злая машерія внутри здѣ-

К к к 3,

лас.

лавшаяся плесу накопшную грызешѣ. Нечаянно, какѣ выше сказано (1040), боль перестаетѣ, и потѣмѣ безѣ опухоли и безѣ знаковѣ вожженія подѣ кожею чувствуется гной, который какѣ подавишь вокругѣ шатается. Гной же сжали прѣумножился, то кожа обыкновенно приподымается. Прорѣзавши кожу, великое множество гною и полутною смердячаго вонѣ выходитѣ, какѣ тѣ выпекутъ, и опустишь туда спичку, то кость обнаженную и поврежденную ощущаешь (1047).

§. 1067.

Когда же такимѣ вредностямѣ костнымѣ въ эпакихѣ лѣтахѣ рахитическіе люди подвержены бываютѣ, то кажется очень надобно, сей лютой болѣзни родѣ, и ея собственности, причины, начало и конецѣ знать. Эта болѣзнь наибольше у младенцевѣ случается, и начинается у нихѣ обыкновенно около шести мѣсяцовѣ отѣ роду. А по прошествіи двухѣ или трехѣ лѣтъ младенцамѣ, рѣдко приключается. Тѣло въ шукѣ нейдетѣ, но какѣ дѣлается сухотка, кожа и мясо пропадутѣ, и высохнутѣ, брюхо дуетѣ, и дѣлается какѣ барабанѣ шуго, что перстомѣ продавить не можно. Кости толще спавляются, и особливо надроспки близѣ составовѣ распухлы бываютѣ. Ребята также и подростшии ходитѣ за крайнею слабостію не могутѣ, а припомѣ у нихѣ зубы позже вырѣзываютѣся, потѣмѣ часѣ черны дѣлаются, шатаются и выпадаютѣ. У эпихѣ же ребятѣ, въ разусжденіи лѣтъ ихѣ, немалая остропа въ разумѣ и переимчивость обыкновенно бываетѣ. Когда же постарѣе подростаютѣ, мало растутѣ, голова велика весьма бываетѣ, и черепа головного

швы

швы, гораздо будучи широки, сывороткою спаиваются. Грудь съ боку вдавлена напередъ или передъ себя торчитъ, и будто бы заостренная и выпуклая дѣлается. Такожъ реберныя концы распухаютъ, и на нихъ желвачки жесткіе нарастаютъ. Если же зло такое усилился, и не съ начала болѣзнь захвачена будетъ, то и другіе уди начнутъ въ безобразіе приходить. Особенно же хребетная кость потерпитъ, и на спинѣ горбы подѣлаются, бедра согнутся, и напередъ дугою выгнутся. На послѣдокъ зло въ костяхъ находящееся, которыя худая мокрота сѣбѣаетъ, больше возрастаетъ, и дѣлается внутрь костная гниль [пс-дарерокаце]. Приходитъ продолжительная горячка, которая у человѣка непрерывно будетъ продолжаться, которою человѣкъ будучи долговременно боленъ, и крайнею сухостью изсохъ умираетъ. Когда же болѣзнь смертию не оканчивается, то она со временемъ въ облегченіе приходитъ, и особенно отъ хорошаго и приличнаго кушанья и вина и движенія пѣлеснаго, есѣ знаки у взрослыхъ поменьше умиляются. Костныя безобразія нѣсколько также поправляются, ежели по времени въ жилахъ чувствительныхъ и въ мышцахъ малосильныхъ и почти пропадашихъ новая крѣпость, и сила окажется.

§. 1068.

Въ пѣлахъ рахитидомъ умерщвленныхъ находящіяся желѣзы почти всѣ, пасочными [лимфатице] или шаровидными [конглобате] называемыя, жесткіи и изъ склѣвишейся нѣкакой матеріи склерозны, а особливо въ брыжейкѣ. Кости не обычайно мягкіи бываютъ (*), мышки испотченны, внутренностныя же части и предъ прочими мозгъ головной пятгостію

ни-

наполненѣ , въ которыхѣ также мокроты много воз-
трямѣ подобной находится.

(*) Чѣмѣ кости мягки дѣлались , съ ГЛИССОНЕМЪ многе
не вѣряѣ и противятся , а то самое представляетъ руvшii въ
Адверс. въ десяткѣ 2 примѣч. 6, и БЕРТЛАВЕ въ Химii Т. 4
стр. 737.

§. 1069.

Ежели лѣченіе этой болѣзни опѣ видимыхѣ при-
чинѣ , отбросивши всѣ потасенныя , начать кто воз-
намѣрился бы , то ей подвержены бываюѣ младенцы,
которые родятся опѣ малосильныхѣ родителей , весь-
ма празднодѣльнымѣ житіемѣ , и прохладными пиро-
ваніями изнуренныхѣ , и въ различныхѣ также долго-
временныхѣ болѣзняхѣ измучившихся. Въ эту болѣзнь
также попадаюѣ ребятка , которые нѣжнымѣ моло-
комѣ кормятся , сырымѣ и худымѣ , и которыми ,
когда опѣ молока опнимаются , даюѣ въ побродягахѣ
ихѣ непрестанно днемѣ и ночью пить прокисаемое ,
или также подслащиваемыя сахаромѣ сластѣны. Мно-
го туѣ вреда дѣлаетѣ пища , ежели она сыра будетѣ
и крѣпка такѣ , что ее слабыя внутренности сварить
и въ хорошей сокѣ питательный обратиѣ не могуѣ ,
а особливо жирныя и клейкія крупки , также слапкия
закуски и всякія каши или саломаты. А припомѣ пи-
щи тѣлу молоденькому пристойной дѣлать не можно,
когда зубы съ превеликою мукою прорѣзываются , и
ежели разныя глисты въ кишкахѣ бываюѣ. Не надоб-
но жѣ забыть , что ребятамѣ ничто такѣ сильно не вре-
дитѣ , какѣ то , ежели не наблюдаюѣ около ихѣ чи-
стоты , и грязь и внутреннее испраженіе , которыми
кожа обыкновенно пачкается , благовременно , не омы-
ваются. Съ и много еще другихѣ причинѣ , о чемѣ
у до-

у Докторовъ спрашиваться должно , ежели болѣзни не причиняютъ , однакожъ тѣло младенческое къ ней наибольше склоннымъ дѣлаютъ , ибо сія болѣзнь рѣдко отъ одной и простой причины , но больше отъ собранія многихъ , дѣлается.

§. 1070.

Изъ всѣхъ же сихъ , я думаю , видно , что сокъ оный , которымъ все тѣло , также и кости питаются должны , въ нихъ изъ сыраго и испорченаго питательнаго сока здѣланный портится . И такъ кости , которыя впрочемъ отъ кислоты распускаются , мягче бывають и распухаютъ , и понеже голова изъ костей складывается , она также , въ разсужденіи всего тѣла , наибольше велика дѣлается такъ , что тяжестью ея хребетная кость не мало давится . Хребетной кости позвонки , которые въ срединѣ дыравы , ежели распухнутъ , и головою внизъ давятся , спинальную жилу припскиваютъ отъ головного мозга продолжающуюся , также жилы чувствительныя , которыя отъ нея скрозь маленькія дырочки съ обѣихъ сторонъ между двумя опростками проходима вонъ выходятъ . Когда же сіи жилы чувствительныя , къ мышкамъ наипаче принадлежатъ , то мышки въ естественной крѣпости слабѣвъ изсыхаютъ . Того ради , когда кости подростаютъ и пухловатѣе дѣлаются , костные же оковы , или какъ по называютъ связки , также некрѣпки бывають , мышки корочія и испорченныя кости сводятъ и корчатъ . Это первое въ хребетной кости дѣлается , которая въ разныя стороны искривлявшись не одинъ видъ горбовъ на себѣ покажетъ . Также отъ грудныхъ мышкъ и отъ правой большой груди , и самая грудная кость , много выпячивается , (*) . отъ мышкъ чревныхъ грудь къ

Л Л Л

низу

низу пащипся , и на хребтѣ горбѣ дѣлается , или *κυφωσις*.

(*) Хребетной кости и другихъ членовъ безобразія какъ натягиваніемъ различныхъ мышечъ обыкновенно дѣлаются , очень кустозно истолковавъ Преучен. Человѣкъ Іоаннъ ГОДОФРЕДЪ БРЕНДЕЛІЙ въ Диссерт. о рахитидѣ , въ ГЕТТИНГѢ 1739 года. Снеси съ симъ ГЛИСОНІА , МАУОВІА и МАРТИНА ГЕРМАНИА ГЕЙСВЕИТА Диссерт. о причинѣ ближайшей рахитида , въ Лейденѣ 1736 года.

§. 1071.

А понеже въ шакowychъ пѣлахъ немаслиный и созрѣлый сокъ къ костямъ приходишь , но сырой , клейкой и на возгри схожій , отъ него , понеже онъ осядаючи волокна костныя раздираетъ , и испортившись вредъ мозгу костному еще дѣлаетъ , изъ чего напоследокъ родится сей презлой родъ гнилости или педарерокаце , который рѣдко вылѣчивается , а часто причиною смерти бывающъ , гораздо еще большее зло дѣлается , ежели къ другимъ причинамъ и блудоѣбная болѣзнь придетъ , которую младенцевъ или отъ родителей получишь , или съ молокомъ отъ кормилицы насосется.

§. 1072.

Также лѣченіе этой болѣзни отъ Докторовъ требовано быть можетъ. Знать же должно , что пѣ по большей части обманываются , которые употребляючи поспѣшность и отважную нѣкакою дорогою болѣзнь прогнать отваживаются. Наибольшая помощь въ умѣренномъ и пристойномъ кушаньѣ , которое легко сваривается и пряностью изнаполнено , также въ питъѣ хорошемъ и въ движеніи пѣлесномъ состояишь. Снаружи здоровы частыя и сильныя перенія , которыми плывучія пѣла вяжутся. Очень также хорошо шерстяныя толстыя сухонки ладономъ

номѢ , маспиксомѢ , бензоемѢ , ягодами можжевельновыми накуривать , и оными хребетную кость тереть. Унгвенпо нервино [масью кѢ жиламѢ чувствительнымѢ способною] мазать , и потирать можно мышки спонкія и безсильныя. А для поправленія шѢлеснаго состоянія приличны бани , толькожѢ онѢ лучше быть должны холодныя , нежели теплыя. О горбѢ на спинѢ , и какѢ оныя , и какѢ его бострогомѢ или шнурованьемѢ лѣчить , напишу шамѢ , гдѢ о вывихнурыхъ частяхѢ говорить буду.

§. 1073.

Ежели у шѢхѢ людей , у которыхѢ кости отѢ увѣчья [отѢ рахитида] распухли , при убавленіи болѢзни , съ другими здравіеносными знаками , боль въ мозгахѢ костныхѢ новая начнется , и нѢсколько крѣпка здѢлается , отѢ оной можно надѢяться , что человекѢ здоровѢ будетѢ . Ежели же съ эпою болью вырастающею тѢло больше сохнутѢ будетѢ , и въ худое состояніе приходишь , то будетѢ значить , что кость внутри порпится. Ежели кость испорчена , оную тѢмже способомѢ , какой я о гнилѢ костной предлагилѢ , излѣчить можно. Часто испорченное мѢсто не слойкомѢ , но такѢ помаленьку опдѢляется (1035). Съ сими испытывать должно оный декоктѢ Бакауповой , толькожѢ онѢ полезенѢ больше взрослымѢ людямѢ нежели ребятамѢ . Ежели кость такѢ повреждена будетѢ , что онаго никакимѢ способомѢ вылѣчить невозможно , то должно удѢ отрѣзать. ОднакожѢ и это излишнимѢ почѣсть можно , да еще иногда пособитѢ поскорѣе и умереть , ежели порча по всѢмѢ сокамѢ и по всему тѢлу распространившаяся напередѢ чрезѢ другія лѣченія исправлена не будетѢ .

А л л 2

зуб-

ЗУБНЫЯ БОЛѢЗНИ. ДЕНЦІУМЪ морби.

§. 1074.

Изъ костей твердѣйшими костями починаются зубы, которые въ костяхъ ланиныхъ и въ челюстяхъ нижней вонзенны. Въ этихъ десенныхъ костяхъ будто бы клинышки повколочены, который способъ, какимъ кости межъ собою совокупляются, урмфисти Анапомики называютъ. Часть зубовъ, корнемъ называемая, въ пазушкахъ и ямочкахъ держится, и какъ другія кости, также плевою прикрывается, эпою зубы, будучи на срединѣ нѣсколько поширѣ и шероховатѣе къ шѣмъ костямъ привязываются. Ибо осталая зуба часть, которую вѣнкомъ [корона] назвать можно, безплевная есть.

§. 1075.

Въ каждомъ зубѣ двоякую матерію видѣть можно. Одна не много отъ другихъ жесткихъ костей отлична, изъ которой почти весь корень и нижняя часть вѣнка составляется. Она вѣдѣтъ имѣетъ будто роговой. Этой далеко чище есть другая она наружная вѣнка часть, которая слоновокостная изъ волоконъ бѣловатыхъ и прекрѣпкихъ составленная, такъ межъ собою сросшихся, что изънутри на ружу идутъ. Въ корняхъ этой слоновокостной матеріи много имѣется, а въ вѣнкѣ больше. Покрѣдѣ же обоихъ и вѣнка и корневъ имѣется пазушка, плевою своею, будто бы какъ надкостъемъ, обѣтая. На кончикѣ въ корень дырочка имѣется, сквозь которую изъ костей низходятъ и въ кость вонзаются жилы быющіяся, жилы крововозвращательныя и жилы чувствительныя.

спившесныя. Эта дѣла въ молодыхъ людей зубахъ , у которыхъ коренья еще не вѣдѣлись , гораздо видна , а послѣ , какъ коренья ростъ начнутъ , суживается. Пауза она , которая въ корени , очень вѣсна , въ вѣкъ гораздо ширѣ.

§. 1076.

Четыре зуба первые , которыми откусываемъ , или кусамъ томиди , передними или рѣзунами [инцизоресъ] называются , и по бокамъ у сихъ стоящіе два собачьи или клыки [канини] по одному , два коренные первые [моляресъ прѣоресъ] или по одному , или двойные , прочіе коренные тройные и четверные коренья имѣютъ. Зубы задніе поскрѣбушами или зрѣлаго ума [сероини или дентесъ сапѣнціе] называемые , которые по большой части уже въ самомъ возрастѣ рождаются , одинъ толькожъ толстой корень имѣютъ. Однакожъ въ нихъ ничего не премѣнаго имѣтъ. Коренья иногда кривые и различными способами закорюченные бывають , такъ , что ими самая кости часть будно бы испрошпая находишся.

(*) Смотр. ЕВСТАФІА о зубахъ МАЛПИГГІЕВЫ дѣла по смерти стр. 51 Ист. Кор. Акад. Наукъ 1769 года стр. 43. Примѣч. де ла ГИРЬ , ГАГЛАРДА , въ помян. мѣст. стр. 57 , и предъ другими ОШАРДЪ Хирургъ дентистъ.

§. 1077.

Боль , которою мучатся и ребята и болше , у которыхъ зубы рождаются , къ превеликимъ мученіямъ причестъ можно , изъ которой другіе да еще прешажкія и часто погибельныя болѣзни рождаются. Облегченіе дѣлается тогда , когда плева десенная испонтевается и размягчивается. Ради такого случая корень алшейной несполченной , да цѣлой , съ медомъ

Л л л 3

ва-

варяпѣ , и младенцамѣ даюпѣ , онѣ корень потѣ на
 болѣное мѣсто кладупѣ , и жуячи десну потѣ дѣлаюпѣ .
 Въ такое намѣреніе также другія жесткія вещи , ко-
 рольки , волчій зубѣ , корку черствую хлѣбную даюпѣ ,
 которыми они пожевываютъ и играютъ . Также иногда
 спичку обвернувъ пряжею въ медѣ теплой помаки-
 ваютъ , и пѣмѣ десну припариваютъ . При эпемѣ хо-
 рошо давать лѣкарства слабѣющія и ревень , чтобѣ на
 нѣмѣ испражненіе было . Проносныя сильныя и дру-
 гія различныя лѣкарства , которыя отъ эпихѣ болѣе
 и отъ жильночувствительныхѣ рваній хвалятся , и
 въ которыя многіе люди вѣрили , часто тяжкую
 бѣду причиняютъ .

§. 1078.

Случается обыкновенно , что зубѣ видѣнѣ , да
 подѣ внѣшнюю десною спрятанѣ , препяжкія болѣзности
 и жилѣ чувствительныхѣ судороги производитъ . Того
 ради , чтобѣ зубѣ подрастающій тяжкихѣ болѣзней
 не дѣлалъ , десну прорѣзать можно . И надѣ перед-
 ними прорѣзывать можно однажды впрямь , а надѣ
 другими и коренными прорѣзывать должно въ двѣ ли-
 нѣи поперегѣ . Всю десну до самаго зуба надобно отво-
 рять , покуда зубѣ со всѣмѣ покажется . Ибо , ежели
 протчія разрѣзавши , нѣсколько волоконѣ непрерыван-
 ныхѣ останутся , тяжесть болѣзненная и жильночув-
 ствительныя судороги пріумножатся , Неочень же
 надобно и спѣшить . Ибо , ежели десна надѣ зубомѣ
 еще несовершеннымѣ прорѣжется , то она въ ско-
 ромѣ времени испортится .

§. 1079.

Зубы по естеству свѣтловаты , снаружи шеро-
 ховаты бываютъ и черны , ежели крупными по-
 рош-

рошками, и со многими сольми смѣшанными, и оными припомѣ часто прущся, или ежели щеточкою жесткою щетинною изъ жесткой щетины здѣланною чистятся. Ибо эпими слоновокопная оная часть со временемъ спирается; ес также свѣдасть мокрота клейкая и острая, какая бываетъ отъ сахару, отъ всѣхъ вещей кислыхъ и сладкихъ, и какою также, ежели въ желудкѣ отъ скисающей пищи горитъ, ротъ и зубы обвѣдасть. Отъ этихъ сыростей и бѣсненьныхъ остатковъ къ зубамъ пристасть, и нагарасть пѣнка, которую шатариноу [Тартарусъ] новѣйше называютъ, и которая въ томъ особливо мѣстѣ, гдѣ ямочки зубной плева къ зубу привязана, скапливается. Ежели эша маперія повседневно вновь будетъ прибавляться, какъ то временемъ безмѣрно велика вырастаетъ, и плева отъ кореня зубнаго отдѣлился, а на послѣдокъ и десна отъ зуба со всѣмъ отспанетъ. И для того зубы некрѣпки въ деснахъ бываютъ, и шатаются начинаютъ, и ради того ихъ острая мокрота на послѣдокъ свѣдасть.

(*) смотри фигуру въ Фаухардѣ т. 1 таб. 2 стр. 136.

§. 1080.

Но не рѣдко порокъ изъ нутри начинается. Ибо ежели въ оной перепонкѣ, которою внутри оная средняя пазуха объемлется (1075), отъ какой ни будь причины, возженіе здѣлается, то зубъ больно болитъ. Ежели возженіе къ загноенію склонится, и оная плева въ болячки придетъ, дѣлается гниль, которая на послѣдокъ наружу выходитъ. Зубы иногда, ежели подъ нихъ чтонибудь жесткое попадется, раскалываются, отъ того также портятся. Двумяжъ способами, какъ зубъ изъ нутри повредился, и какъ

злая

злая матерія снаружи ꙗстъ, зубы боль получаютъ , первое ежели все тѣлесное состояніе испорчено , что бываетъ у ребятей увѣчемъ [рахитиде] немоществующихъ , второе и у пѣхъ , у которыхъ цынгошная или блудодѣйная болѣзнь во всѣ соки вселилась , обыкновенно случается. У всѣхъ же сихъ зубы бывають черны , шатаются , и выпадаютъ. Ничтожъ такъ зубамъ не вредно , какъ рпути , и все что изъ него по искусству химическому составляется. Хоць онѣ въ ротъ будучъ приниманы , или снаружи къ зубамъ прикладываны. Зубамъ также , и преизлишняя теплота и сухота , обыкновенно не мало вредитъ.

9. ЛѢЧЕБ.

Когдажъ зубы великую часть и къ здравію и къ благообразію приносятъ , то ихъ крайне и беречь надобно. Ежели они цѣлы , надлежитъ ихъ чаще , повседневно , и по утру и послѣ ужины теплою водою ополоскать , и утиральникомъ или губкою обтирать. Ежели же уже зубы сивы , то временемъ и зубное чищеніе употреблять должно , отъ чего они свѣшлы бывають и укрѣпляются. Чищенія зубнаго многія имѣются сочиненія , которыя состоятъ наибольше изъ корольковъ красныхъ , изъ раковинъ устресныхъ , изъ жернововъ раковыхъ , изъ кости септе , перра сигиллапа , боло армено , перра японика , гумми лакце , мирры , тутъ же нѣсколько прибавливаютъ понѣскольку квасцовъ жженныхъ. Надобножъ , чтобъ порошки такіе хорошо истерты были , понеже крупными слоновокостную зуба часть сотрешь. Оные порошки также можно съ медомъ розовымъ размѣшивать , и на губку взявши тереть. Не отшѣнножъ должно , чтобъ и порошокъ и медъ , ко-
торой

второй къ зубамъ прилипнетъ , водою прилѣжно вы-
полосканъ былъ. Нѣкоторые корень алшейной съ ме-
домъ варятъ , и въ него сперва различныя благовонія
и соку радицисъ акхузе прибавливаютъ. Корень хоро-
шенько сваривши сушатъ , и его для выпирания и
чищенія зубовъ употребляютъ. Прилипчивая мокро-
та изгоняется вонъ зубочисткою , а наилучше всѣхъ
деревянную. А для того запѣлка или шатарина ,
иногда и инструменты желѣзные надобны бываютъ.
Надобно же прилѣжно стараться , чюбъ или самага
зуба , или десны и оной ямочкиной плесы въ томъ
мѣстѣ , гдѣ она къ зубу приростаеъ , не повредить ,
и оный зубъ не оподрапъ.

§. 1082.

Въ болѣзняхъ зубной причину разсудить должно.
Ежели человекъ оный полнокровія будетъ мучиться , дол-
жно ему изъ жилы кровезовращательной , или чрезъ
насѣчку и приспавливаніе банокъ , кровь пускать.
Должно слабительныя давать легкія , однакожъ доволь-
но дѣйствительныя , которыя дѣйствительными я
призналъ при вожженіи (63). При всемъ же томъ по-
собствуеъ воздержность и питье очень тонкое. Мо-
жно также давать селифру. Гдѣжъ сыворопки из-
лишество будетъ , чю случается , когда человекъ
оный жару разслабитъ , не запью прохолодится , потъ
произвестъ должно. Въ такомъ случаѣ гораздо не худо
испанскія мухи или къ запылку самому , или къ опро-
стку штыкъ подобному прикладывать , и болячки чрезъ
нѣсколько дней не заживаятъ (937, 938). Ежели зубъ,
оный котораго боль происходитъ , свѣденъ , нѣтъ луч-
шаго способа , какъ вонъ его вынуть.

М м м

§. 1083.

§. 1083.

Чернотѣ же и гнилость, ежели не глубоко еще прошли, и наскрозь не пробрались, иногда излѣчить можно, ежели употребивъ къ тому ножичекъ и другія орудія, и сскрестъ, покуда зубъ безвреденъ не здѣлается, а послѣ того къ нему эссенцію коришневую, гвоздишную, миррную прикладывавъ можно. Сильнѣйшимъ лѣкарствомъ почищается масло гвоздишное, и оно прикладывавъ можно. Хорошо также и прижиганъ, къ чему имѣемъ инструменны способные, однакожъ того многіе бояся. Ежели же зубъ сѣденъ, и свободно и безбѣдственно выдернуть его вонъ не возможно, то ямочку можно забить липсовымъ золотомъ или свинцомъ, хорошенько принаровивъ, чпобъ кушанье, питье и воздухъ, которыми плева и жила чувствительная берѣдятся, болѣзни не причиняли.

§. 1084.

Ежели все сіе ничего не пособствуетъ, то зубъ, котораго зѣречь не можно, должно выдернуть, понеже испорченого его матерією слово въ слово другіе цѣлые еще зубы повредиться могутъ. Вырывающіяся зубы различными инструментами, наибольше же клещами и другимъ, который Пеликаномъ лѣкари называли. Ежели зубъ выдернется, а тамъ корень останется, оный инымъ инструментомъ, который *гизауза* именовался можетъ, вынуть вонъ надлежитъ (*).

(*) Такъ называется целсъ въ кн. 7 гл. 12 также у *Родіа* на СКРИБОНІЯ ЛАРГА стр. 94; у *Нѣмцовъ* называется *ейнъ Гейсфусъ*; у *Французовъ* юнъ *пуффоаръ*. Смотри *ФАУХАРДА* Т. 2. таб. 18 фигу 2. Въ этомъ всѣ къ зубному лѣченію потребныя инструменны вырисованы.

§. 1085

§. 1085.

Зубные корни также временемъ портятся , а вѣнокъ бываетъ цѣль. А знать то можно потому , ежели сничкою желѣзною зубъ разбередишь , то бо-
льной боль престою чувствуетъ. Это иногда въ
одномъ , а иногда во многихъ зубахъ случается. И эти
зубы , которые такъ болятъ , вонъ повыдергать над-
лежитъ. Ибо ктому дѣлаются чирьи безверхуше-
шные , болячки и фистулы.

§. 1086.

Не безвѣдственно зубы , а особливо коренные
задніе выдергиваются. Ибо иногда кости челюстныхъ
неплотныя клещами захватываются , или отъ вели-
каго зуба въ великое движеніе приходятъ , и перела-
мываются , а то также дѣлается , ежели закорючен-
ные корни въ кость вроснутъ (1076). Гдѣ кость
переломлена бываетъ , тутъ тяжкая боль и воженіе
дѣлаются. А припомъ тотчасъ кровь потечетъ ,
ежели жила бьющаяся , скрозь кость челюстную про-
ходящая , и зубамъ пищу дающая ; перервана будетъ ,
отъ чего иногда люди и умираютъ. Ежели это слу-
чится , то должно въ ротъ укусъ холодный держать ,
наблюдая все то , что наибольше отъ кровотеченія
пособствуетъ. А припомъ въ пазушку или луночку ,
гдѣ зубъ выдернутъ , положить надобно и инстру-
ментомъ придавить пряжу въ спиртъ обмоченную и
выжигую. Знать иногда надобно , что у зуба быва-
ютъ многіе и великіе корни , ежели его вѣнокъ широ-
кой многіе бугорки будетъ имѣть. Хорошо такой
зубъ , о которомъ можно думать , что его безъ
запрудненія не выдернешь , сперва чрезъ нѣсколько
дней пошатывать , покуда хорошо станетъ шататься ,

М м м 2

и

и тогда его, ежели возможно, перстами, ежели же нѣтъ, клещами выдернуть.

§. 1087.

Бываетъ также иногда, что на деснахъ подлѣ зубовъ пухлячки дѣлаются болѣзныя, которыя *параліада* Греки называютъ. Ежели онѣ съ возженіемъ будутъ, прикладывать къ нимъ должно фиго или ягоды винныя поджареныя. Въ рошу держать надобно будетъ молоко съ корнемъ алпейнымъ вареное. Почти излишнее дѣло есть, снаружи пластырь прикладывать. Ежели гной тамъ покажется, гной потчасъ вонъ выпустить, чтобъ отъ него кость не повредилась, ежели онъ тамъ долго пробудетъ, гной выпустивши, довольно въ рошу кусочекъ сахару съ эссенціею пимпнелле держать, а впрощемъ употреблять шѣ лѣкарства, которыми болячки въ рошу лѣчатся (914, 916).

§. 1088.

Иногда на такихъ чирьевъ безверхушешныхъ худыя болячки и фистулы дѣлаются, изъ которыхъ долго гной шечетъ. Ежели гной не будетъ имѣть изъ нихъ выхода, то десны и окрестныя мѣста съ возженіемъ впорительно и часто будутъ пухнуть. Это обыкновенно случается, ежели кость десенная испорчена, или самый зубъ, а особливо корень его, поврежденъ бываетъ. Такихъ фистулъ никакъ лѣчить не возможно не вынувши зуба. Ежели на кости что нибудь поврежденное найдется, оное оскребать, и пристойными лѣкарствами (916, 1059) очищать должно, покуда она целою не здѣлается. Временемъ также слѣдуетъ отъ кости оплупляться, который оплуплять надобно (1035).

§. 1089.

§. 1089.

Другой родъ на деснахъ опухоли бываетъ безъ вожженія , и называется *επυλιδος* (*). Опухоль временемъ бываетъ жестка, будно бы мозоль, а временемъ неплотна и мягка , и на грибъ или дикое мясо похожа. Сверхъ же того она по большей части на попорченной кости нарастаетъ. Если опухоль будетъ жесткая , то надлежитъ ее кругомъ обрѣзать , и мясо срѣзать , чпобъ кость обнажилась : тогда оною такимъ способомъ лѣчить (1035 до 1061) , какъ о другихъ костяхъ сказано. Если волдырькъ будетъ мякокъ и неплотенъ , оный волочкомъ захвативши подлѣ кореньевъ вырѣзать должно. А чпобъ оная нѣчто не выросло , корень глубоко поразрѣзать , и ропущее мясо квасцами жонными удерживать. Если же подъ пѣмъ мѣстомъ кость повреждена будетъ , оную такимъ способомъ лѣчить должно , какъ поврежденныя кости лѣчатъ. Во время всѣхъ такихъ лѣченій кость приличнымъ къ тому полосканьемъ ополаскивать должно.

(*) различіе *παρυλιδος* καὶ *επυλιδος* имѣетъ ПАВЕЛЪ Кн. 3, Гл. 26, стр. 38.



В Ы В И Х И.

Л У К С А Т А.

§. 1090.

Члены , если изъ мѣста своего выпадаютъ , и кости , которыя по естеству одна съ другою союкуплены , если одна отъ другой отдѣляется , вывихнушими называются. Кто желаетъ болящему въ

М м м з

па-

такомъ случаѣ пособствовать, тому должно не только положеніе костей и изображеніе знать, которыя въ скелетѣ видѣть можно, но припомѣ всѣ членосоставленія и спайки, а при нихъ связки, хрящи и желѣзы въ членосоставленіяхъ находящіяся, и сокъ испускающія. Тотѣ, которымъ будшо бы саломѣ, кости, одна съ другою движимыя, подмазываются, въ памяти держать должны. Разсуждать также надлежитъ мышцы, которыми уды къ различнымъ употребленіямъ движутся. Надлежитъ припомѣ знать возрастъ различіе, и оныя, какъ хрящевыя, такъ костяныя, приростки или надростки. Всево этого, понеже къ лѣченію много способствуютъ, научаются чрезъ прилѣжное и непрестанное костей и составовъ, не такъ въ скелетѣ, какъ въ свѣжѣмъ мертвецѣ, разсматриваніе.

§. 1091.

Чтобъ ученики различныя эти членосоставности лучше понимать могли, по анапомии на нѣсколько родовъ ихъ раздѣлили. Однако великое межъ ими несогласіе есть, и нѣкоторые пѣже самыя членосоставности костныя другими словами называютъ. А понеже ни единого состава не находилъ, который съ другимъ былъ бы во всемъ сходенъ и ровенъ, чтобъ ни въ чемъ не ошмѣнился, то я признаюсь, что лѣчить намѣряющемуся, не въ знаніи именъ пѣхъ отъ авторовъ по наложенныхъ, но въ прилѣжномъ и непрестанномъ оныхъ разсужденіи упражняться надобно.

§. 1092.

Однакожъ я предложу оныя роды и имена, которые хотя искусства въ лѣченіи не дѣлаютъ, толькожъ

кожѣ поощряючи художниковъ разумъ оному посо-
бятѣ. Ибо изъ познанія оныхъ родовъ подлинныя
прѣвила и заповѣди производятѣ, по которымъ и въ
дѣленіи поступать можно. Вездѣ кость съ костью
совокупленную и одну противъ другой положенную, мо-
жно думать двѣ. И какъ двухъ костей такъ и многихъ
фигура и строеніе, какимъ онѣ межъ собою совоку-
пляются, *συλλαξίς* и ихъ связка, совокупность или
способъ, какимъ онѣ межъ собою держатся и связыва-
ются. Въ первыхъ τὸ ἀρθρονъ называютъ, или составъ
или совокупность, или сплоченіе или членосоставленіе,
а послѣднее *σύνφυσιν* именуютъ. Въ составѣ помя-
нутъ различность находящаяся такая, что кости одна
надъ другою движущаяся, или движеніемъ, которое
чувствовать можно, и называется *διάρθρωσις*, или
движеніемъ очень маленькимъ, и которое на силу
можно чувствовать, и называется *συναρθρωσις*. Обое
же движеніе какъ *διάρθρωσις*, такъ и *συναρθρωσις*
иногда способами дѣлается. Ибо кость, голову круг-
лую имѣющая, въ нѣдро глубокое вставлявается,
и называется *εναρθρωσις* (*), или костный конецъ
вкладывается въ неглубокое нѣдро, и называется *α-
ρθρώδης* (**), или кости межъ собою совокупляются,
что обѣ и ямки будутъ имѣть и опростки,
и опростки въ ямки будутъ вкладываться, и въ
ямочкахъ будутъ вмѣщаться, который членосо-
ставленія родъ будто бы пепля на крюку, взаимный
называется *γύγλιμος* (***)).

(*) *Εναρθρωσις* *διάρθρωσις* по есть составъ чувствительный
есть тамъ, гдѣ голова кости бедренной въ яму круглую и глубо-
кую лона вставляющаяся. *Εναρθρωσις* *συναρθρωσις* по есть составъ
не весьма видный, или съ движеніемъ маленькимъ естъ въ кисти, ру-
кой или въ запястьѣ. Ибо въ этомъ составѣ кость великая,
или

или головастая въ глубокое нѣдро вставлявается, которое изъ совокупившихся межъ собою костей лунастой и ладейной, зѣблано.

(**) Ареродіа діареродесѣ называется составъ, гдѣ плечной кости кругленькая головка въ луночку глемоидеиную кости лопатки вставляется. Ареродіа синареродесѣ имѣется въ ногѣ, гдѣ великой отростокъ пятной въ яму кости корабельной вставляется. Также по мнѣнію сихъ анатомиковъ къ Ареродіи причислить можно сные составы, гдѣ кость почти плоская, надъ другою также плоскою, движется, на примѣръ кости, клину подобныя въ запястьи надъ костью корабельною, отростки поперешныя позвонковъ хребетныхъ межъ собою, кость ключевая или яремная надъ отросткомъ самоплечнымъ.

(***) Гинглимъ различныхъ родовъ есть. Гинглимъ діареродесѣ есть въ составѣ кости плечевой съ костью лучею, и съ локотною, бедренной съ берцовъ. Гинглимъ синареродесѣ есть въ спайкѣ кости пятной съ костью таранною. Гинглимъ угловой называютъ, гдѣ двѣ и больше кости будто бы угломъ дѣлаются, на примѣръ, кость плечная и локоть съ лучемъ, бедро съ берцовъ. Гинглимомъ побочнымъ, гдѣ кости съ боку одна съ другою совокупляются, на примѣръ, лучъ съ локтемъ, берце съ дудкою. Нѣкоторые къ Ареродіи причисляютъ, другіе отъ ней и отъ Гинглима отдѣляютъ то *ἄρ-
θρον τριχῶδης*, который составъ есть межъ первымъ и вторымъ иѣйнымъ позвонкомъ, и межъ отросткомъ его зубоподобнымъ. Смолр. **ЮЛОАНЪ** и **ЦЕЛЕНА** о костяхъ гл. 6, въ Опер. стр. 454.

§. 1093.

Синареросимъ также называютъ составомъ костнымъ безъ всякаго движенія. Сей способъ членосоставленія различными манерами дѣлается. Шовъ, согласіе [гармонія], который многіе къ шву причисляютъ, *ὑμῶσις* (1074) *χινδύσις*. Въ этомъ послѣднемъ членосоставленія родъ кость въ другую кость въ длину расколотую вставлявается.

(*) Такая спайка есть такъ, гдѣ кости рѣшетобразной отростокъ и перегородки носовая съ сошникомъ сдѣлаваются. Смолр. **ЖЕНАСЪ** Анатоміи гл. 5, част. 3, стр. 227. Онъ первый кажется такъ называлъ.

Этотъ

§. 1094.

Этѣ всѣ членосоставленія къ τὴν συνῆλξιν принадлежатъ. Σύμφυσις также различная естъ. Ибо или кость проливъ другой положена такъ, что никакой межъ ими матеріи не бываетъ (*). Или кости одна съ другою держатся хрящикомъ чрезъ συγχόνδρωσιν, или связываются связками чрезъ συνδεσμωσιν, которое членосоставленіе συννέυρωσις называютъ, или соспавляющіяся мясомъ и мышками чрезъ συσσερκωσιν.

Объ этомъ иначе написалъ ВИНЗАОВЪ въ Толк: Анат Т т § 123 то αρθρον, то есть связь или членосоставленіе, раздѣляетъ на διαρθρωσιν, σιναρθρωσιν и ἀμφιαρθρωσιν. Діареросисъ у него естъ, гдѣ двѣ кости, у которыхъ концы хрящемъ прикрыты, одна надъ другою или явно или не много и попарно движутся. Діареросимъ также на энареросимъ, ареродию и тинглимъ раздѣляетъ. Синареросимъ называетъ, ежели кости одна съ другою держатся, которыхъ концы въ хрящи не обращаются, также и одна надъ другою не движутся. Куда причислится можетъ шовъ ἀρμονία γομφωσις, къ ней еще прибавится можетъ χινδουλῆσις. А ἀμφιαρθρωσιν называетъ ежели промежъ двумя костями будетъ посредствіемъ хрящъ, да и потъ мягкой, который попускаетъ симъ костямъ нѣсколько движенія имѣть. Такая спайка естъ межъ двумя костями лонными или гребенными и межъ костью крестцовой и безъ именными, межъ ребромъ первымъ и костью грудною. Симфисимъ безъ посредства матеріальнаго раздѣляетъ на такое, которое по времени лѣтъ бываетъ, когда нѣкоторыя кости у ребятъ, будучи раздѣленныя по времени, не оставивъ никакого слѣда срастаются: и на другое, ежели кости никакимъ хрящемъ не кончатся, но одною фигурою, какъ то кости черепстоловныя въ основаніи черепа головного находящіяся, держатся. МОНРО въ те Анатоміи офъ те гумане бонесъ къ симфизу причисляетъ одинъ только шовъ и γομφωσιν. Объ этого отдѣляетъ то αρθρον то есть составъ. Этотъ опять раздѣляетъ на синареросинъ и діареросинъ. Къ діареросимъ причисляетъ и явное движеніе и попаренсе. Синареросимъ называетъ спайкою, гдѣ никакого движенія нѣтъ. Онъ также составъ плечной съ лопаткою, который многіе къ ареродиі относятъ, присвоилъ къ энарероси.

Н Н Н

си. А почеже я для учениковъ пишу, то лучше мѣ показалось остаться притомъ, какъ старинные наши учителя показавъ, хотя впрочемъ и больше понятнѣе кажется раздѣленіе ВИНЗЛОВО и МОНРОВО.

§. 1095.

Когда же костныя спайки и членосоставленія такъ раздѣлены, то объ нихъ нѣчто общее знать должно. То есть очень часно и очень легко члены изъ мѣстъ своихъ выходятъ чрезъ артеродію, которые со всѣмъ одинъ отъ другаго отдѣляются, такъ что кость отъ другой кости, съ которою она совокуплена была, отскочишь. Членыжъ чрезъ гинглимъ, которые крѣпкими связками связываются, только что отъ великой силы, и очень рѣдко со всѣмъ такъ выходятъ, чѣмъ двѣ кости одна съ другою разошлись. Да и это не можетъ дѣлаться безъ поврежденія, разорванія и безъ великаго ослабленія связокъ. И такъ оныя члены только не множо и въ нѣкоторомъ мѣстѣ изъ мѣстъ своихъ выходятъ. Въ артеродіи и въ энартероси движеніе коловращное, такъ что членъ, будто бы около оси, вершится однакожъ такое движеніе совершеннѣе бываетъ въ первомъ членосоставленіи, нежели во второмъ. Въ гинглимѣ не иное какое движеніе дѣлается. какъ только что удъ приводится и изгибается, и что онъ же протягивается. Ежели составы будемъ разсуждать, что плечной кости головка съ пазухою лопаткиною артеродією, и бедерная головка съ пазухою глубокою лоннокостною, чрезъ энартерозинъ совокупляется, то въ локтѣ и въ колѣнѣ гинглимъ имѣется. Также гдѣ ручныя и ножныя персты начинаются, артеродія есть. Ибо у перстовъ верхнія кости на вершечкѣ лунковаты, и вмѣщаются въ себя кругленькія головки тѣхъ костей, изъ ко-

которыхъ пясть и плюсна составляютъ. Прочіе же члены перстные гинглимомъ связываются.

§. 1096.

Древніе Анапомики жилы чувствительныя называли оными жесткими, гибкими, пружинными, хряща мягче, плевъ упружее, кандалами [винкула], которыми кость съ костью связывается, и которыя отъ новѣйшихъ связками [лигаменга] называются. Сіи связки фигуру различную имѣютъ. За общія почти всѣмъ членамъ имѣются оныя плевныя, по величинѣ костей толстыя или тонкія, которыми концы костные въ ссоставѣ связываются. Сіи отъ Французовъ были названы ле Капеюлэръ, и понеже кажется лапинскаго имени имъ нѣтъ, то можеть быть можно бы ихъ чахлами или манапсейками [манпикуласъ] назвать (*). Такою связкою иногда одною (**), иногда съ прибавкою другихъ, кость одна съ другою связывается. Въ нихъ же припомъ держится сало, которыми костные хрящики подмазываются. Сверхъ этихъ манапбекъ или чахловъ, наподобіе плевъ распяленныхъ, идущъ, и съ одной кости на другую противоположащую кость переходящъ, надлежатъ другія плотнѣйшія связки и крѣпчайшія, но гораздо короче и продолговатокруглыя, которыя къ онымъ первымъ присоединяются †. Есть еще инныя связки, которыя межъ оными манпѣйками отъ одной кости наченшися къ другой прирастаютъ ††. Ещежъ имѣются связки, которыя не дають костямъ лежащимъ межъ собою расходиться †††. О другихъ родахъ связокъ я не упоминаю, которыя не такъ для совокупленія костей, какъ для держанія нѣкоторыхъ частей устроены.

Н н н 2

(*) отъ

(*) Отъ ВИНЗЛОВА см. въ Толк. Анатом. Т. 1, о костяхъ свѣжихъ §. 36.

(**) Какъ напимѣрь въ составъ кости плечной съ лопаткою. Ибо кромѣ протяженій мышечныхъ отъ сухихъ жилъ мышечныхъ производящихъ, на силу друга связи видѣть можно, которыми бы этотъ составъ обнимался.

† Особливо въ гиталимѣ, напр. кости плечной съ лучемъ и локтемъ, бедренной съ голенью.

‡ Въ составъ костей лонныхъ съ бедромъ, бедренной съ бердомъ.

+++ Которыя между костью локотною и лучевой, между бердомъ и дудкою имѣются. Она поперешная, которая на первомъ позвонкѣ шѣйномъ, и которая отростокъ зубоподобный втораго позвонка укрѣпляетъ. Связки между отростками позвоночными спинными находящіяся. Куда причислится можетъ также та, которая на лопаткѣ есть, межъ отросткомъ враносоподобнымъ и самоплетнымъ, которая плечной кости головку, чтобъ не тотъ часъ выскакивала, укрѣпляетъ. см. у МОНРО въ преждепомянутомъ мѣстѣ. стр. 268. Познаймотри обовсѣхъ, сверхъ ВЕЗАЛІЯ и РЕАЛДА КОЛУМБА, ВИНЗЛОВА въ помян. мѣстѣ.

§. 1097.

Соспавы короткими и крѣпкими связками связываемыя, только отъ великой мочи вывихиваются. Ежели же вывихнутся, то не безъ затрудненія опять въ свое мѣсто вправляются. Ежели связки разслабятъ, и отъ поврежденія ихъ кости будучи вывихиваться, такія кости легко вправляются; но вправлены будучи въ свое мѣсто, опять вонъ выходятъ.

§. 1098.

Кости въ соспавѣхъ хрящемъ кончатся, и ни единого соспавѣ нѣтъ, въ которомъ бы того не было. Хрящи бывающіе жестки, пружинны, слизки, никакого чувства не имущи. Кромѣ тѣхъ хрящей, которыми самыя кости кончатся, еще другіе имѣются, между двумя костями да и хрящемъ смягченными посред-

средствѣмъ лежаще , на которыхъ также связки а особливо оныя плѣвные чахолки (1096) привязываются (*). Есть и еще , въ которые будто переразиваются кости , и чрезъ посредство которыхъ кости держатся. Эпѣ также нѣкоторое , хотя небольшое , движеніе дѣлающѣ (**).

(*) Въ составѣ челюсти нижней съ костью височною , въ составѣ кости грудной и яремной , бедренной и берцовѣ.

(**) Хрящи , чрезъ посредство которыхъ кости лунныя межъ собою и съ крестцомъ сокупаются. Особливо въ ребрахъ и въ самой груди.

§ 1099.

Въ составы мокрота спекается для того , чтобъ хрящики свободнѣе движеніе имѣли , слово въ слово такъ , какъ колеса дѣгтемъ подмазываются у плѣгѣ. Мокрота оная кажется составлена изъ возгрей , масла и пасоки. Калѣйкая возгрямѣ подобная мокрота вытекаетъ изъ великихъ желѣзъ , въ составахъ лежащихъ , обыкновенно возгрявыми называемыхъ (*). Желѣзы оныя мягки , и изъ нихъ премножество трубочекъ выходящѣ , которыми оный сокъ течетъ . Только оныя желѣзы такъ въ составахъ положены , что движеніемъ костей и поверчиваніемъ нѣсколько припискиваются , отчего по величинѣ движенія больше и влажности изъ желѣзъ сихъ выпискивается , которая къ подмазыванію хрящевыхъ у костей концевъ не оптѣнно надобна . Влажность оная бѣлку яишному подобна , вкусомъ солонъ , отъ огня не сѣдается , только отъ воздуха въ испарину раздѣляется , осаждаючи нѣчто будто бы жицу : Сія желѣзы изобильнымъ жиромъ окружаются , которыми составы почти всѣ напоены . Жирное масло также , какъ подавишь , рас-

Н Н Н 3

плыв-

плываеся, и съ оною клейкою влажностью смѣшивается. да и по. кажется правда, что нѣчто шупже прибавливается опѣ цонкаго костью ноздреватыхъ мозга (1031), который, можетъ быть, скрозъ хрящики пронизать можетъ. Особливо же влажность пасокѣ подобная происпекаетъ изъ оныхъ связокъ, или чахловъ [мантѣекъ], которыми составы обѣмлются, или и изъ ихъ наималѣйшихъ желѣзъ, или изъ кондовъ самыхъ малѣйшихъ жилъ быющихъ.

(*) Смотр. у Пресл. ГАРЕСА въ Остеологіи новой въ гл. 4. стр. 187, у ВИНЗЛОВА въ преждепис. мѣст. §. 66, и Пресл. ФРИДЕРИКА ЛЕБЕГОТА ПИТШЕЯ диссерт. о жирѣ член. составномъ въ Липсіи 1740 года. Опыты нѣкоторыя надъ жиромъ здѣланные смотр. въ Комм. бононскихъ стр. 148.

§. 1100.

Саложъ для того изъ влажностей по естеству различныхъ смѣшано, дабы пѣмъ способѣйшее къ подмазыванію членовъ было. А что оно опѣ недвиженія ссѣдается, опѣ движенія распаивается, распопленное жилками кровевозвращательными поглощается, и съ жидкими часпьми по всему пѣлу расплывающимися смѣшивается, чрезъ опыты познано. Я уже представилъ (357, 485, 486, 487), что изъ раненыхъ составовъ иногда мелікѣра или синовія псечетъ, она по есть спекающсея и призобилюющее сало. Что до та σ а γ κύλας и недвижности составовъ касаетъ, которыя межъ другими причинами и опѣ этой влажності дѣлаются, ежели она згустѣетъ, скоро обрѣваю.

§. 1101.

При всѣхъ же сихъ должно разсуждать и жилы чувствительныя и мышки, жилы быющіяся и жи-
лы

лы крововозвращательныя, и всѣхъ ихъ мѣста и фигуры. положеніе и отдаленіе, всего того въ анатомическихъ упражненіяхъ обучающіяся. Ибо ежели костями вывихнутыми жилы быющіяся и жилы крововозвращательныя приписнутся, отъ того великія вожженія производятъ, а сверхъ того часто и Ангионовъ огонь въ удахъ приключается. Ежели жилы чувствительныя придавятся, дѣлается безчувствіе и слабость, и ихъ самихъ недѣйствительность. Мышки, ежели однѣ приизлишно натянуты, а другія не столько, то онѣ не допускаютъ уду вправиться.

§. 1102.

У ребятъ рѣдко случается, чтобъ члены отъ чего нибудь изъ сосисавовъ вывихивались, а часто оныя подростки или барышки (1090) подлѣ состава отъ прочей кости отдѣляются. Такой несчастливой случай, будучи ни то ни другое, ни переломъ, ни вывихъ, гораздо трудно излѣчивается. Иногда пѣло на такихъ членахъ высыхаетъ, и члены не такъ какъ другіе растутъ.

§. 1103.

Вывихи же многими и различными способами бывающъ. Ибо кости иногда вовсе одна отъ другой отдѣляются, иногда не множо изъ мѣстъ своихъ выскакиваютъ, такъ, что которая изъ одной кости выскочитъ, да не вовсе отдѣлился, но по нѣскольку въ ней останеся. Первый вывихъ въ энареросѣ и въ арероди, а другой въ гинглимѣ, какъ уже я выше объявилъ (1095), чаще случается. Иногда кости съ раною, съ пришибенымъ и осадненымъ пѣломъ изъ мѣстъ вывихивающіяся, или вывихнуты будучи, бу-

будушѣ переломлены , и разможжены , и ради того весьма бояться надобно вожженія , Антонова огня а временемѣ и смерти , и въ томѣ разнспіе есть , ежели кость вывихнушая , потчасѣ безѣ опущенія времени вправливается , и ежели она не вправливается и напослѣдокѣ такѣ застарѣетѣ. Много также зависипѣ отѣ того , каково шѣлесное связокѣ и мышекѣ состояніе будетѣ

§. 1104.

Чуть ли надобно говорить , что члены изѣ своихѣ мѣстѣ силою , ударомѣ , паденіемѣ , плясаніемѣ выдергиваются , и ежели уды , отѣ сильной напуги , нарзно раздираются. А припомѣ кости иногда и отѣ расслабленія и чахлости мышекѣ вонѣ вывихиваются. Ибо въ таковыхѣ удахѣ связки , хотя сѣ начала довольно крѣпки бывають , однако отѣ птягости удовѣ въ ослабленіе приходятѣ и истончаются. Ежели же мышки цѣлы будутѣ , и со всѣмѣ крѣпки , а въ связкахѣ силы не будетѣ , то кости самыя движеніемѣ мышечнымѣ легохонько вонѣ выпихиваются ; а то случается тогда , когда силу употребишь , и уды отѣ того у челоѣка лѣчимого преизлишне будутѣ наптянуты. Иногда въ составы , особливо въ глубокіе , а временемѣ и въ маленькія лошки , въ копоры кости пропиволежащія вставляются , кровь наливается , копорая со дня на день пріумножаяся , кость изѣ мѣста своего помаленьку высовывается. Это случается , когда отѣ горячки , будто бы отѣ воспы , злая матерія въ составы склонится , или ежели жестокимѣ ударомѣ или паденіемѣ , которое гораздо часто случается , снаружи составѣ такѣ поврежденѣ будетѣ , что въ немѣ или связка , или вышепомянушыя жѣлѣзы

(1099)

(1099) сильно зашибены будуще. Ежели у дѣтей рыхлидомъ спрадущихъ кости начнутъ пухнуть, оныя также на послѣдокъ изъ составовъ своихъ выпадываютъ. Ни въ единомъ составѣ такого нещастія чаще не случается, какъ въ ямкѣ бедерной, въ которую головка круглая кости бедерной вмѣщается.

§. 1105.

Вывиховъ имѣются нѣкоторые общіе знаки, а нѣкоторые собственные, то есть за всегда въ томъ мѣстѣ опухоль будетъ, куда кость выскочитъ, а отъ куда выскочитъ тамъ ямка. Удѣ на ту сторону, на которую кость выйдетъ, протягиваться не можетъ, а больше того на противную, и всегда съ болью. По различію случаевъ, удѣ вывихнутой иногда короче, а иногда длиннѣе обыкновенно бываетъ. А при томъ, или никакого или небольшое употребленіе въ немъ ославляется. Боль и вожженіе иногда не такъ отъ кости изъ мѣста своего вывихнутой дѣлается (1100), но понеже мышцы и жилы чувствительныя отъ случившагося съ наружи нещастія досажены и зашибены, то не дадутъ уду движенія имѣть, хотя онъ цѣлъ и невывихнутъ будетъ.

§. 1106.

Что кость не совсѣмъ изъ мѣста своего выскочила, но только нѣсколько пронулась, потому узнать можно, ежели въ составѣ послѣ напуги или удара съ опухолью боль будетъ сильная и непрестанная, которой и въ свое время, и послѣ употребленія всѣхъ помоществованій, облегченія не бываетъ. Удѣ не на всѣ стороны протягиваться можетъ. А что онъ не въ своемъ мѣстѣ, оное самая его фигура показываетъ. Чего ради кость вывихнушая познавается,

О о о

если

ежели удѣ поврежденный съ другимъ неповрежденнымъ поприлѣжнѣе поразсмотришь, или сверстаешь.

§. 1107.

Ежели члены по причинѣ мышекъ параличемъ разслабленныхъ (1104) вонѣ выпадутъ, оное знать можно потому, ежели человекъ когда нибудь апоплексію пораженъ былъ, ежели удѣ разлаблѣнъ будетъ, и въ немъ шѣло исчахнѣтъ. Въ такихъ удахъ члены безъ всякой трудности на мѣсто свое вправливаются, но потчасъ опять вонѣ выскакиваютъ (1097). Ежели плѣчо параличемъ отбито будетъ, со временемъ и отъ естественной его пягости испончываются связки, которыми плечо къ лопаткѣ привязывается, и отъ того удѣ длиннѣе бываетъ (1104). Въ составѣ подлинномъ, кругомъ подавивъ перстомъ, ямки найдешь, гдѣ двѣ кости одна отъ другой отдѣлились.

§. 1108.

Ежели связки будутъ малосильны (1102), а мышцы цѣлы и мочны, то отъ самаго малаго ихъ движенья кости вывихиваются. Составъ бываетъ опухлѣнъ, и будетъ болѣть. Ежели кость вывихнутую на мѣсто вправить не лъзя, хотъ все хорошо будетъ здѣлано, то знать должно, чѣю въ ямку, въ которую кости вскочить надобно, мокрона напекла, и она мокрона въ ямкѣ спяючи препяшсывуещѣ кости на свое мѣсто припишь.

§. 1109.

Различныя также бѣдствія костямъ вывихнутымъ дѣлаются; иногда удѣ вожженѣмъ и Анпоновымъ огнемъ сжраженъ; иногда чирьи безверхушныя

шныя бывають, или дѣлаются опухоли отъоку подобныя (729); иногда тѣло изсыхаетъ, члены пухлы и недвижны и въ нихъ ахулаи бывають, отъ которыхъ дѣлается, что уды послѣ того не такъ дѣйствиельны (1104) остаются. Завсегда большее бѣдствіе бываетъ, когда гинглимъ вывихивается, нежели ареродіа, а особливо, ежели въ ономъ кости межъ собою вовсе разскачутся. Толькожъ это въ гинглимъ не случается просто, развѣ очень чрезъ великую силу, и какъ перервутся, растянутся и обесилеютъ всѣ связи (1095, 1103). Тѣхъ членовъ никакъ лѣчить не можно, которые отъ поврежденія связокъ и мышекъ вывихиваются (1104). Ежели кость насильно снаружи изъ мѣста своего выдернутая, не будетъ тотчасъ вправлена, но въ пренебреженіи будетъ оставлена, то въ ней совершенное здравіе не воспослѣдуетъ, но завсегда слаба останется. Члены, крѣпкими связками и здоровыми мышками держимые какъ великою силою изъ мѣстъ своихъ выдерживаются, такъ и чрезъ великую мочь опять на мѣста свой вправляются. Которые же члены безъ затрудненія и проворно вправляются, тѣ гораздо легче опять выпадываются, и не очень надежно въ мѣстахъ своихъ держатся. Чаще у юношей, женщинъ и слабосильныхъ кости вывихиваются, нежели у самовозрастныхъ, сильныхъ, и у мужчинъ. Ежели въ луночку влажность скопится, и оная саломъ отъ недвиженія ссѣдшимся и густымъ наполнится (1104, 1108) или, ежели кость для того упадетъ, что она сама распухнетъ, то составъ здоровъ быть, и въ прежнемъ мѣстѣ пріобыкнуть не можетъ. Также кость, которой вправить не можно,

О о о 2

на.

напослѣдокъ съ мѣстами тѣми , на которыхъ остановилися , срастаются. Ежели послѣ вправленія кости великая будетъ боль , или жилъ чувствительныхъ пятно , то знать можно , что кость не въ своемъ мѣстѣ , и ею связка давится.

§. IIIO.

Члены вывихнутые должно вправить , и отвести все то , что послѣ вывиху случается. Ежели же кость изъ мѣста своего вывихнутую вправить надобно , надлежитъ оное , что всегда мышечнымъ дѣйствіемъ припугивается , довольно выпянуть. А это можно дѣлать и одному лѣкару , и съ другими присутствующими помощниками. Временемъ дѣло однимъ руками совершается , что я за наилучшее поспавляю , иногда пестями завязываячи , также и разные махины употребляючи.

§. IIII.

Удѣ , ежели будетъ невеликъ , выпянуть его одинъ человекъ можетъ , взявши правою рукою то , что изъ мѣста своего выскочило , а лѣвою то , отъ котораго вывихнутое отдѣлилось. А болѣйшій удѣ къ такому дѣлу двухъ человекъ пребудетъ , чтобъ одинъ въ одну сторону а другой напротивъ того тянулъ. Силу ровную употреблять должно , какъ тому , который вывихнутой удѣ выпягиваетъ , такъ и тому , который другой членъ оппугиваетъ. Ежели то быть можетъ , то ни рукъ , ни пестей на другой удѣ накладывать не должно , только на вывихнутой и на томъ , изъ котораго вывихнулся. Когда уды такимъ образомъ будутъ выпягиваться , должно разсуждать и о мышцахъ , чтобъ всѣ ровно выпягивались. Удѣ вывихнутый выпягивать надлежитъ , разсуждая по обстоя-

тельствъ

япелствамъ, какъ онъ далеко отъ мѣста своего отпущенія, до пѣхъ поръ, чтобъ онъ нѣсколько длиннее натуральнаго здѣлался. Ежели же съ приизлишествомъ тянешся, то связки надсаждаются, и будуще по слѣ того слабы (1104, 1108). Удъ, который должно выпягивать, силою ровною умѣренною, и по маленьку приумножаемою тянуть надлежитъ, а не незапною порывкою порывать. Ежели къ большому уду обвязки, песьмы, и ремни будуще надобны, оныя всѣ бытъ должны мягки, и такъ на концы уда накладывать, чтобъ кожъ и мясу не досадить. Однакожъ надлежитъ ихъ пошуже запрягивать тогда, ежели ими уды у людей полстыхъ и жирныхъ обвязывать надобно будеть.

§. 1112.

Когда же кости на довольное разстояніе между собою растянутся, а то узнать можно по состоянію состава и мышекъ, и ежели удъ нѣсколько подлиннее покажется, нежели какъ по натурѣ бытъ должно (1111), кость опянь въ свое мѣсто вставишь надлежитъ. Того ради опустить и ослабить должно, или руки, или песьмы, которыми удъ вывихнутый выпягивался, а другой удъ, отъ котораго это отдѣлился, назадъ подастся. Надобно же стараться, чтобъ это дѣлалось ровно и полегоньку, чтобъ костный хрящикъ или какая нибудь связка не повредилась, когда кость съ стремленіемъ будеть приходить въ свое мѣсто. Кость же иногда сама собою чрезъ мышечное и связочное движеніе по тому мѣсту, по которому вышла, опянь возвращается, или руками лѣкарскими, а сверхъ того и различными машинами вправляется. Ежели кость маши-

О о о 3

на-

нами вправливается , по смотрѣть должно , чтобъ всегда въ свое мѣсто поюже дорогою , которою вышла , назадъ возвратилась.

§. 1113.

А что кость на свое мѣсто вправлена , попому знать можно , ежели опухоль (1105) опадетъ , боль уменьшится , и удъ отъ неповрежденнаго мѣста , не отдѣляется (1106). Обыкновенно остается опухоль и боль , которыя не отъ вывихнутой кости , но отъ удару претерпѣннаго дѣлаются (1109).

§. 1114.

Когда кость на свое мѣсто вправлена будетъ , то у молодыхъ и сильныхъ людей она одними связками и мышками удержится. Однакожъ членъ чрезъ нѣсколько дней обвязавши обвязкою и суконками носить , чтобъ онъ какъ ни будь ослабѣвши опять изъ мѣста своего не выскочилъ. Ради того также должно удъ или упиральникомъ или каналцомъ подвязать , и носить. Но такъ его положить , чпсбъ силы въ связкахъ и мышкахъ не было. Надлежитъ же по прощесствіи и утоленіи вожженія , и какъ удъ нѣсколько дней въ покоѣ будетъ , опять его къ дѣламъ своимъ пріобучать. Сіе движеніе , покуда еще будетъ боль и вожженіе , бѣдственно быть можетъ ; а какъ оныя пройдутъ , не отменно надобно бываетъ , понеже оно не допуститъ , чтобъ сало въ составѣ сбѣлось , и составъ недвижимъ былъ бы (1004). Лѣкарства въ народѣ употребляемая , почти вовсе излишни.

§. 1115.

Гдѣжъ должно опасаться , чтобъ отъ ослабленія связокъ въ составѣ безсиліе неоспалось , на оный со-

составъ ; прежде завязанія положить суконку въ нѣ-
 сколько разъ сложенную , въ ренскомъ крѣпкомъ ,
 красномъ , горячемъ или въ уксусѣ съ водою смѣ-
 шанномъ обмоченную и выжатую. Въ эпемъ какъ винъ
 такъ и въ уксусѣ очень хорошо варить корни пор-
 меншиллы , бисторте , бріоніе , сигиллы саломонисъ ,
 травы , агримоніе , абсинтіи алхимиллы , мабране ,
 серпиллы , рупе , лавендулле , и прибавляется на-
 шатырь или соль простая. Людямъ же полноцѣль-
 нымъ полезенъ спириитъ маприкалисъ , серпиллы , люм-
 брикорумъ перреепріумъ , формикарумъ. Сіи всѣ и
 для того въ такихъ случаяхъ пособствуютъ , что
 ими и новая крѣпость дается связкамъ и мышкамъ ,
 и что ими же воженіе меньше дѣлается. А кто на
 пластыри надѣется , пошъ долженъ въ то время ,
 когда никакого воженія не будетъ , или очень ма-
 ленькое воженіе на составъ будетъ , прикладывають
 сочиненный пластырь отъ вуртзія , называемый
 дефенсивумъ вириде. Пластырь же накладывать дол-
 жно , чтобъ не со всѣмъ удѣ обнималъ. Иногда ,
 ежели такіа лѣкарства съ начала не будутъ употре-
 блены , въ составъ слабость остается , и боли слу-
 чаются подъ ненастью переменныя , иногда сильныя ,
 иногда вовсе ихъ не слышно бывашъ.

§. 116.

Ежели же великая слабость послѣ сего лѣченія
 въ составъ останется , по сверхъ сихъ лѣкарствъ
 приличны также пластыри ; изъ числа оныхъ окси-
 кроцеумъ и сапонашумъ барбестте , другимъ пред-
 почитаются. Много пособствуетъ потираніе , еже-
 ли удѣ почаще и долго , ежели можно , самому со-
 бою , ежели же не можно , другому кому велѣтъ
 дѣлать.

двигать , и въ дѣйство приводить , чтобъ онъ къ тому пріобыкъ. Тереть можно теперь сказанными ликворами или спиртами химически пріугоповленными. Однакожъ такое спиртами переніе молодымъ и шѣлистымъ людямъ болше полезно , нежели сухоцавымъ , изсохлымъ и старостию сѣденымъ , шѣмъ полезнѣйшія масти. къ мазанью полезнѣйшая всѣхъ масть , унгвендумъ нервинумъ называемая , смѣшанная съ масломъ гнапымъ каріофиллорумъ , оригани , серпилли , розмарини , абсинтіи и съ бальсамомъ перувіанумъ. Также полезны куренія (1072) , и суконками шерстяными втираемыя , къ больному мѣсту прикладываать должно банки или рожки. А припомъ всякъ можетъ знать , что лѣченіе такъ ослаблыхъ частей въ скоромъ времени исполнено бытъ не можетъ

§. 1117.

Вывихнутые уды великимъ воженіямъ бывають подвержены (1109) , которыя иногда отъ удару и паденія дѣлаются , иногдажъ отъ кости вывихнутой , которою жилы кровевозвращательныя даются (1101). Знать это могутъ тѣ , которые жилы кровевозвращательныя напряглыя по уду разсѣянныя у себя видятъ. Есть и другой знакъ тому. Ежели кость великою силою будетъ выдернута , и воженіе отъ зашибенной кожи и мяса дѣлается , оное по большой части въ томъ мѣстѣ будетъ больше , по которому ударено ; ежели же кровевозвращательныя жилы даются , то будетъ конецъ уда того пухнуть , и воженіе будетъ пріумножаться , и до состава доходить. Въ первомъ случаѣ , ежели воженіе отъ наружнаго приключенія дѣлается , и на составъ сильно усилится , онаго

онаго дражнишь не надобно, но сперва его нѣсколько пооблегчить, и для того должно кровь пуспити, и велѣть покойну быть, и прикладывать кѣ больному мѣсту вещи, отъ которыхъ опухоль и боль пропадетъ (79, 80, 81, 1115). Также ежели горячка приключится, отъ оной приспойными лѣкарствами и воздержаніемъ избавляться. По уменьшеніи или по окончаніи вожженія, кость вправить. А гдѣ вожженіе отъ вывихнутой и жилы кровезовращательныя давящей кости здѣлается, то должно поспѣшить, и кость, какъ возможно, скоро на мѣсто, откуда выскочила, вправить. Ежели же послѣ вправленія кости опухоль и вожженіе будетъ продолжаться, то опасаться надобно Анпонова огня, понеже перервана жила бьющаяся, или жила кровезовращательная изъ которой кровь течетъ (*).

(*) Я знаю, что это въ одно время лежащаго, и руку излишне вышатающаго ошибкою здѣлалось (423).

§. 1118.

Ежели человѣкъ будетъ ражой, и полнокровной, требуется послѣ вправленія кости кровь пуспити. Ежели горячка присунется, отъ оной избавится можно, разсуждаячи причину, по которой и способы лѣченія употребить. Ежели горячка и боль будутъ больше дѣлаться, то временемъ гной пупъ родится, чирей безверхушешный бываетъ, которымъ составъ и связи его повредиться могутъ, а особливо, ежели гноеніе глубоко сокровено будетъ, оный и несозрѣлый, и не дожидаясь созрѣванія, прорѣзать должно (96, 993).

§. 1119.

Гораздо тяжелѣе, ежели кость вывихнутая да еще и переломлена будетъ. Въ такомъ случаѣ ста-

П и п

рается

рапья надлежитъ, прежде вывихнутой членъ, а послѣ костные обломки на мѣста свой вставишь. Великимъ бѣдствіямъ удѣ подверженъ бываетъ, ежели кость близъ сосава, вывихнутого, переломлена будетъ: Ибо кость пользовашь и довольно выпягивать не возможно. Въ такомъ случаѣ обломки межъ собою должно совокупить, и дожидать, покуда онѣ глыбою не скрѣпятся. Тогда пробовать надлежитъ, не могутъ ли раздѣленные кости одна съ другою совокупиться. Между шѣмъ, чтобъ составъ недвижимымъ не дѣлался, надобно его водою теплою и масломъ припаривать. Этотъ случай ежели застарѣетъ, рѣдко благополучно оканчивается (1109).

§. 1120.

Голова на шѣѣ держится двумя опростками плоскими, или мышелками, по бокамъ дыры великой лежащими, сквозь которую въ затылкѣ спановая жила съ мозгомъ головнымъ сопряженная низходитъ. Эти мышелки продолговаты, хрящикомъ пріумячены, на срединѣ горбоваты, и поперешною линією раздѣлены наискось на внѣшнюю сторону наклонены, на переднюю сторону идучи, одинъ къ другому поближе дѣлаются. Передняя у нихъ часть нѣсколько повыше и пошире, а задняя сторона пониже и поуже, однако въ нихъ и въ другихъ непремѣннаго я ничего не примѣчаю. Мышелки сии принимаются двумя продолговатыми, также искосистыми, и по срединѣ поперешною линією раздѣленными ямочками, на верхнихъ опросткахъ искосистыхъ имѣющимися, или членосоставленіями позвонка перваго. Ямочки оныя слово въ слово пакъ велики, какъ велики мышелки теперъ описанные. Чего ради и опростки членосоставные верхніе, оныя лу-

луночки имѣющіе , на задней сторонѣ нѣсколько повы-
сокованіе на срединѣ гораздо вдавлены , и ямисты ,
спереди не очень ниски , а въ прочемъ къ передней сто-
ронѣ наискось наклонены. Сей составъ , и какъ запыло-
шные мыщелки , такъ позвоношные членосоставные
отростки , держатся или укрѣпляются связками крѣп-
кими , на подобіе чехла ихъ , обнимающими (1096) ; и
чтобъ часто о томъ не говорить , это всѣмъ составамъ
и позвоношнымъ шутъ же общее есть. Нѣкоторыя
связки имѣются , которыя отъ запылка начинаются , и
къ верхнему и приподнятому краю позвонка первого при-
крѣпляются. Также имѣется перепонка крѣпкая , кото-
рая внутри въ позвонкахъ проходимыхъ отъ запылка ,
до самой крестцовой кости съ спановою жилою прохо-
дитъ. Ибо эту , и спановая жила прикрывается , и ко-
сти , къ которымъ прикрѣпляется , держатся. Не на-
добно пропустить плевы , связкъ подобной , ко-
торою спереди всѣ позвонки и ихъ тѣла покрываются.
На семъ составѣ голова держится , и онъ попускаетъ
головѣ кланяться , а не на бока движеніе имѣть.

§. 1121.

Первый шѣйный позвонокъ , атласъ называемый ,
къ низу также два отростка членосоставные имѣетъ.
На нихъ нѣсколько пологія лошинки имѣются , или
площадки наискось идущія , которыя изнутри къ
наружѣ и къ низу клонятся. Имъ соотвѣтствуютъ
другія площадки , нѣсколько горбоватыя , на отро-
сткахъ членосоставныхъ верхнихъ другаго позвонка
имѣющіяся , которыя наискось къ наружной сторонѣ
клонящіяся. Между хрящиками , которыми сихъ по-
звонковъ концы у отростковъ смягчены , иногда
другіе особо и на срединѣ лежащіе маленькіе хрящики

П п п 2

сы-

сыскиваются (1098); отъ этого соспава свободное головѣ на оба плеча движеніе бываетъ.

§. 1122.

А чтобъ шѣя лучше въ различныхъ движеніяхъ и наклоненіяхъ голову держать могла, съ передней и плотной стороны другого позвонка произрастаетъ великой, полспой и значной отростокъ, зубоподобный [денциформисъ или одонтоидесъ] называемый, потому что показалось нѣкоторымъ, будто онъ на зубъ походитъ. Оный крѣпкою связкою, отъ самой его верхушки произходящею, на запылкѣ и на его отросткѣ завѣсоподобномъ [сфеноидесъ] называемомъ, и на самомъ и переднемъ краю у большой дыры привязывается; у первого же и верхняго позвонка передняя сторона будто бы выхвачена лункою, также хрящикомъ прикрыта, въ которую сей отростокъ зубоподобный, мягкимъ хрящикомъ также одѣтый, съ боку вкладывается. Сей же отростокъ крѣпкою связкою привязывается, въ первомъ позвонкѣ съ одной стороны на другую позади его проходящею (1092 ***).

§. 1123.

И такъ голова соспавомъ между запылкомъ и первымъ позвонкомъ наклоняется и всклоняется, чрезъ соспавъ межъ первымъ и вторымъ позвонкомъ находящимся на бока вершится; а чтобъ запылкѣ отъ первого позвонка не отспавалъ, не допускаютъ до того отростокъ оный зубоподобный и связи его, которыя изъ числа крѣпчайшихъ связокъ почитаются, и не позволяютъ головѣ далеко отшатаиваться. Того ради ежели голова свихивается, то между собою одинъ оцѣ другого опходитъ первый и второй позвонокъ, въ

въ которомъ составъ наибольшее движеніе есть. Это случится можеть, ежели связки подъ запылкомъ крайне сильно вытянуты будуще, и въ тоже самое время голова на бокъ повернется. Я не повѣрилъ бы, чѣмъ такой случай какимъ ни будь способомъ лѣчить можно, понеже во время такого движенія спановая жила приписнется; а какъ она списнется, то всѣ жилы чувствительныя, отъ шѣи до самого низу нисходящія, нечувствительны дѣлаются (*).

(*) ПЕТИТЬ въ помян. мѣст. Т. 1. Стр. 66. исторію представилъ о парнѣ, котораго мужикъ, ухватя обѣими руками за голову, приподнял. Когдажъ мальчикъ борохтался, и шѣишкомъ приподнятой на воздухъ долго шатался, позвонки межъ собою раздвинулись и соскочили, и мальчикъ въ минуту умеръ. Нѣкоторой способъ лѣченія представили ПЕТИТЬ и другіе, толькожъ изъ самой той его повѣсти разумѣть можно, что никакъ лѣчить того не возможно. Позвонки, пятой и шестой отъ жестокаго удара межъ собою раскочившеся, и спановую жилу пополамъ перерваную въ тѣлѣ мертвомъ видѣли Авторы выборные изъ Медиковъ Франкофуртскихъ. Сказываютъ, что человекъ до тринадцати еще часовъ послѣ удара жилъ. Вол. 1. Примѣч. 2.

§. 1124

Что шѣя свихивается, и голова бываетъ на боку отъ поврежденія мышекъ и кожи, уже нѣкоторые примѣтили (*). Ежели кожа будетъ обожжена, и съ нею мышка [пластисмаіоидесъ] и худой спрунъ голову понурою здѣлаетъ, употребить должно жидкія припарки (226), или кожу разрѣзать. Тогда разрѣзъ развеситъ, и въ него свинцовую бляшку положить надобно, чѣмъ спрунъ ширѣ и по мѣсту здѣлался (581). Ежели же мышка тупѣ подобная, жестка и скорчена будетъ, нѣкоторые сухую жилу иной мышкы перерѣзывая осмѣливались, и объявляютъ, что голова потчасъ прямо начала споять, и рана безъ

П п п 3

вре-

вреда залѣчена (**). Не трудно лѣчить, ежели одна мышка типкѣ подобная повреждена будещѣ, и для того другая будещѣ натягивашся. А понеже мышкою типкѣ подобною правою голова на лѣвой бокѣ, а лѣвою на правой верошится, по мышка поврежденная на томѣ боку, на которой голова клонится. Кѣ этой мышкѣ употреблять лѣкарства, которыхъ при разслаблѣхъ удахъ съ пользою употребляются, перенія выше предложенныя (1072, 1115, 1116). Пособствуемѣ также, надѣ мышкою не дѣйствительною самую кожу разсдвинѣ прикладываніемѣ шпанскихѣ мухѣ или горчицы и другихѣ острыхѣ вещей. Весьма тутѣ надобна обвязка, которою полегохоньку голова назадѣ отводится (***) . Чпю случается мышкамѣ типкѣ подобнымѣ, похѣ дѣлаться можещѣ и надѣ другими мышками, надѣ селезеночными, обѣятельными [спленіи комплекси] прямыми, и надѣ пропчими, которыми голова держится (****).

(*) . Смотр. ВООЦІЕВЫ Прим. о дѣйствахѣ потерянныхѣ, гл. 5 стр. 14.

(**) Смотр. это примѣч. у ТУЛПІЯ въ кн. 4, гл. 58 стр. 371 у МЕЕКРЕНА примѣч. 33 стр. 136; с. Фиг. и у РООН. ГУУСЕНЪ примѣч. 22.

(***) Лѣченія такого примѣрѣ намѣ показалѣ Преславн. ВИНЗЛОВЪ въ запросѣ медицинскомѣ. Можещѣ ли въ узнаніи болѣзней смертныхѣ погрѣшностей не дѣлать, Анастоміи нѣсколко только знающій, въ Лютеціи 1732 года предложенномѣ § 3. и въ Комментар. К. А. Наукѣ 1735 года стр. 409, въ которыхѣ усмотришь и фигуру обвязки.

(****). Здѣсь присовокупи диссерт. Славн. МАУХАРТА о головѣ потупленной въ Туб. 1737 года.

§. 1125.

Челюсть нижняя имѣетѣ два отростка, или мышцелка верхнихѣ, широкихѣ, на переднюю сторону.

най-

наискось склонныхъ, которые, кажется, вставливаются въ шѣ ямки, которыя въ кости висошней подлѣ диръ ушныхъ бывають. Совокупляютсяжѣ мышелки круглыя съ отростками поперешными на передней споронѣ костей висошнихъ находящимися, гдѣ кости яремныя начинаются. Межѣ шѣми мышелками и теперь помянутыми ямочками по срединѣ хрящикъ (*) есть. Составъ объемлется связкою крѣпкою, или чехломъ, которая изъ оной ямочки кости висошней вышедши къ срединѣ хрящика очень плотно прикрѣпляется, и послѣ того мышелокъ челюстной объемлетъ. Кажется, что тутъ двѣ связки есть. Та, которою хрящикъ къ кости висошней привязывается, слаба, а та гораздо потуже, которая отъ хрящика низходитъ и мышелокъ обхватываетъ. Отъ этого дѣлается, что, когда разинешь ротъ, челюсть въ низъ опускается, хрящикъ этотъ, съ мышелкомъ связанный, поверхъ того поперешнаго отростка кости яремной подвинется, и великое движеніе въ составъ дѣлается. У этого состава назади привязана желѣза (1099), которая почти въ заушную желѣзу вцепившись само изъ себя выпускаетъ. Знаемъ же, что челюсть съ обѣихъ сторонъ крѣпкими мышками, висошною, жевательною и двумя мышелѣпучными приподнимается и держится. Мышки лѣпучемышной [птеригоидеи] наружной часпочка къ связкѣ оной и по срединѣ состава къ хрящику прицепилась (**).

(*). Смотр. въ МОРГАГНОВОМЪ примѣч. 2, фиг 1, 2, 3.

(**) Смотри обстоятельное сего состава описаніе отъ Пресл. МОНРО изданное въ тѣ Медикаль Эссейсѣ Вол. 1 примѣч 11. стр. 131 и Вол. 3 Примѣч. 13, стр. 261.

§. 1126.

§. 1126.

Челюсть никуда инуда , толко на переднюю сторону вывихивается , а то случается , когда мышцелки ея надъ пѣмъ поперешнымъ отпросткомъ кости яремной движутся. Ибо назадъ и на спороны ни на правую ни на лѣвую вывихиваться не можетъ , понеже напротивъ поставлены отпростки пипишные и шилоподобные. Для пѣхъ же отпростковъ , и на спороны движенья имѣшь неможетъ.

§. 1127.

Ежели челюсть на обѣихъ споронахъ изъ мѣста своего выскочитъ , то вся борода искривится , и на передъ высунется. Ежели же на одномъ боку вывихнется , то всегда она на проотивную сторону повернется , и зубы зубъ противъ зуба стоятъ не будутъ , но подъ передними или грызунами , клыки останутся. ротъ и въ томъ и въ другомъ случаѣ бываетъ разинутъ , и сжиматься не можетъ , да и слины много печь будетъ , человекъ ни говорить , ни жевать не можетъ , и насилу глотать можетъ : Ибо вывихнутой челюсти переднѣ вѣнечные отпростки , къ которымъ мышки височныя привязаны , подъ кости яремныя спрячываются , и не допускаютъ , чтобъ челюсть приподнималась.

§. 1128.

Челюсть изъ мѣста своего выскакивать не можетъ никогда , толко когда бываетъ ротъ разинутъ , или человекъ зѣваетъ , и въ то время поней кпо ударитъ. Часто челюсть вывихивается и во время зѣванія отъ великаго и непомѣрнаго смѣху , а то случается , пѣмъ , у которыхъ связки некрѣпки.

§. 1129.

§. 1129.

Ежели челюсть въ мѣсто свое вправлять надобно , то человека должно посадить на скамейку , такъ , чтобъ пособнику можно голову его держать , или , чтобъ онъ сѣлъ подлѣ стѣны , положивши межъ стѣною и головою его кожаную подушку жесткую ; голову его здѣлать неподвигною : Тогда лѣкарю персты болшіе пряпочками или обвязками обвернувши , въ ротъ на зубы коренные задніе положить , а другіе персты и самую ладонь снаружи такъ на бороду наложить надлежитъ , чтобъ бороду и челюсть крѣпко могъ захватить . Перстами въ ротъ вложенными челюсть на низъ придавить , а ладонью въ туже самую минушу ее , какъ на низъ подавить , назадъ попихнуть . Ежели на одной только сторонѣ она будетъ вывихнута , то труднѣе вправляется . Тогда только что съ той сторонѣ , на которой вывихнулась челюсть вдавливать , а наискось съ противной сторонѣ , бороду брать , и такъ ее назадъ вправлять должно .

§. 1130.

Нѣкоторые , для вправленія на мѣсто свое челюсти человеку больному пощочину дають , другіе кляпъ жесткой промежъ зубовъ кладутъ , и онымъ будто бы рычагомъ челюсть на низъ придавливаютъ , послѣ которыхъ лѣченій большія досадности часно слѣдуютъ . Когда челюсть на мѣсто вправлена будетъ , тогда можно и завязкою или длинною псемою обвязать , съ обоихъ концовъ въ длину почти до самой середины разрѣзанною , оной серединою бороду обнять , а концами двумя у человека голову ; другими двумя шѣю обвернуть , и опѣ шѣи на лобъ

Р р р

при-

приведши, завязать. Въ другомъ мѣстѣ эту обвязку я пращею [фундамъ] назвалъ.

§. 1131.

Шѣйные, хребетные и поясничные позвонки раздѣляются на переднюю и обширнѣйшую часть, шѣломъ или корпусомъ называемую, и на отростки, изъ которыхъ каждой позвонокъ (ежели самой верхней и другой шѣйной выключишь), о которыхъ уже сказано (1120) семь имѣетъ. Ихъ имѣется четыре косыхъ или членосоставныхъ, два поперешныхъ и одинъ задній, спинной или остѣнный называемый. Членосоставныхъ два верхъ, и два въ низъ торчатъ. Сии членосоставные отростки межъ собою совокупляются строеніемъ нѣкоторымъ, такъ, что одинъ другому подставкою бываетъ. Ежели на хребетную кость съ задней стороны прилѣжно посмотримъ, то внизъ торчащіе отростки верхняго позвонка приходятъ на отростки членовные, опъ нижняго позвонка произходящіе. Сихъ отростковъ самая верхушечка плоская, хрящемъ умяхченная, на позвонкахъ шѣйныхъ наискось лежитъ. А на позвонкахъ хребетныхъ и поясничныхъ оная площадка прямо къ верху и къ низу смотритъ, и передняя противъ задней положена. Въ позвонкахъ поясничныхъ сии отростки почти бокъ съ бокомъ сходятся, и къ верху торчащіе отростки жолобоваты; которые принимаютъ въ себя въ низъ торчащіе отростки позвонка верхняго. Самаго нижняго позвонка поясничнаго отростки исподнѣ вставляющіяся въ другія луночки, на кости крестцовой здѣланныя.

§. 1132.

Позвонки многими и крѣпкими связками посвя-
заны и укрѣплены. Первая жесткая и хрящевая есть
связ-

связка пружая и гибкая, которою позвоношныя пѣла связываются. Состоитъ она изъ многочисленныхъ въ округѣ идущихъ мягкихъ и гибкихъ хрящиковъ, изъ нихъ внѣшніе поширѣ окружающіе меншіе внутренніе обнимаютъ. Сіи пѣла сверхъ того другими многими короткими связками держатся, которыя одна съ другою на подобіе литеры Х, переплетаются. Отъ самого нижняго края верхняго позвонка начинаются, сверхъ помянутой теперь связки хрящевой наискось идущъ, и къ краю верхнему внизу лежащаго позвонка прицепливаются. А эти связки обѣмлются еще тою связкою, которою позвоношныя пѣла прикрываются [1120]. Присовокупляется шупъ и она, что внутри позвонковъ съ спановою жилою проходитъ (1120). Съ этою связывается другая, которая по порожнимъ мѣстамъ на спинѣ межъ позвонками оставленнымъ отроспки спинные и ихъ основанія межъ собою связываетъ. Отроспки членосоставные по подобію другихъ, въ соспавахъ находящихся, обнимаются чехлами (1090, 1120). Иныя связки есть между отроспками спинными, инныя между отроспками поперешными, которыя по большей части, кажется, мышечное мѣсто занимаютъ. Есть еще нѣкоторыя между кончиками отроспковъ спинныхъ, которые, во время человѣческаго при дѣлахъ згибанія, не даютъ ему сверхъ надлежащаго наклоняться.

Смолт. ВИНЗЛОВА дес' ось фрѣсб §. 314.

§. 1133.

Рѣбра, и напротивъ позвоношныхъ пѣла, и напротивъ ихъ отроспковъ поперешныхъ, лежащіе, въ первой своей части круглы и нѣсколько будто бы головасты. Они еще по двѣ головки маленькихъ

Р р р 2

имѣ-

имѣютъ, которыми совокупляются съ другими маленькими нѣсколько приподнятыми шишечками, а припомъ вдавленными, ровными или нѣсколько лоцинковатыми и хрящикомъ здѣланными, которыя на задней споронѣ по краямъ двухъ надъ ними лежащихъ позвонковъ и на ихъ тѣлахъ видѣть можно. Однакожъ въ томъ есть нѣкоторое разнство: Ибо перваго и двухъ послѣднихъ нецѣльныхъ реберъ головки не съ двумя позвонками, но однѣмъ и съ его тѣломъ совокупляются. И эти составы своими связками связываются. Близъ реберныхъ головокъ также маленькія желѣзы, жиръ въ составъ дающія, находятся (1099).

§. 1134.

Ребра же горбками другими вспаиваются въ поперешные отростки нѣсколько лункою здѣланные позвонковъ нижнихъ, и крѣпкими связками связываются. Два ребра послѣднія нецѣльные съ оными отростками не сходятся, но опъ нихъ опдѣлившись на однѣхъ связкахъ держатся. И такъ спановая кость или спина изъ многихъ костей составлена, и такъ устроена, что человекъ прямо стоять и ходить и къ надобнымъ трудамъ можетъ згибаться. На бока также нѣсколько нагибаться можетъ, а навзничъ кривиться не можетъ. Шуповскія дѣла дѣлающіе люди такую привычку тѣлесную получаютъ чрезъ долгое времянное въ томъ упражненіе, чрезъ которое связки, а особливо оныя хрящевыя, въ гибкихъ отросткахъ тѣлахъ по времени некрѣпкими дѣлаются, расслабляются и выпягиваются.

§. 1135.

Рѣдко позвонки вывихиваются: ибо ради оныхъ прекрѣпкихъ хрящевыхъ связокъ, чрезъ посредство
ко-

которыхъ. пѣла ихъ связаны (1132), межъ собою раздаваться не могутъ. И здѣлаются же по просто не можеть, развѣ спановая жила, внутрь хребетной кости идущая, будетъ раздавлена и перервана. Это ежели случится, по части нижня, до которыхъ жилы чувствительныя изъ спановой жилы произведенныя принадлежатъ, недействительны здѣлаются, калъ и моча запираются, и на послѣдокъ безъ хотѣнья прорываются, а человекъ чрезъ нѣсколько дней умираетъ.

§ 1136.

Однакожъ иногда случается, что пѣла позвоношныя на своемъ мѣстѣ остаются, а отростки ихъ членосоставныя изъ мѣстъ своихъ выскакиваютъ такъ, что отростки изъ нижняго позвонка проиходяще, на заднюю сторону выдвинуты, и надъ отростками верхняго позвонка въ низъ смотрящими спанутъ. Это обыкновенно случается въ позвонкахъ нижнихъ хребетныхъ и поясничныхъ, когда человекъ во время своего въ низъ наклоненія прямо или на бокъ, сильно зашибенъ бываетъ. И подлинно отростки оные на обоихъ бокахъ вонъ выскакиваютъ, ежели человекъ будетъ прямо въ землю нагнувшись, а ежели на бокъ на поплъ или на другой наклонится, завсегда на противоположной сторонѣ выскакиваютъ. По большой же части не одинъ позвонокъ, но два и больше позвонковъ, такъ извихиваются.

§ 1137.

Такого случая знакъ такой, ежели человекъ нагнутый зашибенъ, онъ прямо стоять не можетъ, а только напередъ, или на бокъ будетъ клониться. Первое случается, ежели отростки членосоставныя на

Р Р Р З

обѣ

обѣихъ споронахъ соскочатъ , а на бокъ клонятся шопъ , у котораго на одномъ боку по случиюся. При всемъ томъ боль бываетъ , которая нѣсколько облегчается , когда человекъ на брюхъ лежа , голову , сколько возможно , приподнимаетъ. Мнѣ кажется , что составы на обѣихъ споронахъ свихнушыя легче вправляются , нежели на одномъ боку.

§. 1138.

Древнихъ ложное было мнѣніе , будто бы позвонки со всѣмъ одинъ отъ другаго отдѣляться , и со всѣмъ попрежнему на свое мѣсто вправляться могутъ. Потому и всѣ роды махинъ ихъ , для выпягиванія хребетной кости и для вправленія позвонковъ изобрѣтенныхъ , излишними мнѣ кажутся. Человека на скамью брюхомъ клали , и одною тесмою грудь обвязывали , а другою поясницу. Обѣ тесмы въ разныя стороны протягивали , и чѣмъ спину сильнѣе выпянутъ , оныя тесмы къ крѣпкимъ палкамъ привязывали , и ихъ самыми концами въ пропиль лежащія пороги упирали. Другіе также концы тесмъ къ осямъ съ обѣихъ сторонъ по концамъ у скамьи лежащимъ привязывали , и ихъ вѣропами завертывали. Вытянувши довольно связки , какъ то они думали , приказывали прислужнику на спину человеку спановившись , и пятою позвонкъ на вышнюю сторону высунувшійся внутрь вдавливать. Иные , на человека сѣвши своею жою , или доскою , поперегъ положа , и съ обѣихъ сторонъ приписнувъ , позвонки назадъ вправлять повѣлывали. Но все то напрасное , понеже такимъ способомъ членосоставныхъ отпростковъ одинъ отъ другаго довольно не отпянешь , и прежде почти всѣ связки , ежели кто такимъ образомъ связки ,

ки, и мышцы поразсудитъ, перервешь, а припомъ позвоночные спинные отпроски переломаться могутъ.

(*) Смотри фигуру въ ХАРТЕРІЕВОМЪ издан: ИПОКРАТ. Т. 12 стр. 38 Таб. 4.

§. 1139

Итакъ, когда отпроски членосоставные вывихнутъ, оныя одинъ отъ другаго свободно разпягиваются, такимъ образомъ человѣка на круглую какую нибудь бочку, подложивъ сперва подушку, брюхомъ положить, а пособщикамъ, какъ грудь, такъ ягодицы его попридержать и порастянуть велѣшь. Когда же такимъ образомъ довольно межъ собою пораздвинутся составы, оныя отъ умѣренного тѣлеснаго згибанія, когда человѣкъ опять впрямъ встанетъ, вправляются; ежели когда на одной сторонѣ составъ свихнутъ будетъ, такъ что человѣкъ, не такъ на брюхо, какъ на проливной бокъ скорчившись будетъ, того также на томъ бокъ, на которой онъ напужится, наискось положить должно. Вправивши на мѣста свой составы, потребны бываютъ лѣкарства пѣже, которыя къ ослабѣмъ связкамъ приличны по моему выше объявленію (1115). Накладывается обвязка, которая чють не ко всѣмъ вредностямъ на груди и на самомъ брюхѣ случающимся, общею можетъ назваться, которая и именуется мантейка съ подпечкою [маншиле кумъ суспенсоріо] (693, 700).

§. 1140.

Въ спинѣ временемъ связки также сильно напругаются, хотя позвонки и членосоставные ихъ отпроски на мѣстахъ своемъ бываютъ. Сіе случается можетъ у дѣтей, когда онѣ пѣлишкомъ будучи слабы во время различныхъ движеній и згибаній ушибаются, и у взрослыхъ, когда они тяжкую работу работаютъ.

юшѣ , тяжкія бремена различно пѣломѣ нагибаясь поднимаютѣ , ворочаютѣ , и носятѣ , или согнувшись всепѣлесною ретивостію на что нибудѣ налагаютѣ . У таковыхѣ боль дѣлается такая , которая отѣ хребта до предсердія доходитѣ , и понеже съ перепонкою брюшинною преградѣ поперешной , достигается , то можетѣ послѣдовать расслабленіе , тошнотѣ и частое блеваніе . Народѣ думаетѣ , что въ спинѣ нѣчто свихнуло , и сисятѣся всякими способами оное , по ихѣ мнѣнію вывихнутое , вправляють . Ежели человекѣ будетѣ взрослой , того на полу , или на скамѣечку сажаютѣ , а колѣномѣ своимѣ въ спину упираютѣ , и рамена его надѣ грудью сложенные руками берутѣ , и сильно вытягиваютѣ . А младенцамѣ , о которыхѣ думаютѣ , что такѣ повреждены на пупокѣ горшокѣ накладываютѣ и придавливаютѣ , а между пѣмѣ все пѣло шрутѣ .

§. 1141.

Самое ясное доказательство народнымѣ мнѣніямѣ противорѣчитѣ , который , подлинныхѣ причинѣ не знаячи , по большей части напрасно съ этомѣ расстройство позвонковѣ думаетѣ , да къ тому еще спранные и непотребныя пособія изобрѣлъ . Ибо оная боль съ изнеможеніемѣ и тошнотою часто случается , наибольшее младенцамѣ , когда у него въ желудкѣ больше того напихано будетѣ , нежели что онѣ сварить можетѣ , когда у него на низѣ запорѣ бываетѣ , и въ кишкахѣ вѣшны . Да и имѣ иногда легче дѣлается , когда попрутѣ ихѣ такѣ , какѣ обыкновенно дѣлается ; ибо чрезѣ то вѣшны разбиваются . Ежели же по подлиннымѣ знакамѣ , а особливо по разсужденію причины , узнается , что нѣсколько повыпянуны были спинныя связки , оныя со временемѣ

немѣ сами собою и чрезѣ отдохновеніе укрѣпляющся. Однакожѣ не бесполезно попираніе и лѣкарства оныя, которыя выше (1116) къ разслабленнымѣ составамѣ полезными я предложилѣ. Ежели хрящевой и мечеобразный отростокѣ [апофисисѣ ксифоидесѣ] у грудной кости имѣющійся, подѣ которымѣ желудокѣ лежитѣ, отѣ удара или отѣ упаденія на заднюю сторону вогнешся, и будетѣ желудокѣ давить, оный банкою или накидываніемѣ горшка на прежнее мѣсто выпянуть можно. Толькожѣ ихѣ не на пупѣ накидывать, но на самую оную ямочку подѣ грудью находящуюся приставлявать должно.

§. 1142.

Народная погрѣшность есть; что позвонки хотя не бывають вывихнуты, однако на которую ни будь сторону высовываются, и ребята горбаты бываютѣ. Примѣчаніе научило, что это случается предѣ прочими ребятамѣ отѣ слабосильныхѣ родителей рожденнымѣ, молодымѣ, тончавымѣ, нѣжно воспитаннымѣ и лѣченымѣ: Ибо такой погрѣшности многіе обрасцы имѣются. Первое, ежели спина назадѣ крива будетѣ, *κύφωσις* или *κύρτωσις* называется, Противное сему *λόρδωσις*, гдѣ спина на переднюю сторону внупрѣ выпятитѣся, а назади будѣло лунастая и вогнутая будетѣ, такѣ, что грудина будетѣ торчать. Вѣ *σκολίωσι* спина излучиною согнувшись, на бокѣ наклонитѣся (*); а припомѣ шутже разсматривать должно лопатки, изѣ нихѣ часто одна высоко торчитѣ, а другая нѣже опуститѣся. Иногда же лопатка отѣ реберѣ гораздо далеко отдѣляется, и на заднюю сторону высовывается (**). Ежели же лопатки на своемѣ мѣстѣ не будутѣ, то и спинѣ

С с с

въ

въ разныхъ стороны изогнуться и извиться должно. Иногда у горбачьихъ кости лонныя въ своемъ мѣстѣ не бывають, но одна впадетъ, а другая выпятившись будетъ, отъ чего и спина на противную сторону выпячивается и кривляется.

(*) Смотри у ГАЛЕНА въ Комментар. 3 на книгу ИППОКРАТОВУ о Составахъ Текст. 2 Т. 12 стр. 368, но онъ еще къ этимъ образцамъ придаетъ, τῆν στήνιν, ὅ ταν διακινηθῶσι μὲν αἱ ἀρμύαι, κατὰ χῶραν δὲ οἱ σφύβυλοι μένωσι. Мнѣ кажется, это состояніе такое, когда расслабнувъ связки всѣ, такъ, что спина на всякую сторону, а приномъ и назадъ гнуться можетъ (1134).

(**) Такіе у ГАЛЕНА называются πτερυγώδεις, у которыхъ на подобіе крыльевъ лопатки торчатъ.

§. 1143.

Ежели же лѣченія способъ а по большей части изъ познанныхъ причинъ такихъ погрѣшностей произвести въ намѣреніи положится, то знать можно, что онъ рѣдко отъ одной, а больше отъ многихъ вкупѣ, дѣлаются, и по за причину принимаютъ, о чемъ больше будутъ объявлять. Между несложными и явными причинами почтается, когда отъ паденія, отъ удара и отъ сильнаго движенія связи ослабѣвають, и самыя кости и отростки ихъ мягкія совокупленія съ собою имѣющіе, не такъ вывихиваются, чтобъ вовсе изъ своего мѣста выскакивали, однакожъ на которой ни будь бокъ согнувшись будутъ торчать. Это дѣлается можетъ младенцамъ, когда ихъ во время рожденія, руками повивальной бабушкѣ поправляють, а временемъ назадъ вправляють и руками вонъ вынимають надобно бывають. Также, и кормилицы по дѣлають, когда младенцевъ упасъ хонящихъ и съ вышины падающихъ руками крѣпко подхватываютъ, и схва-

схватываютъ , и чашны , а особливо спину , крѣпко выпягиваютъ и поворачиваютъ. Ребята также въ играніи и различныхъ тѣлесныхъ движеніяхъ , а въ первыхъ борьбою , и когда на землю ложатся , или съ вышины бросаются , такія и другія удовѣ поврежденія получаютъ.

§. 1144.

А опытъ въ самыхъ такихъ лѣченіяхъ показалъ , что гораздо часто ребята горбатые бываютъ , когда ихъ тѣло въ какихъ нибудь упражненіяхъ тѣлесныхъ безперерывно и долго на которую сторону нагибается. Тоже самое дѣлается младенцамъ тѣмъ , которыми женщины сосцами кормящіе всегда только одну пищю даютъ : Ибо они принуждены бываютъ , скорчивши тѣло свое часто на одномъ боку лежать. Также младенцамъ иногда прикладывается и опѣ того , которыхъ не перемѣняячи съ руки на руку , но на одной рукѣ носятъ , а припомѣ носильщицы къ себѣ крѣпко и часто прижимаютъ , опѣ чего и спина гнется , и лопатка высовывается. Тоже иногда ребятка получаютъ въ спутыцахъ своихъ сплошь сидящіе , которые тѣло свое долго и всегда на одинъ бокъ кривятъ , а на другой , понеже тамъ стѣнка есть , согнуться не могутъ. Также мальчики въ школахъ пописывающіе , когда таблицу на одно колѣно , или на высокой столѣ , кладутъ. Дѣвочки , положно въ пелюды распявши вышиваютъ , и искривя голову на одно плечо съ лопаткою опускаютъ внизъ , а другую руку въ верьхъ поднявши и протянувши , сидятъ. Маркишанты и разнощники , которые товары на шибю повѣсивши для продажи носятъ , и оными обремененные по улицамъ и по перекресткамъ бродятъ ,

а о другихъ умолчу : ибо отъ такихъ и другихъ многихъ причинъ, напослѣдокъ при вступленіи въ силу, отъ непрестанной пріобычки, спина, лопатки и плеча, а сверхъ того иногда и лядвіи отъ натуральнаго своего мѣста и состоянія отдалаются, и оныя удовъ погрѣшности рождаются.

§. 1145.

А припомъ не мало различія есть и въ пѣломъ состояніи. О ребятахъ рахитидомъ страждущихъ уже я выше (1067, 1070) объявилъ. Также я показалъ, что отъ погрѣшности мышечъ кости кривиться могутъ, а то случается, ежели онѣ на одной споронѣ туги будутъ и сведены, а на другой расслаблены (1070. 1124) (*). ИППОКРАТЪ усмотрѣлъ, что ребятка отъ одышки [асема] и отъ кашлю, также и отъ волдырей около легкихъ вѣблавшихся (**), горбатыми бывають, а то дѣлается, когда злая нѣкопорою болѣзани матерія чрезъ *μελας αἷμα* не такъ въ легкія, какъ въ плесу подреберную и въ связки, которыми позвонки между собою держались, склонятся. Ибо связки отъ скопленія худой матеріи, и ежели изъ нее шишки рождаются, гораздо сволакиваются, да такъ, что ими молоденная хребетная кость согнется (***).

(*) Привнеси сюда прим. де ГОВЕОВО Ч. 2 стр. 165.

(**) Част. 6 Афоризм. 46 и о составахъ Част. 37 Т. 2 стр. 794, съ которыми сличи ГАЛЕНОВЫ Коментаріи, СЕВЕРИНА объ Абсцессахъ Кн. 6 и мою диссертацию о грудяхъ, въ Липси 1735 году изданную. Я имѣю скелетъ мальчика близъ двухлѣтнаго, у котораго на хребетной кости *хифосис* есть. Однако оный позвонокъ, который больше назадъ выпятился, внутри червоточиною сѣденъ.

(***) Достопамятная имѣется повѣсть Преслав. ХИКОИНЕАВА о дѣвочкѣ горбатой, у которой спина почти до естественнаго состоянія пришла послѣ горячки и послѣ великаго гнойнаго испражнения низъ. Ист. Кор. Ак. Наук. 1731 года стр. 724, привнеси сюда Диссерт. о грудяхъ.

§ 1146.

§. 1146.

Сѣи пороки только у дѣтей ш. с. у ребятъ дѣлаются, да и у тѣхъ только и сѣ начала лѣчить можно. Впервыхъ же надлежитъ прилѣжно разсудить оныя уже предложенныя и другія приключенія, отъ которыхъ оныя дѣлались, потому смотря и къ лѣченію способы избирашь: Ибо ежели внутри волдыри имѣются, или ежели тѣлесное состояніе испорчено, то рѣдко они исправляются. При всякомъ случаѣ крайнюю умѣренность имѣть надлежитъ, ибо ничего бѣдственнѣйше нѣтъ какъ спѣшеніе, и ежели лѣчить намѣряющіеся прибавивъ нѣсколько силки, грубыми да еще и желѣзными лапами кости высунувшіяся, чтобы назадъ вправить, сильно и непрестанно давить будутъ. Ибо ежели такими благодушными лѣченіями ребятка мучатся, то внутренности чревыя и связки припискиваются, отъ чего другія худыя, а временемъ и смертныя болѣзни рождаются. А понеже, какъ все шло, такъ связки, въ большее безсиліе приходятъ; то часто членовныя худости отъ такого худого лѣченія еще больше дѣлаются. *

(*) Этого лѣченія способъ тѣмъ наиболее погибеленъ, когда такіе люди и всю грудь и брюхо повседневно очень густо елеемъ и жирною матерією мажутъ, отъ чего вся влажность сквозь кожу проходитъ обыкаяя удерживается. Видѣлъ я молодчика, который чрезъ нѣсколько мѣсяцовъ лѣченъ былъ, у него перстыя кости послѣ того распухли.

§. 1147.

Для того мальчиковъ и молодчиковъ, у которыхъ спина гдѣ ни будь выпятилась, надобно въ шнурованіе шнуровать, не въ весьма жесткія и не гибкія, и не въ желѣзныя, но въ такія, которыя изъ киповыхъ усовъ плотно сшиваются, и къ тѣлу прямо принаравливаются. Оныя шнурованья такъ

С с с 3

приню-

приноравливать должно, чѣмъ онѣ выше приходили, и грудь, лопатки и самыя припомѣ плеча обхватывали; а припомѣ подѣ шнурованье прямо и съ великимъ прилѣжаніемъ приноравливать должно подкладки подушешныя изъ кожи, или изъ иной матеріи, копорая изъ волны и изъ нерести сваливается. ш. е. изъ войлока, копорыми нѣсколько будучи жескими шорчащія косточки пришискиваются. У младенчиковъ больше способна бываетъ обвязка, копорою вся грудь обшлется (*). Между тѣмъ, покуда нѣла шакъ за- всегда будетъ одѣто, или обвязано, по натуральному вырастетъ, оныя членовныя безобразія во все искореняются, или много поправляются.

(*) Называется сія обвязка каптафракта, а ошѣ другіхъ, квадрата. Обвязка въ два свитка свитая, самую среднюю кладется подѣ пазуху. Концами или свитками обвязочными верхушку плеча на томъ же боку обнимаютъ, и по груди также и по спинѣ проходятъ до другой подпазухи, опшуда на плечо, и обхвативъ его опять назадъ по груди и по спинѣ возвращаются. Ежели того больше потребуется, то еще нѣсколько разъ такимъ же манеромъ обвязкою поопложе къ верху проходя обойти можно. А послѣ того какъ свитками дойдешь подпазуху ту, подѣ копорую сперва положена, то ея около всего тѣла къ низу, будто бы виншикомъ проходя шакъ, обвиваешь грудь и брюхо, на копоромъ на послѣдні свитки кончашся, и иглою сшиваются. При томъ подѣ эту обвязку подложишь и на кости высунувшія наложитъ должно суконки, или аналекши-десѣ, копорыми кости исподоволь назадъ вдавливаются.

§. 1148.

Однакожъ все это мало пособствуетъ, доколѣ причина такихъ болѣзней не окончится. Болѣзни во всемъ тѣлѣ имѣющіяся, на примѣръ рахитидъ и другія, ошѣ копорыхъ оное удовѣ и связокъ расслабленіе родилось, приспойными лѣкарствами, здоровою пищею и умѣреннымъ и самой болѣзни приличнымъ тѣла движеніемъ, лѣчитъ должно. Особливо же пре- бущая прилѣжнаго и непрестаннаго примѣчанія, чѣмъ

чтобъ , или молодчики , которымъ это приказать можно , или и силы употребя стараться , шло и уды на противную сторону , и противъ худой пріобычки разогнуть. А понеже напередъ всего надобно по-смотръть на лопатки (1142) ребенковы , то когда онъ будетъ ходить оною рукою , на которой плечо пониже , опираться долженъ напалкъ высокой , а другою рукою , на которой плечо выше , долженъ тяжелое что ни будь носить. Ежели лопатки излишне отъ реберъ отдѣлились , оныя обвязкою , съ обѣихъ споронъ самая плеча обхватывающа , свободно назадъ иттииъ понуждающа . Лопатка съ плечемъ въ низъ опускается , когда тяжелое нѣчто повѣшеное на немъ будетъ носить. Какія лѣкарства къ мышкамъ , какъ недвижимымъ , такъ разслаблымъ и безсильнымъ , употреблять должно , уже въ другомъ мѣстѣ я объявилъ (1072 , 1115).

§. 1149.

Ребры гораздо чаще переламываются , нежели вывихиваются. На внѣшнюю спорону не могутъ вывихиваться , понеже противъ положенные отростки попережные позвоножные самый ихъ верхней конецъ держатъ. Не могутъ же легко какъ къ верху , такъ и къ низу вывихиваться. И такъ ежели вывихиваются , то вывихиваются внутрь , послѣ чего сильное воженіе и дыханіе трудное слѣдуетъ , понеже плева подреберная [плевра] будетъ давиться.

§. 1150.

Ежели къ верху или къ низу ребры вывихнутся , то велѣтъ больному человеку ту руку , которая надъ шѣми ребрами , сколько возможно , въ верхъ приподнимать , а между шѣми ребры въ мѣста свой лѣкаръ пер-

перспами своими долженъ вправлявать. А гдѣ ребры въ нутрь вывихнулись, тотъ случай труднѣе. Человѣка такимъ способомъ, какъ я' выше о вывихнутыхъ опросткахъ поперешихъ позвоношныхъ предложилъ, на круглую бочку другимъ бокомъ положить и гнуть, чтобъ ребры вправились. Много шумъ пособствуетъ, ежели рукою нѣсколько грудь будеть попискиваться. Ежели же такимъ способомъ ребры не вправятся, надобно на самой верхушечкѣ реберъ вывихнутыхъ, и на самомъ ея краешкѣ разрѣзать, и всунувши пуда перстъ ребры вправить. Что же до кровопусканія и до воздержанія касается, все то хранишь должно, что хранишь надлежалобъ, ежели великаго вожженія опасаться бы надобно. Нѣкоторые прорѣзавши кожу буравъ въ вывихнутое ребро ввертываютъ: Но этотъ способъ лѣченія, всякой человѣкъ мучительнымъ по многимъ причинамъ легко почтетъ.

§. 1151.

Кость копчикову или хвостецъ хрящъ, чрезъ посредство котораго она съ костью крестцомъ спавается, и сильныя связки держатъ. Кромѣ тѣхъ связокъ, которыми она съ крестцовой костью связывается, связывается еще другою, которую анатомики крестцосѣдалищною меньшею [лигаментумъ сакроишиадикумъ минусъ] называютъ (*). А припомъ къ кишкѣ заднепроходной и къ ея мышкѣ сжимающей и къ другимъ мышкамъ прицепливается,

(*) Смотри у ВИНЗЛОВА десь ось фрѣвъ §. 3.

§. 1152.

Оная косточка изъ мѣста своего выскакиваетъ, когда ее сильно давятъ, и перервавши середній хрящикъ

пикъ отъ крестца отдѣляется. На переднюю сторону она вдаивается, когда человекъ, навзничъ лежа, эту часть о какую ни будь жесткую вещь и неподвижную ударитъ. А на заднюю сторону она по большей части отъ выходящаго младенца въ родахъ, отъ руки повивальницыной выдвигается. Такого случая примѣты такіе, боль а наибольше тогда, когда человекъ ходитъ, сѣдитъ и на низъ испражняется. Бываетъ послѣ того вожденіе, а примомъ и гной дѣлается, который иногда и кишку заднепроходную прорываетъ. Изъ такихъ чирьевъ безверхушешныхъ такъ худыя болячки и фискулы, которые человека со свѣшу согнать могутъ, рождаются.

(*) Смотр. у ПЕТИТА тамже Т. 3 стр. 132.

§. 1153.

Кость, ежели на заднюю сторону вывихнется, чаложивъ руку легко на мѣсто свое вправляется, и спряшивается. А чтобъ она на мѣстѣ своемъ стоялась, противъ того понаклась надобно много толстыхъ и степенно одна другой больше здѣланныхъ суконкъ, и прикрѣпивъ ихъ такою обвязкою, какая при лѣченіи фискулы заднепроходной (696) употребляется. .Ежели же на переднюю сторону вывихнется, то она перстомъ, обмочивши въ масло (1006) и въ проходъ задній всунувши, вправляется. Въ ту пору надобно человеку на стулѣ на срединѣ прорѣзаномъ сидѣть, и такъ покояться: Ибо опасаться надобно, чтобъ она чрезъ движеніе опять на переднюю сторону не выскочила, а чрезъ отдохновеніе она съ крестцомъ совокупиться имѣетъ.

Т ш ш

§. 1154

§. 1154.

Ярма п. е. ключевой или яремной кости верхній конецъ составляется съ великимъ лопаткинымъ отросткомъ, самоплечнымъ [акроміумъ] называемымъ, который отростокъ на томъ концѣ нѣсколько пониже луночку имѣетъ. Между хрящиками, которыми какъ одна такъ и другая кость смягчена, обыкновенно временемъ находится еще малѣхонькой хрящикъ въ срединѣ. Нижняя головка ярма или ключика бываетъ попомяе, почти триугольная, которою она въ луночку весьма маленькую кости грудной вставля-
ется. Въ этомъ составѣ всегда хрящикъ быва-
етъ отъ шѣхъ хрящей, которыми кости кончатся, особенный, примѣчанія достойный и видный. Оба эти составы Ареродіи родомъ почитаются. Ярмо, съ отросткомъ самоплечнымъ и съ грудиною, свя-
зывается связками крѣпкими. Съ задней стороны грудной кости, между обоими яремными концами, посредствомъ бываетъ связка; а при томъ яремная кость на отростокъ враноносоподобный лопаточный опирается, и крѣпкою связкою связывается. У этихъ же костей и въ томъ мѣстѣ, гдѣ одна надъ дру-
гою движется, суть хрящики: На недвижимо сверху стоящемъ ярмѣ широкая лопаточная кость и самое плечо движутся: Ибо оно не допускаетъ, чшобъ эти кости на переднюю сторону и къ груди вывихивались.

§. 1155.

Яремная кость чаще переламывается, а рѣдко изъ мѣста своего вывихивается. Сіе хотя когда и случается, однако она гораздо чаще отъ грудины отскакиваетъ, а отъ отростка самоплечнаго весьма рѣдко. И это двумя способами быть можетъ.: Ибо
весьма

весьма часто ярмо на переднюю сторону выдвигается, и надъ грудиною оказывается; когда по лопаткѣ сильно ударено будетъ, или на нее что упадетъ, тогда она на переднюю сторону выдвигается. Однакожъ иногда яремной кости нижней конецъ на заднюю сторону наклоняется, и подъ грудную костью спрячется. Это случается тогда, когда лопатка на прежнее мѣсто уже будетъ вправлена, а ярмо сильно будетъ вытягивать и гнестъ. А когда ярмо на заднюю сторону повернется, и подъ грудную кость спрячется, то будетъ давить и спомашъ и горло дыхательное.

§. 1156.

Можетъ же и другой яремной кости составъ вывихиваться: Ибо ежели по кости ударено будетъ, а нижней ее конецъ отъ того, что лопатка опустилась, не можетъ изъ мѣста своего выскочить, то иногда яремная кость на отростокъ самоплечный высовывается. А подъ отростокъ самоплечный уходитъ тогда, когда по ней, въ томъ мѣстѣ, гдѣ она съ отросткомъ совокупляется, сильно какънибудь ударено и приписнуто будетъ.

§. 1157.

Безъ дальняго труда въ мѣсто свое обыкновенно вправляется, толькожъ съ трудностью вправленная на мѣстѣ своемъ удерживается. Сажаютъ человека на скамейку, помощникъ пропавъ хребта его поставитъ колѣно, и ухватя оба плеча руками назадъ тянетъ. Ибо чрезъ такой случай соспавы растягиваются: Между тѣмъ лѣкарь, пропавъ человека болящаго спочива, кость на мѣсто свое вправляетъ; и ее или въ низъ привязываетъ, или сводитъ.

Т ш ш 2

§ 1158.

§ 1158.

У кости ключика или основной по наибольше за дѣло почипать надлежитъ, чтобъ ее завязать и удержать. Но какъ неровные случаи случаются, такъ и нѣкоторыхъ отлѣнныхъ дѣйствъ требуютъ. Гдѣ яремная кость отъ грудной кости отдѣляясь на нее высунется, то когда вправится, на нижней ее концы много и толсто сложенныхъ тряпошныхъ придавокъ, а особливо двѣ, на подобіе буквы х перекрещивающихся, и одну широкую наложивъ должно; а руку не очень сильно на переднюю сторону прищипывать. Это хотя пою шесмою здѣлать можно, которою плеча самыя на переднюю сторону тащутся, или оною обвязкою, которою и кость вывихнутую обвязываютъ. Если правое ядро вывихнуто будетъ, то сперва положишь хорошенько плечо и руку, потомъ этою обвязкою подъ крыльцомъ лѣвымъ кругомъ обернуть, по лопаткамъ до головки плечевой дойти, эту обхвативъ, и по вывихнутому яремной кости концу по груди опять подъ пазуху лѣвую возвратиться, и прижиды такимъ же образомъ кругомъ, нѣсколько на подобіе раковинки винтовой, или на подобіе сѣкиры въ верхъ приподнимаясь, обойти должно, такъ, чтобъ она на колосъ походила, а кончипся обвязка въ кругъ обведши на груди. Не меньшеже способна другая обвязка, которою наголовникомъ или шляпою съ загнутыми краями [капиталистическаго рефлекска], называютъ, да Капеленъ. Эта обвязка въ два свипка бываетъ свипая; свипокъ, которой въ правой рукѣ у лѣкаря будетъ, лѣваго бываетъ меньше, и если правая яремная косточка будетъ вывихнута, она начинается подъ лѣвою пазухою,

хою , пропягивается по груди и по лопаткамъ на плечо правое , и обнимаетъ его. Когда же опять на плечо взойдетъ , то долгой конецъ обвязки пойдетъ подъ лѣвую пазуху , а въ то время короткой конецъ надъ вывихнутымъ концемъ яремной косточки и останавливается , и первымъ , который по груди пойдетъ , укрѣпляется. Это какъ здѣлаетъ , то короткой конецъ назадъ завернешь , и по самому плечу къ лопаткѣ на томъ же боку завернешь , и опять поверьхъ той же лопатки по плечу къ концу вывихнутой косточки яремной приведетъ. Между же шѣмъ , покуда обвязка и такъ и сякъ будетъ заворачиваться , то другой длинной свипокъ другой пособляющій человекъ , по лопаткамъ и по груди на самое плечо проведетъ , и шѣмъ проведеніемъ или въ округъ обхожденіемъ , меньшаго свипка згибы обхватываетъ и прикрываетъ. Длиннымъ свипкомъ сперва прижмъ кругомъ обводятъ , столькожъ и короткой свипокъ столькожъ разъ назадъ заворачиваютъ , чтобъ завсегда первымъ онъ хорошо прикрытъ былъ ; а на послѣдокъ оба свипка , подобіемъ винта нанизъ проходятъ. Въ заключеніе же всего того должайшимъ концомъ оба плеча обнимаютъ , на переднюю сторону склоняючись , и на груди оканчиваютъ. Если этою обвязкою обвязывать надобно будетъ , то путь должно быть двумъ человекамъ , одному дѣйствовать длиннѣйшимъ свипкомъ , другому короткимъ. Какая бы обвязка употреблена ни была , однако весьма стараться надлежитъ , чтобъ все плечо , прежде обвязыванія , такъ согнуто и поставлено было , чтобъ его , какъ будетъ обвязано или подвязано , или во время обвязанія , иначе наклонять не надобно было.

Т ш н з § 1152-

§. 1159.

Ежели же яремная косточка отъ грудной такъ отдѣлился , что она подъ грудную кость спрячется , то первая обвязка (1158), подъ лѣвою пазухою наченная , не по лопаткамъ , но по груди на самое плечо проводится должна , и такъ обвертывать , чтобъ плеча ея обвязываемыя назадъ выпятились , и чтобъ она въ низъ низходя будто бы винтомъ проходила , а при томъ сперва на самой кончикъ косточки яремной , которымъ она съ оспроскомъ самоплечнымъ совокупляясь , толстыя и плоско сложенныя суконки понакладывать должно.

§. 1160.

Ежели же когда косточки яремной верхняя головка на оспросокъ самоплечный выскочилъ , то положивши на то мѣсто плосныя суконки , надлежитъ плеча на переднюю сторону птянуть , и такъ держать , а обвязкою къ низу обвертывать. Ежели же яремная косточка такъ изъ мѣста вывихнется , что она въ пазуху , подъ оспроскомъ самоплечнымъ находящуюся , вскочилъ , то на конецъ ея нижней , который отъ грудной кости бываетъ , понакладывать должно оныя плосныя суконки. А оба плеча назадъ завернуть надобно , такъ , чтобъ обвязка къ верху шла.

§. 1161.

Также оба плеча назадъ выворачивать должно и обвязкою обвязывать во всѣхъ случаяхъ , гдѣ косточка яремная , или отъ грудной кости , или отъ оспроска самоплечнаго , отдѣлившись на эти косточки выскочилъ , и не можетъ хорошенько удержана быть , хотя бы толстыя оныя суконки наложены были. Сводя плеча можно какъ на переднюю сторону

рону , такъ назадъ , оною обвякою , которою и яремную косточку укрѣпляютъ , и другою , которая звѣздою называется , которая обернувшись изъ подпазухи около плеча , или по груди , или по лопаткамъ , на самое плечо правое протягивается , оное обнимаетъ , и такимъ же порядкомъ къ лѣвому плечу проводится , и по слово въ слово также обхватывается . Этою связкою по большой мѣрѣ дважды , или трижды , такъ въ кругъ обходятъ , покуда она крѣпко начесть держать . Однако напередъ всего примѣчать то надлежитъ , чтобъ плечо прямо положено было , такъ , чтобъ оно довольно приподнялось , и какъ случаи бывають различные , такъ различнымъ и способомъ что его верхушка , или на переднюю сторону , или назадъ , загнута была ; а то дѣлается , когда нижняя его головка , плечу мѣсто дѣлающая , въ противную сторону будетъ гнуться . Также не отменно надобно дѣлать , чтобъ плечо было недвижимо , для того оное , какъ надобно , скорченное и обвякою обвязанное къ боку привязать , и на локоть съ шѣи висящемъ , или на помочи , изъ тойже самой обвязки назадъ завернутой , дѣланной , или на ручникъ повѣсить надлежитъ . Во всякомъ случаѣ плечо завязывать должно , чтобъ большой палецъ къ груди повернулся , ибо такое положеніе плеча природнымъ признается . А чтобъ больной уда , желая нѣчто ухватить , съ поврежденіемъ не повернулъ , то онъ нѣчто круглое въ рукѣ носить можетъ ; и для того думать можно , что тушь недвижимость очень надобна . Если человекъ будетъ сухожавъ , то покуда суконки и обвязка накладываются , ямочки глубочайшія , сверху и снизу косточки яремной

мною адбавшійся , очень хорошо пряжею въ обѣхъ лишномъ обмоченною , напалнивать.

§. 1162.

Плечевой самой верхней головкѣ кругловатой и одушловатой мѣсто дѣлаетъ нѣсколько впуклая ямочка или углубленіе, въ кости лопаткѣ имѣющаяся. А удерживается она въ ямочкѣ только тою связкою , которая составъ на подобіе чехла обнимаетъ , одна-кожѣ она гораздо крѣпка. По тойже связкѣ , и по продолговатой на кости ямкѣ и жильночусвищельномъ влагалищѣ , проходитъ одна сухая жила мышцы двуглавой или двуконечной , т. е. вранолучевой , которая на верхнемъ краѣ оной углубленіи т. е. лунки оканчивается , въ которую головка кости плечевой вставлявается , составъ защищающій , какъ верхней , такъ и другой , лопатки отъ отроспокъ , изъ нихъ первый самоплечнымъ [акроміумъ] , а другой враноносоподобнымъ [коракондесъ] называется , и крѣпкая связка между двумя этими отроспками находящаяся. Надобно же и познать , что подъ крыльцомъ , кромѣ великихъ жилъ быющихъ , жилъ кровевозвращательныхъ и жилъ чувствительныхъ , въ руку проходящихъ , имѣются и желѣзы ; которыя всѣ части различнымъ заключеніямъ подвержены бываютъ (*). Артерія [составъ неглубоковпадный] бываетъ ползка , и во всѣ стороны очень подвижна.

(*) Для того , чтобы часто объ одномъ не говорить , гдѣ надобно будетъ обвязкою подъ плечо подхватывать , сперва всегда должно подкладывать мякотки суконки , чтобы частіямъ этимъ не досаждать.

§. 1163.

Плечу или рукѣ въ верхъ вывихиваться не даютъ оныя два отроспка , и межъ ими находящаяся связка

ка (1162), да ежели она и внизъ вывихнется , по кругленькая головка долго на узенькомъ лопаткиномъ краю держаться не можетъ. Ежели вывихнется назадъ, то головка ее подскочитъ подъ кость лопаткину. Чаще всего рука вывихивается въ подпазуху и на переднюю сторону . А рѣдко можетъ случиться , чтобъ она на отростокъ враноносopodobный выскочила , и межъ имъ и косточкою яремною подъ мышкою грудною остановилась.

§. 1164.

А причина тому , чтобъ плечо вывихивалось , не другая какая только то , что этотъ составъ другихъ всѣхъ больше движимый , отъ того по чаще и случается. Кость во всѣ стороны выскакиваетъ , когда какая и противная причина случится. Однакожъ нѣкоторые особенные знаки имѣются , ежели плечо внизъ выскочитъ , и головка его подъ краемъ лопаткинымъ будетъ стоять , то рука длинная будетъ казаться , и висѣть. Великая боль бываетъ тогда , когда рука внизъ опускается , а когда она въ верхъ поднимается , тажъ самая боль нѣсколько облегчается. А уже выше опровергнулъ (1163), что плечо долго въ такомъ положеніи остаться не можетъ. Ежели плечной кости головка къ спинѣ вывернется , то локоть къ груди склонится и боль безперерывная будетъ , когда его опъ груди оповодитъ будешь. Ежели же головка на крыльцо выскочитъ , то будетъ торчать отростокъ самоплечный , а подъ нимъ будетъ ямка. Ежели головка будетъ подъ мышкою грудною , то на спину локоть оборотится ; а когда будешь его вытягивать , то великая боль дѣлается , и удъ короче другого бываетъ. Ежели же головка кости плечной на переднюю сто-

У У У

ро-

рону выскочившая будетъ спояшь межъ косточкою яремною и опросшкомъ враноносоподобнымъ , то локошь назадъ будетъ шорчать , и рука другой будетъ короче, а понеже обыкновенно опухоль въ томъ мѣстѣ бываетъ , въ которое кость выскакиваетъ (1105), то опростокъ враноносоподобный не весьма легко отъ плеча отдѣлять бываетъ можно.

§. 1165.

Особливо не очень трудно бываетъ , руку вывихнутую опять въ мѣсто свое вправлять , ежели она вывихнется на крыльцо , или она будетъ спояшь на березку лопаткиномъ , однакожъ и то вскорѣ дѣлать должно ; труднее когда она на переднюю спорону выскочитъ , и подъ мышкою грудною остановится.

§. 1166.

И для того когда будетъ человекъ въ лѣтахъ опросческихъ и слабого состоянія , и связки членосоставныя слабыя будутъ имѣть , то можно у такого и руками плечо вправить. Человека лѣкаря посадить на стулъ , и приказать двумъ помощникамъ , чтобъ одинъ въ охапку обхватилъ своими руками грудь и шѣю болящаго , и полегоньку бы головку кости лопатки отпегивалъ , а другой чтобъ самую руку взявши выпегивалъ. Самому жъ лѣкарю съ боку спояшь , и смотрѣть , что какъ довольно плечо выпянуто будетъ , и межъ костями свободное разстояние дѣлается , то онъ плечную кость долженъ въ верхъ приподнять , выправить , и въ мѣсто свое вправить. А то еще кажется лучше дѣлается , когда лѣкарь самъ руку выпегиваетъ , такою песьмою , которою онъ на шѣю свою кладетъ , и вывихнутую руку обматываетъ , въ верхъ приподнимаетъ , руками же вправляетъ.

§ 1167.

§. 1167.

Но ежели человекъ будетъ мочной, и связки членосоставныя будутъ крѣпки, плути пребываютъ шнуры или обвязки покрѣпче. Двумя обвязками крестъ на крестъ въ два ряда по груди и по спинѣ на подобіе буквы х его обнимаютъ по плечамъ и подъ пазухи по груди, и такимъ же способомъ головку лопатки обматываютъ. Оныхъ обвязокъ концы служитель стоящему за спиною въ руки опдаютъ, или къ скобѣ въ спинѣ вбитой привязываютъ. Третьею обвязкою другой служитель обвязываетъ нижней конецъ кости плечной. Какъ это все такъ учреждено будетъ, то лѣкарь съ боку спяща, прикажетъ, чтобъ два служителя, одинъ къ себѣ а другой къ себѣжъ потянулъ, или, ежели оныя шнуры, которыми шія и грудь опутаны, къ скобѣ привязаны будутъ, чтобъ тесьмою, которою нижней конецъ кости плечной опутанъ, натянули, и руку выпянули. Лѣкарь, съ боку стоящій, пѣмже порядкомъ, какъ я предложилъ (1166), кость плечную приподниметъ, и въ мѣсто свое вправитъ.

§. 1168.

Этотъ способъ къ вправленію кости плечной употребленіемъ или дѣйствіемъ весьма апробованъ: Однако имѣются еще многіе другіе способы оныхъ Авторъ предложенные. Нѣкоторые больного не взиная кладутъ на полу, и подъ пазуху, гдѣ рука вывихнута, подкладываютъ шерсть, суконки толстыя, или что ни будь другое мягкое. Человекъ же тотъ, кто лѣчитъ намѣренъ, къ больному оборотясь къ боку тому, на которомъ рука вывихнута, на полу подлѣ его сядетъ, и рукою своею ухвативъ болящаго за

У у у а

руку

руку , и упершись ногами подъ пазухи , руку вывихнутую вытягиваетъ и вправляетъ. Но такимъ способомъ удъ не можетъ довольно , и такъ вытягиваясь , чтобъ расстояние межъ костями пространное было , и не сославъ , кости плечной съ лопаткою , но сославъ докошной. А припомъ наибольше вытягивающія мышки прошагательныя , нежели аггбающія.

§. 1169.

Другіе больному велятъ на стулъ спать , а припомъ подъ пазуху вѣлну , или суконки подслыныя , многія и мягкія подкладываютъ , руку же на двери или на лѣсничную ступеньку кладутъ , которую руку помощникъ ухватя , сколько ему возможно , вытягиваетъ. Между тѣмъ другой человекъ стулъ изъ подъ ногъ вынимаетъ , такъ чтобъ онъ на стулъ спать не могъ. И когда рука вытянется , а корпусъ на другую сторону опустится , то головка кости плечной отъ дверей , и отъ дерева , въ свое мѣсто вскакиваетъ. Лѣкарь выше стоя съ боку , ежели нужда будетъ , кость руками своими вправляетъ. Не много отъ этого способа отмѣненъ и другой способъ , въ которомъ вывихнутую руку на оцепъ или на коромысло протягиваютъ , и когда оно коромысло два мужика приподнимаютъ , то одинъ послужникъ оную вправляетъ. Ещежъ нѣкоторые руку на плечо человеку сильному и великорослому на колѣна спавшему кладутъ , который ухватя руками больного руку , и когда хочетъ встать , такимъ способомъ удъ вытягиваетъ , и руку вправляетъ. Однакожъ крайне опасаться надобно , чтобъ дверьми или лѣсницею или коромысломъ , подъ пазухою жѣлѣвъ ,

желѣзъ , жилъ быющихъ , жилъ кровосвозвращательныхъ и жилъ чувствительныхъ не повредишь , и вожженія не здѣлашь. Толькожъ такими способами и рука по надлежащему не выпягивается ; выпянется или очень много , или очень мало , такъ и вправитъ хорошо руки не возможно , а особливо когда она назадъ , или впередъ , и не внизъ подъ пазуху , вывихнуша будещъ.

§. 1170.

Нѣкоторыя больного на стулѣ низенькой сажаютъ , руку его промежъ ногъ своихъ просавываютъ , и велятъ одному работнику руку выпягивать , другому лопатку поправлять , а межъ тѣмъ руку руками своими , пощипавши на шю себѣ песьму (1166), выправливаютъ и вправливаютъ. Толькожъ такимъ способомъ развѣ у весьма слабыхъ людей можетъ плечо вправливаться , понеже сосцава выпянушь довольно не возможно,

§. 1171.

Есть и такіе люди , которые слѣдующею дорогою въ лѣченіи поступаютъ. Человѣка на стульчикѣ низенькой сажаютъ , а кто намбрень его лѣтитъ , супротивъ его съ боку на другомъ стулѣ садится , и опершись обѣ колѣно свое локтями сильно , рукою , которая у больного будещъ подъ пазухою , вывихнутаго плеча головку въ верхъ приподнимаетъ , а лѣвою рукою самое плечо въ низъ придавливаютъ. Однакожъ изъ преждереченныхъ разумѣется , что рѣдко такъ дѣло удастся.

§. 1172.

ИППОКРАТЪ къ вправливанію плеча машинку изобрѣлъ , которую онъ аμβημ (*) , а ЦЕЛСЪ (**) У у у з

де

лопатою деревянною [спафа дигнеа], называется. Эта машина иногда способна быть можетъ, однакожъ кажется и ея плечо довольно выпягиваться и отводиться не можетъ (***).

(*) О составахъ располож. 4 Т. 2 издан. Линд. стр. 760. Снеси сюда ГАЛЕНОВЫ Комент. на издан. харт. Т. 12 Текстъ 19 стр. 300.

(**) Кн. 8. Гл. 15.

(***) ПЕТИТЬ эту машину ради такой причины отменяетъ на помянут. мѣст. Т. 1 стр. 186, но НИКОЛАЙ АНДРИ въ совопрошеніи медик. хирург. оную защищаетъ. При вывихнутомъ плечѣ что больше пособствовать можетъ, Амвм ли, или лѣстница, или двери, или вожжи съ вѣшею [полиспаустъ]? въ Парижѣ 1732 года предложенъ. Присовок. здѣсь письмо ГУНАУЛТОВО противъ ПЕТИТА стр. 290.

§. 1173.

Такожъ и вожжи съ вѣкшею [полиспаустъ] употребляются, которыми составъ довольно выпягиваться можетъ. А гдѣ плечо довольно отшатнулось, а особливо ежели внизъ въ подпазуху вывихнется оно, Лѣкарь руками, употребивъ припомъ песьму (1166) выправить, приподнять, и въ мѣсто свое вправить можетъ.

§. 1174.

Изъ амвижъ, или спафа, и изъ полиспауста сочинены были отъ многихъ и многія машины, эпихъ далеко способнѣйшія. Машина та, которую ПЕТИТЬ (*) выдумалъ, и хитро здѣлана, и для величины и пиягости досадна. А припомъ ее присежка или сбросъ, которая на плечо накладывается, кажется назадъ выпягиваетъ жилы сухія мышкы, грудной и преширокой хребетной (**).

(*) См. стр. фиг. въ Комм. К. А. Нау. 1716 года стр. 334. и де Маладъ дес' ось Т. 1. стр. 198.

(**) Это теперь (1172) помянутые Авторы, которые противъ ПЕТИТА писали, наиболее доказываютъ.

§. 1175.

§. 1175.

Я думаю чупь ли не напрасно только родовъ машинъ къ выпягиванію плечъ употребляль, которое сльями и шесъмами въ разныя стороны распяляными довольно выпягивашся, а припомъ, ежели все примѣчашъ будешъ, вправлявшся можешъ. Гдѣжъ не ошмѣнно машина за надобность покажешся, то кажешся прочимъ предпочестъ должна оную, которая у нашихъ въ употребленіи имѣшся. На желѣзной или изъ другаго металла здѣланной палкѣ здѣланъ на верхнемъ концѣ щипокъ, который подложъ подъ пазуху въ бокъ чловѣку упираешся. Должно же опасашся, чтобъ онымъ шѣла, а особливо у женщины, со вредомъ шипки не придавишъ. Удѣ на палку кладушъ, икъ ней привязываюшъ, а узда, которая на самый конецъ кѣспи плечевой въ локтѣ накладываешся къ оси коловращной, или къ шестернѣ, и къ кругу привязываешся, кѣпорые какъ повернушся, то рука безъ затрудненія выпягиваешся. Надобножъ, чтобъ межъ онымъ щипкомъ и межъ палкою соспавъ былъ во всѣ стороны поворошливъ. Ибо удѣ, на палку желѣзную положенный, ежели довольно оптянушъ будешъ отъ сего соспавъ, а конецъ машины безпрестанно въ прошивную спорону ворочаешся, на мѣсто свое вправляваешся.

(*) Лѣкари наши эту машину Глоссокомѣумъ называютъ. У древнихъ γλωσσοκόμοις былъ инструментъ договорный; смотри ОРИАЗІА о машинахъ гл. 24; а у другихъ было вѣгалище, въ которое безъ переломленное, какъ кажешся, было такъ вкладываю, чтобъ наискось переломленную кость шесъмами нарочно выпянушъ было можно. Смотри у ГАЛЕНА на ИПНОКРАТА о переломахъ Комментар. 2 въ Текст. бс, Т. 12 стр. 218. Эту машину, которую я описалъ, уже рѣшма давно употреблялъ ПУРМАННЪ въ Хирургіи куріозной стр. 691: но ее гораздо совершенѣйшую усмотришъ въ Фиг. 18. Ежели бы
о ма-

о махинѣ разсуждать кому похотѣлось, тому примѣчать надлежитѣ то, что я генерально о вправливаніи косней сказалъ (1110 до 1113).

§. 1176.

Вправивши руку, должно суконки мягкія подѣ пазуху подложить (1162); а напоследокѣ одною суконкою подѣ пазуху такѣ подхватить, чтобѣ ея и самое плечо обнялось, и одинѣ ея конецѣ на другомѣ легѣ. Сверхѣ того обвязывающѣ обвязкою, которая начинается подѣ другою пазухою, и протягивается по груди до самого плеча, и оно обнимаетѣ, и по лопаткамѣ до первой подпазухи идетѣ, и опять оборачивается, и такѣ трижды или четырежды кругомѣ обводится. Тогда въ верхѣ поймать должна на подобіе раковинки винтовой, или на подобіе сѣкиры, такѣ, чтобѣ на самомѣ плечѣ будно бы колосомѣ казалась. А покуда еще обвязкою головку плечную въ послѣдній разѣ не обнимешь, то ея прежде дважды самое плечо подѣ онымѣ колосомѣ обойти должно, напоследокѣ же кѣ пазухѣ, отѣ которой началась, обращается, и на груди кончится. Плечо также прямо положишь, плашкомѣ подвязать, и на шѣѣ повѣсить должно.

§. 1177.

Вѣ локтѣ при кости сходящіяся, плечная, лучевая и локотная. Плечная кость на нижнемѣ концѣ два имѣетѣ отростка, или кругленькіе и хрящикомѣ прикрытые мышелки, а межѣ этими сѣ задней стороны глубоковатую ямку. Между двумя раменными костями лучъ выше, локтя короче; онѣ концомѣ круглымѣ и нѣсколько впуклымѣ принимаетѣ въ себя кругленькой мышелокѣ наружной кости плечной. Локотная кость нижняя и длиннѣйшая на верхнемѣ

немѣ концѣ имѣетѣ два отростка или протяжныя вершинки , между которыми будто лунастѣ или вырѣзанѣ. Одна вершинка изѣ самаго локтя или олекрана производимѣ , и гдѣ локоть протягивается , въ оную заднюю ямку кости плечной вдвигается. Другой и передній отростокѣ или верхушка , вѣнцеподобнымѣ называемый прошивѣ внутренняго плечной кости отростка лежащій надѣ этимѣ , на подобіе дверныхъ петель съ крюкомѣ , движется , верхушкою самолокотнаго отростка препятствіе дѣлается , когда локоть протягивается , чтобѣ онѣ на задѣ не отдался ; а другимѣ отросткомѣ вѣнцеподобнымѣ , чтобѣ онѣ при излишнѣ не могѣ близко приводиться и изгибаться.

§. 1178.

Локотная кость также связана съ костью лучевою. Лучевая круглая головка вставлявается въ ямочку нѣсколько пониже усроенную , на локотной кости , на концѣ и на сторонѣ къ лучу обороченой. Эпѣ кости также одна надѣ другою движущаяся , когда руку ворочаешь , въ низѣ или въ верхѣ ладонью. Три кости крѣпкими связками связываются. Цѣлый составѣ съ обоими отростками локотными и съ головкою кости лучевой (1177) обнимаетѣ чехолѣ (1096). Сверхѣ этого идущѣ еще другія связки , изѣ которыхъ одна отѣ мышелка плечнаго производимѣ , и на кости лучевой кончима , другая , отѣ мышелка плечнаго внутренняго начемишаяся , къ локтю проходима , и на немѣ кончима . Кромѣ того головка лучевая прикрѣплена прекрѣпкою и хрящевую связкою , которою она почти вся обхватывается , и съ локтемѣ и съ маленькою его ямочкою связана . Межѣ эпѣми двумя костями подѣ локтя совокупными на середѣ нѣсколько разстояніа

Ф Ф Ф

имѣю-

имѣющими , и опять къ ручной кисти въ мѣсто сходящимися , также посредствомъ связка крѣпкая имѣется , которую они , чтобъ не расходились , держатся. Въ этомъ составѣ есть родъ Гинглима , который угловатымъ называютъ. Составъ бережетъ , и чтобъ рукою великія тягости можно было поднимать , дѣлаетъ верхній локотной отростокъ , то есть само локотной [олекранумъ].

§. 1179.

Локоть на три стороны выгибаться можетъ , на внутреннюю сторону , на внешнюю и на заднюю ; а чтобъ на переднюю сторону не выскакивалъ , препятствуетъ тому отростокъ самолокотный. Однакожъ онъ можетъ переламываться , а припомъ и плечо , какъ онъ переломится , на переднюю сторону выскакивать. Если локоть на заднюю сторону вывихнется , то локотной отростокъ вѣнеподобный будетъ стоять въ задней ямкѣ кости плечной , въ которую натурально верхушка отростка самолокотнаго вкладывается. Рука крива бываетъ , и протягиваться не можетъ. Если же рука во внутреннюю сторону вывихивается , то лучъ противъ внутренняго мыщелка кости плечной будетъ стоять , плечо въ ту сторону , отъ которой кость отскочила , покривится , и къ большому пальцу наклонится. А если плечо на внешнюю сторону выскочитъ , то плечной кости мыщелокъ внутренний вскочитъ въ лунковатую и глубокую локотную яму , а припомъ плечо въ противную сторону нѣсколько покривится , и очень будетъ гнаться. Обыкновенно часто случается , что плечо на заднюю сторону вывихивается , а то не дѣлается въ то время , когда рука просянуша , но когда согнуша бываетъ. Часно

что

по приключается, когда человекъ въ низъ лицомъ на землю ложась, руку согнутую, которою хочетъ поддѣржаться, нѣсколько протягиваетъ, и на нее падаетъ.

§. 1180.

Понеже составъ этотъ крѣпкими связками укрѣпленъ, то онъ не безбѣдственно, не безъ боли и не безъ вожженія вывихивается. А припомъ другая есть причина; чѣмъ жилы бьющіяся, жилы крововозвращательныя и жилы чувствительныя не повреждаются, и чѣмъ составъ, хотя хорошо вправленъ будучи, отъ выдавленного жира недвижимъ не остался. На которую сторону ни быlobъ вывихнуто плечо, однако вправляется однимъ способомъ. Оба члена два сильные мужика руками, а иногда наложивши потяги, нарозно такъ шянутъ, чѣмъ плечо, за которое подлѣ кисти ручной захвачено, покуда еще вправляется, сперва помаленьку эгбалось. Когда же удъ довольно выпянется, то вывихнутыя части съ той стороны, на которую вывихнулись, на противную сторону вправляются.

§. 1182.

Выпягивать и другой способъ есть: Руку на чтонибудь круглое, на стуликъ или на кроватной ободокъ кладутъ, и ее по эпюму руками или и помагами выпягиваютъ, и съзади на мѣсто свое вправляютъ. Но такимъ способомъ удъ довольно не выпягивается.

§. 1183.

Послѣ вправленія состава очень надобны лѣкарства, не токмо такія, отъ которыхъ вожженіе уменьшается, но и которыми разслабленныя связки укрѣпляться могутъ (1114, 1115, 1116). И понеже

Ф Ф Ф 2

въ

въ эпомѣ составѣ жирѣ скоро собирается , и чрезѣ
недвиженіе ссѣвшися локопному эгібанію обыкновен-
но препяпствуеѣ , по первыхъ боль , какѣ бы ни
была велика , составѣ въ движеніе приводитѣ и къ упо-
требленію своему понуждаѣ , а припомѣ составѣ
пристойными лѣкарствами и жесткими сукнами по-
чаще поширатѣ должно. Ежели составѣ обвязатѣ по-
надобився , по наложивъ повязку съ обоихъ концовъ
въ длину разрѣзанную , которой обвязки середкою об-
нимается отпросокѣ самолокопной , а чепыре конца
по внутренней споронѣ локтя обводятся. Обвязка на-
чинается отѣ плеча , и идеѣ наискось по вну-
треннемѣ боку локопномѣ , около котораго и обма-
тывается. Такимѣ же образомѣ отѣ локопной кости
къ плечной , отѣ плечной кости къ локопной , надѣ со-
ставомѣ пакѣ обвивается , чѣобѣ ею кости кругомѣ
обходя обнялись , и напоследокѣ , когда будеѣ
обращаться туда и сюда винтомѣ въ верхъ и внизѣ ,
то весь составѣ ею обовьется , закроется , и сожмется.

§. 1184.

Лучевая и локопная кость такимѣ образомѣ ,
какѣ я выше показалѣ , въ верхнемѣ концѣ одна съ
другою сходятся , и на срединѣ связкою , межѣ ими
находящеюся , связываются , къ тойже самой связкѣ
многія прицѣпливаются (1178). Этѣ кости , которыя
на срединѣ руки нѣсколько разошлись , подѣ кисти
ручной опять сходятся , только чѣо въ толщинѣ пере-
мѣняются. То есть эпомѣ лучъ толще бываеѣ , и съ
боку къ кости локопной оборотившемуся , лощевину
имѣеѣ значную , въ которую локопная кость при
концѣ тонкая и кругая вспавливается. Межѣ этѣ-
ми костями хрящикѣ особенный имѣеѣся. И такѣ
на обоихъ концахъ , подѣ плеча и подѣ кисти
ру-

ручной эѣ кости одна надѣ другою движеніе имѣютѣ , когда рука вѣ низѣ ладонью или вѣ верхѣ ладонью оборачивается. Есть еще и такіе люди , которые думаютѣ , что эѣ кости одну отѣ другой силою оптащипѣ можно , толькожѣ до того не допустипѣ межѣ ими находящаяся связка крѣпкая. Однакожѣ можетѣ бытѣ это нѣсколько и здѣлается , ежели вѣ составѣ мокрота скопится , и жирѣ ссядетѣся.

*Смотр. у ВИНЗЛОВА des os frais §. 271.

§. 1185.

Лучѣ кончипѣя концомѣ широкимѣ , на копоромѣ концѣ ямочка имѣется. А вѣ ямочку ту хрящевую по срединѣ линіею раздѣленную, вставливающа горбоваѣя кисти ручной косточки , а особливо корабельная и лунашная. Эѣмѣ также составѣ чехломѣ и другими крѣпкими связками связанѣ , изѣ которыхѣ одна отѣ отростка острого шилообразнаго кости локотной производитѣ , и на запястьѣ и кѣ косточкамѣ запястнымѣ клинообразной и крючкоподобной прицепливается. Локотнаяжѣ кость сѣ запястьемѣ не совокупляется , но однѣми только связками связывается. Другая связка отѣ отростка острого и отѣ обширнаго конца лучеваго начинается , и кости корабельной и кѣ горбку ея приростаеѣ.

§. 1186.

Чаще рука на переднюю и на заднюю сторону выскакиваетѣ. рѣдко она кѣ мизинцу , а и того рѣже , какѣ кажется , кѣ большому пальцу оборачивается , ибо кажется , что тому знатный лучевѣ отростокѣ препятствуетѣ. Обыкновенно это приключается пѣмѣ людямѣ , которые нечаянно падаючи на прощанутую руку одираются.

Ф Ф Ф 3

§. 1187.

§. 1187.

Узнать потѣ часѣ можно, на которую сторону рука вывихнута, ежели состояніе ся разсудишь: Ибо персты всегда напрошивную сторону вывертываются. Ежели она на заднюю сторону вывихнется, то персты просягиваться не могутъ, ежели же на переднюю выскочитъ, то персты не згибаются. Присутствуетъ сильная боль, и человекъ при томъ руки ни на ладонь поворотить, ни ладонью въ верхъ взворотить не можетъ; а при томъ этотъ составъ чрезъ недвиженіе недвижимъ быти можетъ.

§. 1188.

Вытягивать должно съ одной стороны руку, а съ другой плечо. Тожъ самое дѣлать можно на сполѣ или на другомъ мѣстѣ жескомъ и неуступчивомъ, такъ чтобъ рука положена была внизъ ладонью, когда она на заднюю сторону вывихнется, а когда на переднюю вывихнется, то навзничъ ладонью положить. Когда кости одна отъ другой довольно разтянутся, то оныя въ противную сторону руками вправляются. Когда составъ завязывается, то когда рука вывихнута будетъ или на переднюю сторону или на заднюю, всегда противъ его кладутъ лубокъ изъ бумаги толстой плотной и склеенной.

§. 1189.

Въ кисти, или въ запястьѣ и въ самой кости, когда косточки изъ мѣстъ своихъ выскакиваютъ, а то дѣлается иногда на переднюю, иногда на заднюю сторону, то въ той сторонѣ, на которую выскочатъ, опухоль бываетъ. Отъ косточки безъ выпягиванія перстами, только хорошенько придавивши, на мѣсто свое опять вправляются,

§. 1190.

§. 1190.

А межѣ косточкою пясинною, которую большою трапезною называютъ, и межѣ первою пальца большаго костью особливый составъ имѣется: Ибо на трапезной кости, на которой палецъ движется, съ передней и съ задней стороны двѣ наискось идущія и будто лунасыя лощевинки имѣются, а на срединѣ оная косточка горбата, съ наружной же стороны и съ внутренней имѣетъ бугорочки. Напротивъ же этой косточки лежитъ первая кость пальца большаго, на которой столькожъ имѣется и во всемъ подобныхъ луночекъ, въ которыхъ первой косточки отростки вставляются, и бугорки ее въ ямки этой косточки вкладываются. А понеже этотъ составъ хотя связками и многими мышками держится; очень на всѣ стороны движимъ, по кость легко вывихивается. Его такимъ же способомъ вправлять надлежитъ, какъ я о другихъ объявилъ. Если же косточку опять на мѣсто вправить, то около состава двѣ небольшія продолговатыя сукопочки или спленія такъ кладутъ, чтобъ составъ обхватился. Обвязка начинаючись отъ конца костей въ локтѣ находящихся подлѣ запястья, проходитъ до состава вывихнушаго, и около онаго трижды обвертывается, и тою вывихнушая кость приводится. На перстахъ ничего больше дѣлать не надобно, кромѣ того, что я велѣлъ въ другихъ мѣстахъ дѣлать.

§. 1191.

Бедрѣ въ верхнемъ концѣ у себя имѣютъ великой и круглопродолговатой отростокъ, который наискось къ кости лонной проходитъ, и называется шѣйкою. Эта шѣйка, внутри ноздревата и печуриста,
кон-

кончипся великою и круглою головкою , а припомѣ хрящикомѣ прикрыпою , копорая головка вѣ яму круглую кости лонной вставливается. Яма у Анапомиковѣ хотѣли или укусницею [ацетабулумѣ] называется , копорая у молодыхъ людей изѣ трехъ костей составляется , копорыя чрезѣ посредство хрящевою одна съ другою спаиваются , а называются тѣ кости подздошная , сѣдалищная и гребенная. Припомѣ она яма хрящевага. Однако хрящу у нее во днѣ и снаружи нѣтъ , вѣ томѣ мѣстѣ лежитъ великая желѣза , изѣ копорой жирѣ вѣ составѣ печенѣ , и гдѣ также вѣ этой ямѣ приростаеъ оная крѣпкая связка , копорая изѣ середины головки бедреной происходиѣ (*). Яма оная вѣ самомѣ верхнемѣ мѣстѣ глубока , на низу нѣсколько полога , сверьху имѣеѣ край очень высокой , съ боку же и кѣ днѣ овальной вырѣзанный , чрезѣ что дѣлается , что бедра лучше во внутреннюю сторону и кѣ лону приводиѣся можеѣ. Надѣ эту краю вызубриною имѣеѣ поперешная связка , копорая вѣ низу не приростаеѣ , но вѣ обширной дупляности непроходна. Подѣ эту жила бѣющая и жила кровезовращательная изѣ голенныхъ произшедшя вѣ укусницу кѣ связкѣ оной внутренней и кѣ той желѣзѣ проходяѣ. По оной же дупляности выскакиваетъ желѣза оная великая вѣ близости лежащая , когда она головкою бедреною прижмется ; а то случается , когда бедра на внѣшнюю сторону движется , и отѣ другой бедра отводитѣся (**). Краю оной ямы или укусницы хрящевой , копорымѣ соединяеѣся связка , изѣ всего тѣла человѣческаго крѣпчайшая , копорою , на подобіе чехла , составѣ обкрываетъ. А гдѣ на краю вызубрину и связку поперешную я объявилъ , тамѣ и чехолѣ и краю хряще-

хрящевый, къ той связкѣ поперешной прикрѣпляется, такъ что она въ низу, какъ я сказалъ непроходна имѣется. Другая связка крѣпкая и жесткая, просто круглопродолговатую называемая, почти изъ самой середины головки бедерной вышедшая, въ ямѣ приростае, которою также составъ много связывается. А припомъ всякъ знаетъ, что этотъ составъ и крѣпчайшими мышками укрѣпляется.

* Смотр. у ХЕСЕЛЬДЕНА въ Остеографіи Таб. 18. Фиг. 1. D. и Таб. 39. Фиг. 2. 3.

** Имѣется примѣчаніе пресл. ПЕТИТА въ Ком. К. А. Наукъ 1722. стра. 164.

§. 1192

Понесе эта лонная яма такъ глубока, и составъ такъ крѣпкими связками, а припомъ плотными мышками обѣмляется, то трудно, бедру силою или другимъ случаемъ у взрослого и сильнаго человѣка за одинъ разъ да еще со всѣмъ выдернуть. Когда же въ древніе вѣки авторамъ казалось, что кость часто изъ ямы своей вывихивается, однакожъ послѣ подспержено, что они кость переломленную онѣ вывихнутой негораздо отдѣляли. Ибо оная бедерная шѣйка, которая внутри пещуриспа и не плоска, весьма тоненькимъ слойкомъ кругомъ обведена (*), гораздо часто переламывается, который перелома родъ многихъ заставилъ думать, будто бы головка кости бедерной изъ укусницы выскочила. А припомъ, у молодыхъ людей оная головка надросткомъ бываетъ, которая чрезъ посредство хрящика съ шѣйкою спавается, и для того гораздо легче отскакиваетъ (**).

(*) Смотр. у РУИШЯ въ сокровищ. 5. Таб. 2. фиг. 1. и 2.

(**) ПАРЕЙ въ Книг. 14. въ глав. 21. стр. 416. признается, что онѣ въ такой порокъ самъ нѣкогда впалъ, и переломленную шѣйку за вывихнутую бедру почелъ, которую исторію вшорительно на-

Х х х

писан-

писанную у ШЕНККІЯ прочитать можно въ его Примѣян. Медич. въ Кн. 5. стр. 333. Однакожъ оное дѣло будто пренебреженное отъ руишія опять предложено и фигурами изображено было. въ Тезавр. 8. Таб. 3. фиг. 1. Тожъ самое повторилъ РАВІЙ въ рѣчи о правильномъ способѣ какъ учиться и учить Анатоміи. Присовокули тушъ ХЕСЕЛДЕНОВУ Анатоміи офъ те гуманъ бодя Гл. 5. стр. 35. Таб. 6. фиг. G. и H. Примѣчаніе ДУГЛАСОВО въ Трансакц. Аглин. No. 349. стр. 501. инъ те Абрикдемендъ Вол. 5. стр. 388. Ефем. Натт. Кур. сто 2. примѣч. 20. стр. 218. РУД. ФИЛ. БУРЛИНА Диссерт. о вывихѣ и переломѣ бедренномъ, въ Алп. 1718 году и Іоан. ЗАЛТС-МАННА о вывиханіи кости бедренной рѣдко случающемся, и о переломѣ шѣйки частомъ въ Аргент. 1723 года. Новыя ЗАЛТСМАННОВЫ примѣчанія ; а особливо одно, въ которомъ, и головка бедренная вывихнута, и шѣйка притомъ переломлена была, смотри въ Актахъ Санктпетербургскихъ Вол. 3. стр. 275. Я имѣю бедру у каторой шѣйки давно переломленной, вѣсье нѣтъ, да и головка бедренная, которая еще въ ямѣ своей держится, также много притерлась.

§. 1193.

Хотя же я и разсуждалъ бы, что это рѣдко приключается, однакъ чрезъ опыты изслѣдовано, что нѣкогда круглая бедренная головка изъ глубокой лоннокостной ямы за одинъ разъ, и вся конечно отъ какого нибудь паденія, и насильно выдернута бывала. Не далеко кажется отъ правды, что это дѣлается тогда, когда перерывается оная внутренняя крѣпкая связка, и когда также та связка, которою составъ обнимается, то есть чехолъ, обыкновенно въ такихъ случаяхъ расслабляется, ради того и кость такъ насильно будучи выдернута, хотя вправилась, шамъ недержится, но потчасъ она и въонъ выходитъ.

(*) Смотри дѣла Мед. берлинскія Вол. 10. стр. 107. гдѣ написано, что у человѣка взрослого бедра была насильно раздернута, и вонъ выдернута, послѣ благополучно вправлена была, такъ, что человѣкъ совершенно и безъ хроманія, былъ вылѣченъ. Въ Липсіи за нѣсколько лѣтъ напередъ сего случилось, что работной человѣкъ съ потолка упалъ. Лѣкарь призванный по всѣмъ признакамъ бедру вывихнутую нашелъ, которую онъ также вправилъ. А человѣкъ когда въ короткое время отъ шажкой на головѣ раны умеръ, то шѣло его славный ВАЛТЕРЬ. Ордена

Ордена нашего Старшина , котораго въ крайнемъ почтеніи я имѣю , вскрыль , онъ нашель , кость изъ ямы своей на переднюю и на нижнюю сторону , и къ кости надъ дѣпородоудной вывихнутую ; а лѣжарь опять вправиль . Понеже онъ видѣль мѣста , кости вывихнутой , въ мышкахъ досажденныхъ и вожженныхъ . Однакоже оная бедра безъ труда изъ укусины могла выскочить , понеже перервана была , какъ внутренняя связка , такъ и другой связки , или чехла , которымъ составъ схватывается , часть передняя , скрозъ который прорывъ головка бедерная продралась ; и такъ я почти вѣрилъ , что этотъ составъ у взрослыхъ людей насильно и чрезъ паденіе да и сохвѣмъ вывихиваться не можетъ , развѣ только связка внутренняя перервется . САЛТСМАНЪ въ десяткѣ примѣчаній знатныхъ Анапомическихъ написалъ , что у старухи на обѣихъ бедрахъ не было эшой средней связки , въ Арг. 1725 года , примѣч. 7. стр. 10.

§. 1194.

Но часто бедра выскакиваетъ , когда съ мокрою , въ вертлюгъ скопившеюся , вонъ высавываетъ , отъ которой мокроты оныя связки , или расслабляютъ , или разтягиваются , или сбѣдаются . Иногда отъ горячки , отъ воспы , отъ кори и отъ коросты , и отъ другихъ болѣзней , худая матерія въ составъ обращается и метасомъ дѣлается (1104). Чаще же , отъ удару , и отъ паденія бедерныя илонныя кости пришибаются , и оныя составныя связки , а припомъ и желѣза (1192) , сильно придавливаются , и повреждаются . Ибо , ежели это случится , то много мокроты въ составъ спекается (1105) , или въ тѣхъ же частяхъ вожженіе и напоследокъ гной дѣлается . Эпа же мокрота , которая въ составъ спеклась , чрезъ долгое время и поменьку возрастаетъ , и напоследокъ кость съ превеликою и нестерпимою съ часу на часъ прибавляющеюся болью изъ мѣста своего высавываетъ . Тоже самое и у дѣтей обыкновенно дѣлается , когда падаютъ , и съ высока съ носильщицыныхъ рукъ , скальзываютъ . Ибо

X x x 2

когда

когда онѢ за ногу руками примупся, и составѢ силно выпягивать начнутѢ, то шупѢ связки повреждаютѢ и вѢ слабость приводятѢ. Когда внутренняя связка перерывается, вѢ яму вертлюжную спекается кровь, и другая мокрота. Ежели же связки очень выпянутѢ бывають и расслаблены, то вѢ самомѢ движеніи и хожденіи оныя помиленьку больше вѢ слабость приводятѢся, покуда кость изѢ вертлюга своего выскочитѢ.

(*) ЭтотѢ несчастной случай уже зналъ иппократѢ. Секц. 6. афр. 59. 'Οκίσσιον ὑπὸ ἰχιάδος ἐνοχλῶμένοσι χροίνης ἐξίσταται τὸ ἰχίον, καὶ πάλιν ἐρπίπτει, τῷτέοισι μύζαν ἐπιγυνοῦνται. И афр. 60. 'Οκίσσιον ὑπὸ ἰχιάδος ἐνοχλῶμένοσι χροίνης τὸ ἰχίον ἐξίσταται, τῷτέοισι τήκεται τὸ σκέλος, καὶ χυλῶνται, ἢ μὴ καυθῶσιν. Присовокупн ГАЛЕНА вѢ Коммент. на эпл Афоризмы Т. 9 стр. 289. Много также имѢетѢ ФАЛЛОПИИ о вывихахѢ Гл. 13. Г. 2, дѢлѢ стр. 85. Присов. дѢлѢ ПАПА Благоразумнаго Медика [консультыи медици] совѢтѢ. 50. стр. 244. и ПЕГИТѢ вѢ Комм. К. А. НаукѢ 1722 года стр. 159. и что другіе написавѢ его писали АНДРИ и ГУНАУЛАДѢ, которымѢ онѢ также ошѢтствоваль.

§. 1195.

СнѢжѢ пороки, различныхѢ родовѢ бывающіе, по особеннымѢ нѢкоторымѢ признакамѢ и разбираются. НапередѢ всего разсудитѢ должно причину, отѢ чего какой составѢ, или кость, вредѢ получили. Что кость изѢ вертлюга вонѢ можетѢ выпитѢ отѢ поврежденія связокѢ и отѢ спечснѢя вѢ вертлюгѢ мокроты, потому знать можно, ежели удѢ близѢ состава, отѢ упаденія, или ударомѢ ушибенѢ, будетѢ болѢть, а боль сѢ дня на день будетѢ пріумножаться, а припомѢ и меньше дѢйствительности вѢ удѢ ославашѢся будетѢ, покуда онѢ уже вонѢ вып-

па-

падешъ , и хроманье покажется. Ежели кось смѣста своего выскочитъ , удъ въ противную спорону не можешъ ворочаться.

§. 1196.

Гдѣ шѣйка переломлена бываетъ , это дѣлается отъ удару , или отъ упаденія , и сперва человекъ , ни на ногу стаять , ни хорошо ходитъ не можешъ. Ибо мышки кось стягиваютъ , голень одна другой короче и горбатѣе бываетъ : Понеже ступня ножная на наружную спорону оборотится , и пята до земли доставать не станешъ. Ежели удъ такъ переломленный оборотится , то иногда приложатъ ухо къ верхней части бедра , слышать можно звукъ , или прескъ , который бытъ того дѣлается , когда кости переломленные одна надъ другою ворочаются. Между подлиннѣйшими знаками то почищается , ежели боль умилился , и воженіе минешъ , нога безъ великой трудности и снаружи , и внутри , оборачиваться и згибаться можешъ. Ибо это , во время кости переломленной , бытъ можешъ ; а не тогда , когда совсѣмъ кось изъ ямы своей выпадешъ (1195).

§. 1197.

Ежели же бедра , или силою , или и помаленьку изъ нѣдра своего выползешъ , то она часто на внутреннюю и нижнюю часть выпалзываетъ. Ибо въ той сторонѣ , и укусуница не такъ глубока , и край ее вырѣзанъ , и связка оная внутренняя близко подлѣ того (1191). А понеже бедра мышками ягодичными , которыя весьма крѣпки , стягивается , то она побольшей части , когда связки расслабляются , на внутреннюю и нижнюю спорону выскакиваетъ. Въ этомъ случаѣ головка бедерная остается въ дирѣ овальной , которой дыры

Х х х 3

связ-

связка хоть не совсѣмъ , однако нѣсколько ногу внутрь оборачиваетъ. Голенъ разкоряковапа бываетъ , и другой длиннѣе. Ибо ступня ножная вонъ смотритъ. А понеже нога длиннее бываетъ , то когда человѣкъ ступаетъ , колѣно по большей части згибается. Въ пропчемъ же въ паху опухоль , а на ягодицѣ яма , обыкновенно бываетъ. Понеже укусница въ верху глубока , то въ верхъ и на внутреннюю сторону кости вывихиваться не легко можетъ. Однакожъ когда она и внизъ вывихнется , то иногда ее , сжали въ дирѣ овалной она не остановится , мышки къ верху приподнимаютъ. Въ этомъ случаѣ нога короткая больше на внѣшнюю сторону склонна бываетъ , а на внутреннюю сторону ворочаться никакъ не можетъ. Тутъ также великой бугоръ въ паху бываетъ , которымъ иногда великія жилы бьющіяся и жилы кровевозращательныя сквозь связку ПОВПАРТІЕВУ (792) нисходящія , припискиваются.

§. 1198.

Бедра временемъ и на заднюю сторону , и , какъ кажется , всегда на нижнюю выскакиваетъ , но въ томъ мѣстѣ останавливаться не можетъ , мышками въ верхъ плетчасъ подымается. Въ этомъ случаѣ нога коротка бываетъ , такъ , что только самыми кончиками перспными можно землю доставать , нога крива бываетъ а ступня ножная внутрь заварачивается. На ягодицѣ горбыль , въ паху яма , обыкновенно бываютъ.

§. 1199.

Бедра отъ какой бы нибудь причины ни вывихнулась , временемъ вправляться можетъ , однакожъ и вправленная она всегда опять выпадываетъ. Я могу думать , что рѣдко можетъ случиться , чтобъ она
она

она будучи подлинно вывихнута, была бы совершенно и безъ безобразнаго хроманія вылѣчена. Также, ежели бедра на мѣстѣ своемъ не будутъ, въ удѣ бываетъ сухоща, и плоть исчезаетъ. Ежели у ребенка бедра вывихнутся, то удѣ не такъ какъ прочіе, будетъ росль. Ежели въ ямѣ вертлюжной вожженіе будетъ и гной скопился, то онъ по времени связки переѣдетъ, здѣлаются худыя болячки и фиссулы, и люди на послѣдокъ исчахши умираютъ.

§. 1200.

Однакожъ, ежели бедра случится иногда насильно выдернута, то надобно отвѣдать, не можноль ее вправить. Больнаго положить должно такъ, чѣтобъ спороною, на которую кость выскочила, къверху лежалъ. Удѣ сильно выпянутъ должно двумя пѣсмами, одною опѣ паха, другою опѣ колѣна. Изрядно это здѣлать можно, полиспасомъ, то есть вожжами съ блокомъ и съ крюкомъ, ежели та пѣсма, которою пахъ обнятъ, къ крюку будетъ привязана. Ежели кости одна опѣ другой довольно растянувшись, то бедру лѣкаръ руками своими, употребивъ припомъ и пѣсму, вправляетъ, и въ мѣсто свое вставляетъ. Узнать же можно, что бедра уже въ своемъ мѣстѣ, ежели человекъ удѣ двигать начнетъ. Кладутъ съверху суконку, и обвязываютъ обвязкою, которою колосъ изображается, и будто бы винтомъ, въ верхъ проходитъ, и такимъ образомъ бедру приводитъ. У жирныхъ людей не много обвязка держать можетъ.

§. 1201.

Въ ономъ же случаѣ, гдѣ бедра зашибена бываетъ и боль въ составѣ ярящаяся, и съ дня на день умно-

умножающаяся, опасаться надлежитъ, чтобъ отъ спускающейся въ яму верплюжную мокроты, кость на послѣдокъ вонъ не выскользнула, испытать надобно другія нѣкоторыя вспомошествованія. Проносныя гораздо крѣпкѣя, а припомъ и кровь пускать надлежитъ, чрезъ что припеченіе мокротъ отвращено быть можетъ, употребивъ тутъ же пищу приспосовленную, которою человѣкъ поддерживаться можетъ, а не преизлишне кормиться. Снаружи употреблять можно переніе ликворами, чрезъ искусство химическое прѣготовленными (1115), примѣшивая къ нимъ вещи разбивающія. Обвязкою (1200) сколько возможно, составъ сжимать, и покой наблюдать должно (*). Сыскались нѣкоторые, что у людей сухощавыхъ и не дебелыхъ, глубоко всунувши ланцетъ; связку, или чехолъ, разрѣзывать, и мокроту вонъ выпускавъ отпавались (**), однакожъ отъ такого лѣченія составъ недвижимымъ остаться можетъ.

(*) у Иппократа въ помян. мѣст. и у Эгинета видѣть можно, что древніе въ такихъ случаяхъ обычай имѣли надъ составомъ каленымъ желѣзомъ прижигать, и великой гной производить, присовок. сюда §. 935 (1194*).

(**) Я отъ самаго слышалъ СЕНФІА берлинскаго славнаго Хирурга учивша, что онъ этою дорогою поступилъ.

§. 1202.

Бедерная кость къ низу толще бываетъ, имѣетъ двѣ великія головки, или два мышелка, хрящикомъ прикрытыя, копорые нѣсколько на переднюю, а больше на заднюю сторону торчатъ. На задней сторонѣ межъ ими въ срединѣ глубокая лоцевина имѣется, по которой великія жилы бьющіяся и жилы кровевозвращательныя въ ногу проходятъ. Мышцелокъ внутренній нѣсколько пополнѣе и покруглѣе гораздо бываетъ, нежели на-

наружный. Эти головки оставляются на берцѣ , котораго конецъ верхній обширнѣйшій , двѣ неглубокія луночки на себѣ имѣютъ , въ которыя оныя бедерные мышцелки вставляются. Оная луночка , въ которую внутренній бедерный мышцелокъ приходитъ , другой нѣсколько побольше и поглубже. Межъ этими костями , какъ и межъ другими , хрящиками прикрытыми лежатъ два хрящика лунастые , другъ къ другу обороченные , къ внутренней сторонѣ истонченные и вырѣзанные , которые во время бедернаго на нихъ споянія свободное въ составѣ производятъ движеніе , а припомъ и луночки оныя , въ которыя мышцелки бедерные вставляются , глубже дѣлаютъ. Эти хрящики на передней сторонѣ подъ чашкою колѣнною связкою , полулунною называемою , связываемые , будто бы въ связки корешкія и крѣпкія перераждаемые , прирастаютъ къ буграмъ , отъ которыхъ верхній конецъ берца на самой срединѣ негладокъ. Къ этимъ буграмъ верхняго конца прицѣпливаются двѣ другія крѣпкія связки , изъ тѣхъ числа , которыя въ чехолкахъ заключаются. Изъ нихъ одна начинается отъ той глубокой луночки , которую назади у бедра межъ мышцелками находящуюся я объявилъ , и отъ самаго мышцелка внутренняго идетъ поверхъ оной лощевины , и приростаетъ къ верхнему берцову концу съ задней стороны , гдѣ берцо позади бугровъ щербину имѣетъ , такъ , что связка нѣсколько къ внѣшней сторонѣ подойдетъ. Другая , изъ той же лощевины бедерной и отъ мышцелка внѣшняго произшедши , кончится на берцѣ на верхнемъ концѣ буграми изшарошенномъ съ передней и внѣшней стороны. Сии крѣпкія связки , одна

Ц Ц Ц

съ

съ другою крестѣ на крестѣ пересѣкающіяся , и буди бы буквою Россійскою Х дѣлающіяся , обхватываются крѣпкимъ чехломъ , который также къ онымъ выше-описаннымъ хрящикамъ лунастымъ приростаебѣ. Сверхъ этого чехла идутъ еще двѣ связки . Одна широкая будучи , начинается отъ мышелка внутренняго бедернаго и съ боку , и кончится на головкѣ берцовой во внутреннемъ его мѣстѣ. А другая съ наружной стороны лежащая , и отъ наружнаго бедернаго мышелка наченная , идетъ нѣсколько къ берцу , и нѣсколько къ дудкѣ , къ самимъ ихъ головошнымъ верхушечкамъ. Къ тому еще одну связку придаютъ , которая отъ бедра сзади надъ мышелкомъ вышнимъ наченная надъ нѣдромъ онымъ проходитъ , и къ самой верхушечкѣ головки берцовой съ задней спорной приростаебѣ.

§. 1203

Этотъ составъ , который при всемъ томъ многими мышками окруженъ , защищается костью небольшою , чашкою колѣбною называемою , которая въ верху мышками протягивающими , прямою , голенною , и обширными какъ внутренною , такъ наружною , а въ низу прекрѣпкою связкою привязанная надъ составомъ будио плаваебѣ. Связка она , отъ нѣкоторыхъ къ сухимъ жиламъ помянутыхъ мѣпекъ причипаемая , приростаебѣ къ бутру , у бедра съ передней спорной подъ верхнимъ его концомъ находящемуся. Чашка колѣбная съ задней спорной хрящевата , по середкѣ горбата , по обѣимъ спорнымъ нѣсколько пологая будучи , соотвѣтствуетъ кости бедерной , которая на нижнемъ концѣ межъ двумя мышелками лощевину имѣебѣ. Чашки лощевинка наружная

ружная , въ которую наружный бедерный мышцелокъ вставлявается , обширнѣе и глубже , нежели внутренняя. Кромѣ оныхъ мышечныхъ сухихъ жилъ и кромѣ связки , которою чашка колѣнная къ берцу прикрѣпляется , она ввязывается въ нижней буяраковой бедерной конечъ ; среднюю нѣкоторою связкою , которая отъ задней ея и отъ высоковапой стороны происходитъ. Сверхъ того къ краямъ чашки колѣнной кругомъ прицепливается чехолъ , которымъ весь составъ обемлется.

§. 1204.

Колѣно къ родамъ гинглима п. с. къ составу вставляемому и вставляющемуся причестъ надлежитъ ; не можетъ безъ труда вывихиваться , понеже кости въ томъ мѣстѣ , гдѣ она съ другою соединяется , очень широки и обширны , и понеже онѣ многими и крѣпкими связками связываются. Ежели же бы кости хопѣла вывихнуться отъ натуги , то не можетъ такъ здѣлаться , что развѣ повреждены или разлучены крайне будущъ оныя связки. Припомъ ежели связки повреждены бывають , изъ нихъ мокрота въ составъ напекаетъ , колѣно распухаетъ , и недвижимъ дѣлается , о которомъ болѣзни родъ вскорѣ объявлю. Ежели берцо изъ мѣста своего вывихивается , надлежитъ , чтобъ и чашка колѣнная отъ нее оторвалась. Чашка же иногда вывихиваться можетъ , а берцо на своемъ мѣстѣ остается. Колѣножъ вывихивается на внѣшнюю и внутреннюю и заднюю сторону , а на переднюю нѣтъ , понеже тамъ чашка колѣнная спереди лежитъ. Временемъ колѣнная чашка ; будучи въ низу поперегъ подлѣ оной великой связки разломлена , и къ верху мышками приподнята ,

Ц ц ц 2

глуп-

глупца заставитъ думать, что кость вывихнулась, и въ верхъ высунулась.

§. 1205.

Этотъ составъ лѣчить надобно также, какъ и прочіе составы. Надлежитъ удъ насилно вытянуть, и берцо въ разныя стороны поворачивать и вправлять. Ежели чашка колѣнная съ мѣсто своего здвинется, надлежитъ колѣно на скамью положить, и приведши и придавивши голень составъ натянуть, а чашку колѣнную рукою на мѣсто свое понудить. На колѣно вывихнутое наложить должно суконку, съ обѣихъ концовъ почти до самой середины разрѣзанную, то есть працу [фундаментъ] называемую. Обвязка начинаясь отъ бедра, около которой два раза обернувшись, внизъ протягивается подъ колѣнкомъ до голени, и около той обертывается. Она въ низъ и въ верхъ будто бы винтомъ поворачивается, и весь составъ такимъ образомъ, какъ о локтѣ сказано (1183), обнимается. На чашку колѣнную, ежели она одна свихнута будетъ, на то мѣсто, на которое она вывихнулась, кладется толстая суконка, и обвивается обвязкою, соединяющею [уніонсъ] называемою (515). Обвязка эта съ двухъ концовъ бываетъ сверчена, сквозь которую на серединѣ въ длину прорѣзанную одинъ конецъ продѣвается, такъ, что когда концы въ разныя стороны потянутся, то обвязкою крѣпче составъ обхватится. Такимъ же порядкомъ и въ другой разъ обвязкою составъ обойти должно.

§. 1206.

Лодышка [сура], которую и дудкою [фибула] называють, въ верху и въ низу съ берцомъ сходится,
на

на срединѣ сѣ нимѣ разходится. На верхнемѣ лодышкиномѣ концѣ небольшая и нѣсколько пологая лощевинка имѣется, въ которую вкладывается, на самой верхушкѣ на берцѣ сѣ боку и сѣ наружной стороны имѣющійся бугорокъ. Этомѣ составѣ коропенькими да крѣпкими связками связывается. А что лодышка сѣ бедернымѣ наружнымѣ мышцелкомѣ связкою связывается, я выше объявилѣ (1202). Лодышкина головка жилою сухою мышкой двуголовой также привязывается. Лодышка къ мышцелку нижнему полще бываетѣ, и сѣ боку въ ямочку какѣ на берцѣ такѣ на бабкѣ находящуюся, вкладывается. Эту лодышкину нижнюю головку, единогласно мышцелкомѣ наружнымѣ [маллеолусѣ экстернусѣ] называютѣ; онѣ по большей части внѣ этихѣ костей лежатѣ, къ нимѣ и къ кости пяточной многими коропенькими да крѣпкими связками привязанѣ, держатѣся. Также на срединѣ, гдѣ берцо и лодышка, въ низу и въ верху совокупленные, нарочно расходящіяся, эти кости инною связкою крѣпкою между ими по срединѣ имѣющеюся, держатѣся.

§. 1207.

Случиться можетѣ, что и лодышка прочѣ опдѣлится, и сѣ мѣста своего содвинется, ее безѣ вытягиванія перстами только хорошенько подавивѣ на мѣсто свое вправить можно. А понеже по большей части сила въ оныхѣ связкахѣ теряется, то кость скоро вправленная не надежно держитѣся, и гораздо легко вывихивается, ежели удѣ хотя не множо въ движеніе придетѣ. Для того кость положивши сѣ обѣихѣ сторонѣ толстыя суконки обвязкою обвязать должно, и больного чрезѣ долгое время въ поспелѣ держать, чтобѣ лодышка имѣвши еще расслаб-

Ц Ц Ц 3

лыя

лыя связки , опять не выскочила , когда удѣ больной начнетъ движеніе дѣлать.

§. 1208.

Нога т. с. плюсна изъ семи костей заплюсныхъ , изъ пяти плюсныхъ и изъ перстовъ состоитъ. Большой палецъ у ноги двѣ кости имѣетъ. Берцо и лодышка , внизу одна съ другою совокупленная , въ концѣ своемъ нѣдро великое и глубокое имѣютъ , въ которое вставляются бабка или кость паранная [астрагалусъ или талюсъ] , сверху хрящикомъ прикрытая въ иномъ мѣстѣ нѣсколько лоциновата , въ другомъ бугровата будучи , онымъ костямъ соответствующая. Эпифизъ составъ съ обѣихъ сторонъ защищаютъ мышелки [маллеолы] называемые. О наружномъ выше (1206) объявлено. Внутренній производимъ отъ конца нижняго берцова , который отрожекъ съ боку съ бабкою соедкупляется , и многими связками укрѣпляется.

§. 1209.

Бабка или кость паранная [талюсъ] лежитъ на кости пятной , въ низу съ задней стороны лоциновата , въ средину которой горбылѣкъ этой кости вставляется. Кость пятная съ передней и верхней стороны лоциноватая , принимаетъ въ себя переднюю бабкину кость. Бабка съ передней стороны горбата будучи , вставляется въ нѣсколько пологую ямочку кости корабельной. Кость пятная съ передней стороны соединяется съ костью кубической , по подобію такъ названною. Эти кости всѣ многими и прекрѣпкими связками связываются. Желѣза великая возгрявая (1099) лежитъ въ глубокомъ и великомъ нѣдрѣ , у ноги на внѣшней сторонѣ между бабкою и пятною костью находящеюся ; изъ той желѣзы влага или сало въ составъ идетъ.

§ 1210

§. 1210.

Бабка или кость шаранная на всѣ четыре стороны вывихиваться можетъ. Гдѣжѣ на переднюю сторону ножную вывихнется, то нижнему берцову концу должно или переломиться, или послѣ, какъ связки разслабнушѣ, отъ костей, съ которыми она связана, отдернушѣся, и изъ мѣста своего выскочитъ. Также бабка и на внутреннюю сторону не легко вывихнется, развѣ только берцовъ отпроспѣкъ или мышцепокъ внутренний опломится. Если бабка на переднюю сторону выскочитъ, то пята подъ берцовъ очутишѣся, и почти спрячется, и плюсна распянетъся. Если же бабка назадъ выскочитъ, то берцо на отпроспѣкъ бабкиномъ въ кость корабельную съ передней стороны вставляющемся, остановится, и пята длинная, а нога короче будетъ.

§. 1211.

Понеже этошѣ составъ не только крѣпкими связками и жилами сухими, а припомъ многими жилами бѣющими, жилами кровевозвращательными и жилами чувствительными окружается, и понеже сверхъ этихъ всѣхъ многія плевныя сумки вблизи лежатъ, сквозь которыя жилы сухія продѣваются, то онѣ развѣ отъ великаго насилія, а припомъ и съ великимъ бѣдствомъ можетъ вывихнуться. Ибо дѣлается сильное вожженіе, которое иногда заставляе ногу отрѣзывать, или, что въ ногѣ Антонновъ огонь дѣлается, или, что по облегченіи вожженія великіе чирьи безверхушешные и фистулы бывають, а припомъ и кости повреждаются. Составъ часто распадается, около котораго мозольность дѣлается, а эта мозольность отъ недвиженія съ часу на

на часъ больше бываетъ, и изгибаться составу не дастъ. Гораздо еще чаще слабость связокъ то производить, что кости, великою силою расторгнушыя, хотя опять на мѣсто свое вправляются, не очень надежно держатся, да и опять вонъ выскакиваютъ. Если оба мыщелка переломлены будутъ, и отъ кости отдѣлятся, мозоль [калюсь] нарастаетъ, отчего нѣсколько въ томъ мѣстѣ пригложива терзается.

§. 1212.

Чтобъ составъ, какъ надлежитъ, вправленъ былъ, надобно его довольно выпянуть, а то дѣлается вытягиваніемъ нарочно ногъ и бедра. Лѣкарь, бабку въ мѣсто ся вправитъ намѣривающійся, долженъ и пяту и ногу руками обхватить, и такъ очень сильно приводить. Въ этомъ составѣ прилѣжно поступать должно, чтобъ связки укрѣпились, и опровергнуть (1115, 1116), чтобъ и составъ сильно не распухъ, и чтобъ мозольность отъ недвиженія не дѣлалась. А обвязывать составъ такъ надлежитъ, ежели ко стѣ на переднюю или на заднюю сторону вывихнута будетъ чтобъ обвязка или суконка четвероугольная, со всѣхъ сторонъ надрѣзанная и четыре конца имѣющая (фунда, [праца]) серединою, гдѣ она цѣла, на кость вывихнутую легла, и чтобъ ся концами составъ обхватился. Если же кость на внѣшнюю или внутреннюю сторону будетъ вывихнута, суконкою длиною, которая бы и пяту захватить могла, прикрываются мыщелки. Накладывается тушь и обвязка, которая начинается отъ колѣна, и ею берцо и плюсну обвязываютъ, и окружая на подобіе винта въ низъ опускается, и въ верхъ приподнимается. Дѣлать тушь все надлежитъ, какъ бы ни будь составъ въ здорově привести.

§ 1213.

§. 1213.

Также и плюсныя кости межъ собою и кубическая, а припомъ корабельная, опъ пашной и таранной опскакивать могутъ ; а то бываетъ , ежели нога какою вещью , будто бы рѣшедкою желѣзною уловленная , сильно сжимается. Ногѹ такимъ образомъ вывихнушую , на противную сторону вернуть должно , только же то не безъ труда дѣлается. Въ плюсныхъ и перспныхъ костяхъ ничего больше дѣлать не случается , только самое то , что въ рукѹ дѣлать опредѣлено. Ежели связки розорваны , или въ нихъ такъ мало крѣпости останется , что укрѣпить ихъ будетъ не возможно , то лучше иногда бываетъ вскорѣ ногѹ опнять.

XX

СОСТАВЪ ОКРѢПЛЫЙ.

Α Γ Κ Υ Δ Ω Σ Ι Σ.

§. 1214.

Составы также опъ разныхъ случаевъ окрѣплы бываютъ , такъ , что ихъ згибать бываетъ не возможно , которые пороки *αγκυλας* или *αγκυλωσις* древнѣе называли (*) : То есть временемъ кости и ихъ надростки , близъ составовъ распухаютъ , а то дѣлается у людей соки испорченные въ пѣлѣ имѣющихъ , а особливо у ребятихъ рахитомъ немоглыхъ , какъ я выше сказалъ (1065 , 1066 , 1071). Также когда кость близъ состава переломлена будетъ , мозоль преизлишняя наростетъ , которою составъ изнаполнится , и кости такъ спаяются , что одна сверхъ другой движенія не будутъ имѣть. Иногда

Ч ч ч

случа-

случается, чпо, ежели связки зашибены, или раною сильно повреждены бывають (**), кости онѣ недвиженія межѣ собою срастаются. Ибо связки онѣ ранѣ и онѣ великихъ гноеній, особливо ежели послѣ того худо струпѣ заѣланѣ будутѣ, недвижимы дѣлаются, скорчиваются, и удѣ скорченымѣ и кривымѣ дѣлають. Это и онѣ поврежденія мышекѣ пѣхѣ, которыми колѣно згибается, въ колѣнѣ дѣлается, когда они онѣ разтяженія жилѣ чувствительныхъ протяжены застыются (***).

(*) Смотри у ЦЕЛСА въ Кн. 5 гл. 18 § 28, у ПАВЛА Кн. 4 гл. 55 стр. 71.

(**) Смотри у ХЕСЕЛДЕНА въ Остеографіи Таб. 47.

(***) Смотри въ Ист. К. А. Н. 1728 году стр. 283.

§. 1215.

Часто же во многихъ составахъ, а особливо въ локтѣ и въ колѣнѣ, это случается, что изѣ внутрь прибавляющагося и понужденнаго сала, или онѣ оной влаги, распухають; а та влага во всякомѣ составѣ имѣется, какѣ я выше объявилѣ (1099). Это дѣло начинается обыкновенно онѣ удару и онѣ раны, понеже много гораздо оной мокроты въ составѣ стекается (сб 485 до 487). Также это обыкновенно случается онѣ перелому кости, и когда удѣ долго безѣ движенія въ желобкѣ, или на кровати лежать будутѣ, да и послѣ лѣченія не вскорѣ чрезѣ движеніе въ употребленіе свое вступитѣ. Ежели составъ вывихнется, и связки крайне повредятся и сведутся, или, ежели онѣ пренебреженѣ, и не потчасѣ вправленѣ будутѣ. Также; когда связки онѣ какого случая неумѣреннаго и долговременнаго згибанія и давленія, или онѣ вожженія, которое онѣ различныхъ при-

причинѣ дѣлается, повреждены и обезсилны будутъ. Болѣзнь эта часто случается у рудокоповъ, которые на колѣнкахъ спюючи, на каменьяхъ холодныхъ дѣло свое дѣлають: Ибо такимъ способомъ и связки обезсиливаются, и соки отъ холоду сгущиваются, который испарину изъ всѣхъ плѣсныхъ частей производящую, удерживаетъ.

§. 1216.

Ежели кость въ составѣ переломлена будетъ, и составъ отъ нарослой мозольности недвижимъ дѣлается, такого порока никакъ лѣчить не возможно. Ежели отъ великаго недвиженія составъ отвердѣнетъ, то удъ движеніемъ и стиганіемъ въ прежнее дѣйствіе приводить должно. Движеніе же во время боли вредно, понеже мокрота всегда въ мѣсто болящее спускается, когдажъ боль эта перестанетъ, движеніе весьма полезно бываетъ. Ежели связки отъ раны струпомъ скорчатся, оныя припаривать должно водою или елемъ теплымъ, употребляючи припомъ тереніе (226). Можно еще сверхъ прикладываать жидкія припарки изъ травъ, смягчить и въ разрѣшеніе приводить силу имѣющихъ (91). Ежели же много отъ связки опѣрзано будетъ, того никакимъ лѣченіемъ возобновить не возможно. Болящему (1214), у котораго мышки скорчены бывають, пособствують водныя бани съ травами крѣпительными, или силу дающими дѣлаемая. Хорошо также тому больному мышки мастью жильночувствительною [унгвеншо нервино] (1116) мазать.

§. 1217.

Ежели же по опухоли и по другимъ знакамъ покажется, что внутри мокрота собралась, то съ са-

Ч Ч Ч 2

мага

маго начала очень пособствуетъ самое состава движеніе. Понеже чрезъ движеніе згустившаяся мокрота разжиживется и разбивается. Ежели же вредъ этотъ застарѣлой будетъ, можно отвѣдать лѣкарствами лѣчить. На составъ сперва класть припарки густыя [катапласма] мягчительныя (91), которыя для того наипаче весьма надобны, ежели опухоль будетъ жестка или такая, которую перстомъ подавишь, а она не поддастся. Послѣ же иногда пособствуютъ пластыри, де галбано, де аммоніако, съ которыми смѣшиваятъ діафоретикумъ Минсихти и олеунъ тартари фепидумъ можно, также припарки жидкія изъ селешнова росолу, и въ которой права сабина, руша, варены бывають съ прибавкою уксусу, купоросу и квасцовъ. Ибо отъ повседневнаго такихъ припарокъ употребленія, кожа шероховата дѣлается, и прыщики выскакивають, которыми иногда мокрота вонъ выходитъ, и разходится, и разбивается. Пособствовать также могутъ теплицы, т. е. теплыя воды, ежели въ нихъ удѣ будетъ опускается, и ежели на него съ высокаго мѣста капать будутъ. Въ такихъ лѣченіяхъ долгое время препровождаютъ надлежишь (*).

(*) Смотр. у ЛЕ ДРАНА Примѣч. 93 и 94 Стр. 254. Онъ не натуральными теплыми водами, но другими чрезъ науку составленными на составъ часто и чрезъ долгое время накрапывалъ (Французы то называютъ ле душъ) и послѣ того прикладывалъ пузыри теплою водою наполненные. На послѣдокъ холстиною теплою прикрывалъ составъ, и больного въ постель содержалъ. Двухъ больныхъ онъ такимъ способомъ вылѣчилъ.

§. 1218.

Но ежели опухоль застарѣлая будетъ, и отъ него такими средствами ничего не умалается, то непременно за ножикъ приниматься надобно. Однакожъ

кожѣ и къ тому спѣшить не должно, ежели тѣло
будетъ худаго. сложенія или старое. Опухоль раз-
рѣзывать надобно съ боку, крайне остерегаючись,
чтобъ связокъ шѣхъ, которыми съ боковъ составы
придерживаются (1178, 1202), не перерѣзать. Выпу-
скается мокрота, когда не можно опухоли придавить.
Не худо въ разрѣзъ теплой ликворъ, какъ напримѣръ
декоктъ съ агримонією вареный, и съ водою ран-
ною смѣшенный (222, 295) въ составъ пускашь,
чтобъ мокроту, которая на подобіе жижи сплоскени
скапливается, и густа бываетъ, разбить. Разрѣзъ
пряжею наполнить и закрыть должно, чтобъ въ слѣ-
дующіе дни то, что мокроты осталось, вытекло.
Ежели никакого слѣда его видно не будетъ, то вонъ
взять пряжу должно, и рану, примѣчаячи все то,
что я выше представилъ, залѣчивать (съ 485 до 487).
Также смотрѣть, чтобъ отъ струпа составъ недви-
жимъ не здѣлался (1214), и чтобъ онъ имѣвши
разслабля связки не вывихнулся (1104, 1115, 1116).

~~~~~

## П Е Р Е Л О М Ы.

### Ф Р А К Т А.

#### §. 1219.

Я выше сказалъ, что временемъ кости отъ худо-  
бы соковъ ломки бывають (1032), отъ котораго рода  
болѣзни, ни самое лучшее средство, ни другое какое  
лѣкарство избавлять не можетъ (\*). У спариковъ  
и цынготною или прелюбоудѣнною болѣзью немо-  
ществующихъ, а особливо ежели болѣзнь будетъ за-  
старѣ-

Ч ч ч з

спарѣлая , и гдѣ мозгъ косный почти со всѣмъ сѣденъ , или поврежденъ , и испорченъ бываетъ (1031) . чаще нежели у другихъ кости переламываются , а по примѣшамъ общенароднымъ чаще ио случается вимою нежелеи весною.

(\*) Смотри между множествомъ примѣчаній у Авторовъ выше (1032\*\*) упомянутыхъ , достопамятную исторію САВІАРДОВУ примѣчаній Хирургическихъ примѣч. 62. стр 274.

## §. 1220.

Чаще же всего кости раскалываются , переламываются и пришибаются , когда на нихъ снаружи нѣчто упадетъ. Оное всѣмъ костямъ общее есць : Ибо что по дѣлается на головѣ , уже выше я извѣстилъ (сѣ 509 до 513 да сѣ 523 до 568). Въ прочихъ же костяхъ переломленныхъ нѣкоторыя лѣченія общія бываютъ , а въ другихъ особенныя при всякомъ переломѣ дѣлаются. Въ нѣкоторыхъ удахъ иногда одна кость , иногда двѣ , а иногда и многія попереломаны бываютъ. Кость переламывается или поперегъ пополамъ , или наискось , и пачѣ самая кость иногда тупые а иногда острые концы имѣетъ , которыми мясо и другія части ранены бываютъ. Также иногда много ошломковъ ошъ перелому бываетъ , которые одинъ сѣ другимъ держатся , а временемъ нѣ ошломки одинъ ошъ друга опдѣляются. Кости переломленныя иногда на мѣстѣ своемъ остаются , а гораздо чаще выскакиваютъ. Не рѣдко къ перелому костному рана , опухоль , вожженіе , чирей безверхушесный приключается , или кости переломленной и зашибенной будучи , составъ вывихивается (1103 , 1119). Рѣдко случается , чтобъ кость впрямь , какъ бы дерево ; въ длину раскалывалась.

## §. 1221.

§. 1221.

Переломы лѣзять намѣряющемуся знать долю коостей число , изображеніе , положеніе , порядок , связаніе , совокупленіе , жесткость , мягкость , нездравяемость , гладкость , а припомѣ въ нихъ мозгъ бывающій , опростки , дупла , надростки , со всѣмъ тѣмъ мышкы , какими они прикрываются ; и какія на нихъ вончаша , и жилы бѣющіяся , жилы кровезовращательныя и жилы чувствительныя , копорыя вблизи находятся.

§. 1222.

Кость переломленную узнать можно , ежели она сильно зашибена будетъ , или какое другое нещастіе ей случится , копорому воспронившись она не будетъ въ состояніи. Ежели переломленыя части съ мѣстѣ своихъ здвинутся , то одна часть на другую выскакиваетъ , удѣ одинъ другаго бываетъ короче , и мышкы распухаютъ. Иногда коостей переломленныхъ и одну отъ другой отдѣлившихся концы и глазами и осязаніемъ познать можно. Ибо переломленные кости при осязаніи неровны бываютъ , а припомѣ при движеніи уда гораздо болятъ. Сверхъ же того онѣ , когда удѣ вытягивается , одна отъ другой отпнянутвса , и гнутвса могутъ. Временемъ переломленныхъ коостей , когда одна на другую движется , скрывъ ушами слышать можно (1197).

§. 1223

Ежели кость въ длину будетъ расколота (1220) , что на черепѣ головномъ (530) зачастую , а на другихъ не такъ часто , думаю , случается такой случай , хотя бы вся кость расколота была , съ начала и послѣ

и послѣ приключившагося удара, не весьма достоверно изслѣдовать можно. Ибо обыкновенно ни удѣ другого короче не бываетъ, ни кость при осязаніи неровною не сыскивается. А припомѣ мѣсто или ничего не опухаетъ, или и опухаетъ да мало, и боль, которая отъ плевы наkostной и отъ мѣса зашибенаго дѣлающаяся, мнѣніе о переломленіи или расколотой кости напрасно причинить можетъ. Изъ примѣтовъ же, которыя впредь могутъ дѣлаться, общая примѣта есть, что удѣ будетъ болѣть, а боль она въ этомъ случаѣ ни сама собою не утоляется, ни отъ прикладыванія лѣкарствъ не перестаетъ, но почти со дня на день жесточае бываетъ. Припомѣ наkostная плева при осязаніи еще больше боли въ томъ мѣстѣ, гдѣ кость будетъ расколота, когда перстами ее начнешь пощупывать. Боль въ самомъ мозгѣ костномъ больше приумножается, когда плева, которою кости изнутри прикрываются (1030), при расколотой кости, повреждена, и вожжена будетъ (1065).

## §. 1224.

Ни когдажъ не пристало переломъ ощупывать прежде времени, покуда больной на постѣлю или на мѣсто положенъ не будетъ; гдѣ переломленыя части на мѣсто свое вправишь, и удѣ перевязавъ свободно будетъ. Того ради, ежели то случится на рукахъ или на бедрахъ, прежде всего человѣка на кровать положить надлежитъ. Также, гдѣ кости между собою раступившіяся будутъ, а оныя опятивъ на мѣста свой повправлять должно, надобно, чтобъ одинъ или больше служителей человѣка лѣчимаго держали, и не давали бы ему двигаться, дабы чрезъ движе-

движеніе и боль не пріумножалась , и не произвелось бы большее вожденіе.

§. 1225.

Лучше сходящія кости , которыя поперегъ переломлены бывають , понеже одна на другую наступаютъ. Хуже переломъ бываетъ , гдѣ кость наискось переломилась , а особливо ежели непупые но воспріе концы будутъ имѣть , которыми костную плеву и мясо ранено бываетъ. Кости также разбиыя , и ежели ихъ многіе обломки бывають , не безъ затрудненія вмѣсто складываются. Ежели эти обломки одинъ съ другимъ не держатся , но со всѣхъ сторонъ нарочно разскачались , и на мѣстахъ своихъ не будутъ , такіе обломки съ другими частями не срастаются. А приломъ въ такихъ случаяхъ , и гдѣ обломками , будто бы иглами , плева наискосная и мясо бердящая , великое вожденіе и горячка и гной слѣдуютъ , иногда же опасность и Англонова огня бываетъ. Обломкижъ , ежели успѣхъ будетъ хорошій , замирають , и когда гной здѣлается , вонъ вываливаются. Ежели переломъ уже будетъ застарѣлой , и кости ежели не будутъ вправлены , или мѣлко раздроблены , и съ мѣста движуты , не скипящая , такой переломъ не излѣчивается. Трудные также кости у стариковъ , беременныхъ , прелюбодѣйною , цынгошною , кахеклическою болѣзнію страдающихъ , срастываются.

(\*) Смотри ЮАННА ЗАЦМАННА Диссертат. о составахъ равно не соответствующихъ , которые послѣ переломовъ случаются въ Авг. 1718 году изданной , и смотри фигуру Липс. въ дѣлахъ ученыхъ людей 1685 года стр. 513 Таб. 13 фиг. 4.

§. 1226.

Гораздо еще труднее , когда при переломѣ костномъ и рана еще случится , а наибольшее , когда отъ

Ш ш ш

этого

этого плева накостьная вожженіе получишѣ : Ибо отъ такихъ вожженій больше опасаться надобно, гдѣ, или скорое въ гной претвореніе, или еще скорѣйшій Ан.поновъ огонь слѣдуетъ. Ежели кость подлѣ соства переломлена бываешѣ, то αγκυλωσις дѣлается, какъ выше я объявилъ (1214). А ежели кость въ шакмѣ мѣстѣ переломлена будетъ, сквозь которое жилы бѣющіяся, жилы кровевозвращательныя великія въ самую нущь и къ самому мозгу проходятъ (1031), (1033); ежели косными обломками жилы бѣющіяся, жилы кровевозвращательныя, жилы чувствительныя, жилы сухія, плева подреберная, спановая жила, будутъ бередиться, бѣдственъ пошѣ случай бываешѣ. Ежели кость въ длину бываешѣ расколопа, оноє трудно познаванъ (1223), и опасность наноситъ, чѣмъ мозгъ въ кости не повредился (1065). Плечная и локотная кость скорѣе, нежели бедра и голень сраспы- вающся.

## §. 1227.

Въ лѣченіи переломовъ при случаѣ примѣчать надлежитъ. Все, что ни будетъ не на своемъ мѣстѣ, вмѣстѣ совокупить, и обломки на мѣста свой вправить, удъ обвернувши суконками, и принаровивши къ тому лубки обвязашъ, и бѣдствія, случившяся, отворотить.

## §. 1228.

Ежели кости переломленныя на своихъ мѣстахъ стоятъ, и не выпадаютъ, то не надобно ихъ править. Ежели же съ своихъ мѣстъ здвинулись, надлежитъ поспѣшь удъ выпянуть, примѣчая все то, что выше я приказалъ (1110, 1113). А что кости не



не на своемъ мѣстѣ , примѣчается оное потому , ежели удѣ другой стороны будетъ короче , мышки распухнушѣ , кость при щупаніи неровною покажется , и немошной боль и покалываніе будетъ чувствовать. Ежели удѣ , который выпягивать надобно , плотенъ будетъ , ктому два человѣка надобны , которые бы выпягивали. Рѣдко надобны бывающѣ песьмы или обвязки , которыми бы обвязывались концы костные , и удѣ многіе бы выпягивали , а припюмъ употребляютъ полиспащѣ (1110 , 1111 , 1173).

§. 1229.

Переломленные части , ежели съ мѣстѣ своихъ здвинулись , то должно ихъ прежде вожженія вправить. Ежели же вожженіе уже въ удѣ здѣлалось , то трудно да и бѣдственно насильно мышки выпягивать , для того не надобно уда беречь , но по облегченіи вожженія то , что выломилось , вправлять должно : чего ради пристойно кровь пуспитъ , и прикладывать жидкія припарки , прешивъ вожженія наисилнѣйше дѣйствующія , покуда оно отъ болнаго мѣста не пройдетъ , послѣ того кости вмѣсто складывать. Кровь пускать почти всегда не опмѣнно надобное признается , гдѣ при переломленной кости рана случается , или гдѣ кости и мясо сильно пришибены и раздавлены бывающѣ. Ибо удѣ отъ вожженія различнымъ бѣдствамъ подверженъ бываетъ , а особливо , ежели оно въ плевѣ наkostной случится , въ такомъ случаѣ бѣдства всѣ кровопусканіемъ , а ежели нудя будетъ шрбовать ; повторительнымъ ошвращать должно.

## §. 1230.

Ежели много костныхъ обломковъ будетъ, оныя при выпягиваніи уда рукою и перспами на мѣсто свое вправлявать должно. Случай бѣдственный бываетъ, гдѣ обломокъ въ низъ опускается, и пѣмъ мозгъ костный бередишь. Въ верхъ приподнимать оной должно, пѣло прорѣзавши и опушивши кочадыкъ (508). Ежели копорые обломки вонъ шорчатъ, копорыхъ свободно на свой мѣста вправить не возможно, оныя, ежели будутъ длинны и очень оспры, пилочкою, или щипцами оспрѣзать должно, и першухомъ сгладить, и вмѣсто совокупить надобно. А чѣмъ обломки со всѣхъ сторонъ оспрѣзанные не замерли, и гной не зѣбался бы (1126), пошчасъ противъ того мѣста кожу должно разрѣзать, и все то, что не можетъ прирости, волочкомъ выпацишь. Ибо оставшеся послѣ того нѣдро мозолью заростетъ. Ежели обломокъ нѣсколко съ плевами будетъ связанъ, оный ножикомъ или ножницами оспрѣзать можно.

(\*) Ножницы нарисовалъ ГАРЕНЖОТЪ въ Т. 2 обь инструментахъ стр. 213.

## §. 1231.

Признакъ кости вправленной тотъ есть, что боль и покалываніе нечувствительны зѣлаются, и удъ съ другимъ удомъ сравнится.

## §. 1232.

Когда же удъ и завязывать надобно, то не весьма кпому требуются лѣкарства, развѣ вожженіе или другой вредъ приключится. У древнихъ въ обычаѣ было прикладывать пластырь, а особливо потъ, копорый для такихъ употребленій и сочиненъ, и называется переломокостный [кашагмашикумъ]. Однакожъ  
можно

можно разсудить, что онѣ не можѣтъ быть хорошѣ , понеже будучи приизлишне смоленѣ , испарину удерживаѣтъ , и шѣло очень мягчиѣ , а кѣ спайванію кѣшей чуѣ ли какую вѣ себѣ силу имѣѣтъ. Кѣ вѣ пластыряхѣ надежду свою положилѣ , тошѣ употребляѣтъ можѣтъ сочиненный ФЕЛИКСОМѢ ВУРЦІЕМѢ пластырь, онѣ лѣкарей дефензивумѣ вириде называемый (\*). Пластыремѣ не со всѣмѣ удѣ закрывать должно, но нѣкошорую частѣ незакрытую оставляѣтъ. Кажѣтся лучше, кѣсть переломленую обвертываѣтъ холстинкою простою нѣсколко широковатою, вѣ винѣ или вѣ спирѣтѣ винномѣ обмоченною, кошорая сѣ обоихѣ концовѣ вѣ длину разрѣзана бываѣтъ, и цѣлымѣ мѣстомѣ на переломѣ кладѣтся такѣ, чтобѣ концы и первое неразрѣзанное шряпочкино мѣсто и удѣ кругомѣ обошли и обняли.

(\*) ФЕЛИКСА ВУРЦІА. Практика дерѣ Вундѣ ардней стр. 423  
Ио. Г. Диспенсатор. Аргентораш. стр. 75.

§. 1233.

По этой холстинкѣ обвязываютѣ обвязками Первая, будучи кѣрошѣдхонкая, около перелома прижѣды обвернувшись, кѣверху на подобіе винѣа пойдеѣтъ. Другою, на противѣ первой, также надѣ переломомѣ обвертываѣтъ начинающѣ, и проходяѣтъ вѣ низѣ, пошѣмѣ опяѣтъ завернувшись назадѣ кѣ перелому, разѣ и другой обвертываютѣ около сѣго и на верхней половинѣ повывѣе первой обвязки оканчивающѣ ее. Сверхѣ того накладываютѣ лубки, подѣ кошорые подешиваютѣ продолговатыя и толстыя суконки, и все обвязываютѣ обвязкою, или что за гораздо лучше признаѣваѣтся, узѣнкими и кѣрѣпкими пѣсемочками.

Ш ш ш з

§. 1234.

## §. 1234.

А припомѣ лубками обкладывать надобно такъ , чтобѣ жилѣ кровезовращательныхъ не приписнуть . Ибо ежели это здѣлается , то удѣ распухнетѣ (728 , 729) . Сверхъ же того ни обвязками обвивать , ни лубками обвязывать гораздо пуго не надобно , ибо то , что пуго весма затянута бываетѣ , порипитѣ , и къ Антонову огню склонно дѣлается . Ежели же обвязка не крѣпко держать будетѣ , то кости опять изъ мѣста своего выходятъ . Ежели увидишь , что лубки и обвязки ослабнутѣ , надлежитѣ оныя опять подтянуть . А удѣ , особливо плечо , когда будетѣ завязывано , тотчасъ его сгибать должно такъ , чтобѣ прежде оно здѣлано было въ такомъ положеніи , дабы того послѣ подвѣшеннаго , инымъ образомъ и во время перевязыванія , згибать не надобно бы было , и чтобѣ которая нибудь мышка крѣпче и больше , нежели другія , не была приптанута (1111) .

## §. 1235.

Какъ поступать должно бываетѣ , ежели съ переломленную костью и составъ вывихнутѣ будетѣ , который случай изъ числа труднѣйшихъ случаевъ признавается , выше (1119) я объявилъ .

## §. 1236.

Удѣ завязанный держать надобно , чтобѣ чрезъ недвиженіе кости переломленной , при наростаніи мозольности , срослись . Для того , хотя кость яремная , хотя плечо или локоть или самая рука будетѣ переломлена , то руку подвѣшиваютѣ , и или ушпиральникомъ или жолобкомъ подвязываютѣ . Плечо подвѣшенное надлежитѣ легонько къ боку большимъ пал-

палцомъ, нѣсколько къ грудямъ приклонивши, завязавъ, такое плечу положеніе природнымъ почищается : Ибо чрезъ это дѣлается , что удъ ни мало не будетъ движенія имѣть. А чтобъ это еще не дѣлалось , когда человекъ, можетъ быть, похочетъ что ни будь рукою взять , въ рукѣ мянь державъ надобно. Также ногу вкладывающъ въ жолобокъ деревянный выдолбленный, всякому человеку и по мѣрѣ уда его здѣланный (\*) въ ковчезѣ ПЕТИТОВЫМЪ (\*\*) [ аркула пеннипи ] называемый , или въ холспину крѣпкую , съ обѣихъ сторонъ по палкѣ имѣющую , камышемъ или соломой а приномъ холспиною обвернушую (\*\*\*). Эти всѣ имѣнья должны опъ подошвы поддержку , которую бы нога поддерживалась , а чтобъ она ногѣ не вередила , послать на нее холспую и мягкую спельку. Подъ пяту кладется подпяшничекъ внутри впулкый и швомъ перешитый , или пессемочка мягкая въ два конца , нѣсколько плотно , только не очень свипая : Ибо надобно , чтобъ пяпа на мягкомъ чемъ ни будь лежала. Надъ переломленнымъ удомъ ставится обручъ , которымъ покрывки , чтобъ уда не отягощали , поддерживаются. Къ перевязкѣ уда переломленного , гдѣ и рана приключится , другой способъ завязыванія имѣется , о которомъ ниже я представлю.

(\*) Выдолбить надобно полѣно деревянное , такъ , чтобъ оно было сходно съ удомъ обвязками и лубками обвязаннымъ , и въ оное безъ затрудненія бы удъ вмѣстился. Такой жолобокъ почти не премѣнно надобенъ бываетъ , гдѣ съ переломомъ рана случается , и для того обвязка употребиться должна , восматцать концовъ у себя имѣющая , понеже ея не весьма переломленное укрѣпить можно.

(\*) Смотр. въ истор. К. А. Н. 1718 году стр. 396 , де Маллади десъ Осъ стр. 285 , ГАРВНЖОТЬ десъ Инструменсъ Т. 2 стр. 324.

(\*\*\*)

(\*\*\*) По Францусски. ле Фаносъ. По Нѣмецки ди страладе, смотри у БАССІА. Табл. 15 стр. 239.

## §. 1237

Завязавши и положивши такъ удѣ, кровь должно пуспитъ въ весьма отдаленномъ мѣстѣ отъ поврежденнаго мѣста, и гдѣ опасаться надлежитъ вожженія, пуспитъ надобно. Въ первые дни не приказывать болному кушать, или и позволить да съ проголодью. Когда же вожженіе поуменьшится, а молодность начнетъ ростъ, тогда пища подовольнѣе надобна бываетъ: Однакожъ молодымъ людямъ и то не очень позволяется, не такъ какъ старикамъ. Обвязки прежде четырнадцати дней не развязываютъ, развѣ нѣкопорая опасность къ вожженію окажется. Однакожъ кости различны между собою будучи, нѣкоторыя скорѣе, а другія продолжительнѣе лѣчатся, и мозолноешнію укрѣпляются. Ежели же обвязку отнять надобно будетъ, въ такомъ времени быть шуйцѣ надобно двумъ помощникамъ, которые такимъ способомъ, какъ я выше (1111, 1228) приказалъ, каждой на свою сторону не шлепнуть, и кости не такъ выдвигивать, какъ въ положеніи ихъ держаще должны

## §. 1238.

Гдѣ подозрѣніе будетъ, что кость въ длину раскололась (1124), потчасъ много крови должно пуспитъ изъ жилы кровсвозвращательной. Приказать надобно, чрезъ долгое время покойно и воздержно себя содержать, смотря по силѣ пѣлесной. Вина и всякаго крѣпкаго питья, чрезъ все время не употреблять. Нѣсколько кушать подовольнѣе опредѣлить, когда уже со всѣмъ вожженіемъ пройдетъ, и боль минуется. Лѣкарства мало пособствуютъ шуйцѣ, къ разбитію силу

силу имѣющія , ежели бы кто сверху похотѣлъ ихъ употреблять.

§. 1239.

Ежели же кость будетъ переломленная съ раною , и кровь изъ нее сильно будетъ течь , кровь тотчасъ остановить должно. Удержавши кровь , удъ вышянуть должно , и кости повправлявать. Все же что нѣсколько ошмѣнно дѣлать надлежитъ , чтобъ ранѣ чего ни будь вновь не причинить. А послѣ какъ на рану все потребное положено будетъ , то удъ сперва холстинною широкою обвернуть надлежитъ , которая бы съ обвязкою сходство имѣла , и съ обоихъ краевъ въ длину до середины была бы единожды разрѣзана. Эту суконку надобно въ ликворѣ обмочить (1232). Сверхъ этой суконки кладется обвязка къ тому изготовленная , которая осматцать концовъ у себя имѣетъ. Концы эти такъ кладутся , что съ обѣихъ сторонъ не только удъ и рану обхватываютъ , но и конецъ одинъ другой противъ лежащій , удерживаетъ. Сверхъ этой связи принаравливать должно лубки. А понеже оное связываніе , которое шутъ для очищенія и питанія раны употребляютъ пристойно , нѣсколько слабѣе бываетъ , и для того еще обвязку развязывать должно , то надобно стараться , чтобъ удъ прямо положенъ былъ. Что самое очень хорошо дѣлается , когда въ жолобокъ деревянный выдолбленный (1236) (\*) вкладываютъ. Когда обвязку развязываютъ , удъ надобно двумъ чело-вѣкамъ потягивать , и такъ держать , доколѣ его въ лубки не свяжутъ (1234 , 1237). А то особливо не ошмѣнно надобно бываетъ , когда наискось переломленные обломки ни обѣ одинъ шупой не опираются , и

Ш ш ш

опла-

опасность есть , чтобъ одна кость на другую не высунулась , ежели мышцы скорчатся. При эпомъ лѣченіи до того времени остаться , покуда рана не заживетъ , и кость мозольностью не укрѣпится.

§. 1240.

Ежели надъ переломомъ вожженіе дѣлается , и послѣ того въ гной претвореніе воспослѣдуетъ , стараться надлежитъ гною выходъ вонъ дѣлать. Ибо гной скрозь жиръ и скрозь клепчешую плесу между мышками находящуюся прорывается , и дѣлаются фистулы (944). То отвратить можно , ежели удъ положишь такъ , чтобъ гной вонъ вытекалъ. Также гной вонъ выдавливается , когда съ начала на пустое мѣсто , или на фистулу съ первоначалія омыщенную , будешь класть суконки толстыя и поспешно сложенные (24) , и обвязкою прижимаешь (18). Гдѣ уже нѣдро далеко пройдетъ , то всего лучше , впуспивши туда спичку , до самого его дна кожу разрѣзать (478 , 953) , чтобъ гной выходилъ.

§. 1241.

Кости же скипаются шѣмъ сокомъ , которымъ онѣ питаются , онѣ мозольностью дѣлается , и будучю бы спрупомъ костнымъ бываетъ. Мозольностью также щели и дыры между костями , несросшіяся , наполняются и зариспаются. Мозольность же иногда приизлишняя вырастаетъ , и не только къ здравію служишь , но бугромъ дѣлается такъ , что мѣсто распухаетъ , и удъ безобразенъ бываетъ. Это молодымъ людямъ больше случается , которые кушаютъ довольно , да еще сочнаго , и ежели слабо удъ завязанъ бываетъ. Того ради у нихъ обвязкою , сколько возможно , пошуже обвязывать должно , и прика-  
ываетъ



ывашь кушать не много давать. Гдѣ мозольность  
заспарбѣтъ, и укрѣпится, та рѣдко тонѣ дѣлается.  
А можно ли этого надѣяться, всякъ можетъ по ис-  
пынать, пластырь оксикроцеумъ, и вигеновъ съ ме-  
ркуріемъ прикладывать, и пошуде привязывать.

§. 1242.

Отъ боли (сѣ 447 до 453), отъ вожженія (сѣ 28 до  
101, 156 до 168), отъ Аншонова огня (сѣ 169 до 203),  
отъ судороги и жильноуспинивельныхъ попытокъ  
(455) тѣ средства пособствуютъ, о которыхъ индѣ  
я представилъ. Если это отъ оспрыхъ обломон-  
ныхъ концовъ и отъ колющихся спичекъ дѣлается бу-  
дѣтъ, надлежитъ тотчасъ кости собрать, и все  
примѣчаячи оное, что выше (1231) объявлено, по-  
спрягать. Въ этомъ великой страхъ вожженія и ино-  
происхожденія зависѣтъ, и для того ничто такъ  
не надобно, какъ шепчасъ кровь пускать, да и по-  
шорять (1237).

§. 1243.

Иногда удѣ не такъ болитъ, какъ свербитъ;  
а то дѣлается отъ того, когда пластыри при-  
кладываютъ бывають, или масли употребляются, тако-  
же когда накладываемыя суконки грязныя гноемъ и  
полугноемъ напоенныя случаются. Также по слу-  
чаются, когда лубки презаплине запыгиваются.  
Этому, ежели начала знать не будешь, по легко на  
глаза попасть можетъ. Во всѣхъ случаяхъ наблю-  
дать надобно чистоту. Грязь хорошохонько обпирать  
можно ликворомъ, а въ спирту съ водою смѣшаннымъ,  
или водою ранною (480).

Щ щ щ 2

§. 1244

## §. 1244.

Ежели въ удѣ завязанномъ ошкѣ здѣлается (729), или опасность Антонова огня воспослѣдуетъ (182; 1235) лубки и обвязки развязать надобно, и если хорошо вправлены будутъ, то ихъ никакъ принаровить должно.

## §. 1245.

Удѣ шонѣ натуралнаго обыкновенно бываетъ, если онѣ крѣпко связывался. Это если по излѣченіи перелома примѣчно будетъ, пристойно бани употреблять, а припомѣ удѣ гораздо и попираетъ (смотри 1116). Много пособствуетъ дѣйствованіе, и если удѣ испонченый, возможно самому, а когда самому не возможно, другому вслѣдъ понашивать. Много также пособствуетъ теплой воды капаніе (1217) и кропивное по кожѣ сѣченіе. Также съ пользою употребляются банки. Древнѣе каленымъ желѣзомъ прижигали. Опытъ здѣлать можно, удѣ въ разрѣзанное брюхо скопины живой, или теперь заколодой, положить и парить въ такомъ естественномъ пару, а шонѣ свѣжей паръ пособствовать можетъ. Это все не можетъ поутчасъ пособствовать, но только помаленьку, и успѣхъ со временемъ исполняется, для того при такихъ лѣченіяхъ чрезъ долгое время упражняться надлежитъ.

## §. 1246.

Гдѣ кости скинулись, оное мѣсто долге попираетъ надобно ливоромъ, спиртъ въ себѣ имѣющимъ. Можно также на время приложить пластырь оксигреусумъ.

## § 1247.

## §. 1247.

Это все было общее, а другое еще есть собственное. Въ ноздряхъ кости переламываются, иногда прямо въ носъ, иногда съ боку. Часто шупъ рана случается, и обломки вдавленные бердяпъ, и врьдяпъ плеву, кшпорю ноздри изъ ншря оболочаются, и въ ней великія возженія причиняють. Ошъ такого случая гной, боляжи, каракашцы (775) родятся, пришомъ же и кости портятся (1032, 1046). Эшомъ переломъ шотчасъ познать можно. Ибо ежели напротивъ переломлены будшъ, то онъ съ обшхъ споронъ опадутъ, и съ трудностью духъ въ себя будшъ шашить.

## §. 1248.

Лбчимаго чшловка противъ себя на другомъ стулѣ посадишь, чшобъ сзди прислужникъ голову могъ держашъ. Спичку или другое какое желѣзное орудіе полстенное, мяконкою карпією, обвернувъ въ ноздри всунуть, и какъ она всунется, шакже и снаружи подавливать начнешъ, шо, чшѣ бы ни ошало, приподнимется, и на мѣсто свое вправится.

## §. 1249.

Хуже то бываетъ, гдѣ или на кожѣ или на внутренней плевѣ рана случится. Эту рану лбчишь надлежитъ лбкарешвами, да шакими, кшпорыя костямъ неврешительны (523); ибо кости въ шакихъ случаяхъ обыкновенно обнажены бывають: весьма хорошо къ liquori оному или къ водѣ ранной нѣсколько капелекъ эссенціи мирре и маслихинной примѣшивать. Эшо лбкарство или эссенція вулнерарія Сталлмева (388, 592) въ ноздри кладется, а шѣ лблается спичкою

Ш Ш Ш Ш

кою

кою пряжею обвернутою , или также духомъ припяти-  
вается. А ежели кость уже повреждена будеть , при-  
бавливать можно маленько масла гвоздичнова.

#### §. 1250.

Нѣкоторые у больныхъ ноздри сшивали , или  
трубочки свинцовыя мяконкою пряжею и пластыремъ  
обвернутыя , внутрь въ ноздри вставляли , которыми  
трубочки не позволяють въ низъ костямъ опадати.  
Но такія трубочки рѣдко надобны бывають , по-  
тому же кости , ежели на мѣста свои вправятся , по  
большой части останавливаются тамъ , и не легко  
опять выпадывають : Также трубочки и ноздри хотя  
внутри пущы , однако духъ почти вовсе запирають ,  
а припомъ и плеву бередишь. Снаружи на носъ съ  
обѣихъ сторонъ кладуть сукончки , и сверхъ ихъ  
приноравливается бумага толсто склееная , такъ ,  
чтобъ она нѣсколько повысунулась. Все это при-  
крѣпляется обвязанною обвязкою (\*).

(\*) Этой обвязки также разные манеры имѣются. Кажется все-  
го лучше , обвязка наъ тесмы дѣлающаяся , которая и на срединѣ  
и съ обѣихъ концовъ въ длину разбѣзана будучи , пращу изобра-  
жаетъ. Съ средины обвязки , которая тамъ въ длину бываетъ раз-  
бѣзана , начашь надобно , чтобъ часть верхняя пришла подъ носъ ,  
сторонажъ или часть нижняя на верхнюю губу. Ибо такъ проходъ  
въ ноздри останется. Четыре конца , которые она обвязка у себя  
имѣетъ , изъ тѣхъ верхніе два конда пойдутъ къ зашѣйку , и от-  
туда по обѣимъ щекамъ и по кореню носовому пройдутъ , и одинъ  
на другомъ ложится , послѣ оба конда обвернувшись около головы  
человѣческой оканчиваются. А другіе два конда по зашѣйку и отъ  
зашѣйка на верхушку головную всходятъ , и около той обвернувшись  
съ первыми концами соединяются. Другая обвязка , которая ястре-  
бомъ МЕНЕКРАТОВЫМЪ (15 \*\*\*\*) называется , есть холстинка или  
сукончка треугольная , на которой двѣ дырочки имѣются , ноз-  
дрижъ соответствующія. Къ ней сверху пришта тесмочка ко-  
роткая , а съ боковъ другія тесмы длинныя. Верхняя по носу и по  
лобу къ макушѣ головной проводится , а другія боковыя , съ обѣихъ  
смо.

сторонѣ къ замыку , а отъ замыка по щекамъ къ корню носовому , также проходящѣ , какъ о концахъ первой обвязки объявлено ; и какъ около человѣческой головы , такъ и около верхней очей теснымъ обвивается . Теснымъ , которымъ должно узкимъ быть , такъ по щекамъ обвертывать надобно , чтобъ ими глаза не закрывались .

## §. 1251.

Нѣчто также особеннос о челюсти нижней объявить должно : Ибо и она иногда отъ сильного удара особливо отъ брыливой лошади , переламывается . По большей части кости также переломленные , одна отъ другой не отдѣляются , но шущѣ же остаются . А гдѣ кости сильно зашибены , и изъ мѣста своего вышибены бывающѣ , тогда случай гораздо бѣдственѣ случается , понеже чувствительная жила , отъ пятой пары къ челюсти нижней , и ко всѣмъ въ ней находящимся зубамъ принадлежащая , растягивается , отъ котораго случая великая боль жилѣ по всему плѣчу тяготеетъ съ звономъ въ ухахъ , слѣдуютъ . Также , какъ перервется оная жила бѣгущая , которая по челюсти разходитъ , и зубамъ пищу дастъ (1089) , кровопеченіе дѣлается , которое трудно удерживать (248 , 543) .

## §. 1252.

Если переломленные челюстные кости ни мѣстахъ своихъ будутъ , тогдашнѣ обвязкою обвязать надобно . Если же вывихнушы , оныя сперва на мѣста свой повправлять должно . Человѣка такимъ образомъ , какъ я о вывихнутой челюсти написалъ (1129) , посадить . А бкарь персты обѣихъ рукъ , или большіе , или указательные , пряпочками обвернувши , въ ротъ кладетъ . Одними изъ рта , другими съ наружи отъ подбородка доведши , обломки вправляются . Сверхъ того положить надобно холстинку

спинку въ спиртѣ винномѣ обмоченную и суконку толстую съ бумагою клееною , которая около челюсти обложена будучи , къ ней принаравливается , и обвязкою прикрѣпляется.

(\*) Обвязка , которая кокошникомъ [капиструмъ] по Французски де шевестрѣ называется , въ одинъ свитокъ свивается , и съ самой головной верхушки начавшись , къ виску правому дѣ низѣ и къ переломленной челюсти спускается , и по ней проходитъ , отсюда къ верху по лѣвому виску на самую верхушку головную поднимается , гдѣ ея первый ея конецъ и прикрѣпляется. Съ верхушки головной она назадъ къ затылку поворачивается , и отсюда къ челюсти завернувшись , и оную обхвативши , на подобіе винта , по правому виску на верхушку головную , и отсюда опять къ затылку низходитъ. Когдажъ отъ затылка къ челюсти дойдетъ , опять въ верхъ пойдетъ : назадъ завернувшись по затылку къ челюсти спереди идетъ , и попереди по бодородку дважды обвертывается , такъ что ея обхватитъ , и къ затылку опять пойдетъ. Напоследокъ , какъ опять къ низу подѣ челюсть придетъ , то челюсть , голову и шѣю до прежнему обниметъ , и съ обѣхъ сторонъ къ верху на подобіе винта , или сѣкирою , всходитъ , и обведши около головы нѣсколько разъ , на лбу конится. Къ такому обвязыванію также способна повязка , дѣ два свитка свернутая , которая срединною подѣ челюстью начинается.

#### §. 1253.

Тому , у кого челюсть бываетъ переломлена ; должно въ первые дни , ни говорить и не ѣсть , опасаяся , чѣмъ чрезъ движеніе челюсти , изъ мѣстъ своихъ не выходили обломки. И такъ чрезъ долгое время употреблять надлежитъ кушанье жидкое , какъ то напимѣръ молоко , похлѣбки , хвѣца въ смятку , жижу студенную , кисель , и при такой пицѣ и покоѣ продолжитъ время , покуда челюсть мозольностью не укрѣпится. Ежели съ переломомъ рана будетъ , кому такаяжъ обвязка надобна , какую я описалъ. Ибо эти кости , ежели однажды вправлены будутъ , то и при развязываніи обвязки , по большей части на сво-

своихъ мѣстахъ остаются. Кровопусканіе не спмѣнно надобно , ежели жила чувствительная ударомъ повреждена будетъ.

(\*) Смолр. ЛЕДРАНЪ Т. 1 Прилѣч. 8.

§. 1254.

Также косточка яремная отъ удару , съ паденія съ высока , или поперекъ , или наискось , переламывается. То узнать можно , когда плечо онсе , которое косточка яремная поддерживаетъ , на грудь наклонится , иногда человекъ не будетъ въ состояніи руки приподнять. Также оная косточки яремной переломленная часть , которая отъ груди , и недвижима бываетъ , на мѣстѣ своемъ остается , и на другую , которая отъ опростка самоплечнаго идетъ , и которая съ плечомъ опускается , высавывается. Это дѣло какъ глазами видѣшь , такъ и руками ощупать можно.

§. 1255.

Косточка яремная , ежели переломлена будетъ , не инымъ способомъ , и не съ большимъ трудомъ , вправляется , какъ вывихнутая (1157) , труднее же на мѣстѣ своемъ удерживается. Переломъ этотъ хуже бываетъ , когда косточка наискось переломлена , и раздроблена , и обломки отъ обломковъ отойдутъ , изъ нихъ ежели нѣкоторые остры сыщутся , прорѣзавши на томъ мѣстѣ кожу , вонъ вынуть ихъ должно. Ибо въ такомъ случаѣ , а особливо въ той половинѣ , которая къ груди ближе , обыкновенно опасаться надобно , чтобъ великая жила бьющаяся и жила крововозвращательная , подключевыми называемая , не были повреждены. Гдѣ кости одну съ другою справить должно , то не ту часть , которая отъ груди и недвижима ,

В Ъ В

есть ,

есть , вдавливать , но плечо приподнимать и назадъ шацишь надлежитъ.

§. 1256.

Вправивши все въ шѣ лопцевинки , которыя у жирныхъ людей сверху и снизу косточки яремной бывають , очень хорошо класть пряжу въ бѣлкѣ яишномѣ обмоча , которая пряжа высохши много пособствуетъ въ томѣ , чтобъ яремная косточка на мѣстѣ своемѣ остоялась. На косточку переломленную накладывается суконка толстая , и сверхъ ее , особливо , ежели нѣчто съ которой стороны будетъ торчать , кладутся двѣ длинныя лямки , которыя положивши на крестѣ будутъ изображать букву х. А гдѣ яремную косточку завязывать надобно будетъ , то каковъ случай будетъ , такого и завязыванія будетъ претребовать. Ибо ежели кость поперегъ переломлена и вправлена , то надобно плечо на переднюю сторону прищипывать , а локошь назадъ отводить должно. Ежели же кость наискось переломлена будетъ , плечо назадъ тянуть должно , а плечную кость нѣсколько побольше на переднюю сторону подвигать , и обвязками обвязывать , и поже самое дѣлать , что выше (1158) представлено было. Наибольшее стараніе прикладывать должно , чтобъ плечо , какъ надлежитъ , положено было. Для того руку не только утиральникомъ или лопочкомъ подвязать , но припомѣ плечную кость къ боку приведши , обвязкою привязать , и недвижимою здѣлать надлежитъ (1161).

§. 1257.

Широкая кость лопатка также отъ удару ломается и раздробляется. Ежели ость , на ней имѣющаяся



щаяся поперекъ переломлена будетъ , то обломки на своихъ мѣстахъ останутся. Если же костная тонкая часть раздроблена будетъ , то часто одинъ обломокъ на другой высавывается. Этого переломъ не много опасности въ себѣ заключаетъ. Гдѣ рана туго случится , то иногда приключается къ тому эмфизема (519, 621 \*\*\* , 644).

## §. 1258.

Обломки изъ мѣстъ своихъ выдвинувшіеся перстами подавливающи вправлять надлежитъ , ктому надобно неопмѣнно , чѣмъ , какъ возможно , плечо на переднюю и внутреннюю сторону просягивалось такъ , чѣмъ человеческой локоть прошивъ носа здѣлался. Помощникъ въ томъ положеніи держать долженъ плечо , дабы лѣкаръ чрезъ то вывихнутыя части , въ мѣстахъ свой повправлять могъ. Иногда же лѣкари принуждены бывають кожу ножкомъ разрѣзывать , и обломки вынимать. Наложивши сверху потребныя и толстыя суконки обвязкою обвязываютъ , и плечо къ боку такъ привязываютъ , чѣмъ самое плечо на переднюю сторону пригнулось , а локоть назадъ выпятился.

(\*) Если правая лопатка переломлена будетъ , то обвязкою сперва около плеча лѣвата обернувши по грудямъ до самаго плеча правого проходятъ , которое обвявши опять по грудямъ такимъ же порядкомъ подъ пазуху лѣвую приходятъ. Дважды такъ обвязываютъ , и плеча на переднюю сторону стягиваютъ. А на послѣдокъ обвязкою лѣвое самое плечо обвявши къ лопаткамъ идутъ , въ кругъ которыхъ такимъ же порядкомъ и нѣсколько послабже обвязываютъ , чѣмъ только ихъ прикрыть , и суконки наложенныя придержать. Плечо обвязкою къ боку , а руку ручникомъ на шью подвязать должно , чѣмъ удъ безъ всякаго движенія остался.

## Ъ Ъ Ъ 2

## §. 1259.

## §. 1259.

На лопаткѣ также отъ удару переламывается отъ великой и сокровенной опростокѣ, который самоплечнымъ [акроміонѣ] называютъ. Щупаньемъ то узнать можно. Ежели плечо не весьма поднимается, правда обломки легко дѣлаются, а легче того гораздо вонъ выходятъ. Обвязку наложить должно такую, какую способною къ вывихнутому плечу (1176) я призналъ. На шѣю же руку нѣсколько поплотняе да и шакъ подвязать и повѣсиль, чпобъ она ни мало не шаталась.

## §. 1260.

Ребры на срединѣ и на горбатомъ мѣстѣ такъ переламываются, чпо обломки внутрь вогнувшись, плеву подреберную передяпѣ. Иногда они со всѣмъ переломлены бываютъ, часню же не верхняя, но внутренняя ихъ сторона, нозревапа будучи, повреждается, и шероховатую дѣлается. Чпо ежели случится, великое воженіе дѣлается, послѣ котораго горячка слѣдуетъ, съ дыханемъ труднымъ, болью, загнаиваніемъ и другими бѣдствіями. Также кровь выливается, и эмфизема (519, 619, 644, 1257) дѣлается, а наибольше, ежели переломъ съ раною бываетъ (\*). Можетъ также случиться, чпо обломками повредятся жилы бѣющія и жилы кровеовращательныя межреберныя, отъ котораго случая иногда и смерть скоро слѣдуетъ.

(\*) Смотри. ЛЕ ДРАНЬ Т. 1 примѣч. 29.

## §. 1261.

Ежели же ребры переломлены и внутрь вдавлены будутъ, временемъ возможно бываетъ ихъ на мѣсто

мѣсто свое поспавитъ , ежели они въ томъ мѣстѣ , гдѣ съ хребетною костью , и въ другомъ , гдѣ съ грудиною соединяются , сильно придавлены будутъ. Приказать больному , чтобъ онъ , покуда ребры такъ съ обѣихъ сторонъ будутъ припискиваться , не дышалъ , а по въ разсужденіи боли за шрудное признавается. Иногда ребры не будучи въ прежнее состояніе приведены заставляють кожу и мышки и плеву подреберную прорѣзать , и опустивши перстъ на мѣсто свое ихъ приподнимать (650). Гдѣ завязываются , по на концы реберные накладываются многія и толстыя суконки , и обвязываются обвязкою , маншию съ подвѣскою [маншиле кумъ суспенсорію] называемою (623 , 700 , 1139). Кровепусканіе , голодъ , покой и прочія отъ вожженія наивышше пособствующія въ другихъ случаяхъ полезны , а въ шакоемъ шрудномъ случаѣ весьма надобны (626).

## §. 1262.

Рѣбра рѣдко такъ переламываются , чтобъ на внѣшнюю сторону и къ кожѣ высунулись. Это можетъ случиться , ежели грудь съ обѣихъ сторонъ сильно давится. Этомъ переломъ небыдственъ. Руками и перстами рѣбра въ томъ мѣстѣ , гдѣ переломлены , отступя на палецъ мѣсна , давить надобно , и на свой мѣсна вправлять. На то мѣсто , гдѣ рѣбра переломлены высунулись , суконка толстая , и поверхъ ея два лепеста , которыя , какъ поперегъ положишь , букву х будутъ изображать.

## §. 1263.

Ежели жила бѣющая и жила кровевозра- щельная межреберная порвана будетъ , и изъ нее кровь съ крайнею опасностью течь будетъ , на ле-  
 Ъ Ъ Ъ  
 з  
 житъ

жишѣ новую рану прорѣзать , и жилу бѣющуюся или нипкою завязать , или перстомъ , положи пряжу въ спиртѣ обмоченную , приписнущь ; все то дѣлать должно , что выше (643) предписано.

(\*) Новое орудіе мѣдѣ представлено , для припискиванія жилы бѣющей межреберной дѣланное , котораго изображеніе смотри въ фиг. 19.

#### §. 1264.

На позвонкахъ иногда оныя отростки костные , которые назавѣ торчатъ (1131) , переламываются. Отъ чего также дѣлается , что человекъ на переднюю сторону тотчасъ нагибается. Ежели они какимъ ни будь побытомъ попереломанные будутъ у позвонковъ держаться : то надлежитъ ихъ приподнять , и съ боку положить суконки толстенькія , и на нихъ обвязку наложить (1261). Ежели весь отростокъ опломленный будетъ шататься , то почти занаилучшее признавается , кожу прошивъ его разрѣзать , и его вонъ вынуть.

#### §. 1265.

Случай гораздо бѣдственнѣйшій тотъ , когда самыя позвонки разломлены , и спановая жила повреждена бываетъ. Ибо тутъ всѣ тѣ бѣдствія слѣдуютъ , о которыхъ выше (1135) я объявилъ. Къ такому случаю никакого лѣченія не обрѣщается (\*). Такой же случай бываетъ и у тѣхъ , у кого кость крестцовая поперекъ бываетъ переломлена. Наружныя части ежели будутъ переломлены , однакожъ не весьма раздроблены , отъ обвязанія и отъ содержанія себя въ покой , я думаю , могутъ срастываться. О кости копчиковой выше (сб 1151 до 1153) объявлено.

(\*)

(\*) Достопамятную исторію о мушинѣ съ позвонкомъ переломленымъ восемь лѣтъ жившемъ, видѣть можно въ запискахъ вѣднвнхъ, машур. Кур. во стѣ 1. Примѣч. 1.

§. 1266.

Ежели же нѣчто въ грудной кости переломлено бываетъ, то мѣсто обыкновенно большимъ бѣдспвіямъ подвержено. Ибо ежели ударъ на всей кости случился, то великое воженіе въ плевѣ подреберной и въ средогрудной, также гноеніе и опасность жизни слѣдуютъ (717). Также кость въ ономъ мѣстѣ очень неплотна будучи другимъ зоключеніямъ подъ тонкою кожею подвержена бываетъ, и такимъ случаямъ нещастье получаетъ. Ежели это случится, то опухоли дѣлаются, которыя въ гной претворяются, и худыя болячки съ гнилью костною оставляютъ. Ежели нѣчто отъ кости въ низъ упадеъ, оное разрѣзавши кожу приподнявъ, примѣчаячи все то, что выше (558) я приказалъ. Ежели кость разломленная, безъ дѣланія другой дыры приподняться не можетъ, оную буравомъ повертѣвъ надлежитъ, которое лѣченіе не опмѣнно надобно бываетъ, гдѣ подъ костью въ плевѣ средогрудной, которая въ этомъ мѣстѣ клетчешую плеву между двумя перспонками въ срединѣ имѣетъ, гной или иная мокрота скопится (\*). Прощее все тоже дѣлается, что я о костяхъ поврежденныхъ сказалъ (съ 1044 до 1066).

(\*) Этою болѣзнію боленъ былъ самъ АВИНЗОАРЪ, который ее пространно и описываетъ въ Кн. 2. Гл. 6. о Апостемахъ бывающихъ въ плевѣ, которая грудь длину на двое раздѣляетъ. Смотр. больше у ФРЕИНДА въ исторіи и физикѣ Т. 2 стр. 91, и въ дѣлахъ стр. 494. О просверленной грудной кости смотр. примѣч. въ коммерц. листер. 1731 года стр. 281 и 1733 года стр. 410.

§. 1267.

## §. 1267.

Нѣсколко надобно сказать о плечѣ особенно , ежели оно будетъ переломлено. Человѣка посадить на высокомъ стулѣ, и удѣ приподнявѣ нѣсколько повыше вслѣдъ двумъ человѣкамъ легонько выпягнувъ , которые взявши плечо нарочно и выпягиваютъ. Рѣдко надобно бываетъ плечо песьмами выпягивать такими , которыми верхній и нижній концы завязываются. Ежели кость поперекъ , да такъ переломлена будетъ , что одна кость на другой остановится , то надобно руку или полотенцомъ , или обвязкою , или лоточкомъ подвязанную , туго и такъ повѣсить , чтобъ нѣсколько повыше приподнялась. А гдѣ кость наискось переломится , оную обвязывать послабже надлежитъ , чтобъ удѣ побольше висѣлъ. Ежели подлѣ верхняго состава переломлена будетъ , та заставитъ думать , не вывихнулась кость , и составъ въ несчастіе можетъ попасть , чтобъ недвижимымъ не здѣлаться (1214, 1226). Въ томъ мѣстѣ не очень годится обротъ , около уда обвертываемая , для того употребить можно обвязку обѣ восмнатцати концахъ (1239).

## §. 1268.

Но , ежели рука до локтя переломлена будетъ , впервыхъ разсудить надлежитъ , одна ли кость или обѣ кости переломлены. Ибо переломленная кость , переломленной подпорою быть можетъ. А то познается такимъ способомъ , ежели за руку передъ локтемъ одною рукою возьмешь , другою же рукою кисть ручную больного человѣка въ низъ и въ верхъ ладонью повернешь. Понеже кость , которая цела , отъ припискиванія перстнаго не будетъ подаваться , и будетъ спо-

стоять крѣпко, а переломленная опѣ того же самого опіивается. Оная связка, которая между костями лежиѣ (1184), кость переломленную къ другой приводитѣ.

## §. 1269.

Сильные выпягивать надлежиѣ удѣ, ежели обѣ кости переломлены будутѣ. Ежели же лучь одинѣ переломленѣ будетѣ, удѣ полетоньку, и пакѣ вытягивается, чѣобѣ рука оборошилась къ мизинцу; а ежели по случится кости локотной, то повернуть на сторону къ пал. цв. Ёѣ удержаніи костей на мѣстѣ своемѣ все хипроспѣ и нѣсколько потуже обвязками и лубками обвязывать надлежиѣ, ежели обѣ кости да и наискось переломлены будутѣ. Ибо гдѣ одна кость цела, то больше прибыли бываетѣ опѣ нее, нежели опѣ обвязокѣ и лубковѣ. Суконки очень узенькія, толькоѣ полспыя, плотныя и во много рядовѣ сложенные, такіеѣ и лубки, съ обѣихѣ сторонѣ промѣѣ двухѣ этихѣ костей на связку шу, о которой я поминаѣ, чѣо межѣ ими лежиѣ, класѣ должно, кромѣ же сего, и на самыя кости ничего ни снизу ни сверху накладывать не надлежиѣ.

## §. 1270.

Ежели же вѣ кистѣ, вѣ ладони, вѣ перстахѣ что небудѣ случается переломленное, шупѣ къ лѣченію никакой новинки не прѣбуется. Лубки къ перстамѣ припоровитѣ должно, а оныя дѣлающа изѣ бумаги бишой и полсто склеенной.

## §. 1271

Выше я объявилѣ, чѣо у бедерной кости вѣ верху шѣйка переламывается (1192), а припомѣ и при-  
Ы Ы Ы мѣшѣ,

мѣпы, по кошорымъ то знать можемъ, представилъ и прополковалъ (1196, 1197). Ни когда кость въ шомъ мѣстѣ отъ обвязыванія сростаться, и удѣ въ первое состояніе приходилъ не можетъ. Обвязка (1210) въ первые дни накладывается. Надобно же припомъ знать, что бедра на срединѣ переломлена будучи, а особливо наискось, короче бываетъ, понеже она полстыми и крѣпкими мышками припаявается. Если на бедрѣ съ переломленною костью и рана на тѣлѣ случится, такой случай иногда великимъ бѣдствіямъ подверженъ бываетъ. Ибо кости, ни по надлежащему пользоваться, ни легко вмѣсто совокупить, ни крѣпко удержать не можно. Все дѣлать должно съ великою хитростію и употребляючи великое прилежаніе, да и лубками крѣпчайшими обвязывать.

§. 1272.

Въ чашкѣ колѣнной нѣчто также примѣчаніе требующее имѣется. Какими мышками и связками она держится, въ другомъ мѣстѣ (1203) сказано. Она поверхъ бедра и бедра плаваючи, ни на одной кости не опираючись, когда составъ изгибается, къверху приподнимается, а когда протягивается, въ низъ пускается. По большой часи поперекъ разламывается, а то случается, когда человекъ согнувши составъ упадетъ, и о камень или обочину иное жесткое чашку зашибетъ (\*). Тогдашнѣ обломокъ верхній, скорченными полстыми и крѣпкими мышками вверхъ уходитъ, и отъ нижняго далеко отодвигается. Это приключеніе трудное лѣченіе въ себѣ заключаетъ, понеже оный верхній обломокъ не безъ труда припаянушь, и съ другимъ нижнимъ, на мѣ-

стѣ



спѣбъ своимъ находящимся совокупить, а больше труд-  
ные удержатъ можно. Бѣдшѣе бываеѣ тогда , когда чашка съ нижней стороны переламывается , или порвавши оную связку (1203) , разпятиваеѣся (\*\*). Тогоже слово въ слово опасатся надобно отъ обломковъ многихъ въ чашкѣ колѣнной , чѣобы колѣно не сволокло , и недвижимо не зѣблалось ; ежели обломковъ гдѣ много случится , нарастаетъ на чашку прилипливая мозольность , отъ которой на послѣдокъ колѣно не будетъ згибаться. Когда же такая небольшая косточка въ длину разламывается , и раскалывается , оное очень терпѣть можно.

(\*) руишѣево Примѣч. Анаст. Хирург. 3. Онѣ чашку колѣнную отъ одного сильнаго выпягиванія мышекъ во время згибанія составнаго разломленную видѣбл. О разломленной чашкѣ смотри у ПАРЕА о переломахъ кн. 14 въ гл. 22 и у ГИЛДАНА въ сошн. 5. прим. 88; у ПУРМАНА въ Хирург. ч. 3 Гл. 21 стр. 858.

(\*\*) Смотри въ Трансакц. Аглнн. Но 365 стр. 44 и въ ше абридементѣ. Вол. 7 стр. 678.

### §. 1273.

А что чашка поперекъ разломлена , познать можно пошому , когда мѣсто между разломками раздвинувшимися , порожнее зѣблается , тоже самое и глазами видѣть и руками ощупать можно. Какъ же бы чашку опять на мѣсто свое попрежнему вправить , и обломки одинъ съ другимъ совокупить , то надобно ногу на скамью положить , и какъ возможно выпянушь , а припомѣ одному прислужнику руками бедру вправлявать , а другому слугѣ берцо вблизи сводить. Человѣку подоншею ногою въ спѣну упереться должно. Между пѣмъ лѣкаръ обломковъ верхней руками и перстами по легонку въ низъ опшпигиваетъ , перебирая припомѣ мышки пѣ , къ которымъ онѣ

Ы Ы Ы 2

онѣ прицѣпляется (1203), покуда опломокѣ эштоѣ съ нижнимѣ не совокупится.

§. 1274.

А чѣтобѣ чашка колѣбная такѣ справленная могла вмѣсто сойшисѣ, онѣ многихѣ и многіе способы и вещи выдуманы (\*). Лучшее же всего, употребивѣ обвязку, чашку обвязать, чѣтобѣ она срослась (\*\*).

(\*) пурманнѣ колесо или кольцо, изѣ проволоки желѣзной и изѣ корпѣи здѣлавши употреблялъ см. на пом. мѣст. МАЗІЕРО въ Оперѣ Хирургико Рационально 5. стр. 198 употреблялъ два ремня крѣпкіе, которыми удѣ сверху и снизу обнимался придаетѣ тамѣ и фигуру; которые ремни напоследокѣ другіе перемѣнили. ГАРЕНЖОТѣ десѣ Инструманѣ. Т. 2 стр. 300 машину представилѣ желѣзную. Но предѣ всѣми этими предпочтѣся можетѣ преждепомянутый способѣ обвязыванія.

(\*\*) Подѣ колѣбно кладетѣся холстина, въ которую съ обѣихѣ сторонѣ по палочкѣ нѣсколько толстой, солемою и холстиною оберченыхѣ (1236). Лубокѣ толстымѣ компрессомѣ покрытый подѣ самое колѣбно подкладываетѣся, а между онымѣ компрессомѣ и холстина кладетѣся, которою жилы бѣющія и жилы кровевозращательныя, подѣ колѣбкомѣ въ низѣ проходящія, сберегаются. Между удомѣ и палочками съ боковѣ положитѣ должно толсто свернутыя суконки, или, что за лучшее признается, многія, да маленькія и полныя, подушечки, на чашку накладываетѣся тряпочка, четырехугольная, со всѣхѣ сторонѣ, и въ длину, на подобіе пращы, разрѣзанная; ибо на срединѣ также тряпочка разрѣзана быть должна, чѣтобѣ, хотя и по обвязаніи уда, чашку видѣть было можно. На самую верхушку колѣбной чашки поперегѣ кладетѣся суконка очень плотная и во много рядовѣ сложенная, уская и нѣсколько плотно сверченная. Сверхѣ этой суконки кладутѣ обвязку, въ палецѣ широкую, и крѣпкую серединою, которою и она толстая суконка, и шѣ двѣ палочки съ холстиною обвязываютѣся. Обвязки оной концы, когда изѣ подѣ колѣбна на ту толстую суконку опять возвратятся, правый конецѣ лѣвою, а лѣвый правую проводятѣся съ обѣихѣ сторонѣ подѣ колѣбно, да такѣ чѣтобѣ она толстая суконка и съ нею чашкинѣ обломокѣ верхній въ низѣ клонился, а нижній въ верхѣ приподнимался. Подѣ колѣбкомѣ опять одинѣ конецѣ чрезѣ другой переходитѣ, и между шѣмѣ пониже чашки колѣбной другая суконка, также толстая кладетѣся, и обнимается такимѣ же образомѣ обвязкою изѣ подѣ колѣбна

лѣпка идущую. Обвязка прижды такимъ способомъ подѣ колѣно и по тѣмъ двумъ суконкамъ обводится и укрѣпляется. Наконецъ на верхъ оной на срединѣ разрѣзанной холстинки, и чашки колѣнной, накладывается другая вдвое сложенная холстинка, которою кость обнаженная прикрывается. Оной же первой холстинки четыре конца, и ими также она верхняя толстая суконка, да и сама чашка колѣнная сводятся въ мѣсто, которые концы, прикрѣпляются остаткомъ остальныхъ обвязочнымъ, понеже оной одинъ конецъ съ средины чашки колѣнной къ верху другой къ низу, наподобіе раковины обвивается, и такъ кончится.

§. 1275.

Въ голени также случается, что одна кость переламывается, а другая цѣла бываетъ. Гдѣ берцо переломлено бываетъ, оное оцупать можно, а гдѣ дудка, то такъ узнавается, ежели ее перстами продавишь, то нога на внутреннюю и внѣшнюю сторону вертится (1268). Дудка ежели будетъ переломлена, хопя и хорошо исправлена будучи, труднее на мѣстѣ своемъ удерживается, для того больше объ ней старанія имѣть надлежитъ. Ибо этоудѣ неровенъ, то обвязки при обвязаніи перевертывать должно (16), или впавшее мѣсто напалнивать можно толстыми и постепенно накладываемыми суконками. Въ ступнѣ и перстахъ ничего больше дѣлать не надлежитъ, только тождѣ самое, что дѣлается на рукѣ.

•••••

## КРОВЕПУСКАНИЕ ИЗЪ ЖИЛЪ КРОВЕВОЗВРАЩАТЕЛЬНЫХЪ.

САНГВИНИСЪ ДЕТРАКЦІО ПЕРЪ ВЕНАСЪ.

§. 1276.

Прорѣзываючи жилу кровезовращательную кровь пускать, кажется дѣло весьма легкое, однакожъ ко-

Ы Ы Ы 3

гда

## 782 КРОВЕПУСК. ИЗЪ ЖИЛЪ КРОВЕВОЗВРАЩАТЕЛ.

гда жилы кровезовращательныя невидны, и не безъ трудности ихъ найти можно, иногда бываетъ трудно и не безъ великой опасности. Ибо съ жилами кровезовращательными жилы быющіяся, жилы чувствительныя, жилы сухія, и пропѣженія мышечныя, совокуплены, копорыхъ часпей ежели хоть одной ланцетомъ коснется человекъ, многоразличныя бѣдствія отъ того слѣдуютъ, пѣлу человекскому (428, 448, 449, 426). Также опасаться надобно, чтобъ ланцетомъ наскрозъ жилы кровезовращательной не проколотъ такъ, чтобъ изъ ранки нижней кровь не потекла, и *exhūmoris* не зѣбалась (712). Лѣкарю, кровепусканіемъ лѣчащему, надлежитъ по большою части такому быть, какого ЦЕЛСЪ (\*) описываетъ.

(\*) Кн. 7 въ предисл. смотр. 2 (\*).

### §. 1277.

Въ нынѣшнее время употребляють на то ножичекъ обоюдный, ланцетомъ называемый. Этотъ инструментъ почти всѣхъ полезнѣйшій, понеже его недрожливою рукою прямо опустить можно, и такъ дѣйствовать, чтобъ жилу кровезовращательную не только проколотъ, но и не множо приклонивши руку, разрѣзать. Особливо этотъ инструментъ полезенъ, что имъ можно жилу кровезовращательную безъ опасности гораздо разрѣзывать, а то не оптѣнно надобно бываетъ, когда кровь густую и сильно движущуюся у человека выпустить надобно.

### §. 1278.

Другой инструментъ не такъ способенъ, который у древнихъ въ употребленіи былъ. По Нѣмецки (эіне фліэте) по Русски желѣзко или топорокъ называемый. Палочка нѣсколко продолговатая на кончикѣ спря-

## КРОВЕПУСК. ИЗЪ ЖИЛЪ КРОВЕВОЗВРАЩАТЕЛ. 783

спрятанная и завоспренная. Оную двумя перстами беруть, острей на жилу кровезовращательную наспавливаютъ, и перстомъ другою рукою въ нее такъ вдавливаютъ, что за одинъ разъ и кожа и жила кровезовращательная отворяется.

### §. 1279.

Нѣкоторые же къ этому орудію придѣляли пружину, а сверхъ того къ нему же придѣляли и маленькое желѣзцо, ось имѣющее, которою повернувши, слово въ слово какъ бы въ винтъ, оно желѣзцо приподнимается и опускается. Желѣзцо же на одномъ концѣ закорюченъ, а на другомъ прорѣзано, по которому разрѣзу острей ниспускается. Желѣзо прорѣзаннымъ концомъ ставится на жилу кровезовращательную, и тѣмъ препятствіе дѣлается, чтобъ острей съ боку пружиною спущенное глубоко въ жилу кровезовращательную не прошло, и наскрозъ не пробило. Этимъ инструментомъ не гораздо больно бываетъ кровь пускать на ногѣ. Фиг. 20. Этимъ инструментомъ употреблять долженъ шотъ лѣкаръ, кто къ нему привыкнетъ.

### §. 1280.

Ежели жила кровезовращательная невидна, перстъ сперва на то мѣсто положить и испытывать, не близко ли лежитъ бѣгущая жила. А по всякому извѣстно, что она сердцемъ приподнимается. А чтобъ жила кровезовращательная, изъ которой кровь пускать надобно, надулась, и оказалась, надлежитъ ее выше мѣста того, въ которомъ прокалываютъ, завязать, и перстомъ приписать. На ногѣ завязываніе это излившимъ почти признается, имъ не такъ

## 784 КРОВЕПУСК. ИЗЪ ЖИЛЪ КРОВЕВОЗВРАЩАТЕЛ.

такъ жилы кровезовращательныя , какъ берцо , сопѣлка , и великая оная сухая жила Ахиллесова , да-  
ваясь. Ежели то надобно будеть , то на жилу  
кровезовращательную положить толстую суконку ,  
и обвязкою прикрѣпить можно. Всего лучше ногу  
въ воду теплую поставить. Также гдѣ на рукѣ жилы  
кровезовращательныя не хорошо видны , губу въ  
теплую воду обмоча на то мѣсто , гдѣ кровь пускашь ,  
кладушь.

### §. 1281.

Жилы кровезовращательныя въ длину прорѣзы-  
ваются , а поперегъ не такъ хорошо ихъ прорѣзывать ,  
понеже такъ прорѣзанныя не очень скоро заимаются.  
Однакожь жилы кровезовращательныя маленькія наис-  
косъ прорѣзывать иногда принуждены бываемъ , чтобъ  
кровь густая выпечь могла. Для того также лучше  
жилу кровезовращательную пониже прежняго прорѣ-  
зыванія прокалывать надобно. И такъ кому кровь въ  
первой разъ пускать надобно , у того жилу кровезо-  
вращательную , какъ напримѣръ посредственную  
(медіана) называемую , въ верху и къ сердцу ближе  
прорѣзывать должно. Жила кровезовращательная ,  
изъ которой кровь пущена будетъ , перстомъ пони-  
же прорѣза приписывается , на раночку кладется  
тряпочка чепыреугольная въ нѣсколько разъ сложен-  
ная , и обвязкою обвязывается. Тряпочку оную обы-  
кновенно обмакиваютъ въ разные ликворы , но мнѣ  
кажется въѣхъ лучше холодная вода.

### §. 1282.

Кровепусканіе требуется наибольшее въ прехъ  
случаяхъ. Ежели онъ ся множество худова будеть ,  
то ся убавишь. Иногда же шаковымъ убавленіемъ кро-

крови теченіе отъворачивается, и въ другое мѣсто выдвигается. Ибо чрезъ примѣчанія узнано, что изъ дальнихъ мѣстъ кровь къ тому мѣсту, изъ котораго ее пустили, нѣсколько будто бы тянется.

(\*) Кровь пускается для усиленія или исправленія [вакуціонемъ] для отведенія въ сторону [дериваціонемъ], и въ дальнее мѣсто отплативанія [ревульсіонемъ]. О первомъ нѣчто сумѣнія не имѣемъ. А что въ сторону отведеніе и въ дальнее мѣсто отплативаніе жизненнымъ кроводвиженіемъ и окружнымъ общеніемъ дѣлалось, тому многіе противорѣчатъ. Но жила крововозвращательная та, изъ которой кровь пускается и вытекаетъ, тогда не такъ противна бываетъ втекающей въ нее крови изъ жилъ бьющихся, какъ тогда, когда изъ нее не пущено, и она кровью наполнена. Ибо самая въ жилѣ крововозвращательной содержимая истощенная кровь другой намѣстной крови препятствіе дѣлаетъ. И такъ, понеже большая способность въ прорѣзанной жилѣ крововозвращательной кровь въ себя впускать, не больше ея и вытекаетъ въ ту, нежели въ другія непрорѣзанныя. Это то есть въ сторону отведеніе. Когда же больше крови въ жилу крововозвращательную прорѣзанную, а сперва въ жилы бьющіяся течетъ, изъ которыхъ жилы крововозвращательныя тѣ, которыя въ жилѣ крововозвращательной прорѣзанной надлежатъ, производятъ, оное убавляется въ кровь въ другія жилы крововозвращательныя текущую; который случай дѣлаетъ въ дальнее мѣсто отплативаніе. Много также пособствуетъ оная жизненная сила волокъ, которую и какъ жилы бьющіяся, такъ жилы крововозвращательныя, сверхъ того мышки и другія части, по которымъ онѣ раздѣляются, имѣютъ. Ибо какимъ образомъ всякая живая тѣлесная часть, болѣю, будто бы отъ приложенныхъ вещей какихъ острыхъ, мучимая обыкновенно распадается, и возжигается; что случается отъ того, что великое сжатіе крови въ жилы бьющіяся, въ сжатой части имѣющіяся, скапливается; такъ, ежели крови преизлишнее множество или погубительное движеніе въ горячкѣ или лихорадкѣ и въ другихъ случаяхъ видимое чрезъ прорѣзаніе жилы крововозвращательной. Отворяется она въ ту самую часть, изъ которой выпущена будетъ, кажется какъ взята бываетъ. Понеже оное движеніе, чрезъ которое много крови въ одной жилѣ бьющейся и въ другой течетъ, отъ одного сердца производимъ не можетъ (31). Смотри въ ГОРТЕРОВЫХЪ Компенд. Тр. 46 §. 8 стр. 235. Чрезъ весь вѣкъ превеликое несчастье отъ прорѣзанія жилъ крововозвращательныхъ въ болѣзняхъ особливо къ леченію колотыхъ въ груди [плевритидисъ] было, о которомъ смотри РЕНАТУМЪ МОРЕАВЪ о кровопусканіи во время колотыхъ въ грудь; еще, когда ПЕТРА БРИССОТА апологію и житіе на свѣтъ издалъ,

## 786 КРОВЕПУСК. ИЗЪ ЖИЛЪ КРОВЕВОЗВРАЩАТЕЛ.

то всѣхъ медиковъ мнѣнїя объ этомъ дѣлѣ изслѣдывая, издалъ коротенькую, но ученымъ преисполненную Медицинскую или врачебственную историю. Этотъ раздоръ во время ВЕЗАЛІЕВО съ какою упорностію производился, можемъ мы видѣть изъ писемъ СИМОНА ПІЕТРЕА къ ГВЕРИНУ въ житїи БРИССОТОВОМЪ въ помин. мѣс. стр. 115. ВЕЗАЛІЙ писалъ письмо къ НИКОЛАЮ, ФЛОРЕНАТУ Императора Карла пятаго Медіку окровепусканїи изъ жилы подпазушной на правой рукѣ, когда бока болѣли, въ Монтиссератѣ 1544 году изданный. Книжечку для шого я упоминаю, что врезанные люди БЕРГАВЪ и АЛОНИЪ, издавшіе ВЕЗАЛІЕВЫ дѣла, объ ней не упомянули. ВЕЗАЛІЙ объ ней упоминаетъ въ эпистолаѣ о кор мѣ хинѣ, въ дѣлахъ Т. 2, стр. 672. Нѣчто также имѣетъ ДУГЛАСЪ въ библиогр. Анапом. стр. 72. Присовокуни шутъ и шю, что въ преразумномъ разсужденїи о колошѣ въ груди написалъ весьма знатный мужъ и мнѣ крайній прїятель ТРИЛАЕРЪ въ главѣ 2 § 30 стр. 28. Между новѣйшими писателями объ этомъ дѣлѣ я нахожу ГЕККВЕТА, СИЛЬВУ, МЕВРИСЕА, ШЕВАЛЬЕРА, МОРИССОНА, КВЕСНАЯ, МАРТИНА всѣхъ Франгузовъ, и БУТАЕРА Англичанина.

### §. 1283.

Того ради, ежели кровь надобно пускать для опнятія всестѣльной причины, оную хорошо пускать изъ рукъ. Ежели же теченіе кровное отвратить похочется, надобно ее весьма въ отдаленномъ мѣстѣ ошъ большаго мѣста пускать. Однакожъ это незаконная причина. Ибо временемъ въ случаяхъ незаныхъ, и ежели опасность великая въ вредности будетъ, какъ то напримѣръ, ежели голова будетъ проломлена, или хотя и въ самомъ колошѣ, лучше сперва ближнее самое мѣсто испустить, а послѣ въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ кровь пускать. Ежели же бы кровь пускать случилось близъ мѣста уязвленнаго, то ее столько пускать должно, сколько силы у человека будетъ.

### §. 1284.

Также ежели кровь въ какомъ ни будь мѣстѣ бѣдственно будетъ течь, у человека полнотѣльнаго



наго , то въ другомъ мѣстѣ пустить должно , чтобъ послѣ отворенія другой дороги переспала шечь по той , по которой теченія не хотимъ. Въ этомъ дѣлѣ благоразуміе лѣчащаго пребудетъ , чтобъ больной , котораго онъ похочетъ облегчить , поперявши всю силу , не умеръ.

§. 1285.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ вредительно бываетъ неумѣренное , а гораздо чаще весьма малое кровн выпущеніе. Не рѣдко лучше бываетъ , гдѣ такое лѣченіе пребудетъ , оно на два дни распредѣлить , нежели приизлишнимъ кровепусканіемъ челоѣка безвременно испушить и безсильнымъ здѣлать.

§. 1286.

Рѣдко кровь пускается изъ жилъ кровезвращательныхъ по лбу , по вискамъ и по углу главному тому , который къ носу стойтъ , лежащихъ. Со лба кровь пускаютъ нѣкоторые велятъ безумнымъ , или съ ума сходящимъ. А изъ той , которая въ кушкѣ внутреннемъ межъ носомъ и глазомъ лежитъ , пускаютъ , у кого чрезъ долгое время глаза гноятся будучи. Въ нѣкоторомъ мѣстѣ (299 , 312) я представилъ , что изъ жилъ кровезвращательныхъ , по плесѣ глазной вышедшей идущихъ , кровь пускаютъ бываетъ надобно (\*).

(\*) Когда на лбу кровь пускается , то ранку закрываютъ обвязкою ладью [скафа] называемою. Въ кушкѣ главному та обвязка способна , которая и при другихъ глазахъ болѣзняхъ и при фистулѣ слезной употребляется , и называется одноглазникомъ [монокьюль]. О вискахъ скоро обглаголю , какъ буду говорить , какимъ способомъ обвязывая жилу бывшую заживать надобно.

§. 1287.

Хотя же жилы кровезвращательныя подъ языкомъ находящіяся и отворяются , когда горпанъ воз-

Б Б Б 2

жита-

## 783 КРОВПУСКЪ ИЗЪ ЖИЛЪ КРОВЕВОЗВРАЩАТЕЛ.

жигается, и распухаетъ, и духъ запирается во время нѣкоторыхъ жабъ. Однакожъ мало тутъ помочь бываетъ, когда небольшую ранку на жилахъ крововозвращательныхъ прорѣзываютъ. Ежели же гораздо разрѣжется, или пополамъ перерѣжется, то отъ кровенеченія родиться можетъ обда. Ибо крови не легко удержанъ можно. И дѣйствительнѣйшаго нѣтъ лѣкарства, только что уксусъ, спиртъ или другой какой ликворъ, къ остановленію крови способный (что, 411), въ ротъ держать.

§. 1288.

Дѣйствительное самое лѣкарство отъ многихъ болѣзней, кровопусканіе изъ жилъ крововозвращательныхъ шійныхъ или яремныхъ. А чтобы онѣ оказались, нижняя часть шѣи обвязкою обвязывается. Жила въ длину прорѣзывается, безъ затрудненія кровь, наложъ тряпочку, чрезъ обвязаніе обвязкою удерживается. Начальнѣйшая потребность въ этомъ лѣкарствѣ обыкновенно бываетъ тогда, когда время неожиданная гибель случается, какъ то во время пролома головного, во время огнечинаго бреженія [и въ френтии], во время вожженія великаго на глазахъ (305, 312), также и во время жабы (1187). Завсегдажъ, пустивши кровь изъ жилы яремной, пустить и изъ ноги подлѣ лодышки должно (\*).

(\*) Смотр. преучен.го мужа ТРАЛЛЕСЪ коммент. О жилѣ яремной.

§. 1289.

Ежели изъ руки пускать, то чаще пускается изъ посредственницы [медіана]. Подъ нею лежитъ протяженіе мышечное мышцы двуголовной, до котораго ежели ланцею коснешся, вожженіе послѣ того дѣлается. Съ владѣтельною [базилика], которую на правой рукѣ печеношною [гепатика], на лѣвой селезеношною

## КРОВПУСК. ИЗЪ ЖИЛЪ КРОВЕВОЗВРАЩАТЕЛ. 789

ношною [спленика] называютъ , совокуплена жила бьющаяся и жила чувствительная . Головная шонка , из обыкновенно во большой части невидна бывашъ .

§. 1290.

Въ пѣлахъ полныхъ и дряблыхъ на рукахъ жилы крововозвращательныя иногда не видны бываютъ , для того другую на кисти ручной отворять должно . Та , которая изъ жилы крововозвращательной владѣтельской произошла , къ мизинцу принадлежишь , называется здоровка [салвателля] , другая , отъ головной начинающаяся , къ пясти доходитъ , и тушь межъ пястью и большимъ пальцомъ внизъ опускается . Всѣ эти жилы крововозвращательныя зачастую одна съ другою чрезъ посредство иныхъ совокупляются . Тонки бываютъ , и чемъ больше разсыпаны окажутся , надлежишь руку въ воду теплую опустить .

§. 1291.

Часто же подлѣ лодыжекъ кровь пускають на ногѣ , и не такъ съ великою опасностью пускается кровь изъ жилы крововозвращательной шой , которая изъ голенной проишедши идетъ къ внутренней лодыжкѣ , и называется берцо-плюсная [сафена] . Если же нужда будетъ требовать , другія лучше видны жилы отворить стараться надлежитъ , чтобъ жилы сухой не повредить . Больному велѣть покойно себя содержать , чтобъ или кровь опять не проскочила , и чтобъ къ раночкѣ вожженіе не прикинулось (\*), а то часто случается .

(\*) Это и отъ другихъ случаевъ бываетъ , какъ то избытокъ . Если конецъ у ландета тушь будетъ , или вода она будетъ нечиста , въ которую ногу ставить , или въ губкѣ , которою ногу обтирають , песокъ и другія нечистоты будутъ .

1292

В Ъ В 3

§ 1292.

## 790 КРОВЕПУСК. ИЗЪ ЖИЛЪ КРОВЕВОЗВРАЩАТЕЛЪ

§. 1292.

Оная великая жила кровезовращательная въ удѣлѣ породномъ мужескомъ находящаяся, и по верхней его половинѣ проходящая, иногда опворяться можетъ, когда въ немъ вожженіе великое здѣлается, и онъ будещъ споять. Однакожъ великое стараніе имѣть должно, чпобъ жилы чувствительной и жилы бѣющей не повредишь. Жила кровезовращательная въ то время, когда удѣл опадетъ, сжимается, и приписывается шряпчюю и обвязкою ей подобною, которую обвязку соединительною [уніаншемъ] называють, о которой выше сказано (515, 1205).

§. 1293.

Какъ то лѣчить, когда ланцетомъ жила бѣющая прорѣзана (446), или чувствительная и жила сухая повреждена (448, 449), или изъ жилы кровезовращательной синевое подкожное [Эхимосисъ] здѣлается, въ другомъ мѣстѣ сказано (446, 454, 723, 724).

§. 1294.

Пускають также кровь и изъ жилъ бѣющихъ, особливо изъ тѣхъ, которыя по вискамъ идуць. А понеже жилы бѣющія не безъ трудности сростаются, то должно такую жилу бѣющую прорѣзывать, которая на кости лежитъ, и которую попому крѣпче и приписнуть можно (\*). Такое кровепусканіе особливо полезно бываетъ тогда, когда великая черная немочь [апоплексія] случается у человека, или великое въ глазахъ бываетъ вожженіе, и онъ великой липкости опасаться надобно чиршкювъ на плевъ роговой. Еще оно у людей тучныхъ иногда онѣ амаврози [т. е. онѣ пуска глаза]

вного] пособствуемъ , и бывали такіе люди , которые будучи незапно ослабли чрезъ такой способъ сибѣмъ получали.

(\*) МАРТИНЪ , Докторъ Монпельеиской , велитъ также вбодѣвающимъ груднымъ болящимъ на рукѣ изъ жилы обьющейся на кости лучевой лежащей кровь пускать. Третье де ла флеботоміи Арпертономи , стр. 481.

§. 1295.

Человѣка посадишь на стулѣ надобно такъ , чтобъ голову онѣ на одинѣ бокѣ наклонилъ. Левитъ намѣряющійся , персты наложя , долженъ жилы приподнимающеюся искать , какъ не очень великой , такъ и не очень тонкой. Мѣсто заприимѣишь можешь чернилами. Кровь пускается изъ жилы обьющейся или ланцетомъ или лучше шнеперомъ. Жила бьющаяся поперегъ не прорѣзывается , но пересѣкается. Изъ нее много крови пускать должно.

§. 1296.

А кровь съ стремленіемъ текущую (353) , какъ ее довольно выпустишься , надлежитъ удержать. На раночку кладется бумажка жованая , въ спиртѣ обмоченная и выжатая , на ту накладывающіяся придавочки тряпошныя маленькія толстыя и постепенныя одна другой больше. На нижнюю тряпошную придавочку кладется какая нибудь монетка , бобинка , или иное что нибудь жесткое (24). Обвязка къ тому недругая какая способна , только та , которую узловасною [нодоза] называютъ (\*).

(\*) Эта , какъ рую другимъ также именемъ солнечною [соларемъ] называютъ , которую МЕНКРИНЪ въ примѣчаніи 38 стр. 165 на рисункѣ представилъ. Узда крѣпче , но тѣснее , въ палецъ шириною , съ обоимъ концомъ склѣпанъ , среднюю надъ раню наложенъ , около головы обвѣшивается. Когда же оба конца опять на рану и на наложенныя на нее суконки придуть , одно чрезъ другой переходятъ , и вер-

## 797 КРОВЕПУСК. ИЗЪ ЖИЛЪ КРОВВОЗВРАЩАТЕЛ!

и верхней, идетъ по шѣвно, другой въ низъ по челюсти нижней до другого виска на другой сторонѣ проходитъ, и шамъ эти концы опять нѣсколько, и то излегка, прикрѣпляются. Отъ виска въ того оба концы, опять на мѣсто раненое приходитъ, и надъ сѣымъ одинъ съ другимъ связавшись, и нѣсколько поуже сплунувшись узломъ завязываются. Опять эти концы концы голову человеческую кругомъ обвиваютъ; и какъ къ ранѣ придутъ, опять другой узелъ повыше первого завязываютъ. Такимъ же способомъ третій узелъ завязывается, такъ, чтобы узелъ надъ узломъ лежалъ. Ибо ими обвязка скрѣпляется, и суконки и другія вещи на рану, приложенныя, крѣпко приписываются.

### §. 1297.

Кровь еще пускается, когда кожу ланцетомъ прорѣзываютъ, и на нее баночку прикладываютъ такъ, что какъ она присосется, кровь пойдетъ. Кожу прорѣзываютъ или ножечкомъ на то здѣланнымъ (\*) [шнeperомъ] или машиною, у которой многіе попорки съ боку выскакиваютъ (\*\*). Сверхъ прорѣзанной и насѣченной кожи рожокъ баночка [кукурбитула] направляется; а чтобы она прямо влившись укрѣпилась, сперва кладутъ въ нее тряпочку зажженую. После того баночка прочь отнимается, и гдѣ кровь еще течетъ не переспала, губку въ холодной водѣ помоча обтираютъ насѣчки, и вновь баночку приставляютъ. Многія, и къ различнымъ частямъ, и не только къ насѣченной кожѣ, но и къ цѣлой, приставляются и присасываются баночки, ежели стремленіе матеріи отъ благородной части отврапнть задолжное признается.

(\*) Смотри фигуру въ ГЕЙСТЕРОВОЙ Хирургіи Таб. 12. фиг. 2

(\*\*) На поманут. мѣст. фиг. 4.

### §. 1298.

Это лѣченіе весьма старинное, и оно часто въ болѣзняхъ долговременныхъ, а наипаче въ глазныхъ,  
ГОЛОВ-

головныхъ , ушныхъ , много пособствуетъ. Къ нему также прибѣгать должно , гдѣ у людей полныхъ и дряблыхъ жилъ кровевозвращательныхъ никакихъ не видно , и безъ бѣдства прорѣзываны быть не могутъ. Также это кровепусканіе лѣкарствомъ почитается отъ великой боли въ бокахъ , особливо ежели при ней никакой горячки не будетъ (\*). Чрезъ опытъ узнали , что банки , наскѣвши сперва кожу , на запылкѣ весьма хорошо спавишь , ежели въ головѣ острая и смертоносная боль будетъ , какъ то болѣзнь всеголовная застарѣлая [цефалеа] , черная немочь [апоплексія] , жилъ чувствительныхъ разрѣшеніе или параличъ , [нерворумъ резолюціо] , высухлость [маркоръ] и несносная спать охота , особливо , ежели эти пороки отъ крови , а не отъ другой мокроты , происходятъ (\*\*).

(\*) Смотри. Диссерт. о жилъ кровевозвращательной безпартной. (син. пари) въ МОРГАГНОВЫХЪ Прот. 5 стр. 83.

(\*\*) Смотри. Славнаго АВГУСТИНА ФРИДЕРИКА ВАЛТЕРА Диссерт. о наскѣнаніи запылка , въ Липсѣ 1741 году.

§. 1299.

Понеже кроветеченіе , изъ носу случающееся , часто другимъ болѣзнямъ облегченіе дѣлаетъ , то многіе , различныя махины употребляли , чтобъ ее изъ ноздрей могли пускать.

Смотри. у АРЕТЕА , о лѣченіи застарѣлой болѣзни всеголовной , въ Книг. 2 Гл. 2 стр. 128 о лѣченіи болѣзней Хроническихъ или застарѣлыхъ. у АЛПИНА на показ. мѣст. Книг. 3 стр. 168 , Диссерт. моя о надрѣзываніи глазъ.

§. 1300

Древніе еще особливимъ способомъ , просѣкиши кожу , помногу крови обыкновенно выпускали , особливо на ногахъ изъ мышцековъ. Этимъ способомъ ,

б б б

развѣ

## 794 КРОВЕПУСК. ИЗЪ ЖИЛЪ КРОВЕВОЗВРАЩАТЕЛ.

развѣ онѣ многимѣ суровымѣ только покажется, многихъ болѣзней вовсе избавляюща, и онѣ многихъ облегченіе получающа, а особливо, гдѣ не безъ опасности покажется, кровь изъ жилы кровезовращательной пускаетъ.

Смотри у ГАЛЕНА о Пияцахъ Гл. 14 Т. х. издан. Харш. стр. 455, у АНТИЛЛА и АПОЛЛОНИА въ ОРИВАЗИИ Кн. 7 Гл. 19 и 21, въ Коллект. Г. СТЕФАНА стр. 315 и 317. Также АЕТИЙ раздѣляетъ τῆν σκῆλασιν ἀπὸ τῆς εὐχαρίστου Кн. 3 Гл. 20 и 21 стр. 50 издан. Алд. Этомѣ способѣ лѣченія былъ въ употребленіи у Египтянъ, представляетъ АППИНЪ въ Книг. 3 о медицинѣ Египетской стр. 166 и далѣе, онѣ и изображеніе присовокупилъ, и МАННЪ, который эпистолу объ этомъ дѣлѣ состояніи писалъ къ ІЕРОНИМУ ФАБРИЦІУ АКВАПЕНАЕНТСКОМУ. Понеже сей ІЕРОНИМЪ признается, что онѣ опытами искусяся, что сіе лѣченіе въ морѣ и другихъ прешажныхъ и опчаянныхъ болѣзняхъ весьма здорово. Однакожъ сіе лѣченіе, какъ бы безчеловѣчнымъ, отбросилъ КОРТЕЗИИ Ми цел. Мед. Десяткѣ 7 стр. 381. Снес. ФРЕИНДСЪ исторію и физику ч. 1 стр. 16 въ Опп. стр. 379 и Диссерт. мою о надѣ-  
зываніи глазъ.



## П О Д Т Ю К Ъ с у ф ф у з і о

§. 1301.

Подпюкъ [суффузіо], по Гречески ὑπόχυσις, или υπόχυμα, у другихъ порогомѣ воднымъ свѣ-  
сока падающимъ [Капаракма] называется, когда или зернышко хрустальное, κρυσταλλώδης, или его по-  
крытая, оболочка паутиная αραχνώδης, въ кото-  
рой оно заключается, и ὑαλώδης, которою стекляной влажноты пазуха, надъ которою горошенка спойтѣ, обѣмляется, которыми всѣмъ по природѣ прозрачнымъ быть должно, темны здѣлавшись противъ свѣту лежащая, и его въ средину свою не пропускающа.

Всѣ



Всякому извѣстна распрѣ о семъ, который порокъ въ глазу чаще случается, и гдѣ мѣсто его. Исторію посѣ преславнаго ГРІЙСТЕРА въ Диссерт. о Катарактѣ и Главкѣ мѣ и ПЪИІА Медика К. А. Наукъ 1725 году стр. 8, особливый приложивши трудъ, собралъ преуčenный мужъ МОРГАГНЪ въ эпистолахъ Анатомическихъ 18 и 19, которыми въ ВАЛСАВИНОЙ Диссерт. 2 Анатомическую упоминаетъ. Древнѣе же, между которыми ЦЕЛСЪ, Кн. 7 Гл. 7, ГАЛЕНЪ Дефиниц. Медич. §. 363 Т. 2, ХАРТЕРЪ стр. 271 и въ введеніи, отъ него народу приписанномъ, Гл. 16 на помѣну мѣ ш. стр. 392, ПАВЕЛЬ Кн. 3 Гл. 22 стр. 35 и Кн. 6 Гл. 21 стр. 83, Издан. Алд. и другіе почти всѣ думали, что въ влажности водяной межъ ягодкою и горошинкою сбѣдается влажность, и помаленку жесточѣетъ. ГАЛЕНЪ и ПАВЕЛЬ раздѣляютъ *από τῆ ὑποχύματος τὸ γλαύκωμα*, чрезъ которыхъ слова показываютъ, что природный ягодный цвѣтъ перемѣняется въ лазоревой. Сие мнѣніе чрезъ многіе вѣки у всѣхъ врачующихъ на сердцахъ держалось, какъ для того, что ГАЛЕНЪ будучи человекъ славный и почти нѣй на помѣ утверждался, такъ и для того, что думали, будто бы вся возможность зрѣнія наибольше отъ горошенки происходитъ. Но въ прошломъ вѣку настоящимъ мѣстомъ подтѣка горошенку хрустальную, первый кажется показалъ ФР. КВАРРЕЙ Медикъ и Хирургъ Парижскій знатный, отъ котораго тожъ самое ХРИСТОФОРЪ ШЕЛГАММЕРЪ, а отъ этого ГВЕРНЪ, РОЛВИНЦІЙ въ Диссерт. Анат. кн. 1 гл. 13 стр. 179 взяли. Другіе этого дѣла изобрѣтателямъ и начальникомъ РЕМИГІЯ ЛАНІЭРІА, ЛЬКАРЯ и Каменорѣзца Парижскаго поставляютъ; а то кажется утверждаетъ ГАССЕНДЪ, который что это отъ преславнаго Парижскаго ЛЬКАРЯ, котораго имя не упоминаетъ, примѣчено, и публично толковано было, представляетъ въ Физикѣ секц. 3 Артик. 2 кн. 7. Дѣлъ Т. 2 стр. 371. Снес. БРИССЕАУ въ предис. и ПАЛФИНЪ Анат. Хирург. Т. 2 стр. 386, Ле ремаркѣ сюръ ла Курсъ дес' Операціи д. М. ДІОНИСЪ парѣ де ла ФОЭ стр. 554. Также въ прешедшемъ вѣку еще стѣ многихъ, и между оными отъ РОГАУЛА въ стр. Физич. Ч. 1 гл. 25 § 7, отъ ПЕТРА БОРЕЛЛА въ прибавл. къ сочн. 3 примѣчан. мед. стр. 279, было предложено, смотр. у МОРГАГНА на показ. мѣст. Однакожъ болшее число хотѣли лучше древнихъ мнѣніе, собравъ причины, защищать, нежели дѣло самое опытами испытывать. Напоследокъ въ началѣ этого вѣка БРИССЕЙ Медикъ и АНТОНІЙ МАИТРЕ ІЕАНЪ ЛЬКАРЬ, почти въ послѣднее время, разрѣзавъ послѣ смерти глаза, узнали, что во время того лѣченія, когда подтѣкъ обыкновенно лѣчимъ, съ мѣста своего двигается, и придавливается горошенка. По примѣчанію математиковъ, и предъ  
 Ъ Ъ Ъ 2 прош-

протчими ВОПИСКА ФОРТУНАТА ПЛЕМПИА въ Офтальмографіи кн. 3, гл. 14, стр. 107 уже давно доказано было, что горошенка къ побужденію къ себѣ и къ оси приближенію лучей свѣтлостныхъ, а сверхъ того къ зрѣнію ничего не пособствуетъ, человекъ и безъ горошенки видѣть можетъ, особливо ежели зрѣніе глазное пособствуемо будетъ стекломъ окапистымъ. Изрядно это утвердило Лече ле пресл. ПЕТИТА ЛѢкаря. Онъ проѣзжавши плеву роговую изъ глаза вынулъ горошенку темную у человека такого, у котораго подшѣкъ иглою дважды бывши сниманъ, и опять дважды приподнимался, и напоследокъ скрозъ зѣницу въ сторону, по просту камерою переднюю называсемою возвращался. Ибо человекъ тѣмъ глазомъ видѣть, и употребивши стекло крупное пясмо (унцалесъ линесъ) читать могъ; смотр. у БРИССЕА о Катарактѣ стр. 167, и послѣ сего ГЕЙСТЕРА о катарактѣ §. 12 стр. 57, снеси И. К. А. Наукъ 1708 году стр. 47. Когда преславный мужъ ГЕЙСТЕРЪ въ книгѣ о катарактѣ сіе новіе мнѣіе о мѣстѣ и прирѣдѣ вреда или порока сего, особливы: у опредѣвши трудъ, утвердилъ, однако у многихъ древнее и во все всажденное мнѣіе изъ головъ не взяло. Отъ сего же для того отведены быть не могли, что маленькія пленочки или кожицы, иногда въ глазахъ у тѣхъ людей, которые подшѣкомъ немоществовали, послѣ смерти нахъ дились, которыхъ примѣры смотри у ПАЛФИНА въ Анапоміи Хирургической Т. 1. стр. 387. Также тѣ, которые употребляючи подшѣкъ лѣчили, часто то, что противъ зѣницы внутри лежитъ, безъ труда не только могли отводить, но и раздирать и на части разбивать. Ибо тоненькую и изъ густой мокроты здѣлавшуюся плевочку или кожуцу, иглою легче раздирать можно, нежели самую горошенку, которая большую жесткость въ себѣ иметъ, что всѣмъ безъ мечтанія павды ищущимъ видимо было. А межъ тѣмъ, какъ эта распря въ великомъ непостоянствѣ у лѣчащихъ находилась, пресильнымъ перваго мнѣія и стариковъ защитителемъ былъ ВООЛГУЗІЙ, глазныхъ болѣзней лѣчитель преученый, который мнѣ въ дѣлахъ эшихъ нѣкогда учителемъ бывалъ. Ибо онъ не спорилъ, что горошенка вредъ причиняетъ, и свѣтъ шеряетъ, однакожъ оный родъ болѣзни съ древними, въ которыхъ чтеніи много обращался, хотѣлъ, чтобъ глазомъ назывался. Смотри ле Ди сертаціонъ сюръ ла катарактѣ э ле Глаукомъ, на который преславный мужъ ГЕЙСТЕРЪ и отвѣтъ и защитеніе мнѣія своего представилъ. Возбуждены здѣлались преученые люди, и какъ въ рѣзаніи, такъ въ лѣченіи преискусные, которые новую прилѣжность къ изслѣдыванію сихъ дѣлъ приложили. Начальнѣйше САЛАТОРЪ МОРАНДЪ ЛѢкарь Парижскій, и ученіемъ и искусствомъ знатный, и предъ протчими всѣми, не очень давно умершій. ФРАНЦИСКЪ ПЕТИТЪ Медикъ, изъ нихъ первый въ истор. К. А. Наукъ

Наукъ 1722 году стр. 21 показывается, что иногда не такъ горошенка, какъ ибкая пена, прошивъ збнцы становится. Эта же пена не изъ соковъ принужденныхъ дблается, но изъ плени оныхъ, которою горошенка обвязывается, и которая выше я описалъ. А другой ПЕТИГЪ, излбдовавши съ крайнимъ прилбжаніемъ всѣ глазныя части, также къ сему мнѣнію присталъ, и отъ того новый путь къ лбченію прѣобрѣлъ. Одна ошъ кое о чемъ съ МОРАНДОМЪ кажется не согласуется. Понеже споритъ противъ того, которое первой утверждаетъ, что горошинкинъ внѣшній к ай съ покровомъ, въ которомъ она заключается, или съ оболочкою, связываются, но много на то доказываетъ, что эта горошенка въ своемъ мѣстечкѣ безъ всякаго связанія свободно будто волнуется, и особеннымъ способомъ влажнстью, между горошенкою и покрываломъ находящеюся, питается. Ком. К. А. Наукъ 1730 году б24, въ которомъ дбл ПЕТИТЬ съ АНТОНИЕМЪ МАЙТРЕАНЪ кажется согласуется, который т же самъ ел. 12, стр. 14 въ народъ представилъ. Не признававши также ПЕТИТЬ, чтобъ это покрывало темно быть могло; онъ также различными опытами искушалъ, что того легко и дблать не можно, ежели на него, изъ глаза выпавши, различные ликворы, которыми у горошенки прозрачность отбемлется, будуще поливаться. Также доказываетъ, что онъ всегда въ глазахъ съ подтѣкомъ умершихъ находилъ горошенку сухую, а эту плену весьма прозрачную, на пом. М. 1730 году стр. б34. Правда иногда эта пена сухая вылана, да то случается отъ повреждения онаго сока, который бываетъ между горошенкою, онъ то на оную плену садится. А другіе ПЕТИТУ противорѣчатъ, которые часто эту плену толстую, раздѣлу и сухую находили, и доказываютъ, что это безспорно дблается отъ возженія. Кромѣ того ПЕТИТЬ, оную плену *уадабч*, которою ибдра стеклянныя обвѣляются, двойную представляетъ, и въ ней нашелъ каналъ мокроюю наполненный, которымъ горошенка, говорящъ, окружается; смотри въ исп. корол. Ак. Наукъ 1726 года стр. 111. Лбченія же способъ, какой отъ сихъ примѣчаній извѣдалъ, ни гдѣ очень ясно, однакожъ прѣзрительно, сколько мнѣ понятно, въ аписполахъ, извѣстенъ я видѣлъ, изъ которыхъ двѣ первыя 1729 года, противъ ГЕККВЕГА, третью 1732 года, противъ ВИНЗЛОВА издалъ; снес. Ком. К. А. Наукъ 1725 года стр. 8 и 1720 года стр. 320. Велитъ же шѣмъ, кто лбчитъ похочетъ подтѣкъ, чтобъ не всю горошенку съ покровомъ его изъ ибдра сока стекляннаго выбизали, и въ низъ низлагали, но оную плену, или покровъ въ низу, и съ задней стороны прорѣзывали, и послѣ въ эпотъ дбланной разрѣзъ горошенку такъ выдавливали, чтобъ племъ оной передняя сторона дб-

ла осталась. Придаеѣ, такъ человекъ лучше видѣть будетъ, ежели по изверженіи и низавлеченіи горошенки покровъ оный съ передней стороны неповрежденный, опять или влажностью водяною или стеклянкою наполнится, и горбатъ дѣлается, то человеку послѣ лѣченія очки почти ненадобны бывають. ПЕТИТУ послѣдовалъ смѣлчакъ оный и славолюбецъ ИВАНЪ ТАЙЛОРЪ, который въ прочемъ всѣмъ, что ПЕТИТЬ и другіе о природѣ и болѣзняхъ глазныхъ написали, смѣхотворной субтильности припвореніемъ и бродяжническимъ хвастунствомъ больше темноты навелъ, нежели свѣта придалъ. Однакожъ я получилъ, что онъ сему отъ ПЕТИТА изобрѣтенному къ лѣченію способу очень благополучно послѣдовалъ. Этому два рода катаракты поставляетъ, одну подлинною называетъ, а другую ложною. Первая родится, онъ думаетъ, безъ поврежденія и безъ всякой перемѣны въ покровъ, горошенка въ нѣкоторой части попортилась и перемѣнивъ свое природное состояніе, цвѣтъ, прозрачность, положеніе, изображеніе или фигуру и величину, гораздо скорчится. Другой же родъ есть, когда съ горошенкою, или цѣлою, или съ нѣкоторою ея частію, разслаблѣю и распухлою, и покровъ попортился, и обѣ части потускнѣють. Сверхъ сего придаетъ главкома, жоторой мѣсто также въ горошенкѣ полагаетъ, въ ней, онъ говоритъ, вся горошенка съ покровомъ такъ распухаетъ, что на послѣдокъ зѣница распустилась, и разширилась, и *mudraṣṭis* съ *amaurōses* воспослѣдуютъ. Подлинная катаракта родится, придаетъ, отъ сильного давленія горошенки, и покрова ея. Давленіе можетъ дѣлаться отъ мышцъ глазъ движущихъ, и ради такой причины, тѣ предъ прошлыми этимъ порокомъ страждутъ, которые отъ непрестаннаго чтенія, или инымъ способомъ, острое глазное зрѣніе на какое дѣло терять привыкли. Также иногда случается, что, отъ удара мышцы повреждаются, и сѣоживаются, такъ, что какъ онъ скорчится, такъ приписнется горошенкинъ покровъ, что онъ будучи очень тонокъ, прорвется, и горошенка нечаянно всю прозрачность потеряетъ, и въ влажность водяную, и въ то порожнее мѣсто, которое по естеству между горошенкою и зѣницею бываетъ, называется камерою заднею, перейдетъ. Во время помаленьку вырастающаго порока, также, ежели оный вырастетъ, человекъ нѣкоторыя вещи, съ боку положенныя, лучше видѣтъ, нежели тѣ, которыя противъ зѣницы прямо положены. Великъ ТАЙЛОРЪ тѣмъ, которые этой болѣзни боялись, беречься безпрестаннаго чтенія книгъ и всякаго другаго дѣла, которое остраго зрѣнія глазнаго требуетъ. А что онъ назвалъ катарактою неподлинною, оное знать, можно научиться отъ самой причины, говоритъ, понеже послѣ сильного вожденія и *Флеуриуи* обыкновенно дѣлается. Ибо также

также горошенкинъ покровъ , въ которомъ уже руишій сокр. 2 таб. 1 фиг. 8 стр. 78 жилы бьющіяся были найдены , нѣсколько вожженія имѣющъ , ежели другіа глазныя плены , а особливо ликосоставная , онымъ заражены будутъ. Снеси ПЕТИТА въ И. К. А. Наукѣ 1730 году стр. 226. По окончаніи вожженія зрѣніе помаленьку тупѣетъ , и со дня на день больше помрачается , такъ , что человекъ то , что съ боку лежашъ , не больше будетъ видѣть , какъ то , что прошивъ будетъ. То , что внутрь глаза у такихъ людей находится , отъ зѣницы не далеко лежашъ , и цвѣтъ имѣетъ бѣловатой , и почти лазоревый. Ибо горошенка самая , да онажъ вся распускается и разстываетъ. Того ради , когда подъ покровомъ и между покровомъ и горошенкою обыкновенно мокрота бываетъ различно густа и расщѣнена , а наибольше бѣловатая , такіа катаракты отъ нѣкоторыхъ цистическихъ , понеже въ мѣшечкѣ своемъ содержатся , и отъ мокроты молочными или гнойными были названы. О главкомѣ же ТАЙЛОРЪ говоритъ , что она родится отъ всеблеснаго худого состоянія , или отъ калексіи , и особливо отъ преизобилованія въ сокахъ мокроты. Ибо испорченные соки , въ горошенку перелившіеся , дѣлаютъ , что она вся съ жесткостію распухаетъ. Для того наибольше тяжкая и долговременная , какъ въ головѣ , такъ въ глазу боль напередъ главкомы бываетъ , и оная боль , когда будетъ горошенка распухать и внутреннія части глазныя будутъ давиться , будетъ умножаться , доколѣ все зрѣніе потерлется , и *αμάρωσις* воспослѣдуетъ. Понеже на послѣдокъ оная плена глазная , зрѣніе дающая , которую ТАЙЛОРЪ съ МАРИОТТОМЪ ликосоставною , другіе , и сколько я разсуждаю , правильнѣе , съшистою , называютъ , отъ затвердѣлой горошенки угнѣтаема будучи , дарованія чувства лишается. Для тойже самой причины также распускается и расширяется зѣница. Въ этихъ глазахъ съ начала горошенкинъ цвѣтъ помаленьку переиѣняется , но на послѣдокъ онъ лазоревымъ дѣлается , ягодка же отъ горошенки угнѣтаема будучи напередъ и къ плевѣ роговой выдвигается , онъ придаетъ ; смотр. ТАУЛОРСЪ Трентизе онъ же Диссертсѣ отъ же кристаллине Гуморѣ. Это я тутъ привелъ не для того , что будто бы я думалъ , что этому человеку много вѣрить надобно , но для того , чтобъ я могъ думать , что чрезъ сіе то , что ПЕТИТЪ предложилъ , нѣсколько пооткровеннѣе и пояснѣе дѣлается. Много еще знатнаго присовокупилъ ВАЛСАЛВА и МОРГАГНЪ на показ. мѣст. Изъ сихъ же не мало и особливо то поминемъ , что подтѣкъ раждается и отъ испортившейся оной плены , которую нѣдро стекляное , надъ которымъ горошенка лежашъ , прикрывается , и которая отъ *υαλαδεις* происходитъ. Понеже оба они это примѣчаніями изъ разрѣзанныхъ по смерти глазъ утвердили.

Того

Того ради, ежели подтѣкъ, который сперва иглою лѣченъ былъ, не потчасъ, но по прошествіи нѣскольکو времени, и помаленьку возвращи-  
тся, оное отъ поврежденія этого покрова, изъ котораго, по при-  
мѣчнiю МОРГАГНОВУ возгри также выходятъ, случается можетъ.  
Смопр. у ВАЛСАЛВЫ въ диссерт. Анаст. 2 §. 17 Т. 1 стр. 146 и у  
МОРГАГНА эпист. 18 §. 23 Т. 2 стр. 334. Развѣ во всемъ этомъ я  
обманываюсь, то ужѣ заодно знаю, что настоящей катаракты  
мѣсто есть то, о которомъ я сказалъ. И хотя ни Морганъ въ эпист.  
18 §. 13, 18 §. 8 приприводитъ тому во все не хотѣлъ, то бы-  
ваютъ подтѣки въ части влажнѣсти водяной, или въ такъ называемой ка-  
мерѣ задней, безъ поврежденія горошенки, изъ принужденнаго и густа-  
го сока раждаемая; однакожъ то узнаю, что и сѣ кожицы безъ по-  
врежденія самой горошенки, не можно иглою сечь, а горошенка ежели  
уязвлена и ранена будетъ, темна дѣлается, чего мы отъ другихъ  
примѣчаній учимся. Смотр. примѣч. ПЕТИТОВО о величинѣ двухъ такъ  
называемыхъ камеръ глазныхъ въ Комм. К. А. Наукъ 1723 года стр. 54.  
и 1728 года стр. 295 и 408. Также кажется лучше можно лѣчить под-  
тѣки, гдѣ покровъ прозраченъ и целъ, нежели, гдѣ онъ также ужѣ ис-  
порченъ, и гдѣ отъ долговременности болѣзни усилилась, и все межъ со-  
бою гораздо срослось. А то правда, что подтѣки оныя, которые хо-  
тя иглою однихъ или нѣскольکو разъ, а припомъ сильно, сдавливаны,  
ниже зѣницы сведены бытъ не могутъ, или которые и сведены буди-  
чи, потчасъ возвращаются, и которые, ежели на послѣдокъ въ низу  
останутся, великое вожженіе производятъ, такіе бывають, въ кото-  
рыхъ горошенка испорченая съ своимъ покровомъ срослась, и съ отросст-  
ками рѣсничными сцепилась, отъ которыхъ безъ затрудненія и безъ  
тяжкаго ихъ досажденія, и безъ опасенія и попія, не можно нарзено раз-  
дѣлить. Но это при лѣченіяхъ тѣхъ подтѣковъ наименѣе случается, ко-  
торыя ужѣ застали. Смотр. де ла ФЭ на пом. мѣст. и БЕНЕД. ДУД-  
ДЕЛСЪ Третизе офъ те Дисеасесъ офъ те Горни-Коалъ сфъ те Ээй,  
анд. те варіоусъ Киндс офъ. Катаракт. гл. 3 стр. 107. Это лѣнско-  
во пространство и подовольте протолкзати хотѣтъ, по еже изъ сѣхъ  
явственно будетъ, что ужѣ лучше изслѣдовано подтѣка мѣсто и нату-  
ра. И всѣхъ, которые науку составляютъ, убѣждать должно, что сѣ  
потому, чего чрезъ опыты въ лѣченіи научатся, это или огрѣве-  
ргали, или больше утверждали, и чтобъ предзнаменованія не только  
общія, но различныя подтѣкамъ собственныя, а при томъ чего  
отъ каждаго или надѣяться, или бояться надобно, а сверхъ того  
всѣмъ этимъ пристойное лѣченіе, показывали бы. ПЕТИТОВЪ выше-  
помянутый лѣченія спосо-бъ, который ТАЙЛОРЪ по обычаю сво-  
ему пространнѣе описалъ, описывать я не смѣю, чего ради при томъ  
способъ лѣченія подтѣковъ, который уже давно съ природою болѣзни  
не довольно изслѣдованъ былъ, а въ употребленіи находился, а останусь.

## §. 1302.

Опѣ раждающагося и недавнаго подтѣока глазѣ тускнѣнь начинаеть , что у болнаго передѣ глазомѣ будто облачко будеть ворочаться. Это со дня на день , иногда скоро иногда не скоро , толсто покажется , и на послѣдокѣ внутренней силѣ такѣ противоспанеть , что его и съ наружи другой присматриваяся глазами видѣнь можеть . При состарѣннѣ подтѣока зрѣнне глазное больше и больше припуляется , а на послѣдокѣ все перьяется (\*).

(\*) уѣщавать надобно молодыхъ людей обучающихся , что то , передѣ глазами такѣ мерещущееся , не всегда катаракту значить . Ибо то и опѣ другихъ причинѣ приключаться можеть , какѣ на примѣрѣ , ежели на плени роговой опѣ вожженѣ прыжки и болячки дѣлаются , или по излѣченнѣ ихъ струпики останутся . Также ежели грубой сокѣ или гной изѣ плевѣ ликосоставной и отпростковѣ рѣснншныхъ вожженныхъ въ влажнѣ водной соберется , и ежели въ стеклянѣ такѣ въ плевѣ сѣтнстой пороѣ будеть , и особливо , ежели подѣ сею въ плевѣ ликосоставнѣ и жилы обьющѣя и жилы кровевозвращательныя , которыя или крови или ласокѣ опредѣлены , распухнутѣ , изѣ чего не рѣако *αμαυωσις* слѣдуетѣ . Смѣтр. въ ПИТКАРНОВОЙ Дисс. Мед. Теорѣю болѣзней глазныхъ стр 206. Самѣ человекѣ лучше эти пѣна видѣть можеть , ежели онѣ на себѣ сѣтнлое скрозѣ бумагу тоннѣкою иглою испро олоштую , чернѣю или зеленѣю краскою выкашленную , будеть смѣтрѣть .

## §. 1303.

Однакожѣ есть различѣе . Ибо иногда подтѣокѣ помаленку дѣлается , и глаза съ первыхъ дней не много , а послѣ больше , помрачаются . А другѣе опѣ него незапно и въ малые дни слѣпнннѣ , а то наипаче случается , когда сильно глазѣ зашибенѣ будеть , и прорветѣся , или вожженнѣ получишѣ она *αχαυωσις* горошенкина плена .

## §. 1304.

Самый такѣ подтѣокѣ разноцвѣтенѣ бѣваетѣ . Понеже имѣетѣ цвѣтѣ молодой , шарый , лазоревый ,

Д э э

золо-

золотый, свинцовый, рѣдко синий, зеленый и круглый. Чего отъ всякаго надѣяшься, тотчасъ предложу.

§. 1305.

Ежели одна горошенка пускла будетъ, а она плена, *арахидис* цела и прозрачна, то человекъ съ начала лучше видитъ то, что съ боку лежитъ, нежели то, что напротивъ. Также ночью и въ темнотѣ, когда зѣница расширяется, онъ лучше видитъ, нежели днемъ и при великомъ свѣтѣ. А что плева *арахиди* повреждена, познавается отъ первоначалія и по болѣзни, отъ которой эпотъ порокъ пришелъ: Ибо обыкновенно рождается отъ вожженія, которое хоша и разбито будетъ, то очень скоро зрѣніе тунится, и помрачается такъ, что въ короткомъ времени весь свѣтъ теряется. Въ эпотъ подтѣка родъ никакого чувства о свѣтѣ не оставляется, и человекъ ни въ темнотѣ, и хотя зѣница расширена будетъ, лучше видѣть не будетъ. Самый же подтѣкъ, внутри видимый, бѣловатъ бываетъ, и будшо морщиноватъ.

§. 1306.

Первый родъ катаракты кажется родится, ежели соку онаго по естеству между горошенкою и межъ покровомъ ея бывающаго, и отъ котораго она пропитаніе получаетъ, не будетъ. Ибо горошенка сжимается, суха дѣлается и пускла. Эпо передъ другими, тѣмъ приключается, которые день и ночь чипаютъ, пишутъ, или иное дѣло, какъ на примѣръ рѣзу, вперенными глазами дѣлаютъ. Понеже когда мышки глазныя прямые крѣпко напрягаются, [а тому не ошибно быть надобно, ежели то, что передомною

ле-



лежитъ , и близкое похочемъ разсмотрѣть] къ горошенкѣ приписывается покровъ , который случай не допускаетъ , чтобъ оный сокъ изъ самага покрова выходить и опдѣляясь могъ. Когда же горошенка не правильно питается , то она , какъ сказано , портилась. Временемъ , ежели глазъ сънаружи зашибенъ бываетъ , тожъ самое съволоклыми сильно опъ вожженія мышками обыкновенно случается.

§. 1307.

Горошинкинъ же покровъ , или плена *ἀραχιδης* , портился , когда она незапно прорывается , такъ , что иногда горошенка , которой также пороченой быть надлежитъ , на переднюю глаза сторону , которая межъ плесою роговою и зѣницей есть , перейдетъ. Но я теперь объявилъ , что это случается въ глазу сильно ушибеномъ. Впрочемъ изъ различныхъ причинъ въ плевѣ лисосоставной и отпросткахъ рѣсничныхъ вожженіе дѣлается , которое глазнымъ *Φλεγμονή* (281) называется : Ибо сіе , ежели велико будетъ , также на оной горошинкинъ покровъ приходитъ , и его портитъ. Иногда вожженіе дѣлается , ежели въ сокахъ испорченная и сырая матерія будетъ , которая , какъ по всему плѣу расходится , то и въ глазныя нѣжныя части и въ эту плену приходитъ , въ жилы обьющаяся , на пасоку опредѣленныя , переливается , останавливается , и проходы запираетъ. Этому бѣдствію плѣ подвержены , у которыхъ плѣсное состояніе испорчено , и особливо , которыхъ насморкъ долго и гораздо будетъ мучить , также и плѣ , у которыхъ носъ не мокры , но сухъ бываетъ , или , которые о высмаркиваніи ихъ не стараются. Ибо возгри , которыхъ въ ноздри испражнятыя не могутъ , въ глазъ

иногда обращаются. Также проходы оные, сквозь которые мокрота текла, ежели досажены и разслаблы будупь, засариваются; а по случисься можеть, ежели по глазу снаружи сильно ударено будеть. Обдствуюпъ также пь, у которыхь блудобная болбзнь рпутью бываеть лбчена, и пь, у которыхь смертоносныя другія болбзни и сильная предь прочими боль бываеть. Не меньшеж и еще, которые пьломь слабы, неплотны и пучны, и которые пьло свое лбнностью, сномь, роскошью, блудобнянемь изнуряютъ, и въ безсиліе приводяпъ, или, которые изъ мбста благораспореннаго въ тяжелое приходяпъ, или пьло отъ жару разслабное поипъ часъ прохоложиваюпъ (\*).

(\*) Ежели эта оболочка испортится, надобно кажется, чтобъ и горошенка испортилась. Однакожъ есть примбчаніе достопамятное САНТОРИНОВО, онъ горошенку прозрачную нашелъ, а плеву, свбшлыя черпъ, на подобіе лучей составленную имбющую. Прим. Анат. Гл. 4 § 4 стр. 82. Снеси пушъ МОРГАГНОВО помн. мбсл. эпист. 18 §. 19 стр. 329.

#### §. 1308.

Знать также не опмбнно надобно, что изъ вожженной оной плены *крусаллѣды* иногда гной между ею и горошенкою собирается, который родъ подтѣдка, понеже мокрота въ эпотъ покровъ скопившаяся находится, капарактою цистическою, другіе гноеватую, нбкоторые попому, что она мокротна на сыворопку молошную походипъ, молошную назвали (\*). Также иногда кажется самая горошенка распаеваеть, и въ такую же мокроту превращаеть (\*\*). Иногда она скорченная, тусклая и другимъ цвбтомъ послъ испорченія мокроты находится (\*\*\*)

(\*) Смот. у ТАЙЛора Фреатизе онъ те Дисеасес офъ те кристаллине гумоуръ. Гл. 5 стр. 23.

(\*\*)

(\*\*) Смотр. Примч. ГЕЙСТЕРОВО въ глазу собачьмъ, въ запискахъ Нап. Курюз. Сто 4 Прим. 108, другое ВАЛСАЛВИНО у челоѣка въ МОРГАГНЪ на пом. мѣст. элист. 18 §. 17 стр. 326.

(\*\*\*) У старухи я нашелъ этотъ катаракты родъ, у нее много мокроты молочной въ покровѣ горошенки, или въ плену Круса-лльнѣ скопилось, въ самой же мокротѣ горошенку тусклую, нѣ-сколко желтоватую, которая не множко побольше чечевички въ кушанѣ употр. бляемой была. Смотр. программу [задачу], которую 1736 году Марта 17 числа вскрыше публичное шрупа я назначилъ, изъ которой это примѣчаніе также привелъ Пресл. МОРГАГНЪ на пом. мѣст.

§. 1309.

Недалекъ отъ эшихъ пороковъ въ горошенкѣ хру-пальной бывающій, когда онъ съ покровомъ своимъ гораздо да такъ распухаетъ, что прочія глазныя часипи отъ нее задавятся. Это по симъ признакамъ познавается: Глазъ жесткъ, отъ перста неусту-пающій, приподнимается, и больше, какъ по природѣ должно, выпучился; въ немъ нѣкоторая тяжесть и боль чувствуется, внутри въ глазу то, что передъ глазомъ будеть, цвѣтъ имѣетъ морской воды. На послѣдокъ, ежели зло застарѣетъ, зѣница раз-ширится; и придетъ мидриазъ. А понеже и спе-кляная влажность и плева сѣпистая отъ горо-шенки, которая гораздо распухаетъ, давятся, про-падетъ вся зрѣнія возможность, и дѣлается амаузиасъ. Главкомю элотъ порокъ называютъ. Но главкомъ есть другой родъ, когда спекляная влажность рас-пухаетъ, портится, и темень дѣлается. Однакожъ она очень часню въ разрѣшеніе приходитъ, и глазъ туманенъ будучи, впускымъ и вялымъ или дряблымъ бываетъ, который, какъ подавишь, не пропивится. Надобно же быть, ежели влажность испортилась, должно и горошенкѣ испортиться.

Э э э э

§. 1310

## §. 1310.

Первой родъ подтіока иногда содержаніемъ въ кушаньѣ и питьѣ и приспоспобными лѣкарствами отвратить можно, а припомъ, гдѣ онъ уже въ созрѣніе пришолъ, рукою излѣчить. Другой родъ хуже кажется, понеже въ немъ не одна горошенка, но и покровъ ея, а временемъ съ оною плесою, которою стекляннаго сока нѣдро прикрывается, вредъ получаетъ, и иглою разводитъ ее надобно. Надежду также къ благополучному лѣченію подастъ самый подтіока цвѣтъ, который быть долженъ избѣла голубой, нѣсколько желтоватъ, и ежели глазъ ни жестокъ, ни очень мягокъ, и ежели въ немъ нѣкопорое чувство свѣта оспалось, такъ, что въ темнотѣ зѣница нѣсколько будетъ сжиматься, а при свѣтѣ разширяться. Мало излѣчимъ бываетъ подтіокъ, гдѣ цвѣтъ бываетъ на золото, на мѣдь или на желѣзо лощное схожій, ежели онъ случится отъ тяжелой и долговременной болѣзни, отъ великихъ въ головѣ болей, или отъ удару тяжкаго, и отъ глазного отіока здѣлается. Также почти никакой надежды не бываетъ и у тѣхъ, которые безъ этого вреда, и прежде рожденія подтіока, зрѣніе тупое имѣютъ, у нихъ по большей части амавросисъ приходитъ. Этого больше бояться должно, гдѣ зѣница, потерявши природную фигуру, въ другую превратится, ежели она гораздо разширится и недвижима здѣлается, а въ глазу никакого чувства блистанія молніина не оспанется. Также глаза малые, впалые, жесткіе и выпуклые, къ лѣченію неспособны бываютъ. Неспособна къ тому старость, ни лѣтъ также отроческія, ни средній возрастъ, ни старой ни молодой къ тому спо-

способенъ. Пришомъ разсуждать надобно пѣлесное состояніе, которое ежели испорчено, или нѣкакой порокъ въ сокахъ будетъ, шупъ худой болѣзни и не благополучнаго окончанія въ лѣченіи опасаться надобно. Главкома съ начала чрезъ содержаніе въ кушаньѣ и питьѣ и лѣкарствами, которыя вредную матерію въ раствореніе приводятъ, и нанизъ прогоняютъ, разбивается. Ежели же застарѣется, никакого лѣченія не принимаетъ.

§. 1311

Ежели глаза пускнѣютъ, и подтѣка опасность дѣлаютъ, отвѣдаютъ пособствовать себѣ кушаньемъ, питьемъ и лѣкарствами. Лѣченія же способъ отъ очевидныхъ причинъ установить надлежитъ. Того ради кто отъ подтѣка не видѣть начинаетъ, шѣмъ никогда не надлежитъ глазъ къ писанію и чтенію, и къ дѣланію какого дѣла, часто принуждать, но отъ всякаго шруда, крѣпкаго глазнаго зрѣнія требующаго, воздерживать. Примѣчанія великаго требуется шупъ вещей общихъ, но къ здравію нужныхъ, какъ на примѣръ, чѣмъ на низъ испражненіе, и у женщинъ крови мѣсячныя порядочно происходили, ежели у мужчинъ почечуйная кровь привыкла течь, оной не удерживать, понеже въ глазахъ слабѣсть, подтѣкъ и главкома часто отъ этихъ причинъ дѣлаются. Ежели множество крови будетъ грѣшнѣе, оной убавить, какъ изъ жилы, такъ насѣкаячи кожу, и приспавливаючи банки. Иногда ежели такія нещасія человѣка скоро захватятъ, шѣмъ скорѣе вспоможенія дѣйствительнѣйшія промышлять надлежитъ. Того ради, ежели отѣкъ въ глазу будетъ, кровь пускнѣе изъ жилы кровсвозвращательной яремной,

а

а сверхъ того и изъ жилы бьющейся , и на вѣкахъ почаще дѣлать ξύσις (298) , прикладывая и употребляя все , что отъ Флеγμονѣ пособствуетъ. Ежели въ сокахъ мокрота густая будетъ изобиловать , должно ее вонъ выгнать , и куріозныхъ брашенъ беречься , чтобъ непотребная матерія въ пѣлѣ не оспалась. Въ такихъ случаяхъ и въ пѣлахъ плотныхъ по большой части пособствуютъ воды минеральныя , которыя долго и безперерывно пить надлежитъ. Также пособствуютъ вещи мочу гонящія , изъ такихъ , предъ прочими , сокъ миллепедарумъ силвестріумъ , оныхъ по дватцати , по трицати , а наконецъ болше , живыхъ съ виномъ въ иготъ трутъ. Вино же по утру чрезъ многіе дни пить надобно. Также полезно на кожѣ болячки дѣлать , или прикладываніемъ испанскихъ мухъ (937 , 938) , или источниками (съ 926 , до 934) , или то , что великую дѣйствительность имѣетъ , заволокою (939) , чтобъ худая матерія выходить могла. Ежели другой порокъ въ сокахъ будетъ , давать надлежитъ декокты и лѣкарства изъ ртути къ очищенію соковъ пристойныя : ежели послѣ великаго кроветеченія глаза тупѣютъ , и зпихъ болѣзней опасностъ наводятъ , давать надобно похлѣбки , въ которыхъ корни и травы силу къ отворенію имѣющія , варить можно. А гдѣ глазъ мрачащійся пухнетъ , и жестокъ будетъ , не бесполезны припарки изъ травъ мягчительныхъ , отъ которыхъ при концѣ , ежели нѣсколько опухли и жесткости минетъ , къ разбивательнымъ вещамъ приступитъ надлежитъ. По-неже часто болѣзнь такими средствами прогоняется , ежели сперва употреблены будутъ вспоможенія , теперь мною приказанныя , и которыя вредную мапперію

рю вонѣ изгоняють : ибо безѣ сихѣ иногда припар-  
ки вредны бытъ могутъ.

§. 1312.

Ежели же этимѣ лѣченія-способомѣ оныя поро-  
ковѣ роды въ самомѣ началѣ не разобѣются , то смо-  
трѣвъ надлежитѣ , не можнѣо рукою лѣчить принятъ-  
ся. Это лѣченіе наиболше мѣсто имѣетѣ въ первомѣ  
подшѣока родѣ , ежели не очень застарѣетѣ. Понеже  
послѣдній родѣ , гдѣ и горошенка и покровѣ ся по-  
вреждены , къ лѣченію не такѣ хорошій способѣ  
имѣетѣся. Также излишнее да и небезбѣдственное руч-  
ное лѣченіе , ежели оно употреблено будетѣ въ глав-  
комѣ или въ подшѣокѣ , къ которому *μυδρίαις* и *αἰμάου-  
ρῳις* прикинулись ; и самого подшѣока также нѣ-  
которое созрѣніе есть : Того ради дожидать надле-  
житѣ , покуда подшѣокѣ жесткости нѣкоторой не  
преизлишней не получитѣ , котораго приключенія  
знакъ обрыкновенный бываетъ , ежели у человека свѣта  
и вещей , копорые предѣ глазами обращаются , нѣ-  
которое чувство останеся , а онѣ ни вещей , ни  
цвѣтовѣ , довольно распознать не можетѣ. Ежели  
время выбрать похочетѣся , лѣчить весною должно  
или осенью , покуда не начались , или уже какѣ пере-  
домяты жары. Также разсуждать надобно о пломя-  
номѣ и о почечуѣ , копорыхѣ жилы кровевозвращатель-  
ныя , кровь изливаючи , лѣченіе не безопаснымѣ дѣ-  
лають. Не меньшежѣ дожидать должно , ежели мокро-  
та въ ноздри въ гортань или къ лѣгкому пе-  
четѣ , и частыя покашливанія , похаркиванія и чха-  
нія , или въ головѣ боль , въ шѣлѣ горячку , про-  
изводятѣ. Надобно также , чтобѣ въ шѣлѣ день , ко-  
гда больного будуще лѣчить , небо открытое , вед-  
Ю ю ю рьяное

ряное, не облачисное и не мрачное было. И шотѣ, кто лѣчишь будетѣ, долженѣ быть со всѣмѣ здоровѣ, понеже къ этому дѣлу и глазное зрѣніе острое и чистое, и рука проворная и недрожливая пребудетѣ.

## §. 1313.

Прежде лѣченія слабительное нѣсколько разѣ давать, и человека чрезѣ нѣсколько дней умѣренно и не очень сильнымѣ кушаньемѣ кормить должно; а пить приказать воду или ппизанѣ, или иное нѣчто изѣ пипшей весьма слабое, которыя вещи всѣ много служить могутѣ къ отвращенію вожженія, котораго иногда бояться надобно. Въ шотѣ самый день предѣ лѣченіемѣ опять на низѣ ослабить чрезѣ клистерѣ, чшобѣ нужда не заставила больного вставать для испражненія.

## §. 1314.

Иглою дѣло дѣлать должно, однако не весьма заостреною, и не весьма тонкою. Ибо ежели преизлишне заострена будетѣ, повредиться могутѣ маленькія жилки бѣющіяся и жилки кровезовращательныя въ ягодкѣ и въ отрѣскахѣ рѣсничныхѣ. Ежели же весьма туповата будетѣ, оную больные, и разѣ только приписывая, впускать. Наилучшею мнѣ кажется, у которой конецѣ нѣсколько тонокѣ здѣланѣ, широковатѣ, а не весьма заостренѣ. Имѣть долженѣ рукоятчку, и на ней значокѣ, что когда игла въ глазѣ впустился, знать бы можно, которою стороною она широка, и которою тонка. Игла быть можетѣ изѣ желѣза, довольно крѣпкаго, но не хрупкаго. Однако почти лучшая  
игла



игла та , которая изъ золота дѣлается , понеже отъ многихъ ударовъ молочныхъ твердѣетъ. Ежели изъ желѣза будеть , великое стараніе прикладывать надлежитъ , чтобъ вся ржавчина выперта была. Для того ее , доколѣ еще въ глазъ не поставишся , продѣть можно сквозь сукно шерстяное плотное , каковъ кармазинъ обыкновенно бываеиъ , и попираючи имъ выгладить. Также , покуда не поставишся , между губами мокрыми проволоку можно.

(\*) Древніе употребляли иглу круглую очень заостренную. Смотри фигуру у БАРТИША ч. 5 стр. 65 ; онъ предъ прочими серебряныя предпочитаетъ. ТАЙЛОРЪ , который новый оный способъ лѣченія представляетъ , иглу употребляетъ нѣсколько широкую , а конецъ у нее съ одной стороны горбатъ , съ другой ровенъ. Смотри на показ. мѣст. гл. 11 стр. 33 ; ее кажется нарисовалъ ШАРПЪ Таб. 10 стр. 169. Но онъ сперва плевую склеротическую [матерію] ланцетомъ прорѣзываетъ , и путь отворяетъ , куда иголку вложить. Также употребляетъ орудіе желѣзное , зеркаломъ глазнымъ [спекулюмъ окули] называемое. Но такимъ способомъ чуть ли можно воспрепятствовать , чтобъ въ разрѣзъ разинутый , когда глазъ онымъ желѣзомъ будеть давиться , влажность водяная не вышлеала. А это ежели случится , упадутъ и плева роговая и ягодка , и безъ вреда не возможетъ отвестись подтѣокъ. Это примѣчаніе также достойное нахожу въ не Зуппленемъ по КЕННЕДИСЬ Офталмография , которая горкимъ разсмотрѣніемъ можетъ назваться многихъ авторовъ , а особливо ХЕСЕЛДЕНА , стр. 97.

#### § 1315.

Для утоленія вожженія надобно лѣкарство дѣйствительное. Преизрядное лѣкарство есть соспавляемое изъ квацовъ жженныхъ и сахару сатурни , или изъ жагры отъ яри , которую въ народѣ туцїею называютъ. Эту кладутъ въ сѣлокъ яишной , и прибавивъ воды розовой разбалтываютъ , и размѣшиваяютъ. Въ этомъ лимворѣ обмакиваютъ , и выжимаютъ суконочку , и тотчасъ прежде лѣченія кладутъ на другой глазъ , и обвязкою прикрѣпляютъ.

Ю ю ю 2

§ 1316

## §. 1316.

Мѣсто свѣтлое быть должно , чтобъ лѣкаръ инструментъ въ человѣческомъ глазу видѣть могъ. Однакожъ преизлишней свѣтъ , ежели въ глазу нѣко-торое его чувство оспалось , здѣлашь можетъ , что зѣница весьма сожмѣтся. Чего ради человѣку не прямо пропивъ свѣту садиться , но чтобъ свѣтъ съ боку лѣчимоу человѣку въ глазъ приходилъ. Пропивъ больного на спулъ , нѣсколько повыше , лѣкаръ садится. Голову прислуживающій человѣкъ держать долженъ такъ , чтобъ она не шаталась. Сверхъ того еще два человѣка съ боковъ придерживающіе , чтобъ больной не шатался ; понеже маленькимъ движеніемъ вѣчно зрѣніе потерять можно. Того ради пряжу и суконки на другой глазъ положа , и завязавъ , глазъ , который лѣчить рукою будутъ , положа на вѣка персты , легонько потереть надобно , чтобъ маленькія жилы крововозвращательныя , которыхъ прогати иглою не надобно , надулись , и побольше оказались. Человѣка увѣщавать надобно , чтобъ онъ глазъ къ носу отворопилъ , и недвижимъ здѣлалъ. Тогда лѣкаръ одною рукою вѣка нарочно разводилъ , а другою иглу вонзаетъ. Лѣчить же должно лѣвый глазъ правою , а правый лѣвою рукою. Иглу взявши такимъ порядкомъ , какъ мы пишучи обыкновенно перо беремъ , въ глазъ такъ вонзаетъ , чтобъ мизинецъ и другой перстъ къ нему близкій на високъ и на уголъ глазной къ виску лежащій оперлись.

## §. 1317.

Вонзать или опускать иглу должно прямо сквозь оболочки , почти по срединѣ того мѣста , которое есть между пленою роговою и между угломъ къ виску лежащимъ , такъ , чтобъ ни одной жилы крове-

кровеовозвращательной не повредить. То мѣсто къ дѣйствию способно, которое отъ плевры роговой на двѣ линіи разстояніемъ отстоятъ (\*). Какъ скоро игла въ глазъ пройдетъ, то ее наклонить надобно къ самому подтѣку, и повертывая поглубже вонзять. Когда же къ подтѣку придетъ, то ручку такъ повернуть надобно, чтобъ конецъ иглы и спора на ее плоская на верхъ подтѣка легла. Этимъ подтѣкъ помаленьку на низъ придавливать и подъ край зѣницы отводить надлежитъ. Когда этотъ край перейдетъ подтѣкъ, то его нѣсколько по-сильнее иглою попридавить должно, чтобъ въ низу подъ влажностью спекляною остановился. Если остановится, и человекъ все то, что предъ глазами находится, видѣть можетъ, то лѣченіе исполнено. Тотчасъ же глазъ наведши вѣка закрыть должно, чтобъ новый свѣтъ ему не досадалъ. Иглу вонъ брать, когда вѣка вмѣстѣ сведены будутъ. Все дѣлать должно тщательно, чтобъ внутреннихъ глазныхъ частей не повредить.

(\*) Сквозь которое мѣсто иглу въ глазъ впускать должно, особливо трудъ положить на то ПЕТИТЬ Медикъ въ комм. К. А. Наукъ 1726 году стр. 370; онъ показываетъ, ежели на одну линію глазъ будетъ проколѣтъ, повредишь отростки рѣсничные. Ежели же проколѣтъ будетъ на три или на четыре, повредить можешь разширеніе мышечное. А послѣ этого поврежденія слѣдуютъ рвота, всего омерзѣніе и другія худыя приключенія: Того ради въ заключеніе говоритъ, что наилучшее мѣсто отъ плевры роговой нѣсколько подалѣ двухъ линій отстоящее. ТАЙЛОРЪ на пом. мѣст. гл 11 стр. 33 иглу такъ пускаетъ, чтобъ между плевсю роговою и мѣстѣмъ, въ которомъ глазъ прокалывается, разстояніе было на полторы линіи.

§. 1318.

Послѣ сего пряжу въ шой мистурѣ (1315) обмо-  
ча, и выжавъ приложить, и глазъ завязать должно.

Ю ю ю 3

ВЪ

Въ первый , чрезъ всякіе при часа , пряжа какъ вы-  
сохнешь , опять помачивать , чтобъ вожженіе удержалось. Ежели въ немъ великая опасность будетъ , то кровь пустишь надлежитъ. Никогда же прежде семи дней въковъ не растворяшь , понеже не обыкновенный свѣтъ глазъ пронуть можетъ , и здѣлать , что подтѣкъ опять возвратится. Надобенъ тутъ покой и воздержность. Человѣку навзничъ лежать надобно такъ , чтобъ голова торчала. Кушанья въ первые дни никакого не употреблять , кромѣ жидкаго , чтобъ челюсти не работали. Въ послѣдніе дни смѣшавъ воду теплую съ спиртомъ горючимъ , и въ ней пряжу помачивать , выжимать и на глаза прикладывать.

## §. 1319.

Въ седмый день человѣка приподнять надобно , обвязку развязать , и глаза открыть въ темномъ мѣстѣ. Когда онъ видитъ , надобно , чтобъ закрывши окончины въ темнотѣ остался , дабы глазъ исподволь къ свѣту привыкалъ ; для такого случая также глазъ суконочкою чепыреугольною , зеленою или лазоревою краскою выкрашеною , хорошо прикрывать , но ее обвязкою не привязываютъ , да такъ приноравливаютъ , чтобъ предъ глазами висѣла.

## §. 1320.

Случиться можетъ , что во время этого лѣченія попорченная и съ мѣста своего пронувшаяся горошенка сквозь зѣницу въ то мѣсто , которое между плевою роговою и ягодкою имѣется , выскочитъ. Въ такомъ случаѣ велѣтъ болному на спинѣ и въ темнотѣ лежать ; такимъ способомъ горошенка опять сквозь зѣницу въ старое свое мѣсто возвратится , которую пошомъ опустивши въ глазъ иглу подъ сторону зѣницы

ош-

отвесить и придавить можно, чтобы въ низу осталась. Ежели же она спойнѣ, и боль причиняетъ и вожженіе, потчасъ плену роговую разрѣзать надобно, и горошенку по этому разрѣзу щипчиками или маленькимъ крючкомъ вонъ вытащить. Въ этомъ лѣченіи все сходственное быть должно съ тѣмъ, что я при лѣченіи Ипопѣ предложилъ (сб 321 до 323). Такосжъ лѣченіе употребить и тамъ, гдѣ изъ поврежденной жилы бѣющей, и жилы кровевозвращательной, великое множество крови въ глазъ выпечетъ, оную потчасъ, и покуда она вожженія не здѣлаетъ, вонъ взять надлежитъ (сб 321 до 323).

§. 1321.

Есть нѣкоторый подтѣлка родъ, который, по-сеже никакого лѣченія не пріемлетъ, довольно объ немъ только и объявить. Подтѣлкъ въ своемъ мѣстѣ бываетъ, но онъ будто трясуційся, всегда шатается. Это случается, ежели отростки рѣснишныя, о которыхъ выше я донесъ, что съ покровомъ горошинкинымъ соединены будутъ, въ нѣкоторомъ мѣстѣ разорваны, и отъ связи рѣснишной отдѣлены. Другой родъ есть, который не только шатается, но туда и сюда пакъ движется, что горошенка пущая, какова обыкновенно въ подтѣлкѣ бываетъ, пропивъ зѣницы спокчи, иногда видна, а иногда опять будто исчезаетъ. Глазъ бываетъ впуклый и не жестокъ, а зѣница широка, да и фигуру природную потеряла. Раждается сей порока родъ, ежели спелаяная влажность распаетъ, а на немъ сухая горошенка будетъ плавать. Этого никакимъ искусствомъ исправить не возможно.

ЧЕР-

# ЧЕРНАЯ ВОДА ВЪ ГЛАЗУ.

## Α Μ Α Υ Ρ Ω Σ Ι Σ.

### §. 1322.

Помрачаются иногда глаза безъ слипанія или подпѣлка, ежели жила чувствительная оптическая и оная оболочка, отъ которой зрѣнїя возможность происходитъ, безчувственны дѣлаются, или параличь получающъ. У нѣкоторыхъ зрѣнїе помаленьку и исподоволь тупѣетъ, и на послѣдокъ помрачается, а у другихъ оно незаметно отнимается, шѣ нечаянно и ослѣпающъ. Ежели оба глаза свѣтъ теряющъ, или старость заспигнетъ, приходишь *Mudraotis* (1307).

### §. 1323.

Этотъ глазной параличь отъ различныхъ причинъ дѣлается, на примѣръ ежели человекъ во пмѣ всякаго свѣта лишенъ будучи долгое время сидѣть будетъ, а послѣ въ глаза ему не заметно блистательный и сіяющій и всякое зрѣнїе пресѣкающій свѣтъ допустивъ, или ежели въ горячкѣ, огневицѣ, и въ самомъ ея стремленіи, кровь изъ ноги пущена бываетъ. Иногда эти пороки послѣ родимцовъ остаются; въ которыхъ случаяхъ всѣхъ никогда и ничего пособствовать мы не можемъ. Такую же слабость иногда дѣлаетъ мокрота, которою мозгъ и оптическія жилы чувствительныя угнетаются. Тѣхъ самыя въ нестроеніе приходящъ иногда отъ удара, или, ежели подагра или другая болѣзнь, худо и подавляющими вещами будетъ лѣчена. Противъ этихъ болѣзней, ежели онѣ въ глазу не весьма осѣлись, отвѣдавъ надлежишъ шѣ вещи, которыми худой матеріи выходъ вонъ дѣлается. Желѣзомъ каленымъ при-

прижигать надобно на верхушкѣ на головѣ, и за ушми, (938) Также очень хорошию, а особливо, при всѣхъ эшихъ, человѣку спящему, и ежели горячки никакой не будетъ, прикладывають на запылокѣ и на хребтѣ (937, 938). Болячку также, или пакѣ называемую заволоку [сетацеумѣ], эблать можно на запылкѣ (939); которыхъ болячекъ долго заживлять не надлежитъ.

§. 1324.

Но, ежели *араушотис* эблается послѣ великаго кровеченія, или послѣ соитія, которая чаще случается, или числомъ, или природою, въ разсужденіи лѣтѣ и тѣлеснаго состоянія, преизрядныя вспомошествованія тѣ, которыя отъ содержанія въ кушаньѣ и питье производяты. Давать должно похлѣбки мясныя наблюдая все то, что я индѣ (418) приказалъ. Также полезна спюдень и питье изъ орѣховъ Какао называемыхъ, приготовляемое. Послѣ блудобѣнія, и ежели послѣ кровеченія, опасаться не надлежитъ, чтобъ кровь опять не проскочила, давать также можно вино хорошее. Снаружи голову и швыи, также все тѣло, холстиною шероховатою прилѣжно и часто потирають надобно. Пособствуютъ также теплицы, или природныя, или чрезъ науку составленныя, ежели съ вышины на голову будутъ капать (1217).

§. 1325.

Иногда у тѣхъ, которые отъ этой слабости слѣпотствуютъ, никакихъ возгрей изъ носа нейдетъ. Этимъ пособствуютъ, паръ отъ воды теплой съ майбраномъ вареной, и подъ носъ поставляемой. Клейкая мокрота чхательными вонъ взяша быть можетъ.

Я Я Я

§. 1326.

## §. 1326.

Но ежели это будетъ отъ худыхъ болячекъ ежели ἔρπης [лѣтучій огонь] (919), шолуди [порриго] (962), короста [скабіесъ] и другіе болячекъ роды, снаружи прикладываемыми подавляющими удержаны будупъ, пособствовать могутъ лѣченія, которыми соки очищаются, и потъ производится. Другіе, которые отъ прелюбодѣйной болѣзни свѣтъ шеряли, оной опянь получали, когда меркуріемъ возбуждено было у нихъ слины теченіе. Это быть можетъ, ежели кости въ задней ямы глазной части, или ихъ плева, отъ вреда внутри здѣлавшагося, распухнутъ, такой вредъ онымъ лѣченіемъ искореняется.

## §. 1327.

ИППОКРАТЪ сказалъ, что отъ ранъ, на бровяхъ случающихся, свѣтъ или зрѣніе теряется. И ВАЛСАЛВА нѣкогда излѣчивъ могъ глазъ, который пѣпухъ индѣйской носомъ въ томъ мѣстѣ уключилъ, и человекъ потчасъ ослѣпъ. Онъ теръ бровь въ томъ мѣстѣ, гдѣ изъ ямы глазной жила чувствительная, вѣтвь жилы чувствительной глазобольной соспавляющая, выходилъ.

Жила чувствительная глазобольная [нервъ офталмикъ] есть первѣйшая вѣтвь изъ трехъ вѣтвей большихъ, на которыя жила чувствительная пятой пары раздѣляется, которая также, гдѣ эти жилы чувствительныя въ яму глазную идутъ, съ жилою чувствительною третьей пары соединяется. Отъ сего же жилы мышцы глазъ движущія, жилы чувствительныя и движенія силу получаютъ. Мышцы жилу чувствительную оптическию обвиваютъ, которую, ежели сжматся, сильная описнуть могутъ. Эта причина кажется онаго тиска отъ раны на брови происходящаго, которую ИППОКРАТЪ усмотрѣлъ. Ибо жилы чувствительныхъ межъ собою совокупленныхъ соединенія иногда превеликія движенія въ тѣхъ дѣлаютъ, что чханія засвидѣтельствуютъ, которые отъ тѣхъ оной маленькой жилочки чувствительной, отъ той же жилы чувствительной глазобольной



больной къ ноздрямъ принадлежащей , происходятъ. См. при мѣсто ИППОКРАТОВО въ Коакахъ пересм. Секц. 3 Ч. 391 Т 1. Изд. Лина. Стр. 573. ВАЛСАЛВУ дисер. Анаст. 2. И на нее пресл. МОРГАГНА эпистолу 17 и 18. Смеси программу , о ранахъ на вѣкахъ случающихся , для чего слѣпому дѣлають , въ который годъ 1741 Пинегирикъ медицинской назначилъ.

-----

## РАЗНОГЛАЗНОСТЬ.

### Σ Τ Ρ Α Β Ι Σ Μ Ο Σ.

§. 1328.

Разноглазныя [спрабонесъ] называются , у которыхъ глаза нарочно смотрятъ , и не ровно движутся. Сие иногда бываетъ отъ худой пріобычки , когда ребята зрѣніе долго да и часто на то , что съ боку лежатъ , или недалеко отъ глазъ находится , наискось ворочають. Или ежели одинъ глазъ , болѣзною какою нибудь пораженъ будучи , долго не будетъ закрытъ. Таковымъ свѣтъ и все , на что они смотрѣть желаютъ , съ противной стороны и гораздо далеко отъ нихъ отдавлены быть должны. Когда ребенокъ подроснетъ , надобно его опучать отъ пріобычки , другимъ , и первому противнымъ способомъ , къ чему гораздо много пособствовать то можетъ , ежели мальчикъ въ зеркалѣ долго и часомъ уставившись на свои собственные глаза смотрѣть , да еще , прямой прямымъ , косый косымъ глазомъ остро и долго разсуждать будетъ. Это кажется лучше того , что на глаза кладутъ и привязываютъ грецкихъ орѣховъ скорлупу , зѣлавши на нихъ съпереди противъ зѣницы дырочки , которыми также дѣлается , что глазъ , ежели человекъ имъ видѣть желаетъ , прямо вертѣться будетъ (\*).

Л я я 2

отрост-

отростки рѣсничные, которые изъ связки рѣсничной  
 производящъ, и которые горошенку съ его покровомъ  
 въ мѣстѣ своемъ содержатъ, а при томъ ежели на  
 то, что передъ нами есть, смотрящъ желаемъ, горо-  
 шенку къ плевѣ роговой приводящъ, понѣскольку  
 расстроены и силы своей лишены будучи. Ибо, слѣ-  
 дуящъ, чтобъ съ другой стороны, гдѣ волокна не  
 повреждены, чтобъ они спягивались и приводились,  
 и чтобъ самая горошенка на то мѣсто ворочалась и  
 приводилась. Отъ чего, ежели, такой человѣкъ ви-  
 дѣтъ, желаящъ то, что передъ нимъ лежищъ, зѣница съ  
 противной стороны наискось лежащей горошенки здѣ-  
 лается, глазъ мышками своими нѣсколько на ту  
 сторону завернуть надобно. Это, также, быть мо-  
 жетъ, ежели глазъ отъ другаго вреда, какъ напри-  
 мѣръ отъ болячекъ плевы роговой и отъ спрунья,  
 помрачается; чего ради онъ мышками на ту сторо-  
 ну вертится, которую человѣкъ лучше смотрящъ мо-  
 жетъ. Или, ежели все зрѣнїе потеряно, будетъ въ  
 темной водѣ [амбрози], отомъ будто неспараются,  
 и не движется. Ежели, неровности пухнутъ, что  
 у младенцевъ Аглинскою болѣзною или рахитидомъ  
 немоществующихъ часто случается, и особливо кость  
 основная, сквозь которой дыры, жилы чувствительныя  
 къ глазамъ идущъ обыкновенно, сплскиваются жилы чув-  
 ствительныя къ мышкамъ принадлежащія, и въ нестро-  
 енїе приходящъ. Которое жилъ чувствительныхъ не-  
 строенїе отъ другихъ также причинъ дѣлаться мо-  
 жетъ. Однакожъ наибольше глаза такъ косятся,  
 ежели произшедшимъ отъ раны, или отъ воспы и  
 другихъ случаевъ великимъ гноемъ, мышцы поврежда-  
 ются и скорчятся. У нѣкоторыхъ это несчастїе отъ ро-  
 жденія

жденія бываетъ, у которыхъ во время родовъ повивальница глазъ портишь. У другихъ оно нещасное наследственное бываетъ, у которыхъ родители также косы и разноглазы будутъ. Ежели отъ такихъ причинъ эта слабость останется, то ей ни чрезъ какое стараніе пособить не возможно. Однакожъ та разноглазность безобразнѣе бываетъ, которая случается небреженіемъ щасья человѣческаго (\*\*).

(\*) Смотр. у БАРТИША ч 2 стр: 13.

(\*\*) Смотр. у ПОРТЕРФЕЛДА въ те: Медиаль Эссейс Вол. 3 прим. 12 стр. 106.

~~~~~

МОЧИТЬСЯ ТРУДНО.

УРИНЕ РЕДЕНДЕ ДИФФИКУЛТАСЬ.

§. 1329.

Прихожу я къ тому, что въ протокахъ уринныхъ и въ пузырь случается. Моча или урина иногда неидетъ, чему многія причины есть. Иногда порокъ бываетъ въ почкахъ или въ мочешочникахъ, во которыхъ моча въ пузырь перетекаетъ. Оно же по болѣзни узнать можно, которая боль въ поясницѣ и надъ луною будетъ продолжаться, приходитъ также и рвога или блеваніе. А мѣсто подъ костями гребенными, которыхъ пузырь берегутъ, ни пухнетъ, ни болитъ. Этакимъ припадкомъ медикамъ лечитъ должно. Гдѣ же пузырь отъ своей мокроты напругается, въ томъ мѣстѣ подъ гребнемъ и опухоль и боль бываетъ. Опухоль также на перстѣ попадаетъ у мужчинъ, ежели въ задній проходъ его всунешь. Гдѣ очень напругенъ будетъ пузырь, вожденіе съ опасностью. Аниопова огня дѣлается, и больной между

Я я я 3 3

бѣдъ.

бѣдспвенными мученіями ѿспву и желчь ртомъ выble-
ываетъ. Иногда моча въ шѣйкѣ пузыряной проходъ
себѣ дѣлаетъ, и скрозь болячку, отъ Анпонова огня
или отъ гноя, здѣлавшуюся выходитъ.

§. 1330.

Ежели пузырь вожженіе имѣтъ будетъ, что по
боли, по горячкѣ и по другимъ признакамъ (1329)
знать можно, потчасъ кровь пуспипъ изъ руки, и
давать лѣкарства слабительныя [леніэнція]. Пособ-
ствуетъ декоктъ изъ корня алпейнаго, изъ яменю;
изъ цвѣтовъ вербасковыхъ, папаверисъ реадосъ; или
здѣлать можно изъ семенъ маковыхъ и мигдальныхъ
сокъ, къ которымъ всѣмъ понемножку селипры при-
бавливается. Человѣка также въ баню сажать, или
брюхо его масломъ укропнымъ помазывать можно.
Но баня вредна бываетъ, гдѣ вожженіе уже усили-
лось, и на шуляпахъ Анпонова огня опасаться надоб-
но. Да и декокты оныя неполезны, гдѣ пузырь уже
гораздо напряженъ. Ежели же зла эими преодолѣть
не возможно, надлежитъ мочу рукою смягчить, или
впустивши въ пропокъ уринной и въ пузырь трубоч-
ку, которую Греки *катеѳѣра* называютъ, или, ежели
этой вправить не возможно, здѣлавши прорѣзъ и про-
коловши снаружи пузырь. О которыхъ лѣченіяхъ не
умедля объявлю.

§. 1331.

Не можетъ также моча печь, ежели ся путь
сплющился, а то бываетъ въ старости, или, ежели
мозгъ костный, который въ хребетной кости про-
ходитъ, и отъ котораго жилы чувствительныя къ
пузырю принадлежатъ, поврежденъ, и жилы чувстви-
тельные

тельные въ нестроение пришли (*). Въ этомъ случаѣ часто требуется , сколько разъ моча будетъ понуждаема , только ее вспавивъ въ пузырь трубочку , выпускать. Изъ этого случая почти всегда происходитъ , что послѣ у человека моча безъ хотѣнія его течетъ. Вспоможения такогожъ иногда требуютъ шѣ , у кого пузырь гораздо надутъ , понеже долго мочу задерживаютъ , и отъ того пузырьныя плевы разслаблы бывающъ. Трубочку въ пузырь оставлять можно , и въ нее также пускать декоктъ , который въ пузырь нѣкоторое чувство возбудить можетъ. Съ ячменемъ варятъ въ водѣ траву иссопъ маррубіумъ , маїранъ , руту , алхимиллу , и прибавливаютъ осмую часть воды ранной. Гдѣ пузырь опять къ обыкновенію своему и въ первую силу придетъ , что иногда по прошествіи многихъ дней случается , трубочку вонъ взять. Надлежитъ же человека уговаривать , чтобъ онъ почаще ссалъ , и чтобъ пузырь отъ множества мочи въ немъ скопившейся опять не раздулся , и не разслабъ (**).

(*) Мочи задержание отъ свинутыхъ позвонковъ полныхныхъ смотри въ запискахъ Натур. Курса дес. 3 л. 4 прим. 126 стр. 257.

(**) Катетеръ , гдѣ въ пузырь оставляется , ч езъ всѣе семидней вонъ вынимать и вычищать должно ; понеже онъ отъ той матеріи , которая отъ ссака опсѣдаетъ и къ нему прилипаетъ , широкое дѣлается , и протокъ уринной сдерживать можетъ. Также къ тому способу катетеры гибкіе , которые ниже опишу , или , которые изъ свинцу дѣланы , нѣсколько закарючены , и не очень длинны.

§. 1332.

Чрезъ примѣчаніе открылось , что какъ разслабнетъ и раздуется пузырь , иногда надъ костями гребенными опухоль бываетъ , хотя моча кажется идетъ

Эта-

Этакой случай нѣкоторые заставилъ думать, что тамъ гной дѣлается, которые припомъ къ отворенію опухоли совѣты свой склонить не усумнѣлись. Когда же на послѣдокъ трубочку въ пузырь прямо поставили, великое множество мочи вытекло и вся опухоль опала. Не трудно чирей безверхушешный отъ опухоли, которая изъ приподнявшагося пузыря дѣлается, разпознавать. Чирей безверхушешный же еще бываетъ, или на срединѣ мягче, но опухоль эта со всѣхъ сторонъ равна быть должна.

(*) См. три ктѣ всѣхъ лучше о трудности испускать мочу, талъ Франц. КОЛОТЬ де л' Операционъ де ла Талъ стр. 264. Снеси де ла ТАЙН в нотахъ на ДЮНИСИЕРУ книгу стр. 202. Если пузырь гораздо напрягается, дѣлается можетъ кила пузырьная, которой §. 793, 850.

§. 1333.

Мочѣ также натурально испускаться препятствуютъ нѣкоторыя вещи, внутри протокъ закладывающія. Иногда кровавыя заскляя, или гноевасыя, изъ почекъ низходятъ. Случиться можетъ, что кровь въ пузырь въ движеніе придетъ, и послѣ работныхъ надсяданій и послѣ великихъ болей вонъ пойдетъ, которая, такъ по пути уринному вышедши, на червякъ или на глисту будетъ походить (*). Рѣдко другіе и подлинныя черви эпортъ протокъ запираютъ (**). Гораздо чаще камешокъ выходитъ. Во всѣхъ сихъ случаяхъ трубочку снавить надлежитъ, и то, что препятствуетъ, прочь отворачивать должно.

(*) Смотри Записк. Нат. кур. Дес. 1 А. 6 Прим. 46 стр. 88.

(**) Смотри Ю. РОДІА Примѣч. Мед. Сто 3 Прим. 36, стр. 157. Запис. Натур. Ку. Дес. 2 А. 1, Прим. 77, стр. 183.

§. 1334.

§. 1334.

Случай гораздо труднѣе бываетъ , ежели въ пузырьѣ различнородныя опухоли повывростають . Съе по большей части внутрь пузыря случается , ежели пузырь болячки будетъ имѣть , или шероховатымъ камнемъ , также лѣкарствами сильными , мочу гонящими , изнуряемъ будетъ . Опухоли иногда жестки бываютъ , не болятъ , другія мягки , гнилому мясу подобны , которыя отъ прикосновенія болятъ . И эти пухлячки прешаествуютъ , чтобъ пузырь зажимался , и мочу выжималъ . Сего порока лѣченіе такое : Пузырь такимъ способомъ , какимъ у шѣхъ , коимъ камень вынимають ; прорѣзываютъ ; и оныя бугорки лѣкарствами легонькими , которые гной производятъ , въ разрѣзъ пускаючи , въ гной обращаютъ (*).

(*) Смолр. у КОЛОТА стр. 274 , который также показываетъ, что гнилое мясо и желдыри съ наружи на пугзырь наросли , но шомъ брѣзны родъ никакимъ способомъ лѣченъ быть не можетъ.

§. 1335.

Самый простонародный порокъ есть , когда въ пропукѣ уринномѣ шишки растущѣ , которые пропукѣ оный забираютъ , и не даютъ ни мочѣ испускаться , ни трубочки поставить. Человѣку часто будетъ хотѣться сдѣлать , но очень трудно , она по капелькѣ съ превеликою болью испускается. Эпоть случай и крайняя она уринная трудность многихъ обманывала , и заставляла думать , что въ пуши уринномѣ изъ гнилова мяса родились мяшишка или мясныя бородавки , а по для того отъ правды не далеко бытъ казалось , что эшою болѣзнію тѣмъ предъ пропчими спрадашъ было надобно , у которыхъ чрезъ долгое время гносовастый полугной (сангъсѣ) изъ уда шелъ , и у которыхъ

E e e

рыхъ эта зловерная и блудоѣйная гоноррея неприличными и подавляющими лѣкарствами была лѣчена. Того ради, на эти замахи или догадки склонясь, начали помочи. требовавшъ отъ лѣкарствъ бѣдкихъ и прижигательныхъ, которыя въ проходѣ уринной, скрозь трубочку серебряную, къ тому устросенную, палочкою, или на воцанку наливши, впускали, чпобъ волдырьки оныя сбѣли (*). Но не рѣдко лѣченіе не благополучно. оканчивалось, и чрѣзъ употребленіе оныхъ сильныхъ лѣкарствъ все избѣдено, да сверхъ того тяжкія вожденія дѣлались. Понеже по вскрытіи пѣль мерпвыхъ явилось то, что уринной путь заперало, негнилое мясо или бородавчика мясная, но чаще мозольность и струпь отъ худой болячки, послѣ гонорреи, ославшійся (**). Иногда распухаетъ оное высоковатое мѣсто въ сволѣ, которое мясцомъ сѣменнымъ, или головою пѣпушьею называютъ, гдѣ и пузырьки сѣменные и желѣза предстательная скрозь маленькія трубочки выходъ имѣютъ (***). Временемъ же другіе пути, особливо оныя, которые изъ желѣзъ пѣхъ, которыя Ковперъ нарисовалъ, и возгривыми называлъ, проиходятъ, отъ худой мащери распухаютъ, и понеже къ проходу уринному принадлежатъ, то оный запираютъ †. Также и по правда, что нѣкоторые написали, то есть разслабѣетъ внутри протока уриннаго внутренняя плева, и жилы крововозвращательныя распухаютъ и уловасты дѣлаются ††. Однакожъ случится можетъ, что, какое мѣсто въ древнія времена у многихъ было, нынѣ уже чуть не отъ всѣхъ брошено, то есть ежели болячки, въ протокѣ уринномъ будучъ имѣются, то гнилое мясо наростетъ, или другія родятся шишечки

кн

ки, которыя лѣкарствѣ пребываютъ, къ удержанію и сѣяденію мяса гнилаго способныхъ †††.

(*) Уже ГАЛЕНЪ въ Кн. 1 о мѣстахъ уязвленныхъ гл. 1 Т 7 издан. ХАРЪЕРІЕВА стр. 381 три причины наипаче описываетъ, которыми обыкновенно путь уринной запирается. Иногда крѣпость самой (ствѣла) распухаетъ, что никакого проходу не остается, и что дѣлается или отъ ожоженія, или отъ скирра, или отъ чирья безверхушешнаго, и отъ иной опухоли. Иногда мясо изъ болячки мозолистое тѣло (спрунѣ) изъ густой и недвижной мокроты родится. А иногда лутъ застилаютъ, или камень, или запеклая кровь, или гной, или густая и недвижимая мокрота. Сказываетъ, что онъ видѣлъ нѣкогда человѣка, у котораго мясо въ стѣволѣ выросло, какъ каемерѣ пустили, прорвалось такъ, что съ мочкою кровавое и мясное пошло. Когда же въ шестомъ надѣсяти лѣтѣ въ Европу пришла блудодѣйной болѣзни зараза, изъ Индіи западной произшедшая, и она пространно распространилась, и почти всю Европу завладѣла, то гораздо многіе люди отъ лѣчащихъ помочи отъ сей болѣзни просить начали. Изъ нихъ многіе околополви тѣ лѣка того ополчились, и между ними первѣйше АНДРЕЙ ЛАКУНА Сегоменской, и АЛФОНСЪ ФЕРРІЙ, изъ нихъ первый 1551 году въ Римѣ, другой 1553 году въ Люгдунѣ, съ особливѣмъ при лѣжаніемъ объ этомъ мяшишкѣ писали. Они же, и почти всѣ имѣ пользовавшіе, лѣкарства бѣкія съ воскомъ смѣшанныя въ проходѣ уринной пускать велѣли. Смотри различныхъ лѣкарствъ стѣ авто-ровъ употребляемыхъ составленія, у ФРАНЦИСКА РОНКАЛЛА, котораго новое изобрѣтеніе еще придаѣлъ. Понеже предложилъ трубочку гибкую или, какъ называютъ, чернишкѣ [вермикуляремъ] изъ серебра зѣланную, и обвязкою тоненькою шелковою на ней пришитою, обвязанную. Онъ объявляетъ, что чрезъ посредство этой трубочки, къ мяшишкѣ лучше прикладывать лѣкарства можно, также и самую трубочку, ежели нужда будетъ претовати, чрезъ нѣсколько дней въ проходѣ уринномъ и въ пузырь оставить можно. Смотри ФРАНЦИСКА РОНКАЛЛИ Экзерцишац. Мед. Хирург. о новомъ способѣ, какъ истрѣблять мяшишка [карункуласъ] и лѣчити фистулы стѣвѣла мочеиспускательнаго въ Бриксіи 1720 году.

(**) Въ тѣлѣ мертвомъ человѣческомъ, который этою болѣзнію чрезъ долгое время страдалъ, нашелъ ИВАНЪ КОНРАТЪ, БРУН-НЕРЪ, не что другое, только на срединѣ стѣвѣла мочеиспускательный стѣсненный и сморщенный, будто бы отъ ожоги, около желѣвъ предстательныхъ удивительный струной отъ болячекъ древнихъ, вѣстарѣлыхъ, а нынѣ излѣченныхъ, видѣ былъ видимый, и край-

(***) Сие многими примѣчаніями утврждають АНТОНІЙ БЕНЕВОЛИ стр. 19 и ГИРОЛАМО МАРИНИ Праштика делле Опера-іони ди Хирургіа гл. 4 стр. 58.

(ff) Э по защищаетъ ГАРЕНЖОТЬ дес' Операціонъ Т. 2 стр. 21.

(†††) Сте собственными своими и другихъ примѣчаніями утвер-
ждаетъ ЮАННЪ АДАМЪ ГЕНСЕЛІЙ въ записк. Наш. Кур. Сто 6
Прим. 84 стр. 349. Съ нимъ согласенъ и пресл. АСТРУКЪ о бо-
лѣзни блудотѣйной, кн. 3 гл. 4 стр. 310.

5. 1336.

Отъ этихъ же примѣчаній новый способъ въ леченіи промышлять было надобно. Неспособны шунты и мочѣ прудносить приумножаютъ всѣ вещи осприя , которыя ртомъ употребляючи , мочу гднютъ. Ибо и эти и всѣ , которыя свѣдаютъ и прижигаютъ , въ проходѣ уринной различными способами , на такой конецъ выпускаемая , чтобъ гнилое мясо и мясныя боро-

бородавочки выѣдали , весьма худы , онѣ зло возбуждать могутъ , и произведши вожженіе , зажигають . Въ проходѣ уринной спавить надобно вощаночки небольшие или палочки , которыя изъ полошна тонкаго , изъ холстинки поненькой извѣстнымъ образомъ скатанныя дѣлаются , по Францусски бужіесъ . Эти не должны быть , ни очень толсты , ни очень тонки , а на концѣ нѣсколько потонѣ . Надобно же съ начала такія палочки поненькія употреблять , а послѣ нѣсколько потолще . Ежели уринной путь такъ сжатъ , что она никакъ печь не можетъ , не переставать , но надобно отвѣдывать , употребляючи спруну лютейшую изъ кишки скотской зѣланную . Гдѣ тонкая спруна вернуться въ проходѣ уринной можетъ , послѣ того нѣсколько потолще употребить , и послѣ палочку вставить должно . Спруны же и палочки помазывать лѣкарствами легонькими , саломъ расплненнымъ , елеемъ , масломъ коровымъ несоленнымъ , и ежели болячка шупъ будетъ , прибавливать къ нимъ умѣренно подавляющія , и различными смѣшеніями услаждать . Сіе же все въ проходѣ уринномъ держать надобно , что за весьма нужное признавается , ежели онѣ очень тѣснѣ , и мозоль , копорая въ немъ выросла , жестка будетъ . Понеже сими палочками все то , что препящствуетъ , и придавливается , и размягчивается , чпобъ мокрота могла протекать . Человѣкъ , когда ему сцасть похочется , палочку вынуть долженъ , и опяшь мастью помазавши вставить , а припомъ связкою около брюха обвязываемою подвязать (*) . Помочь также дѣлаетъ баня , чпобъ человѣкъ часто въ водѣ теплой съ шравами мягчительную силу имѣющими сидѣлъ .

Е е е з

(*)

(*) Въ этомъ лѣченіи пущь первый вступилъ кажется Медикъ , котораго примѣчанія къ РИВЕРІЕВЫМЪ дѣламъ присовокуплены , прим. 22 стр. 695. Но снѣ палочку изъ свинцу здѣланную употреблялъ , которою уринной пущь разширивалъ. Палочки оныя свинцовыя предпочитаетъ предъ тѣми восковыми АСТРУКЦІЙ на поман. мѣст. кн. 3 гл. 4 стр. 320. Онъ великъ , съ начала тонѣхонкія , а потомъ потолще , елеемъ помазавши , вставлялъ , и такъ пущь отворялъ.

§. 1337.

Есть еще нѣкоторыя причины , которыя не даютъ мочѣ ити. То случается женщинамъ беременнымъ , ежели внутри отъ рождаемаго , не такъ дежащаго , уринной пущь припискивается. И этотъ случай онаго лѣченія скрозь трубочку серебряную прѣбуетъ. Этому пороку не трудно пособствовать у мужчинъ , ежели на низѣ у него нѣтъ , и заднепроходная кишка каломъ жесткимъ набита. Иногда великая и несносная боль , которою шѣ люди мучатся , у которыхъ почечуй отъ вожженія пухнетъ , по приключеніи судорогъ , уринной пущь запираютъ. Этимъ такія вспоможенія прѣбуются , которыя прописъ сихъ опухолей инѣ я предложилъ (1015 , 1016). Также чирьи безверхушешныя бывають отъ различныхъ причинъ между проходами или на таку [инѣ перинео] шокколо задняго прохода , съ которыми , ежели не будутъ застарѣлы , великая боль и сильное вожженіе обыкновенно случаются (съ 990 по 992). Случай бѣдспвенѣ бываетъ , ежели такіе чирьи безверхушешныя дорогу въ пузырь найдутъ , что много гною съ мочею выходить будетъ. Изъ нихъ гной вызывать должно , примѣчая все , что выше (съ 993 до 996) я приказалъ. А между тѣмъ , ежели отъ трудности уринной бѣда будетъ слѣдовать , то также трубочку серебряную употребить можно,

КА.

КАӨЕТЕРИСМЪ.

КАӨЕТНРНΣМОΣ.

§. 1338.

Ежели же въ сихъ или другихъ случаяхъ воспребуется рукою, и опущенною въ пузырь серебряною или мѣдною трубкою, каөетеръ называемою, мочу въ движеніе привести, тому, кто лѣтитъ будещъ, надлежитъ имѣть оныхъ трубочекъ много, чтобъ ко всякому тѣлу, большому и малому, были пригодны. Мущинамъ закорюченныя и длинныя, а женщинамъ прямыя и короткія способны. Должны онѣ быть гладки, не очень толсты, и не очень тонки. На концѣ, которымъ въ пузырь впускаются, запаяны и шупы, съ обѣихъ сторонъ по дирочкѣ имѣючи. Имѣть также изъ тогоже металла проволоку, которая въ нихъ всавывается, чтобъ можно было оппихнуть то, что бываеъ въ трубчѣ застряеъ.

§. 1339.

Другіе трубчѣкѣ роды имѣются, которыя уже давно ПЕТРЪ ФРАНКЪ нарисовалъ (*). На концѣ не такъ какъ первыя прорѣзаны, но въ низу отворены въ концѣ. Ибо случиться можетъ, что въ пупиуринномъ оная внутренняя оболочка или расслабла, или вожжена будучи, распухнѣтъ, или она, ежели оныя каөетеры опускаются и всавываются, оными дирочками захватившя, и сильно досажденіе получишъ. Того ради въ сихъ, отъ ФРАНКА изобрѣтенныхъ, на самомъ концѣ приделана головочка, которая къ оной серебряной проволоцѣ, сквозь трубчѣку продѣвной, такъ принаяна и припоровлена, чтобъ ее запл-

запиралъ, и чтобъ трубочкинъ конецъ былъ запертъ, и никакой шероховости не имѣлъ. Гдѣ эпотъ катетера родъ въ пузырь пускать надлежитъ, проволока она свинцовая съ головочкою натягивается, и трубочка запирается. Когда же въ пузырь придетъ, проволока съ головкою скрозь трубочку внутрь всавывается, чтобъ моча скрозь ее вышечь могла.

(*) Смотри. Третье десяти ерни глав. 31 стр. 115, ГАРЕНЖОТЪ десяти инструмента. Т. 1. Гл. 8 стр. 259 и фиг. стр. 278.

§. 1340.

Также въ оныхъ катетерахъ или трубочкахъ, которыя для женщинъ здѣланы, нѣчто перемѣнено. Понеже имѣются, на которыхъ жолобокъ здѣланъ, по которому, ежели трубочка въ пузырь будетъ вправлена, впущена быть можетъ и спичка, или ежели нужда попроситъ, разрываніемъ мочи путь отворитъ ножечекъ (*).

(*) Смотри изображение въ ГЕЙСТЕРОВОЙ Хирургіи Таб. 33 фиг. 7 стр. 1016.

§. 1341.

Безъ затрудненія у женщинъ, у которыхъ уринной путь коротокъ и прямъ, катетеръ въ пузырь вставлялся. Тоже самое у мужчинъ, у которыхъ путь уринной и длиннее и кривое, а при томъ не рѣдко внутри отъ вожженія и другихъ случаевъ (1335) распухлый, или сморщенный больше трудности имѣетъ. Ибо крайняя бѣда бываетъ, ежели катетеръ насильно вправляется, чтобъ имъ пути уриннаго, или пузыря не повредить, отъ котораго случая великое вожженіе и Аншонова огня опасность здѣлаться можетъ. Сей способъ, какъ впускать катетеръ, только чрезъ одно

одно употребленіе познавается , чего ради учащіеся въ немъ дѣла прилѣжно упражнятыя должны , какъ надъ тѣлами мертвыми , такъ у живыхъ людей , чтобъ чрезъ упражненіе облегченіе себѣ пріобрѣсти могли.

§. 1342.

Два способа имѣются , какъ катетеръ впускать ; изъ нихъ перваго только чрезъ одно частное употребленіе и упражненіе учимся , въ немъ больше опасности находится , нежели въ другомъ , хотя меньшее затрудненіе лѣчащему , кажется , дѣлаетъ. Кпо по первому поступать хочешь , шопѣ человека навзничъ , на скамейку или на кровать кладешь , лѣкаръ одною рукою потку мужескую беретъ , другою трубочку , слесемъ помазанную , въ пупъ уринной впускаетъ , такъ , что горбатая ея сторона къ части наддѣпородоудной обвернувшись будетъ. Трубочку легоньку подавливая въ даль подвигаетъ , когда же до шейки пузырьной дойдетъ , потку нѣсколько побольше на трубочку понапянетъ , а трубочкину рукоятку , которая уже къ мѣсту между проходному оборочена была , такъ наклоняетъ , и будто кругомъ оборачиваетъ , чтобъ она противъ пупа здѣлалась , которыми движеніемъ трубочкинъ конецъ въ пузырь приходитъ.

§. 1343.

Другой же способъ лѣченія таковъ есть. Положивши , какъ сказано , человека , трубочка такъ впускается , что рукоятка ея къ пупку придвинется , и чтобъ часть горбатая къ мѣсту между проходному человеческому оборочена была. Когда , напянувши

V V V

так-

также попку, къ шбйкб пузырной дойдешъ, трубочку сб поткою напередъ наклоненную въ пузырь вправляющб.

§. 1344.

Когда такб трубочка въ пузырь придетб, тб изб нес проволока выдергивается, или въ другомб родб, которая въ низу заперта, далб просавывается проволока сб головочкою оною, чшобб моча скрозъ трубочку выпсчь могла. Ежели же для найденія камня катетерб впущенб будетб, шо его покурдюзнбе поворачивать надобно, чшобб камень или прикасаніемб, или, также, ежели катетерб обб него стучипб, ушами бы слышно было. Гдб моча испражнится, трубочку вонб вынимаютб, ежели же случай требуетб, чшобб ее въ пузырьб оставить, опустить надобно другую гибкую изб проволоки серебряной свитую, особеннымб мастерствомб здбланную, которую къ брюху обвязкою и привязать.

ПРОКАЛЫВАНІЕ ПУЗЫРЯ.

ПАЦИЕНТЕЗИСЪ ВЕЗИДЪ.

§. 1345.

Иногда же шупб только худаго бываетб, что онаго симб способомб преодолбть не можно, но приуждены бываемб, чшобб моча покб свой вонб имбла, пузырь инструментомб сб наружи опровергать. Того ради охотники лбтить мясо прорбзываютб ножикомб обоюднымб, въ томб мбстб, гдб разрбздблается, ежели камень способомб, который сб приборомб великимб называютб, о кошоромб ниже скажу, вынимать
бы

бываеѣь надобно. Въ разрѣзѣь вкладываютъ трубочку нѣсколко толстую серебряную, и оную такъ долго въ разрѣзѣь оставляютъ, и къ брюху привязываютъ, покуда то, что въ пупи уршиномъ, засѣло, не очистишся. Трубочку хорошо лѣнпечкою шелковою воцанною обвертываютъ. Предъ прочими способнѣйшія трубки серебряныя гибкія, или свинцовыя (1344).

§. 1346.

А понеже эѣѣѣь разрѣзѣь не легко сходится, и часто болячка или фистула обыкновенно оспаеѣься, сквозь которую моча течеѣь, нѣкоторые иглу или инструментъ употребляютъ, пому подобный, которымъ вода выпускаеѣься у страдающихъ водяною болѣзнію (756), который острѣь будучи трубочку серебряную плотно приѣьланную имѣеѣь [прокарѣь]. Надобно же, чтобъ инструментъ и длиненъ и нѣсколко толстенѣь былъ. Онъ же въ другомъ и въ помѣь мѣстѣь впускаеѣься, въ которомъ пузырь опворяютъ тѣь, которые камень рѣзаніемъ, называемымъ боковымъ, вынимаѣь обыкли, который способъ благонадежнѣйшимъ кажется, понеже разрѣзѣь легче заживаеѣь (*) , что ниже опишу.

(*) Чѣѣѣь тоѣь, кто лѣчить будетъ, знать могъ, пришлеѣь ли инструментъ въ пузырь. ДЕНИСИЙ въ Примѣч. Хирург. о камнѣ Таб. 11. оный переѣьнулъ, и такъ зѣьблалъ, что какъ скоро конецъ ножика въ пузырь пройдетъ, сквозь трубочку серебряную, которая на верхнемъ и нижнемъ концѣь много дырочекъ имѣеѣь, моча вытечеѣь. Нѣкоторые инструментъ или иглу употребляютъ, у которой на трубочкѣь жолобокъ имѣеѣься. Ибо иногда разрѣзѣь мѣѣь разрѣзывать надобно бываеѣь, и тогда въ оной жолобокъ хорошо ножичекъ вкладывать и рану разрѣзывать можно, покуда просторна зѣьблаетъся.

§. 1347.

Послѣь же какъ за нѣсколько лѣѣь, нѣкоторые надъ костымъ гребенными пузырь прорѣьзываютъ, и

V v v 2

ка-

камень такимъ способѣмъ , какой нѣкогда ПЕТРЪ ФРАНКЪ предложилъ , вынимать оныя установили , многими оное мѣсто предъ другими способѣйшими показалось , которые инструменѣмъ тому во всемъ подобный , каковымъ вода у спрадующихъ водяною болѣзнію выпускается , надъ костями гребенными , наискось , и къ шѣлкѣ пузырьной , всавываютъ. Понеже прямо прокалывать не должно , чтобъ брюшной плевъ [перитонеумъ] , которая на верхнемъ концѣ пузыря лежишь , шуще не ранишь. Такъ же шипъ разрѣзомъ моча вонъ выпускаетъ. А понеже рана не легко заживаетъ , и отъ мочы , ежели въ нее будетъ выпскашь , худыя болячки въ плевѣ оной клѣпчатой , которая подъ брюшиною находится , дѣлаются , надлежишь человѣку навзничъ лежать. Но ежели то можно здѣлать чрезъ природной путь уринной , то въ пузырь опустить должно трубочку , чтобъ чрезъ нее моча выпскала. Не такъ часно случается можеть , чтобъ у женщины путь уринной такъ запырался , и то , что застряло , иначе прогнать было не возможно. Но въ томъ случаѣ такимъ способѣмъ опворить можно пузырь. У мужчинъ гораздо безопаснѣе то быть можеть , прорѣзавши то мѣсто , сквозь которое камень , какъ называютъ , рѣзаньемъ боковымъ вынимася.

§. 1348.

Выпустивши мочу , и все то , что внутри препятствовало , опврашивши , рану заживашъ надобно. Много пособствуетъ шущъ , ежели больной зжавши , и одну съ другою ноги связавши лежать будетъ , и ежели трубочка въ натуральномъ проходѣ уринномъ оставлена будетъ , чтобъ сквозь нее моча выходила.

про-

ПРОРЪЗЫВАНІЕ МѢСТА МЕЖДУ ПРОХОДАМИ или ПРОРЪЗЫВАНІЕ ТАКА.

С Е К Ц І О П Е Р И Н Е И.

§. 1349.

Иногда въ мѣстѣ между проходами или въ пакѣ чирьи безверхушешные бывають , а по обыкновенно случается , когда небольшой камушекъ въ томѣ мѣстѣ будещъ стоятъ , и части бередишь , и день отъ дня отъ матеріи , которая отъ мочи отсыдаещъ , выроспаетъ , или , что очень часто случается , ежели гоноррея ядовитая , чрезъ приниманіе лѣкарствъ горячихъ , острыхъ и проносныхъ , виномъ , блудомъ , яніемъ возбуждена , или подавляющими удержана будещъ. Сіе ежели случится , чю по знанію гноспроизводныхъ примѣтъ видѣшь можно , съ первоначалѣ трудъ приложить должно , чюбѣ вожденіе было отъращено , понеже пакіе чирьи безверхушешные трудно въ здорое приходятъ. Кровь пускити надобно , на низѣ слабити клещерами , и давати все , что отъ вожденія пособствуеъ. Ежели же сверхѣ чаяніа опухоль къ гною склонится , то снаружи прикладывати вещи , копорыя мягчатъ , и гной въ созрѣніе приводятъ. Гной же прорѣзавши опухоль поранѣе вонъ выпустити , чюбѣ болячка внутри находящаяся не распространилась , и на многія нѣдра не раздѣлилась. Ежели вожденіе отъ камня произойдещъ , камень вытащити надобно , а впротчемъ болячку очистиши , и примѣчая все то , о чемъ шотчасъ объявлю , заживити должно.

V v v 3

§ 1350

§. 1350.

Гораздо часто въ пущи уринномъ отъ чирьевъ безверхушешныхъ, внутри прорывающихся, болячки оспаюся и фистулы, которыя также родяся, ежели противъ оныхъ пакъ называемыхъ мясешекъ (1335) употребляемы бывають прижигательныя лѣкарства, или противъ гонорреи осприя; также мозольности родяся, или камушки пристають, которые проходъ уринной запирають. И въ такомъ случаѣ, ежели инымъ способомъ пособить не возможно, иногда принуждены бываемъ мѣсто между проходами прорѣзывать. Однако къ этому никому слома голову сѣвннть не надлежитъ, понеже не мало путей сыщется такого, которое затрудненіе въ лѣченіи здѣлать можеть.

§. 1351.

Гдѣ проходъ уринной прорѣзывать надобно, тамъ въ него, ежели путь отворенъ, сперва вставляється каемеръ жолобокъ на себѣ имѣющій, и по которому въ лѣченіи камня пузырь прорѣзывается. Ежели же онаго инструмента впустишь не возможно, то дѣло здѣлать надобно ножичкомъ, или въ то мѣсто, прорѣзавъ напередъ кожу, вонзять надлежитъ оный инструменти, которымъ у страдающихъ водяною болѣзнію воду выпускають, или иглу триугольную, у которой на трубчкѣ жолобъ имѣется (1346). Ибо по этому, выдернувши вонъ инструменти, ножичекъ впустишь, и разрѣвъ поширъ растворишь можно.

§. 1352.

Когда путь пакъ будетъ здѣланъ, то ко всякому пороку особенное лѣченіе употребить надлежитъ.

Ежели

Ежели камень будетъ въ проходѣ стоятъ , оный выпещить должно. Ежели болячки или гнусныя или старыя , мозолистыя или дикія наросли , въ пупи уринномѣ будутъ , или ежели нѣчто жесткое или шероховатое тамъ родилось , оное , что осыпалось , очистишь , а жесткое умягчишь , и какъ ножикомъ , такъ лѣкарствами , искоренишь надлежитъ. Лѣкарства лучше къ ранѣ прикладываются , ежели тряпочка расщипанная , у которой край въ ниточки расщипанъ , спичкою въ разрѣзъ вдѣнется , и скрозь натуральную дыру въ плѣшку продѣнется. Понеже тряпочка , которая лѣкарствомъ для счяденія мозольности и очищенія болячки намазывается , въ пупи уринномѣ оспавляется , и подважды въ день пересдѣргивается , чтобъ часточка новымъ лѣкарствомъ намазанная на болное мѣсто приходила. Между лѣкарствами почти наилучшее есть масъ Арцесъ , къ которому нѣсколько ртути дульцисъ примѣшивается. Ежели же болячки или фиспулы въ многія нѣдра раздѣляясь , то надобно всѣхъ ихъ поразрѣзать. Мозольность очень хорошо ножикомъ или со всѣмъ вырѣзывается , или мѣлко надрѣзывается.

§6. 1353.

Имѣются еще другія примѣчанія надобныя. Болячки , которыя отъ гонорреи въ пупи уринномѣ оспаются , иногда пропадаютъ , ежели снаружи кожу ртутемъ и онымъ сочиненіемъ , которое Неаполипанскимъ называютъ , на мѣстѣ междупроходномъ , мажутъ. Ежели что зло зашарѣло , и болячка мозолиста , и много нѣдръ , которыя глубоко прошли , имѣетъ , того ничемъ лѣчить не лзя. Ежели порокъ отъ болѣзни блудѣйной родился ,

по

то эпу болѣзнь прежде всего , и покуда еще мѣсто не разрѣжется , лѣчить надобно. Часто случается , что воженіе , въ мѣстѣ между проходами имѣющееся , также въ мошонку шуляпную приходилъ. Тогда еѣ разрѣзать надлежитъ , и болячку прорѣзавши оболочку поглубже , чисту здѣлать. Невеликая опасность бываетъ , хотя мошонка шуляпная и испортилась (134). Гдѣ не только уринной пупъ , но и шейку пузырьную широко разрѣзывать понадобится , то въ нее напередъ инструментиъ жолобоватой вложить должно (по Французски Горгоретъ) , и по немъ трубочку толстинуку серебряную впустить. Между же тѣмъ полосканье изъ декокту яшнаго , прибавивъ нѣсколько воды ранной , или ежели нѣчто въ гной привести покажется , прибавить меду розоваго , въ нее впускать можно.

§. 1354.

Ежели пузырь разрѣзанъ будетъ , всѣ пособія употребить должно , копорыя воженіе отвращать могутъ. Крови много пустить надобно , брюхо весьма масломъ мазать , и какъ къ брюху , такъ къ ранѣ , употребить припарку. Больному кушать почти ничего не давать , пить умерено , ппизану. Ибо ежели больше надлежащаго пьется , пузырь наполняется , ежели же мало , то рана мочею острою будетъ бередиться. Рану не прежде лѣкарствами бѣдными промывать , или мозольность ножикомъ надрѣзывать , но тогда , когда воженіе уполнися , и гной окажется. Къ ней сперва прикладывать должно пряжу сухую , а послѣ балсамъ Арцееи. Ежели болячки и фиспулы всѣ разрѣзанныя , но жесткія въ гной обращаются , то оную трубочку серебряную , а припомъ и пряпочку

почку разщипанную , ежели она употреблена будетъ ,
 лежишь можно ; а скрозь натуральной уринной про-
 ходъ другую трубочку неполстую , или каеэперъ
 гибкой , въ пузырь опустишь , и тамъ оставишь дол-
 жно , чѣмъ мочѣ этимъ путемъ , а не раною вы-
 ходъ здѣлался . Рану кормить надлежитъ , и зажив-
 ляшь , которая часто съ трудностью лѣчится , такъ ,
 что иногда , а особливо въ пѣлахъ сухощавыхъ и чак-
 лыхъ , фистула оспаешся . Надобно , чѣмъ больной ,
 и протянувши , и зжавши бедра и бедра , да еще и
 связавши ихъ связкою , лежалъ . Съ крайнимъ прилѣ-
 жаніемъ смотрѣть должно , чѣмъ моча серебряною
 трубочкою текла , а не въ рану , для того трубоч-
 ку тамъ завсегда и оспавляшь . Обвязка къ ранѣ
 способна та , которая около брюха обвивается , двѣ
 другія песьмы , на спинѣ къ ней , на подобіе бук-
 вы П. пришивая , имѣющая . Тесьмы къ мѣсту
 междупроходному , гдѣ рана проходишь , и что на
 рану положено , прикрываютъ , и отъ раны къ брю-
 ху такъ проходятъ , что правая на лѣво , лѣвая на
 право , и обѣ съ пою , которою брюхо обвязано ,
 связываются . Эту же обвязку , чѣмъ не говоритъ
 отомъ часто , употреблять должно , когда и пу-
 зырь ради камня прорѣзанъ будетъ . А чѣмъ мошонка
 шуляшная отъ текущей мочи не ссаживалась , то
 трубочкою въ пузырь оставленную вытекаемое , въ
 сосудъ брать , а самую мошонку шуляшную воцанкою
 шелковою прикрывать и обвертывать , а сверхъ того
 подвѣшивать должно * .

(*) Сей лѣченія способъ , будто бы ненадобный отбросилъ ас-
 трукъ въ помян. мѣст. Кн. 3 Глав. 4 стр. 318 . Ибо придаетъ ,
 что онъ зналъ многихъ , у которыхъ послѣ лѣкарскаго долгаго
 мученія таковымъ лѣченіемъ , гораздо тяжкая непослѣдокъ сызгу-

А а а а

γ γ γ γ

Урѣзъ оставалась, къ пя вопро чѣмъ она благополучно проходила, и рана заживляна; понеже путь уринной отъ струпа гораздо сморщивается, и почти запирается. Но оное, какъ кажется, отвратить можно, ежели серебряная или свинцовая трубочка въ пузырь будетъ оставаясь, покуда все въ надлежащее здравіе не придетъ, и ежели по окончаніи лѣченія оныя палочки изъ холстинки вощаной въ прохѣдъ уринной вставляются, и въ немъ держатся, отъ которыхъ онъ расширяется. Многими примѣрами сей лѣченія способъ утвердилъ выше похваленный КОЛОТЬ въ мѣстѣ. Всякъ видитъ, что его, ни въ какомъ времени, ни въ какомъ возрастѣ, ни въ какомъ плѣтѣ, а притомъ ни въ какомъ погрѣшеніи, отъбывающа не надобно. Временемъ же, гдѣ инако человѣку пособить бываетъ не возможно, отъважное лѣченіе пособствуетъ.

СВИЩЪ ВЪ ТАКЪ.

ФИСТУЛА ПЕРИНЕИ.

§. 1355.

Иногда въ такъ или въ мѣстѣ межъ проходами фистулы остаются, ежели отъ великаго гноенія или также отъ Анпонова огня, много вонъ выпадетъ, или, ежели нужда бываетъ разрѣзъ долго не зашворяшь, понеже долго очищаться долженъ бываетъ пузырь и путь уринной. Также случится поможетъ, ежели великъ камень прорѣзомъ мѣста межъ проходами выштенъ, и пузырьная шѣйка великою силою порвана, или ежели рана не порядочно будетъ лѣчена, въ семъ случаѣ край болячкины понадрѣзать и взшарошить надобно, а рану прикладывая лѣкарства, которые мясо питаютъ (338), наполнишь довольно. Къ тому же пристойно, чтобъ больной завсегда протянувши ноги, и бедра связавши, лежалъ, и чтобъ моча трубочкою въ пузырь оставленную вытекала. Когда край у болячки очистится, и рана наполнится, то перевязывать ее рѣдко надобно.

Ежели

Если же фистула вовсе затворилась не можетъ , стараться надлежитъ , что хотя бы она поуже здѣ-
далась. Если же сими лѣченіями воспретивъ спивать не возможно , чтобъ прорѣзомъ моча не текла , авторы нѣкопорыя машины выдумали , копорыми болячка и фистула припискивается.

(*) Смотри у НУККІЯ фиг. 11 , у ГЕЙСТЕРА Таб. 26 фиг. 10.



РАЗЛИЧНЫЯ ЛѢЧЕНІЯ , У СТРА- ЖДУЩИХЪ КАМЕННОЮ БО- ЛѢЗНІЮ УПОТРЕБЛЯЕМЫЯ.

ВАРІЕ , КВЕ КАКУЛІОЗИСЪ АДГИБЕНТУРЪ , КУРА-
ЦІОНЕСЪ.

Надобно читателю знать дать , что все , что ни касается до лѣченія страждущихъ каменною бо-
лѣзнію , и до исторіи онаго лѣченія , надобно при-
писать трудамъ пречунаго мужа ЮСТА ГОДО-
ФРИДА ГУНЗІА Анат. и Хирург. Професс. Публ. Экстр.
въ здѣшней Академіи песьма знатнаго. О особенной
благосклонности , которую онъ мнѣ оказалъ въ
этомъ трудѣ , нѣчто сказано въ предисловіи.

§. 1356.

Тѣла , известія подобныя , почти во всякой
тѣла человеческого чашпочкѣ , изъ сухостей нашихъ
дѣлаются , а подлинныя камни изъ мочи только ,
какъ въ почкѣ , такъ въ пузырь. Обыкновенно же
изъ пузыря только чрезъ рѣзаніе вынимаются , ежели
больному инакимъ способомъ пособить не лзя , и под-
линныхъ примѣтъ къ смерти не будетъ (*). Ибо ,
копорые въ почкахъ будутъ , оныя оставляють надле-
житъ

А а а а 2

жишѣ

жити , ежели поясница не будетъ пухнуть , въ которомъ случаѣ , или какъ чирей безверхушешный прорвется , или прорѣжется , вонъ взяты должно (**).

(*) Камень изъ тѣхъ болѣзней бываетъ , которыхъ всякой человекъ въ себѣ причину имѣетъ , и вѣчно питаетъ , безъ сомнѣнн за- всегда признаны были. Весьма трудное быть должно и сумнительное , все дѣйствіе Хирургическое , которое у страждущихъ сею болѣзнію дѣлается. Однакожъ и никакого зла нѣтъ , съ которыми бы бѣдственнѣйшая боль была сопряжена , и которое бы долѣ пропалгивающаго человека , повседневно хотѣло уморить. И отъ этого кажется заблуждалось , что въ самыя древнѣйшія времена , каменную болѣзнію страдающіе не сомнѣвались , въ жестокія и весьма сумнительныя лѣченія вдавались. Всякъ знаетъ , что во времена ИППОКРАТОВЫ находились , которые осмѣливались камень изъ пузыря вынимать , и больныхъ отъ очевидной смерти избавлять. Поневже онъ Медицинской и Хирургической науки будучи отецъ , присагою обзывалъ , чтобъ отъ лѣченія людей страдающихъ каменною болѣзнію удерживались. Должны они были людямъ въ томъ дѣлѣ искуснымъ ихъ составлять. Упомянутые толковали , будто бы ИППОКРАТЪ оное смертоноснымъ , или безчеловѣчнымъ и отъ челоуѣчества отчужденнымъ почиталъ. Можетъ это изъ словъ АВИНЗОАРОВЫХЪ утвердиться , который вырѣзываніе камня такъ безчестнымъ дѣломъ , проклятымъ и бѣдственнымъ называлъ , что не только въ немъ упражняться , но и смотрѣть , честному челоуѣку на то не должно. Смотри у Ю. ГЕНРМЕЙБОМІА въ Комментар. адъ юзюрв. Гиппок. Стр. 162. Арапы за беззаконіе почитали дѣтородные уды смотрѣть , отчего Греки весьма чужды были. Другая же смертоносности причина есть , о которой ИППОКРАТЪ думалъ , что она съ вырѣзываніемъ камня сопряжена. Ибо въ Афор. 18 кн. 4. говоритъ *κῆλυ διακοπῆτι θανάτῳ* , что пузырь раненый имѣетъ смертоносное дѣло , который Афоризмъ изъ кн. 1 о болѣзняхъ взятъ. Но что яснѣе есть сего , что ИППОКРАТЪ въ прислѣ не на бѣду погибелную смотрѣлъ , которая съ поврежденіемъ пузыря сопряжена бы была , но на трудность лѣченія. Ибо придаетъ , что оное лѣченіе уступить должно тѣмъ , кто всю науку въ томъ дѣйствіи помогалъ. Чемъ кажется хотѣлъ учениковъ своихъ убѣждать , чтобъ не принимались безъ осторожности за такое сумнительное дѣйствіе , но должны себѣ ту науку чрезъ долгое въ ней упражненіе постигать. Смет. Ю. ГЕНР. МЕЙБОМІА помн. мѣст. тл. 16 стр. 153. и далѣе и весьма преполезное есть толкованіе , которое далъ ЛАВРЕМБОЕРГІЙ въ портіи Эскулапа тл. 9. Поневже онъ думаетъ , что

что въ республикѣ Коорской нѣсколько Министровъ Медицинскихъ публично здѣлано было , которые страждущихъ каменною болѣзнію лѣтили. И такъ ИППОКРАТЪ хотѣлъ , чтобъ лѣчащіе симъ Министрамъ своимъ , публично опредѣленнымъ и нанятымъ , оное дѣлать оставляли. Понеже древніе , кажется , думали , что въ томъ лѣченіи , которое художники у страждущихъ каменною болѣзнію употребляли , пушьюринной и мясной пузыри часть открывается , а не тѣло пузыря , о которомъ думали , будто бы оно плевное. Смотри у Цельса въ кн. 7 гл. 26 и авторъ Исагог. гл. 18. Изъ чего явствуетъ , какъ то толковать , что ИППОКРАТЪ осмертоносной пузырьной ранѣ написалъ. Хотя то и такъ толковать можно , что ИППОКРАТЪ , никого не видалъ , который бы отъ раны пузырьной избавленъ былъ , или хотѣлъ , а по большей части оныя умирали , которые пузырь проколотой имѣли. Новѣйшіе же видѣли , и частыми примѣчаніями утверждено , что не всегда смерть слѣдуетъ , когда пузырь раненъ бываетъ. Смотри выше §. 679. Кромѣ тамъ представленныхъ Авторовъ , примѣчанія о выдѣченныхъ , а особливо плажками пузырьными ранами , имѣетъ ФРАНЦИСКЪ РОССЕТЪ въ Парш. Цес. Ассерпт. Исторіол. Спр. 256 и далъ въ Париж. 1590 года. К. СТААПАРТЪ ФАНЪ ДЕРЪ ВІЕЛЬ сто 1. примѣч. 81 и которыхъ тамъ представляетъ , ДІОНИСЪ въ куръ дезъ операц. Демонстр. 3 стр. 243. эд. 1740 году Амѣандъ у Дугласс. Въ Лишотем. стр. 42 ФРАНЦ. КОЛОТЪ. въ Тряше де л'операционъ де ла шалье стр. 48 и далъ и другіе премногіе. Кто же бы сказалъ. Какимъ путемъ оныя Медики поступали въ лѣченіи ономъ , которые во времена ИППОКРАТОВЫ страждущихъ каменною болѣзнію лѣтили ? Не невѣроятно , что онѣ той дороги держались , которая отъ ЦЕЛСА открыта была. Она очень проста , что наибольше древность утверждаетъ. Послѣ ИППОКРАТА , ни единого изъ Медицинской науки писателей не имѣется , который бы о лѣченіи камня что нибудь предложилъ , или казался бы что въ этомъ Хирургическомъ дѣйстви хроще обращался , кромѣ АММОНІА , котораго ЦЕЛСЪ описываетъ въ кн. 7 въ гл. 26 , который тѣмъ именемъ Λεθότομοι прозванъ былъ , понеже инструментъ выдумалъ , къ разламыванію камня великаго въ пузырь способный. Да и то вѣроятно , что АММОНІЙ не инымъ способомъ , какъ тѣмъ , который отъ ЦЕЛСА представленъ , путь въ пузырь открылъ. Той же дороги держался и МЕГЕМЪ , который моложе АММОНІА былъ , и въ римѣ жилъ ; ЦЕЛСЪ въ Предисл. къ кн. 7 , изъ того же ЦЕЛСА гл. 26 кн. 7 видно , понеже учить , какой инструментъ выдумалъ , для выниманія камня игловастаго ; во сколько разъ больше разсказывалъ бы , какое лѣченіе употребляетъ всегда у страждущихъ каменною болѣзнію , ежели бы ошѣкнсе бы-

ло отъ Целсовскаго. Камень же вырѣзываемиъ лѣчитъ нерѣдкое дѣло было, кажется, какъ въ ГЕРОФИЛОВЪ, такъ и ЦЕЛСОВЪ и ГАЛЕНОВЪ вѣкъ. Это я уже пропущу, что ГАЛЕНЪ, или нѣкто другой авторъ есть, въ Исаг. гл. 18, упоминаетъ инструментъ, который ко изслѣдованію камня въ пузырь мы употребляемъ, отъ ЭРАЗИСТРАТА καὶ ἡτῆς названъ былъ, ФЛОРЪ въ эпист. Лив. вѣжн. 55 говоритъ: что Александрова сына, Царя Сирскаго, мальчикъ десятилѣтняго убили подкупя Медиковъ, которые народу солгавши, будто бы онъ отъ каменной болѣзни умеръ, вскрывали. А ГАЛЕНЪ какъ въ Исагог. на помян. мѣст. такъ въ Коментш. на Афор. 18 кн. 7 ИППОКРАТОВЪ и особливо ГЕЛІОДОРЪ у ГАЛЕНА о обвязкахъ гл. 16 объ этомъ Хирургическомъ дѣйствіи, будто бы въ народѣ извѣстномъ писали. Того ради ЦЕЛСЪ, который на помян. мѣст. первый изъ древнихъ, то есть которыхъ писанія до насъ пришли, какое лѣчение у страдающихъ каменною болѣзнію употребляемо быть можетъ, пространнымъ словомъ представилъ, объявляючи не такъ, какъ бы онъ то избрѣлъ, но можетъ быть оно уже отъ самыхъ ИППОКРАТОВЫХЪ лѣтъ совершенно было. Которые, отъ ЦЕЛСОВЫХЪ даже до ПАВЛА ЭГИНЕТА временъ, въ лѣчебной наукѣ прославились, ежели отъ ГАЛЕНА отступили, хотя о страдающихъ каменною болѣзнію нѣчто говорили, а о лѣченіи ничего не объявили, ПАВЕЛЬ же во всемъ ЦЕЛСУ послѣдовалъ. Смотри. Кн. 6 гл. 60 и Арапскіе Медики отъ сей дороги не уклонились, что изъ АВЕНЦЕННА кн. 3 фен. 18 гл. 7 и АЛБУГАЗИ часть 2 гл. 60 и 61 познать можно. Однакожъ АЛБУГАЗИ, сказываютъ, нѣчто переимѣнилъ, понеже подлѣ боку ягодицы лѣвой, а у женщинъ подлѣ корня кости неименованной, вздумалъ прорѣзъ дѣлать. А можетъ быть это мѣсто поже самое было, которое ЦЕЛСЪ нижнюю самую лѣвую границу называетъ, и подъ которою дѣвицъ прорѣзывать такъ велѣлъ, чтобъ разрѣзъ поперегъ былъ. На пом. мѣст. АЛБУГАЗИ также изображеніе ножика необоюднаго представилъ, что нынѣ многіе думаютъ, будто бы онъ выдумалъ, и не много отъ того отиѣненъ, какой ХЕСЕАДЕНЪ употребляетъ. Многихъ Медиковъ, которые въ Аравіи въ искусствѣ ручнаго лѣченія презрѣдно обращались, память преспала. И между тѣми, которые въ 13, 14 и 15 вѣкахъ въ Италіи и Франціи въ этомъ искусствѣ упражнялись, ни объ одномъ не упоминается, который бы о лѣченіи страдающихъ каменною болѣзнію нѣчто дошопамѣтисе произнесъ, кромѣ ГВИДОНА, который отъ Целса показанную, и въ то время презрѣнную дорогу, будто бы опять открылъ. Тракт. 6 Доктор. 2 гл. 7. Отчего здѣлалось, что, понеже многіе боялись ЦЕЛСА дѣлать, что въ тошъ вѣкъ часто дѣловалось, страдающихъ каменною

менною болѣзнию лѣченіе, какое ГВИДОНЪ представилъ, Гвидоновскимъ назвалось. Однакожъ онаго онъ самъ можетъ быть никогда не дѣлывалъ. Понеже говорилъ, какими образамъ поступать должно по бруну, ѲЕОДОРИКУ, РОЛАНУ, РОГЕРІЮ и по другимъ мастерамъ. Сии сами, ежели отъ РОГЕРІА опшпупишь, также пространно, какъ и ГВИДОНЪ, о вырѣзывантіи камня говорили. Сіе древнѣе лѣченіе приготовленіемъ малымъ [аппаратусъ парусъ] названъ, не много послѣ какъ ІОАНЪ ДЕ РОМАНИСЪ другое нашолъ, которому для числа инструментѣвъ приготовленія великаго [аппаратусъ магни] имя дано; будто бы въ однихъ инструментахъ различіе состояло. ЦЕЛСЪ оное хотѣлъ въ такомъ только тѣлѣ опшпупывать, которое лѣтъ уже девяти, а за четырнадцать не перешло. И ни единъ, кромѣ людей смѣлчакѣвъ, или нѣсколькихъ бездѣльниковъ не нашелся, который бы осмѣлился оное лѣченіе надъ вырослыми учинить; не для того будто бы не могъ, но для того что не безъ опасности могъ. Въ прошломъ вѣку около 1663 году человекъ нѣкакой въ Франціи проискался, РАУ именемъ, который о себѣ говорилъ, что онъ отъ го способу, который немногими инструментами дѣлается, не такъ, какъ того, который съ превеликимъ приутовленіемъ, бѣдиться долже, понеже какъ ребятъ безопасно лѣчить, такъ и изъ пузыря взрослыхъ людей камень вынимать можно, изъ бердигаса въ Лютецію пришолъ каменною болѣзнию спраждающихъ тамъ лѣчить. Однако примѣтили его, что онъ въ лѣченіи дѣтскомъ не болѣе пособствовать можетъ, какъ и лѣкаръ съ малымъ инструментѣвъ приборѣмъ, камень вынимаютъ; взрослыхъ также многихъ такъ рѣзалъ, что пузыря не прорѣзывалъ. Однакожъ имѣлъ такъ противное рукъ употребленіе, что тотчасъ камень подкладывалъ, и когда видѣлъ иногда, что то съ стороны примѣтили, бѣгствомъ спасался. Смотри. де МЕНЖИЛУЗО Команш. сюръ ла Ширюрже де ШОЛАКЪ Т 2 стр. 739 и дал. въ бурдиг. 1663 году карлъ ДРЕЛИНКУРЪ въ Лежане дю Гасконъ въ Парижѣ 1665 году. ФРАНЦ. КОЛОТЪ въ поман. мѣст. стр. 28 и дал. ФРАНЦ. ТОЛЕТЪ въ Трактѣ де ла липтомотіе стр. 146 и далъ въ Парижѣ 1708 году. Въ нашемъ вѣку очень мало имѣетъ лѣчащихъ такихъ, которые бы думали точно этимъ путемъ ребятъ безопасно отъ камня можно избавлять. Начальникъ тому есть ГИРОЛАМО МАРТИНИ, который въ неискусствѣ вѣритъ, что бы у малолѣтнихъ ребятъ отъ ИВАНА ДЕ РОМАНИСЪ предложенное лѣченіе употребить похотѣлъ. Въ пратптика делле принципали операціоне ди хирургіа. Гл. 11. Другія доказательства, которыми надобно сего лѣченія утвердиться можетъ, представлены отъ славн. ГЕЙСТЕРА въ написав. Хирург. стр. 202 и 279. Смотри также ДЕНИСІЙ въ примѣч. Хирург.

рург. о камнѣ стр. 95. Ежели отъ вызыванія камня отступимъ , который въ пути уринномъ стойтъ , одинъ случай есть , въ которомъ оное какъ урезанъ , такъ и у взрослыхъ употребить надлежитъ. Есть же еще случай , ежели камень въ шлѣкѣ пузырной такъ будетъ стоятъ , что мѣсто междупроходное распухнетъ. Г. ДЕ ЛА ФАГЕ въ нотахъ на Диснистеву Хирург. стр. 221 сему лѣченію на послѣдокъ малый снарядъ или приборъ (петитъ аппаратъ) имя дано , гдѣ , какъ выше сказано , другой выдуманъ отъ ИВАНА ДЕ РОМАНИСЬ , и названъ великимъ снарядомъ или приборомъ (де гранд. аппаратъ) ради множества инструментовъ , которыми дѣлается. До сего времени многие думали , что похвалу изобрѣтенія сего Италіанцамъ , а особливо ИВАНУ ДЕ РОМАНИСЬ приписать должно. Но не давно эту славу отнять , и своему народу приписать возмѣнился , самымъ малымъ мечтаніемъ зараженъ будучи , который началъ Хирургической науки во Франціи исполковать въ книгѣ съ надписью такою решерсъ критикъ , а историкъ сюръ л' орижине , сюръ ля диверсъ эпамъ а сюръ ля прогръ де ла ширюрж. анъ франце въ Парижѣ 1744 году стр. 258 и дал. Понежѣ думаетъ , что разбойникъ оный , котораго исторію , кромѣ премножества другихъ , АМВРОСІЙ ПАРЕЙ имѣетъ въ кн. 24 въ гл. 19 , и которому почти до сего времени вѣрили , будто бы у него камень изъ почекъ вызванъ былъ , пузырнымъ камнемъ страдалъ. Человѣка же сего нѣмецъ нѣкоторый КОЛОТЬ именемъ вылѣчилъ , который у него тоже лѣченіе употребилъ , которое въ народѣ Маріановымъ называется. Я думаю въ правду , что мнѣніемъ о КОЛОТОВОМЪ лѣченіи ничто больше противиться не будетъ , какъ только то , что ФРАНЦИСКЪ КОЛОТЬ , самъ будучи изъ той фамиліи послѣдній , славу изобрѣтенія онаго лѣченія ИВАНУ ДЕ РОМАНИСЬ приписываетъ въ помян. мѣст. стр. 20 , 64. ИВАНЪ ДЕ РОМАНИСЬ , родомъ изъ Кременіи изъ города Казала большаго былъ , науки своей въ Римѣ учился. Смотр. у МАРИАНА САНКТА въ книжечкѣ золотой о камнѣ изъ пузыря чрезъ вызваніе вытягиваемомъ глав. 18 , и ИВАНЪ самъ въ эпистолахъ къ МАРИАНУ , которая при концѣ сей книги находится. Онъ ничего о семъ исвомъ лѣченіи пути не пишетъ , но былъ онъ отъ ученика его МАРИАНА САНКТА , въ Варолѣ въ Аппуліи родившагося , въ книжечкѣ ужѣ отъ посла открытъ. Однакожъ и изъ сей книжечки не видно , въ которое бы время ИВАНЪ эту дорогу нашолъ. Однѣ гсворятъ , что въ началѣ 16 вѣка это здѣлалось , другие 1525 году , какъ КОЛОТЬ въ мѣст. помян. стр. 64. Многие около 1520 году. ДУГЛАСУ вѣроятно кажется , 1500 году ближе то здѣлалось 1520 года и МАРИАНОВА книжечка , не такъ какъ въ народѣ думаютъ , въ Венеціи 1535 года , но 1522 года на свѣтъ вышла. МАРИАНЪ , который Медической науки училъ былъ , при

жизни ИВАНОВОЙ, свою книжечку издалъ, въ которой на нѣсколькихъ мѣстахъ признается, что его на эшотъ путь лѣченія ИВАНЪ привелъ. Однакожъ здѣлалось, что не ошъ ИВАНА, которьй изобрѣлъ, имя получилъ, но ошъ МАРИАНА, который списалъ, и можетъ быть прикрасилъ, МАРИАНОВЫМЪ названъ. Имя же великаго снаряда [магнн аппаратусъ] отъ числа инструментовъ имѣетъ ЦЕЛСОВО лѣченіе, кромѣ ножика однимъ крючкомъ, или иногда и перстемъ, дѣлается, которыми камень вынимаемъ. Напротивъ того въ МАРИАНОВОМЪ древле употреблялись кромѣ ножика, спички закорюченныя, въ длину жолобѣкъ заѣланный имѣющія, и вообще-путешественники [ипинераріа] или трубочки назывались, испытатель или извѣдыватель [эксплюаторіумъ], или иная спичка прямая, проводники [дукторесъ] два, ошворять, или расширитель [аперіенсъ] или [дилататоріумъ] клещи, спичка съ пулечкою [бушонъ], которую, МАРИАНЪ веррикулѣмъ называетъ, ложка, и иногда особенный инструментъ, который МАРИАНЪ двубшникомъ [дуо лшера] назвалъ. Кромѣ всѣхъ сихъ вмѣсто клещей часто крючокъ зубчатой употребляли. Всѣ думаютъ, ежели ошъ ФАЛКОНЕТА отступимъ, это МАРИАНОВО лѣченіе кромѣ того, что инструментами, и мѣстомъ гдѣ рѣзать, очень далеко отъ ЦЕЛСОВОЙ лѣченія дороги отлчно. О которомъ дѣлѣ способнѣйшее говоритъ мѣсто будетъ, когда къ боковому рѣзанію придемъ. Поразсмотримъ теперь коротенько МАРИАНОВА способа исторію. Между МАРИАНОВЫМИ учениками римской нѣкто лѣкаръ былъ, ОКТАВІАНЪ ДЕ ВИЛЛА называемый. Сей одинъ отъ МАРИАНА науки, какъ стражающихъ каменною болѣзнію лѣчить, обучился, чего никакимъ доказательствомъ утвердить невозможно. Отъ сего послѣ того Галлофранки лѣкари оную переняли, хотя можетъ быть, и Италіанцовъ тогожъ училъ, изъ которыхъ НУРСИНЫ, которые въ благополучномъ лѣченіи килъ славны были, это лѣченіе въ Европѣ разсѣяли, Ю. РЮЛАНЪ сынъ и КАМИМЪ ФАЛКОНЕТЪ, не знаю начеми основаніе имѣючи, утверждаютъ, первый въ Энхирид. Анаст. Папеол. кн. 2 гл. 31, а другой въ Вопросѣ: при выниманіи камня, надобно ли другимъ предпочитать снарядъ боковой? Онъ же ОКТАВІАНЪ, когда часто въ Парижѣ зыванъ, а надобно было ему чрезъ Треснель, городокъ близъ Трикаста, ѣздить, обѣ науки своей сказываютъ съ ЛАВРЕНТЬЕМЪ КОЛОТОМЪ разговорился, который, хоть медикъ былъ, однако и рукою сверхъ того лѣчивалъ. Съ того времени, какъ Медицинская наука въ старину ЭСКУЛАПІЕВОЙ, такъ каменной болѣзни лѣченіе КОЛОТОВОЙ, фамиліи, только во Франціи, единственно осталось. Смотр. ФРАНЦ. КОЛОТЪ въ пом. мѣст. стр. 66 и дал. КОЛОТЪ эшу отъ ОКТАВІАНА полученную науку, такъ искусно,

б б б б

искусно оказывалъ, и такіе благополучные успѣхи имѣлъ, что Генрикъ 2 Король Его Каменорѣзцомъ Королевскимъ [Липотомумъ Регіумъ] пожаловалъ, что 1556 году здѣлалось. Который шипулъ КОЛОТЫ при себѣ имѣли до самаго ФРАНЦ. КОЛОТА, который послѣдній изъ той фамиліи былъ. На мѣсто сего ТОЛЕТЪ Липотомомъ Королевскимъ здѣланъ. Преставился КОЛОТЪ въ 1706 году, и презрѣдныя примѣчанія о лѣченіи камня и другихъ болѣзней пузырныхъ, здѣлалъ, которыхъ книжечка въ 1727 году въ Парижѣ выпечатана. Въ ней можно прочитатъ корошешкую исторію о КОЛОТАХЪ стр. 67 и дал. Однакожъ много о КОЛОТАХЪ Липотомомъ имѣется у ПАРЕА кн. 16 гл. 47 и кн. 24 гл. 18. ГВИДОНЪ ПАТИН. Лепрѣ Шоазѣ Том. 1 стр. 284, 335, 372. Том. 2 стр. 107, 248 Том. 31 стр. 339 Нувелл. Лепр. Том. 2 стр. 213, 231, 314. Решеріи сюръ л' Орижинѣ де ла Хирурги на мѣст. пом. смотр. также Ю ВАНГОРНЕ Микропехне стр. 451 въ Липс. 1707 года. Отъ КОЛОТОВЪ помощи требовалъ почти всякъ и во Франціи и внѣ ея камнемъ пузырнымъ страждущій. И достовѣрно кѣнимъ также принадлежитъ, что о нѣкоторомъ КОЛЕТѣ у ВРЕНЕВЕЛТА въ диссерт. липот. стр. 53 издам. 1687 году написано, развѣ онъ ТОЛЕТА хотѣлъ написать, котораго имя въ то время уже нѣсколько въ славѣ было. Также, что о КАЛЛОТѣ нѣкоторомъ у ТОЛЕТА на мѣст. помн. стр. 157 и у ТИТСИНГА въ Геэлкунд. Верганделмнт. оверѣ д нѣ стезѣнъ энѣ гелѣ Стезѣнъ Сніаген. стр. 95 въ Амстер. 1731 года, упоминается. ФИЛИППЪ КОЛОТЪ, дѣдъ ФРАНЦИСКОВЪ, двухъ кѣ себѣ лѣкарей прибралъ, РЕСТИТУТА ГУРАЛТА и СЕВЕРИНА ПИНЕА, изъ которыхъ сей по повелѣнію Королевскому другихъ десять лѣкарей онго искусства, какъ страждущихъ каменною болѣзнію лѣчить, обучалъ. ФРАНЦИСКЪ же КОЛОТЪ говоритъ, что ни сего ни того, что сѣбѣ Гошпишалаей Парижскихъ лѣкари КОЛОТОВЪ въ этихъ палатахъ видѣли камни лѣчащихъ, силы такой не имѣли, что сѣбѣ МАРИАНСКАЯ дорога подлинно показана была на мѣст. помн. стр. 72 и далѣ. Хотя же КОЛОТЫ секретовъ или тайностей нѣ наукъ не открывали, однакожъ отсюда ужѣ сѣ полавинны шестъчатпдматаго вѣка во Франціи лѣкари были, которые ЦЕЛСОВУ дорогу оставивши на Маріанову перешли, или еще нѣсколько лучше, другую нашли, которая сѣ Маріановою не гораздо нахетс-ствовавшая; или отъ ОКТАВІА, или отъ иного какого МАРИАНОВА ученика, научены были, или выучились изъ МАРИАНОВОЙ книжечки. Примѣромъ наибольше ПАРЕНСЪ быть можетъ, который сей лѣченіи способъ очень обстоятельно извѣсилъ въ кн. 16 гл. 42 и далѣ, и кажется здѣлалъ. А что сѣбѣ подлинно отъ него здѣлано, ни гдѣ имѣя предложеннаго не нахожу. Славу же искусныхъ лѣкарей сѣбѣ заслужили тѣ, которые въ Маріановѣ лѣченія сѣбѣ всту-

вступили , изъ прошедшаго вѣка лѣкарей Галло Франковъ , ИВАНЪ БОННЕТЪ , ФРАНЦИСКЪ ФЕВЕНИНЪ , ОУФФИНЪ , отецъ и сынъ , ТАКОВЪ ГАРАНЪ , ЮННОТЪ , ГОВИНЪ и еще немногіе. Смотри. ДЕ-ВО въ Инд. Фунер. ГВИДОНЪ ПАТИНЪ Лепр. Нувелл. Том. 2 стр. 63 , 213 и дал. ТОЛЕТЪ на пом. мѣст. предисл. и стр. 33 , 155 , 179. Въ нашемъ вѣку многіе изъ лѣкарей Галло-Францусскихъ имѣются , которые камни лѣчатъ , а наибольше въ той Хирургіи упражняются , которая съ великимъ снарядомъ дѣлается. Въ Франціи очень мало лѣкарей бывало , да и нынѣ не много , которые въ Маріаново лѣченіе у страждущихъ каменною болѣзнію такъ исполняли , чтобъ славу какую ни будь себѣ заслужили. Предложеножъ было , да и то въ первый разъ отъ нѣмецкаго человека ГВАЛТЕРА , ГЕРМ. РУФФА въ книжечкѣ , по нѣмецки написанной , о лѣченіи камня въ почкахъ и въ пузырьъ бывающаго. Арг. 1543 въ 4 томѣ отъ ГОУРМЕЛЕНА Операц. кн. 2 стр. 178 и далъ. ПАРЕА на пом. мѣст. ГИЛДАНА въ кн. о вырѣзаніи камня пузырьнаго , въ базил. 1628 году 4 , которая книга въ операхъ гораздо полнѣе имѣется отъ ЮСИФА КОВИЛААРДА въ Хирург. Оператер. кн. 2 Част. 1 гл. 10 отъ ИВАНА ГРЕНЕВЕЛТА на пом. пом. де ЛАНВУ въ диссерт. сюръ ле малади э сюръ лезъ Операсіонъ де ла пѣррѣ въ Париж. 1700 году , отъ ТОЛЕТА на пом. мѣст. отъ АЛХИЗА въ Липотоміи овверо дель коваръ ла пѣтра : въ Флоренціи 1707 году , ЛЕДРАНЪ въ книгѣ , которую надписалъ во Паралѣ де дифференъ манѣрѣ де тире ла пѣррѣ горъ ла-вессте въ Париж. 1730 году , и отъ другихъ нѣкоторыхъ , которые о Операціяхъ хирургическихъ писали , а наибольше ДІОНИСІА , ГАРЕНЖОТА и ГЕЙСТЕРА. Утверждать я не хочу , что всѣ , которыхъ я доселѣ упоминалъ , Маріанова лѣченія или учились , или списывали , точно въ тотъ путь , по которому МАРИАНЪ поступалъ , попали. Довольно , что знали , что пузырьъ подъ костями надѣшпородоудными лежалъ , и мѣсто , гдѣ камень , по которому средній перстъ къ таку приведши , въ старину прорѣзывали , путешественникъ и другіе инструменты употребляли , которыми дѣлали , чтобъ большой снарядъ казался. Понеже думали , что въ этомъ Маріаново лѣченіе состоятъ. Въ нынѣшнемъ вѣку уже дѣлалось , что многіе изъ врачей нежикъ обоюдный употребляютъ и предводителя жолобова-тато. (Горжеретъ). По этому не разширителя , но больше указатель-ный перстъ правой руки , такъ впускаютъ , чтобъ полетоньку впускаючи его , шпѣйку пузырьную отворить. Камень вытащивши , многіе послѣ того трубочку , а особливо гибкую , въ рану вкладываютъ , которою бы все , отъ камня или отъ пещу въ пузырь оспавшееся , свободно вытечь вонъ могло. Кромѣ сего новѣйшимъ , это наибольше въ похвалу приписать должно , что о красотѣ больше и о пригото-
леніи

852 РАЗЛИЧ. ЛѢЧ. у СТРАЖ. КАМЕН. БОЛѢЗ. УПОТ.

лѣнїи пособїишихъ къ безопасному лѣченїю исполненїю , инстру-
ментовъ пицанте имѣли , что довольно явствуетъ изъ того , еже-
ли рисунки у ПАРЕА находящіеся съ ТОЛЕТОВЫМИ сравнить. Не
давно же ЛЕ ДРАНЬ , какъ въ порядкѣ обвязыванїя больного , такъ
и въ фигурѣ ножика нѣчто перемѣнилъ. Ибо онъ употребляетъ ножикъ
остроконечнѣе другихъ , и у того оба края остры , то есть обоюдный ,
и прямой , на мѣст. пом. Таб 3 фиг. 4 и стр. 55. Къ сему , ежели
камень будетъ такъ великъ , что его вытащить не можно послѣ
перваго разрѣза , безъ опасенїя великаго прорыву и раздранїя частей ,
поширѣ расширить первый разрѣзъ съ боку велитъ. Выдумалъ такъ-
же къ дѣланїю сего прорѣза новый ножикъ , съ спичкою жолобова-
пою , и вожда жолобокъ имѣющаго , который на обушъ бороздку
въ длину протянутую имѣетъ. Смотри примѣчанїя наши о способахъ ,
какъ камень лѣчить , стр. 69 и дал. и таб. 1. Однако кажется еще
очень не давно въ нихъ опять нѣчто перемѣнилъ. Смотри ЛЕ ДРАНЬ Опе-
рац. о хирург. стр. 304 въ Пар. 1742 ; однакожъ уже давно сіе раны
расширенїе представилъ , и ножичекъ кривой въ то намѣренїе выдумалъ
ТОЛЕТЪ на пом. мѣст. стр. 115 и дал. Снес. также де ЛАВНАУ.
на пом. мѣст. стр. 105 , АЛХИЗІЙ на пом. мѣст. стр. 81 и ШЕФЕРЪ
въ диссерт. о различныхъ литотомїи родахъ стр. 21 въ Аргентор.
1724 года. Прощте почти всѣ Маріаново лѣченїе такъ дѣлаютъ ,
какъ ниже покажется. Къ сему страждущихъ каменною болѣзнію лѣче-
нїю оное принадлежитъ , которое ПЕТРЪ ФРАНКЪ въ первыхъ
описалъ на пом. мѣст. гл. 33 , и которое кромѣ того отъ ГИЛ-
ДАНА на пом. мѣст. гл. 16 , и отъ ГРЕНЕВЕАТА на пом. мѣст.
стр. 52 Фраконіановымъ именуется. Есть же оно такое : Здѣлавши
прорѣзъ , ежели камень въ него попадетъ , крючкомъ вытащить его
надобно , ежели же нѣтъ , кношь вложить должно , которымъ
чрезъ нѣсколько дней не заживляючи рану хранить надобно , изъ кото-
рой на послѣдокъ камень или добровольно выходитъ , или легко вы-
нимается. Послѣ ФРАНКОНЕА предложилъ это лѣченїе ДР ЛЕ АУ-
ЗОНЪ на пом. мѣст. гл. 10 , и особливо ГИЛДАНЪ на пом. мѣст.
который оное лѣченїе сильно хвалилъ. Хвалили также и приспосы-
лыми примѣрами его полезность утвердили ФР. КОЛОТ. на пом.
мѣст. стр. 182 и дал. и ТОЛЕТЪ на мѣст. пом. гл. 20. Однакожъ съ
тѣмъ объявленїемъ , что рѣдко случается , чтобы сіе лѣченїе упо-
треблять бы надобно было. Еще способъ лѣченїю камня есть , кото-
рый снарядомъ высокимъ [аппаратумъ альшумъ] (ле готъ аппаратъ)
называютъ. Въ этомъ дѣйствителен камень вынимается , пузыря надъ
костью дѣлорододудными прорѣзавши. Такимъ же случаемъ отъ
ПЕТРА ФРАНКОНА найденъ , чего ради способомъ Франконическимъ
а другие снарядомъ или прорѣзыванїемъ подбрюшнымъ аппаратусъ
или секціо гипогастрика] называютъ. Объявляетъ ПЕТРЪ
ФРАН-

РАЗЛИЧ. ЛѢЧ. У СТРАЖ. КАМЕН. БОЛѢЗ. УПОТ. 853

ФРАНКО на мѣст. пом. стр. 139, что ему нѣкогда случилось, а года не показываеиъ, и кажется весьма обманываются иъ, которые 1560 годѣ кладуиъ, что когда у младенца двулѣшного ЦЕЛСОВО лѣченіе здѣлаиъ, не могѣ камня вытащитиъ, понеже очень великѣ былъ. Чего ради чтоиъ въ безчестіе не поспастъ, что не умѣиъ камня вынуть, перстами лѣвой руки, которые въ задній проходѣ вложииъ, камень приподниаиъ, и когда помощникѣ самое брюко близенько подѣ пупкомѣ подавиаиъ, чтоиъ камень надѣ костыми дѣшородоудными оказаиъ, брюхо сѣ пузыремѣ надѣ камнемѣ прорѣзаиъ, оный благополучно вытащииъ, и рану залѣчиаиъ. Однакоиъ ФРАНКО лѣчущиѣ увѣщаваеиъ, чтоиъ не послѣдовали тому, что онѣ сѣ при- нужденіа здѣлаиъ. Понеже ИППОКРАТОВОЮ саявою ослабленѣ бу- дучи, думали, что раны, въ корпусѣ пузырьномѣ случающіа, смерть причиняюиъ. Первый доказательио послѣ ФРАНКОНА сѣ лѣкарское дѣйствіе представииъ и хвалиаиъ, и ими Гомѣ аппаратъ даиъ РУССЕТѢ въ книгѣ написанной 3 л' Енфантемаиъ Цезаріон. стр. 77, и которая вышла въ Париж. 1581 года въ 8. Опять тоиже предложиаиъ, и три способа къ дѣйствию прибавииъ въ книгѣ 3 Парш. Цезар. Ассерт. Историол. написанной стр. 266 и даиъ. Исправиаиъ же онѣ то, а особливо въ семѣ, что пузырь не надѣ камнемѣ отво- ратиъ показаиъ, напротивѣ приказаиъ подождать, чтоиъ пузырь или мочою наполниа, или похлѣбки какой приличной наитиъ, чтоиъ онѣ надѣ костыми лунными, вздувшиа и оказываа, безѣ опасеніа прорѣзанѣ быти могѣ. И не только самѣ опыты надѣ тѣлами мерт- выѣ людей дѣлаиъ стр. 266, но и надѣ живымѣ дѣланаго лѣченіа отѣ нѣкошторого человека примѣрѣ имѣиъ, стр. 282, что такѣ за первое изѣ всѣѣхъ тѣѣхъ починалоа, что обѣ ономѣ лѣченіи по согла- сию приговоры имѣюиъ. Послѣ РУССЕТА вспоминали обѣ этомѣ лѣ- ченіа способѣ ГИЛДАНѢ на помян. мѣст. первое, чтоиъ бросиа, потѣиъ, чтоиъ хвалиа, РЮЛАНѢ въ Анеропогр. кн. 2 стр. 28 и въ Анимадѣ. на Веслингіа. ГРЕНЕВЕЛТѢ. на мѣст. пом. БАРОБЕТТЕ въ Хирург. гл. 26 ТОЛЕТѢ на мѣст. пом. гл. 15 стр. 137 ЛЮНИСѢ на мѣст. пом. Демонстр. 3 стр. 230 и другіе. Сѣ большимѣ спара- ниемѣ тоиъ самое дивно хвалиа, и лѣкарей къ упражненію въ томѣ возбудити хотѣиъ Парижской Медики НИКОЛАЙ ПЕТРЕЙ. иио къ школѣ Медической 1635 году задачу предложиа: для выниманіа камня надобноиъ въ лунѣ пузырь прорѣзывать? Сіа диссертациа, понеже очень между рѣдкими книгами находится, опять выпечата- на была въ ДУГЛАССОВОЙ литотом. Дугласс. стр. 12 Лонд. 1723 году, снес. о сѣй диссертации ГВИД ПАТИНѢ въ Лепрѣ- жоазі Том. 1, 20 стр. 61. Понеже ПАТИНѢ пишетиъ, что ПЕТРЕЙ это лѣченіе у многихъ и у мужчинъ и у женщинъ употре- бляиъ старалса и такѣ аброяиъ все достойио, что о БОННЕТѢ Париж- скомѣ

скомъ Липотомѣ ни имѣется у ТОЛЕТА на пом. мѣст. стр. 139 и ДИОНИСЪ на пом. мѣст. и кто 1651 году умеръ. Смотри ДЕВАУКСЪ на пом. мѣст. Однакожъ снеси то, что ПАЛИНЪ въ Еписк. къ БАРТОЛИНУ, которая есть между бартолиніанскими 20 сто 3. ГРЕНЕВЕАТЬ также упоминаетъ, что онъ принужденъ былъ нѣкогда у страждущаго каменною болѣзнію это лѣчение употребить. На пом. мѣст. стр. 152 изд. въ Лонд. 1710 году. ДИОНИСЪ хотѣ описать лѣченія далъ, котораго не пробовалъ, однакожъ оное дѣлать такой образецъ предложилъ, каковъ почти и ДУГЛАССЪ употреблялъ. Не сумнѣвался также оное прочимъ лѣчить камень способамъ предпочиталъ. На мѣст. помян. стр. 231 и далъ. Прежде ДИОНИСІА испытать оное СОЛИНГЕНІЙ такъ хотѣлъ, чтобъ пузырь не ливкоромъ къ тому способнымъ, но воздухомъ напущеннымъ, раздулся. Хирург. часть 3 гл. 20. Около 1700 году КОЛОТУ Магистратъ Парижской приказалъ, по принужденію можетъ бытъ ФАГОНИЕВУ, смотри у ДИОНИСА на мѣст. пом., опыты въ мертвыхъ тѣлахъ дѣлать. Смотри. ФРАНЦ. КОЛОТЪ на пом. мѣст. стр. 43 и далъ и Авторъ предисл. къ КОЛОТУ стр. 15, также объ нихъ къ Магистрату отъишествовалъ, что никакимъ образомъ у живыхъ не дѣлать, понеже бѣдствія исполнено, сказалъ. Однакожъ въ тожъ самое время пробѣ Дуплинской Лѣкаръ, у лѣвочки камнемъ страждущей, это лѣчение употребилъ. смотри Трансакц. Фил. 1700 году. Съ самаго того времени до 1718 году ни кого не нахожу, кто бы объ немъ хотя упомянулъ. Понеже въ томъ году ІАКОВЪ ДУГЛАССЪ Медикъ • семъ такъ долго презрѣннымъ лѣченію, предъ собраніемъ Королевскимъ Лондонскимъ, такъ представилъ, что не только безопасно оное дѣлать можно, чрезъ Анапомію показывая, РОССЕТОВЫ наипаче доказательствъ употребилъ, но и превосходство его предъ прочими всѣми утвердилъ. Трансакц. Фил. въ другой годъ 1719 въ концѣ и 1720 году Іаковъ братъ [Іакоусъ фратеръ], ИВАНЪ ДУГЛАССЪ Лѣкаръ Лондонской, четырехъ больныхъ этимъ путемъ лѣчилъ, изъ нихъ троихъ вылѣчилъ, а четвертый отъ пошлости жилъ чувствительныхъ умеръ. Смотри ЮГН. ДУГЛАССЪ а не въ Методѣ офъ куптингъ фор те споне секц. 11 ДУГЛАССУ многие изъ Англичанъ послѣдовать начали, ПАВЕАЪ, МАККИЛАЪ, БАМБЕРЪ ѲОРНГИЛАЪ, и особливо ХЕСЕЛЬДЕНСЪ Трапизе онъ те Гитг. Операц. въ Лонд. 1723 году, въ 8, котораго весьма остро безъ причины ценить ГУСТОНЪ въ Липотому: въ Кастрашусъ [Липотомію въ кладеній] въ Лонд. 1723, въ 8. Смотри также АНОНИМУСЪ и въ Метод. офъ перформингъ те гитгъ Операціонъ Лонд. 1724 году въ 4. МИДЛЕТОНЪ и въ шортѣ Ессая онъ те Операціонъ офъ Липотоміи, а въ и въ и въ перформедъ би те не въ методѣ а вонъ те офъ пубисъ, Лонд. 1727 году, въ 4. САНУЕЛЬ ПУЕ Окс. онъ те зерваль методъ офъ Липотоміи Лонд.

1724 году въ 4. Скоро послѣ того, какъ въ Англіи возобновлено здѣлалось это лѣченіе, покусились дѣлать тоже самое въ Германіи Пресл. ГЕЙСТЕРЪ, смотр. диссерт. о высокомъ снаряжѣ [де Альто аппарату] въ Гелмст. 1728 году. ПРЕБИШЪ Лѣкаръ Прусской въ трактатѣ о высокомъ дѣйстви по Нѣмецки написанномъ, въ Регіомонт. 1727 году и РУНГІЙ, Лѣкаръ бременской, смотр. у ГЕЙСТЕРА на мѣст. пом. стр. 49. У трехъ каменною болѣзнію страдающихъ это лѣченіе также употреблялъ СЕНФІЙ Лѣкаръ берлинской, и изъ нихъ два выздоровѣли, а одинъ умеръ. Смотри ЭЛЛЕРЪ въ примѣч. Хирург. стр. 209 и далѣ.

Между симъ въ Парижѣ надъ тѣлами мертвыми опыты дѣлаемы, стараніемъ наибольше ВИНЗЛОВЫМЪ, однакожъ оныя опыты привести Лѣкарей не могли, чтобъ надъ живыми искусились, покуда пресл. МОРАНДЪ и БЕРРИЕРЪ надъ двумя больными этого лѣченія не здѣлали. Смотр. МОРАНДЪ въ Тр. де ла Талле о готѣ аппарель въ Париж. 1728 году. Отъ сего времени почти никого не знаю нашедшагося, который бы эту операцію дѣлалъ, а наибольше, какъ ХЕСЕЛЬДЕНЪ въ ней обращаться началъ, которую обще рѣзаніемъ боковымъ [секціономъ латералемъ] именуютъ. Исказалъ прошія подбрюшнаго рѣзанія [гипогастрика секцію] ЛЕ ДРАНЪ, на пом. мѣст. стр. 95 и далѣ. и ДЕНИЗИ на пом. мѣст. защищаетъ напротивъ и предъ прочими превозноситъ МАТВЕЙ ЭРНЕСТЪ, БОРЕЦІЙ въ диссерт. о Операциі высокой по Аглиски Гигѣ Операциі называемой, въ Регіомонтѣ, 1723. МИДЛЕТОНЪ, который съ начала не хвалилъ на мѣст. пом. предисл. ДЕ БРЕВИЛЬЕ, Медикъ Парижскій въ вопр. къ выниманію камня, надобноль предъ прочими предпочитать высокой снаряжъ? въ Париж. 1734 году. Напоследокъ же за три года передъ тѣмъ, оную будто бы возобновилъ, и чемъ какъ легче, такъ безопаснѣе дѣлать было можно, новые нѣкоторые инструменты изобрѣлъ славн. ЛЕ КАТЬ, котораго лѣченія способъ ниже представляю. Достойно же примѣчанія это, что всѣ вознамѣрились пузырь прорѣзывать водою наливши, а ПІЕТРЕЮ пущника [истинерадумъ] опустивши, и по нему открывать поправлялось, на пом. мѣст. чему весьма прилѣжно послѣдовать началъ СЕРМЕЗІЙ Медикъ Амстердамской, смотр. Лишотоміа Дуглазіана офше эвъ нѣре вѣзе ванъ спеевъ-сиденъ, те Упрехт. 1727 году. Принадлежитъ же сюда, ежели ТИММІЮ повѣрить можно, ГЕНРИКА ГЕССА, Лѣкаря Гафтенскаго, изобрѣтеніе. То есть, выдумалъ працю, котораго изображеніе далъ ТИММІЙ, которую, вмѣсто клещей въ разрѣзъ, надъ костію дѣтородоудною здѣланный, въ пузырь впускалъ. Воспрепятствовать же тѣмъ хотѣлъ, чтобъ пузырь не бередился. И сѣялся отъ ТИММІЯ 1725 году, что камень этою працюю вынулъ, но понеже много камней въ пузырь было, надлежало ему

356 РАЗЛИЧ. ЛѢЧ. У СТРАЖ. КАМЕН. БОЛѢЗ. УПОТ.

ему прочіе клещами вынимать. Смотри. ТИММІЙ въ Агдинскій и Французскій примѣч. о рѣзаніи Подбрюшномъ по Нѣмецки въ брем. 1731 года, и снеси Акта Эрудит. 1729 году. Мѣс. Августа стр. 347 Таб. 4, смотри. также КОЛОТЬ на пом. мѣст. въ концѣ. Приступимъ теперь къ тому каменную болѣзнію страждущихъ лѣченію способу, который боковымъ [ляпералемъ] называютъ, понеже разрѣвъ съ боку какъ плевры брюшины, такъ съ боку пуши уриннаго и пузыря бываетъ. Къ сему принадлежатъ обще равіанской, Хесленденской, Лекаціанскіхъ два, фулбертіанской, и который отъ ФРАТРА ЯКОБА изобрѣшенъ, и который изъ всѣхъ первымъ быть почитаютъ. Кому не извѣстно, что ФРАТЕРЪ ЯКОБЪ ДЕ БЕАУЛІЕВЪ, въ городкѣ Боуфортѣ въ бургундіи, родился 1697 году, въ Парижѣ пришолъ, и шамъ съ Медиками и Хирургами Королевскими разговаривалъ, и свой лѣченію способъ имъ представилъ, и что онымъ у премножества страждущихъ каменною болѣзнію, да еще въ присутствіи Медиковъ, поступалъ, смотри. МАРТИНЪ ЛИСТЕРЪ инъ теІорнейшо Парисѣ, Лонд. 1690 году въ 8. БУССЕРІИ въ Трансакц. Фил. 1690 году, МЕРІЙ Обсерв. сюръ л' манѣр де талъ данъ де дюксѣ зексѣ пуръ л' экстракціонъ де ла Піэррѣ пратикъ паръ Фреръ Іаковъ а Пари 1700 году въ 12, ДІОНИСЪ на пом. мѣст. Демонстр. 3 стр. 239 и далѣ. Когда сіе онъ объявилъ о себѣ, что изъ чину монашескаго, и имѣетъ искусство, въ которомъ упражняется, будто бы отъ бога откровенное, и творилъ то явно, такъ, что болѣющимъ безъ платы пособствуетъ, тѣмъ кажется дѣлалъ, что съ начала всѣ о ІАКОВѣ были хорошаго мнѣнія. Того ради по повелѣнію Магистратскому дѣлалось, что фратеръ ІАКОВЪ въ 1698 году въ Гошпиталѣхъ любви или челоуколюбія [харитатисъ] и дому божіа [домусъ деі] въ Парижѣ каменною болѣзнію страждущихъ лѣчилъ бы. Но въ корѣ потомъ многіе Лѣкари Парижскіе Якововъ лѣченію способъ такъ охулили, что и исправивши по нему поступать не возможно, говорили. Что особливо МЕРІЙ, ДЕ ЛАУНАУ и КОЛОТЬ дѣлали. Чего ради чтобъ ІАКОВЪ въ то время еще не зналъ лѣчение свое совершенно дѣлать, однакожъ я не думаю, чтобъ изъ того объ ономъ разсудить было должно, что Лѣкари Парижскіе отомъ написали. Кажется тутъ никакого сумнѣнія быть не можеть, что фратеръ ІАКОВЪ въ первыя времена многія бѣдствія смертельныя дѣлалъ, такъ и МЕРІЙ и другіе его увѣщавали, со всѣмъ извѣстно, какииъ способомъ многіхъ только затрудненій избѣгать могъ. Носится же слухъ, что Іакова на подлинный путь привелъ ГУНОЛДЪ, Медикъ Андагенской, который книгу написалъ съ такою надписью. истосъ дю проседъ де фреръ Жакъ, и которую еще невычитанную упоминаютъ пресл. ФАЛКОНЕТЪ на пом. мѣст. стр. 8 и МОРАНДЪ въ Мемоар. де л' Акад. Р. дезъ Сіансѣ. 1731 года стр. 217 и далѣ. Да еще самъ ІАКОВЪ

ІАКОВЪ 1702 году кортсѣдхонькую книжечку издалъ съ надписью : Нувелль методъ де талъ , а шире ла пѣрр де ла везікѣ въ 4. Изъ сихъ книгъ , пресл. МОРАНДЪ говоритъ , видно , что ІАКОВЪ уже въ это время въ томъ лѣченіи упражнялся , которое нынѣ отъ ХЕСЕЛЬДЕНА имя себѣ имѣетъ , или , какъ то извѣстно , 1712 году въ Аргенторатѣ отъ фратра ІАКОБА дѣйствуемо было. Однакожъ въ семъ другомъ періодѣ исторіи фратра ІАКОБА много еще не про-толковано. Протолковалъ ее , но только , вкратцѣ МОРАНДЪ въ Комментар. К. Ак. Наукъ 1731 году. Но пространнѣе противъ его сказалъ пресл. ГЕЙСТЕРЪ въ наставл. Хирург. стр. 988 и далъ , о чемъ спорить мы не намѣрены. Къ исторіи ІАКОВОВОЙ кромѣ напредъ сего прибавленнаго , касается и то , что ДЕ ЛОНЭ на пом. мѣст. стр. 130 и далъ , КОЛОТЪ на пом. мѣст. стр. 82 и ФУЛГЪ въ диссерт. о различныхъ способахъ въ показаніи литотоміи и о преимуществѣ РАВІАНОВА , въ Гіэсѣ 1727 году § 24 противъ ІАКОБА сказали. Снеси также ІАК. ДУГЛАСС. Гистори офъ тхе латерал. Операц. гл. 1 и далъ въ Лонд. 1726 году въ 4, ЭЛЛЕРЪ на пом. мѣст. стр. 195 и далъ , и ШЕФЕРЪ въ диссерт. о различныхъ родахъ литотоміи въ Аргент. 1724 году. Вообще почитается , что ни единъ въ ІАКОВОВЪ лѣченіи слѣдъ не попалъ , однакожъ я получилъ отъ пріятелей , что Аргенторатской Лѣкаръ ЛЕ МЕРЪ по ІАКОВЪ пошолъ. Послѣ ІАКОВОВА лѣченія о РАВІАНОВОМЪ поговорить надобно. Никто не противился тому , что это изъ онаго будто бы родилось. РАВІЙ при вырѣзываніи камня у ІАКОБА спайвалъ , большихъ послѣ рѣзанія мертвыхъ вскрывалъ ; того ради находилъ лѣченіе , ежели части рѣзаныя разсудить , пресизрядное , а погрѣшностей , которыхъ ІАКОВЪ дѣлывалъ , легко избѣгать было можно , шолко иное въ инструментахъ перемѣнить надобно , и лѣченіе дѣлать Медику въ Анатоміи искусному. Утвердился все это можетъ тѣмъ , что когда РАВІЙ Маріаново лѣченіе у многихъ каменною болѣзнію страждущихъ не благополучно дѣлалъ , оставивши оное къ ІАКОВОВУ лѣченію прилѣпился , которое сказываютъ больше двухъ тысячъ у людей дѣлалъ. Многие имѣются такіе , которые думаютъ , что не самъ онъ исправилъ Іакововское лѣченіе , но употребилъ МЕРІЕВЫХЪ соѣтѣвъ , и пресл. ГЕЙСТЕРЪ РАВІАНОВСКО-меріанскимъ называетъ въ диссерт. о снарядѣ высокомъ стр. 11. Но сперва РАВІЙ уже 1698 году это лѣченіе дѣлалъ , смотри ФААКОНЕТТЪ на пом. мѣст. стр. 3. Потомъ ежели РАВІЕВЪ ножикъ который не много отъ того разнствуемъ , который врачующіе въ Маріановскѣ употребляютъ , съ тѣмъ сравнится , который МЕРІЙ выдумалъ , какое несходство ! Какое также въ самомъ рѣзаніи , и доказательно также въ частяхъ рѣзанныхъ ! Ибо РАВІЙ съ желѣзою предстательною пузырь прорѣзываетъ , и АМЕРІЙ желѣзу предстательную одну , да и ее , какъ кажется , не со всѣмъ разрѣзываетъ.

В в в в

Ибо

ибо что нѣкоторые спорящѣ, что РАВІЙ желѣзу предспасительную не ранишѣ, однакожѣ не могущѣ никого представить, которой бы у мертвого въ тѣлѣ видѣлѣ, который бы части въ этомъ лѣченіи прорѣзывать надлежало. Пресл. АЛЪЗИНЪ въ рѣзѣхъ зѣруи Ачатом. кромѣ его смѣтр. АЛЪИНА отпаѣчь на погребеніе РАВІЕВО, ЭРНДТААЛЬ въ пущ. Агл. и Голан. стр. 119 и далѣ, ІАК. ДУГЛАСС. на мѣст. пом. гл. 6, ФЕГРЪ въ диссерт. о камнѣ пузырьномъ стр. 17 и далѣ базил. 1716 году, ФИЛГУСЪ на мѣст. пом. 5. 29 и дал. ШЕФЕРЪ на пом. мѣст. стр. 7 и 25 и дал. БОРЕЦІЙ на пом. мѣст. стр. 11 и дал. Авпорѣ въ предисл. къ КОЛОТУ стр. 48 и далѣ, ВЛЛЕРЪ на пом. мѣст. стр. 195 и далѣ, ЛЕ ДРАНЪ параллель стр. 109 и далѣ, кромѣ ГЕЙСТЕРА и ГАРЕНЖОТА. Ибо говорящѣ, что она сей способъ у живыхъ дѣлала, ГЕЙСТЕРЪ на пом. мѣст. стр. 966 и далѣ, и ФИЛГЪ на мѣст. пом. стр. 44. И также ЛЕ ДРАНЪ, хотя другой пупникъ употреблялѣ, на пом. мѣст. стр. 118. Сказывалѣ мнѣ также ЛѢкаръ, въ этихъ дѣлахъ искусный, что СЕН-ФИЙ РАВІЕВУ лѣченію подражалѣ, что кажется также ГЕЙСТЕРЪ утверждаетѣ на пом. мѣст. стр. 984 и далѣ. Въ Голландіи же отъ многихъ ЛѢкарей учился, имѣетѣ ШЕФЕРЪ на пом. мѣст. стр. 26, ДЕНИСІА видѣлѣ, что онѣ маленькой камень вынималѣ, однакожѣ такъ, что онѣ великую силу къ тому прикладывать былѣ должнѣ. БОРЕЦІЙ на пом. мѣст. стр. 13, ДЕНИСІЙ самѣ книжечку издаѣлъ подѣшвенемѣ прилѣчь. Хирург. о камнѣ въ Лейденѣ 1731 года, въ которой это одно пишеть, что РАВАНОВА способа преимуществу предѣ всѣми другими выхвалеть, и онѣ одинѣ по РАВАНОВУ лѣченію знаеть поступать. Писалѣ противѣ ДЕНИСІА ТИТСИНГЪ Геельхундиге Веронделингъ оверѣ денѣ штеѣнѣнѣ штеѣнѣ-Сниденѣ въ Амстерд. 1731 году. Но многие утверждаютѣ, что послѣ смерти РАВІЕВОЙ, великаго сего Медика, лѣченія путь въ небреженіи въ Голландіи лежалѣ, покуда ХЕСЕЛЬДЕНЪ о прѣготовленіи и возстановленіи опять думать не началѣ. Здѣлалось это 1727 году, когда тожѣ дѣло и въ то же время начиналѣ Д. БАМЗЕРТЪ. Оба они, чтобѣ при рѣзѣнтіи подбрюшномѣ [инѣ секціоне Гипогастрика] пузырь водою наполняли, и ХЕСЕЛЬДЕНЪ особливо изѣ тѣхъ нѣкоторое перебралѣ, что у ІАК. ДУГЛАССА написано на мѣст. пом. въ послѣ писанныхъ. Когда же изѣ болѣешихъ сперва рѣзанныхъ нѣсколько отѣ гнилыхъ болячекъ въ перепонкѣ клетчатой около задняго прохода находящейся, дѣлающихся померло, ХЕСЕЛЬДЕНЪ въ другую дорогу вступилѣ. Открывѣ оную въ тѣ Аппендиксѣ то же фоуртѣ Эдигтонѣ офѣ тѣ Анатоміи 1730 году, и исѣе написалѣ ДУГЛАССЪ въ тѣ Аппендиксѣ то же Гистори офѣ тѣ Латерал. Операцъ въ Лонд. 1731 году, въ 4. Смотри также МОРАНДЪ Мем. де л' Академ. 1731 году. ХЕСЕЛЬДЕНЪ же хотя тѣже самыя инструменты употреблялъ, которые въ Марфановѣ употреблялъ, однакожѣ въ инструментахъ

никѢ , пожикѢ съ оуухомѢ , въ проводникѢ жолобовастомѢ и въ
 клещакѢ нѣчто благоразумно переправилѢ , смотр. ДУГЛАССѢ въ
 прибавл. гдѢ инструментовой изображенія имѣются. Въ этомѢ та-
 кой успѣхѢ получилѢ , что изѢ дватцати семи , которыхѢ безпре-
 станно лѣчилѢ , ни единого , изѢ сорока шести двухѢ только по-
 терялѢ , о которыхѢ никакой надежды не было , чтобѢ вылѣчились.
 Ничего также до сего времени не потеряла отѢ превосходства сво-
 его ХЕСЕЛЬДЕНОВА Хирургіи , но и другіе Лѣкари Аглинскіе въ ней
 упражняются , изѢ коихѢ первый есть ШАРПѢ ; онѢ презрѣдное
 описаніе съ изображеніями инструментовой издалѢ въ Трѣацизе онѢ
 те Операц. сѣбѢ сургери. УспѣхѢ же , который ХЕСЕЛЬДЕНѢ имѣлѢ ,
 пр. МОРАНДУ совѣщовалѢ , чтобѢ въ 1729 году въ ЛондонѢ по-
 бѣдѣлѢ , чтобѢ могѢ отѢ самаго ХЕСЕЛЬДЕНА на этомѢ пути настав-
 ленѢ быти. Смотри МОРАНДОВО писмо СЕНАКУ въ МеркюрѢ де
 ФрансѢ Дек. 1729 году , МОРАНДѢ по возвращеніи 1730 году , въ
 гошпитали челобѣколюбіи также и въ городѢ съ ПЕРЖЕТОМѢ , шести-
 наццатѢ страждущихѢ каменною болѣзнію такѢ этимѢ способомѢ вы-
 лѣчилѢ , что оба по семи человекѢ сохранили , между которыми оной
 мальчикѢ былѢ , котораго исторію имѣетѢ ГАРЕНЖОТѢ въ Оп. Т. 2
 стр. 198 и далѢ , и о которой припомнить можешь , что я сказалѢ
 въ прим. о нушяхѢ , какѢ камни лѣчить стр. 41 и далѢ. Въ то же время
 о ХЕСЕЛЬДЕНОВОМѢ лѣченіи писалѢ ЛЕ ДРАНѢ , и когда многія по-
 требности въ немѢ усмотрѣлѢ , то наибольше заблалѢ , что утвердилѢ ,
 что оно не разнится отѢ Маріанска на мѣст. пом. стр. 139. Боль-
 ше же прочіе Лѣкари сему лѣченію воспротивились. Вопреки ,
 что свое лучше всѣхѢ прочихѢ очень изрядно доказываетѢ ФАЛЬ-
 КОНЕТТѢ въ вопросѢ объявленномѢ. А что о боковомѢ прорѣзываніи во-
 обще говорится , тожѢ есть , аки бы о ХесельденановомѢ было гово-
 рено , ниже покажетѢся. Пресл. МОРАНДѢ , когда упражняшѢся въ
 немѢ не переставалѢ , ни КоролевскимѢ указомѢ ему въ томѢ не за-
 прещено , что въ своей книжечкѢ Операцій ШАРПѢ положилѢ , то-
 гда многихѢ учениковѢ имѣлѢ , которыхѢ этой Хирургіи училѢ. Смотри.
 Рефут. д'юнѢ пассажѢ дѣ третѢ де Мр. ШарпѢ сюрѢ ла талле
 лапераль въ Париж. 1739 году. КакѢ же много каменною болѣзнію
 страждущихѢ чрезѢ сѣзаніе боковое во Франціи сохранено , видѣти
 можно въ истор. Корол. Акад. НаукѢ 1731 , 1734 , 1737 , 1738
 годовѢ и далѢ. Упражнялись въ этой Хирургіи во Франціи въ ру-
 пеллѢ ЛА ГАЕ , въ РошоматѢ ЛЕ КАТѢ , въ ГалахѢ въ испаніи ВИР-
 ГИЛИЙ. Между ними великсе имя сѣбѢ пріобрѣлѢ ЛЕ КАТѢ , ко-
 торый , сперва такѢ же инструменты употреблялѢ , какѢ МОРАНДѢ ,
 а потомѢ иные вымыслилѢ , которыми лѣченіе безопаснѣе дѣлывалѢ ,
 смотр. Г. де ла ФАЕ ремаркѢ сюрѢ ДюонисѢ стр. 251 , и Таб.
 прилож. 2. ИнструментыхѢ употребляемые пушникѢ и дѣа но-

жика , къ которымъ отъмѣнный связи родъ приданъ быть долженъ , для связыванія камнемъ болящихъ , который всѣмъ протѣя превосходитъ. Давно въ прежнее присвоенной книжечкѣ Примѣт. 4 сѣ великаго моего пріятеля ЛЕ КАТА льченіе я переписалъ , какое отъ другихъ получилъ. Послѣ этого времени самъ ЛЕ КАТЪ меня весьма пріятельскимъ письмомъ научилъ , что много въ той перепискѣ ложнаго есть , что какъ я съ благодареніемъ пріемаю , такъ и читателей увѣщаваю , чтобы перепискою оною въ погрѣшеніе впадать не могли , и вскорѣ такую онаго переписку издамъ , о которой искреннѣйшій пріятель ЛЕ КАТЪ чрезъ письмо меня наставлялъ. Далъ также знать , какъ благополучные успѣхи его льченія способъ имѣетъ. Однако мнѣ пріятель сказывалъ такой , который сѣмъ ЛЕ КАТА , видѣлъ , какъ онъ рѣзалъ и которому въ этомъ дѣлѣ совершенно вѣрить могу ; онъ въ 1741 году новое льченіе пробовалъ. Понеже возбужденъ весьма благополучными успѣхами , которые Раванск. е льченіе имѣло , и славою , которая носилась , что РАВИЙ , не вредя желѣзѣ , предстательной , бокъ у пузыря прорѣзывалъ , путешника нѣкакого особенной фигуры преразумно выдумалъ , котораго изображеніе выдалъ МОНРО въ Мед. Эсс. оф. Эдимб. Вол. 5. Таб. 6. фиг. 4. Обстоятельнѣе же описанъ имѣется въ дѣлахъ ученыхъ людей Липс. 1745 году въ мѣсяцѣ Февралѣ. Кромѣ сего ножикъ также придаетъ , правда обоюдный , однакожъ отъмѣнный отъ другихъ , и зеркало заднепроходное , которое уже прежде изобрѣлъ , употребляетъ , для отведенія въ бокъ кишки заднепроходной , а пузырьной боковой лѣвой стороны нѣсколько для прищипки. Сими новыми инструментами 1741 году мудро выдуманное , и часто надъ мертвыми тѣлами испытанное , льченіе у трехъ больныхъ такъ исполнилъ , что у иного пузырь между двумя мочеточниками , у другаго между желѣзою предстательною и мочеточникомъ лѣвымъ и надъ пріятелищемъ сѣменнымъ тойже стороны прорѣзывалъ. Но ни единого изъ нихъ кого ни льчилъ , сохранить не могъ , и когда рѣзаніе за весьма трудное призналъ , тогда желѣзу предстательную наибольше впущенію клещей и вытягиванію камня препятствіемъ призналъ. Которая же слава о РАВИИ пузырь одинъ прорѣзывающемъ Албиновымъ описаніемъ утверждалась , ЛЕ КАТЪ возбудилъ къ льченію сего изобрѣтенію , оное уже около осмнадцати лѣтъ прежде сего ФУЛЬБЕРТА , лѣкаря Парижскаго , двинуло , чтобы также новыя нѣкоторыя орудія выдумалъ , которыми бы могъ къ боковой пузыря сторонѣ безъ поврежденія желѣзѣ предстательной , прищипить. Первые опыты надъ тѣлами мертвыми дѣлалъ 1727 году , а надъ живыми 1731 году. Смотр. Мемоаръ де л' Акад. де Хирург. Том. в стр. 664 и 673. Ни единый до сего времени не сыскался , который бы этому льченію подражалъ. Снеси о семъ льченіи КЕССЕЛЬРИНГІЙ въ Диссерт. о Методѣ Фульбертъанскомъ въ Галб 1738

1738 году. Я въ упомянутой книгѣ, Примѣч. Хирург. Примѣч. 1 и Фульбертъ самъ въ Мемоарѣ де л' Академи де Хирург. Том. 1 стр. 650 и далѣ, гдѣ благоразсмотрѣнія достойное имѣется, что Фульбертъ не такъ, какъ другіе надъ нѣсколькими больными лѣченіе свое до сего времени въ дѣйство производилъ, показываетъ. Орудія, которыхъ Фульбертъ употребляетъ, въ первыхъ КЕССЕЛЬРИНГІЙ на мѣст. пом. послѣ того самъ Фульбертъ на мѣст. упомянутомъ Таб. 1 изобразилъ. Преизрядныя также въ томъ мѣстѣ имѣются частіи рѣзанныхъ изображенія, которыхъ путь къ лѣченію весьма откровенный представляютъ, и которыхъ въ этомъ родѣ, сколько мнѣ извѣстно, первыя имѣются. Полезное и неполезное лѣченія сего кратко отъ меня представлено на мѣст. псм. пространнѣе отъ КЕССЕЛЬРИНГІА. Уравнивалъ то все одно съ другимъ Г. ДЕ ЛА ФАЕ на мѣст. пом. стр. 254 и далѣ. Противъ сего наряднымъ дѣломъ есть письмо, которое подъ титуломъ: Лептрѣ де Монс. (***) Шир-де Провансѣ а Монс. (***) Метрѣ Хирургѣ де Парис. въ Парижѣ 1740 году выпечатано. Однакожъ остро опушалъ то, что въ этомъ письмѣ за ФУЛЬБЕРТА сказано, КОХЛАНЪ въ Обсерв. критикѣ сюръ дѣ Лептрѣ джѣ Хирургѣ де Провансѣ а Монс. (***) Хирургѣ де Пар. 1741 году, къ которой книжечкѣ придалъ можно обоимъ писемъ разборъ критической, въ дѣлакъ ученыхъ людей Липс. 1745 году мѣсяца Февраля. До сего мѣста краткую исторію мы представили лѣченій спраждующихъ людей каменною болѣзнію, которыхъ намъ ужѣ извѣстныхъ; остается еще изъ частіей рѣзанныхъ составить первое то, всѣ ли частіи подлинно различны, такъ и то, въ которое время и что найдено. Того ради въ первыхъ все спраждующихъ каменною болѣзнію лѣченіе на то раздѣлиться можетъ, въ которомъ пузырь надъ костями дѣтородоудными прорѣзывается, и на то, въ которомъ подъ сими костями путь къ пузырю отворяется, скрозъ который камень вынимается. Потомъ въ этомъ лѣченіи, которое въ такъ дѣлается, середняя ли пузыря часть, или больше мочеиспускательнаго ствола часть, или боковая пронзается. Къ обимъ симъ всѣ лѣченія способы принадлежатъ, о которыхъ доселѣ сказано, кромѣ Франконіанскаго, который для того отъ прочихъ весьма далеко отлѣнно и отъ ПЕТРА ФРАНКОНА избрѣжено. Почти всѣкъ знаетъ, что обще въ Маріановомъ та прохода уринаго часть прорѣзывается, которая предъ желѣзою предстательною; и рана, которою кожа прорѣзывается, шву въ такъ имѣющемуся, соотвѣтствуетъ. Чтoby клецки всунуться, и камень вонъ-вытащиться могъ, устье пузыря и путь уриной открытой сильно разшириваться, а часто съ желѣзою предстательною разрываться бывають должны. Хорошо же все дѣлается, ежели сіи частіи такъ разщеливаются, что розрывъ разѣ можемъ разрѣзанной будеть соотвѣтствовать, смотр.

В в в в з.

КО-

КОЛОТА на мбст. помин. стр. 84, 86, и особенно ЛЕ ДРАНА на мбст. пом. А о томъ лбченіи, въ которомъ съ боку разрѣзъ дѣлается, различныя мнѣнія имѣются. Ибо хотѣли, чтобъ въ равнаномиомъ одинъ пузырь, послѣ желѣза предстательная, съ боку прорѣзывалась, которому рѣзанію ФУЛЬБЕРТЪ и ЛЕ КАТЬ подражать хотѣли. Однакожъ многіе РАВІА защищаютъ, что онъ пузырь не другою дорогою, но какъ Хесельденъ открывалъ, гдѣ путь уринной въ плевной части, желѣза предстательная вся, съ близъ лежащую пузырьною частью съ боку разрѣзывается, которою онъ къ лѣвому спегну лежишь. Хотя этотъ внутренній разрѣзъ почти прямо назадъ идетъ, однако вышній нѣсколько наискось внизъ проводится. И онымъ разрѣзомъ мышка бульбокавернозная по большой части съ боку немножечко повреждается. Но положимъ, что боковое рѣзаніе Хесельденское лбченіе есть; понеже въ ономъ почти всѣ упражняются, которые говорятъ о себѣ, что боковымъ рѣзаніемъ лбчили. А Хесельденское отъ Іакобовскаго не разнится, то на примѣръ, которое фратеръ ІАКОБЪ, или въ Аргенторатѣ, чтобъ мѣ этотъ примѣръ упростить, у больныхъ каменною болѣзнію употреблялъ, или которое МЕРІЙ хвалилъ на мбст. пом. глав. 1, 2; смотр. пресл. МОРАНДА въ мем. де л' Акад. на мбст. пом. стр. 216. Весьма въ народѣ разглашенное дѣло есть, когда РАВІА о способѣ его лбченія спросили, отвѣтствовалъ, читай ЦЕЛЬСА; и МЕРІЙ подозрѣніе имѣлъ на ІАКОБА, что онъ этотъ способъ лбченія отъ кого ни будь перенялъ, которому чрезъ чтеніе ЦЕЛЬСА въ голову пришло такое лбченіе выдумывать, на мбст. пом. стр. 64. МОРАНДА же совершенно открывъ на пом. мбст. стр. 222 и далъ, что боковое рѣзаніе, сколько до частей рѣзанныхъ касается, самое настоящее или подлинное ЦЕЛЬСОВСКОЕ и всѣхъ весьма древнѣйшее есть. Кажется же сіе мнѣніе и ГАЛЕНОВЫМЪ нѣкоторымъ мбстомъ утвердиться можетъ, который въ веден. на мбст. пом. говоритъ, что Лѣкари, ежели хснятъ камень вонъ вынимать, должны мясную пузырьной шѣйки часть разрѣзывать. Чего ради рѣзаніе боковое должно такъ раздѣлить, чтобъ одно малымъ снарядомъ, другое великимъ, дѣлалось. Первое будетъ Цельсовское, а другое Іакобовскимъ еще будетъ называться. Хотя же вообще ФАЛЬКОНЕТЪ все это кажется утверждаетъ, однако мнѣніе предложилъ, по которому боковое рѣзаніе съ великимъ снарядомъ дѣланное, Іакобовское гораздо древнѣйшее будетъ. Прежде ФАЛЬКОНЕТА общее всѣхъ мнѣніе было, что ИВАНЪ ДЕРОМАНИСЪ, когда новую дорогу къ лбченію камней выдумывалъ, это у себя въ намѣреній имѣлъ, чтобъ мужеской путь уринной съ женскимъ одинаковымъ дѣлать, и корочшій въ пузырь прохоль отворить. Напротивъ того ФАЛЬКОНЕТЪ разсуждаетъ, что ИВАНЪ ДЕРОМАНИСЪ основательно думалъ, что онъ изобѣженною дорогою также легко, какъ

Цель-

Цельсовскимъ лѣченіемъ къ пузырю приписать можетъ на пом. мѣст. стр. 9. Какое ИВАНОВО намѣреніе ни было, инѣ извѣстно, что межъ тѣми, которые прежде ІАКОВОВЫХЪ временъ, другое камнемъ спраждающимъ лѣченіе употребляли, а не то, которое или съ малымъ снарядомъ, или въ подбрюшной самой частѣ бываетъ, весьма многіе были, которые или съ намѣреніемъ, шѣйку пузырьную, по пупни- ку отворяли, или въ томъ мѣстѣ были, что они Маріаново лѣче- ніе дѣлаютъ; снеси ФУЛЬБЕРТА помян. мѣст. стр. 660. Межъ эти- ми первый есть ПЕТРЪ ФРАНКО, котораго рѣчи я привожу: Я Иванъ ле разоаръ а л' андре де ла дитъ канюль [такъ называ- етъ пупника] иль фо коппе ле коль, де ла весикъ сторъ ла камите д' Ісель. Ла фе, онъ трамера ле дитъ разоаръ паръ де- данъ Іселя, ле кель комъ явонъ дѣ паръ си деванъ коппера де дѣсъ кость, слѣонъ к' иль э фигуре: аянъ фе ас- се бонъ увершоръ веръ ла капасите де ла вес и протч. И недавно напередъ сказалъ, что разрѣзъ на лѣвомъ боку дѣлать должно въ томъ мѣстѣ, гдѣ Цельсовская бываеъ на мѣст. пом. стр. 130. Протчіе, которыхъ я знаю, ИВАНЪ АНДРЕЙ а КРУЦЕ на мѣст. пом. кн. 7 стр. 23, который думаетъ, что всю шѣйку разрѣзывать должно, чтобы камень видѣнь дѣлаался, что подлинно въ Маріановомъ бытъ не можетъ ФРИДЕР. ДЕ ЛОСОНЪ въ лѣвомъ боку, на два или на три перста отъ задняго прохода хотѣтъ разрѣзъ дѣлать на мѣст. пом. глав. 8; ДУРАНТЪ СКАКХЪ, на концѣ ягодицы лѣвой, разрѣзъ дѣ- лалъ на мѣст. пом. стр. 187. Смотр. также ГИЛЬДАНЪ на мѣст. пом. гл. 4, КОВИЛААРДЪ на мѣст. пом. стр. 101. Сіи всѣ ежели не по Хесельденову способу въ лѣченіи поступали, однакожъ близъ того воротались. Послѣ ІАКОВОВЫХЪ временъ и особливо послѣ РА- ВІЕВЫХЪ и ХЕСЕЛЬДЕНОВЫХЪ преблагополучныхъ успѣховъ, многіе, которые въ Маріановомъ упражнялись, сію такъ помаленьку перемѣ- нили, что новое лѣченіе дѣлали, которое шогло бы называться среднимъ между Маріановымъ и Хесельденовымъ. Эпаль причина то- му, что такое бываеъ различіе въ числѣ спраждающихъ каменную болѣзнь, которое въ Госпиталѣ Дому Божіа въ Парижѣ 1720 году и далѣ и 1740 году сохранены; о которомъ дѣлѣ смотр. у МОРАНДА претѣ де ла таллаъ о томъ аппаратѣ стр. 263 и КОГЛААНЪ на мѣст. пом. стр. 35; снес. также о недавныхъ мѣстѣ въ Маріано- вомъ лѣченіи упражняться ДЕ ЛОНЕ на пом. мѣст. стр. 99 о томъ де л' устрѣдъ, ТОАЕТЪ на мѣст. пом. стр. 173, ЛЕ ДРАНЪ Па- раллель стр. 59, КЕНЪ на мѣст. пом. стр. 19, 21, Г. де ла ФАЕ на пом. мѣст. стр. 223, смотр. также изъ старинныхъ ПАРЕЙ на пом. мѣст. гл. 42. Того ради лѣченій, которыя спраждающимъ камен- ную болѣзнь употребляютъ, два началѣйшіе рода. Ибо камень вонъ вынимается, когда пузырь бываеъ надъ костями дѣтородоу- щими

ными прорѣзанъ , или подъ ними. Однако это тремя способами дѣлается. Понее путь уринной , или прямо прорѣзывается, какъ бываетъ въ старинномъ Маріановомъ , или наискось, какой разрѣзъ новѣйшіе дѣлаютъ , которые отступитъ отъ Маріанова не хотятъ , или поперегъ съ боку. Это весьма старинное есть , а понее нѣкоторое въ инструментахъ есть несходство , что безъ пущника употребляется, Цельсовскимъ называется, а которое съ пущникомъ , хоть обще Іаксбовскимъ называется, должно конечно Франконіанскимъ называться. Однакожъ признаться надлежитъ , что это наибольшее въ томъ отъ первыхъ разнѣствіе имѣетъ , что , какъ въ семъ шѣйка пузырная , и самый пузырь отворяется, въ оныхъ только путь уринной.

(**) Между лѣченіями, рукою дѣйствируемыми, очень мало лѣчащихъ для вырѣзыванія камня изъ почекъ мѣсто дающихъ, которое дѣйствіе нефротоміею называется. ИППОКРАТЬ , гдѣ болѣзни почечныя ни упоминаетъ , въ первомъ мѣстѣ камень называетъ. У кого боль ежели приключится , прикладываешь сверху надлежитъ вещи , которыми согрѣвать могутъ. Ежели подъ этими припарками опухоль здѣлается , въ которой опухоли и гной будетъ , близъ почки разрѣзать должно , и камень или песокъ вынувши рану залѣчить. Въ книгѣ о внутрен. узвлен. стр. 539 сей лѣченія способъ охулили изъ древнихъ АВИЦЕННА кн. 3 фен. 18 тракт. 2 гл. 18 и СЕРАПІОНЪ въ Практик. Тракт. 4 гл. 22. Можетъ быть , нѣкоторые осмѣлились , гдѣ почка и не распухла , и гноей не дѣлался, камень вырѣзывать. Такое должно быть рѣзаніе , каковымъ Эгерю Парижскому камень , сказываютъ, вынуть , лишъ бы только подлинно камнемъ мучился. Смотр. у ФАРЕЯ въ кн. 18 гл. 19 и у МЕЗЕРАЯ на мѣст. пом. РОССЕТЪ споритъ , что это лѣчение безъ опасн. стѣи очевидной смерти предпріять не возможно, однакожъ должно дѣлать не на хребтѣ да близъ костей подвздошныхъ , въ анфаятъ Цесарь стр. 78 и парт. Цесар. Ассерт. стр. 222 и далѣ. Почти тоже РЮЛАНОВО мнѣніе было кажется , въ Анеропсграф. кн. 2 гл. 26. Однакожъ больше склоняется , ежели въ опухоли гноей будетъ , то наложить лѣкарство прижигательное должно , въ Энхирид. Анаст. патолог. кн. 2 гл. 29. Сего лѣченія отъ ДОМИНИКА МАРХЕТТИСЪ нѣкогда здѣланнаго , примѣръ имѣется въ Трансакц. Филос. но 223 стр. 340. Не хвалитъ его, и различные доказательства на то дѣло приводитъ НИКОЛАЙ ТУЛЬПІЙ въ примѣч. мед. кн. 4 гл. 27. Отъ ТУЛЬПІЕВА мнѣнія теперь изъ лѣчащихъ очень немногіе отстаютъ. Смотр. изъ новѣйшихъ писателей ИВАНЪ ДУГЛАССЪ въ мед. Эссайс оф. Эдинб. Том. 1 прим. 21 , но не многіе , гдѣ камень чирей безверхушесный дѣлаетъ , прорѣзывать смѣютъ; понее говорятъ , что рана не сходится , но вѣчно фистула остается. Не хочу спорить , понее почти глубоко подъ мышками на хребтѣ лежатъ , и великимъ

кимъ множествомъ жиру облиты, но немало фистулы опасаться должно. Но ежели сама собою опухоль здѣлается, и въ ней гной покажется, кто воспретитъ опухоли прорваться, понеже гнойная матерія внутрь обратится, и человѣка уморитъ? Чего ради надлежитъ стараться, чтобъ вожеженію случая не дать, однакожъ я думаю мудраго Медика дѣло быть, такъ долго не дожидаться, покуда самъ чирей безверкушешный прорвется, но недозрѣлый потчасъ прорѣзывать. Понеже чемъ долѣ гной внутри держится, тѣмъ больше опасаться фистулы должно. Изъ различные примѣры сего лѣченія имѣются. Смотри о Нефрстомѣ ГЕОРГ. ВОЛОГ. ВЕДЕЛ. въ диссерт. о Литотоміи въ Іен. 1704 году, пресл. ГЕЙСТЕРЪ въ наставл. Хирург. стр. 203 и далѣ, ІАКОВЪ МЕРВ на мѣст. пом. стр. 2 и далѣ, и ФРАНЦ. КОЛОТЬ на мѣст. пом. стр. 36 и далѣ.

\$. 1357.

Завсегда вообще безчеловѣчнымъ и отважнымъ дѣяніемъ почитася было то, какое у спорадическихъ каменною болѣзнію употреблялось. Да и спорить тому не возможно, что Медицина или Врачеваніе въ эпоху и нынѣ часто обманываетъ, хотя ни въ одномъ ручномъ дѣйствіи такъ много не извѣдано. Того ради, чѣмъ многія въ немъ и роды и времена бѣдственныя имѣются, тѣмъ меньше къ дѣйствию сему спѣшить надобно. И кпю оно дѣйствіемъ испытать похочетъ, сперва надъ многими мертвыми тѣлами утвердиться долженъ.

§. 1358.

Камень, пузырю досаждающій, никогда ни въ ка-
кихъ лѣтахъ больше не бывашъ чувствителенъ, какъ
въ ребячыхъ. А изъ ребятъ бѣдственнѣйшій бывашъ
тѣмъ, которые отъ родителей скудныхъ родятся.
Изъ чего догадываться можно, что камню по большой
части пища и питье причину подаешъ, изъ грубой,
Г г г г кислой

кислой и клейкой матеріи приготовляемыя. Однакожъ въ доказательствѣ можетъ быть, что иногда и изъ природной нѣкакой почешной и пузырьной вредности родится. Понеже весьма многіе спрадущихъ каменною болѣзнію примѣры имѣются, которые будучи въ ребячествѣ рѣзаны, однако молодцами и мужами адѣлавшись, опять и прешій камень въ пузырь имѣли (*). У взрослыхъ напротивъ того рѣдко камень въ пузырь родится, но только подростаетъ. По большой же части, или небольшой камушекъ, или песочку нѣсколько, которыя съ частицею гноя или крови сросшись, съ мочою изъ почекъ въ пузырь перекапываются. Изъ чего тутъ видѣть ясно можно, сколько различныхъ причинъ быть можетъ у взрослыхъ къ каменной болѣзни. Когда такой камушекъ въ пузырь опустился, то на немъ, изъ иловатыхъ частицъ, какія въ мочѣ бывають, многія скорлупины нарастають, ежели мягкой и песчаной камень не будетъ. Часто бываетъ, что ежели такой камушекъ сожмется, оной, который изъ почекъ въ низъ упадетъ, вонъ выходитъ. Какъ же иловатая матерія на камнѣ нарастаетъ можетъ, такъ и на всякомъ тѣлѣ, которое какою бы дорогою въ пузырь ни пришло. И апотъ то настоящій пузырьный камень называется. Понеже найдены въ камняхъ, какъ изъ живыхъ людей, такъ изъ мертвыхъ вынутыхъ, различныя желѣзца, иглы, палочки, пули свинцовыя, волосяные снопики, перья, кноты, вошаныя свѣчки и другихъ премножество (**). Однакожъ въ томъ нѣтъ никакого сумнѣнія, что камень въ пузырь, къ частицѣ гноя и къ крови, а можетъ быть и къ возгрямъ, пузырь обмазывающимъ, приростаетъ можетъ, особливо, когда пузырь

из-

изнутри многія скважни или ноздреватины будещъ имѣть, въ которыхъ моча нѣсколько времени задер- живася (***).

(*) Изъ многихъ примѣровъ, которые бы представить можно, нѣсколько только соберемъ. ФРАНЦ. ТОЛЕТЪ на пом. мѣст. стр. 256 мужчину имѣлъ, которому въ самомъ его ребячествѣ камень чрезъ рѣзаніе вынутъ былъ, напоследокъ въ пятьдесятый отъ рѣду годъ, опять камень въ почкахъ родился. Другой примѣръ упоминаетъ де ЛАУНАВ на пом. мѣст. стр. 40 и далѣе, который тѣмъ наибольше достопамященъ, что когда послѣ перваго выдѣзыванія фистула осталась, однакожъ камень двенадцати унцовой въ пузырьъ выросъ. Дважды освобожденъ былъ отъ камня РЮЛАНЪ, что самъ свидѣтельствуемъ въ разсмотр. на СПИГЕЛІА, трижды ЭЛЛАДИНЪ, Медикъ Парижскій у ГУРМЕЛЕНА въ операц. стр. 185 и другой у КОЛОТА на пом. мѣст. стр. 15. Многіе имѣются примѣры человѣческіе, гдѣ пошрижды по четыре и по пяти разъ рѣзаны были, смотр. у ГЕЙСТЕРА въ Наставл. Хирург. стр. 1003 и въ Мем. де л'Акад. де Шир. Том. 1 стр. 4, 15 и далѣе.

(**) Многіе примѣры собранные смотр. въ Платнеровой диссерт. о камнѣ въ пузырю приростшемъ §. X, къ которымъ пригласиася могутъ ЮСИФА КОВВИЛАРДА въ Примѣч. Іатрохир. стр. 39. Онъ камень выпалилъ близъ пульки свинцовой вырослой, подобный сему примѣръ ДЮНИСЪ также упоминаетъ на пом. мѣст. стр. 243; смотр. также у КОЛОТА на пом. мѣст. Снопокъ волосаной, около котораго каменная матерія облѣпилась ОЛ. БОРРИХІЙ видѣлъ, снес. дѣл. ГАВН. вол. 2 примѣч. 55. Шила сапожническаго, въ камнѣ торчащаго исторію смотри въ Эдѣак. Медич. Франц. 4 года стр. 29. Два камня въ обломкахъ трубки табако-курительной приростшіе имѣлъ КЕНЕ на пом. мѣст. стр. 8, у человека, изъ котораго сіи камни вынуты, напередъ сего камень вырѣзыванъ. И когда въ ранѣ свербежъ имѣлъ, которой ему досаждалъ былъ, оныя обломки въ фистулу вкладывалъ, и оными рану почесывалъ, а понеже очень коротки были, въ пузырь ихъ упустилъ. Кнотъ изъ пражы здѣланной, и камнемъ обростлой, который за тридцать четыре лѣта назадъ въ чирѣ безверхушешномъ надъ костями дѣтородоудными потерянъ былъ, изъ пузыря у женщины честной и пожилой вынулъ КОЛОТЪ на пом. мѣст. стр. 49 и далѣе. Ключикъ въ камнѣ найденный поминаетъ МАТВЕЙ въ Примѣч. ади. тогожъ Вопрос. Мед. стр. 128. Игольникъ, который дѣвочка чешучись, въ пузырь впишула, и около котораго

Г г г г 2

ка-

268 РАЗЛИЧ. ЛБЧ УСТРАЖ. КАМЕН. БОЛБЗ УПОТ.

камень сбрось , изъ ЛУИСЦА БОРЕТІЙ имѣетъ на пом. мѣст. стр. 18 , смотр. ВАЛЛИСНЕРОВЫХЪ дѣлъ Том. 3. стр. 310 и дал. Снѣ всѣ насѣ учатъ , ежели ради какой нибудь несправности фистулу въ пузырь оставишь должно , которою бы моча выходить могла , не очень долго оставляшь должно , чтобъ не могъ большій вредъ въ проходѣ уринномъ здѣлаться , ежели песокъ прилипнетъ.

(***) Снести сюда должно ГУСТЕТОВО разсужденіе о камняхъ въ перепонкѣ заключенныхъ въ мемоар. де л' Акад. де Шир. Том. 1. стр. 395. и далъ.

§. 1359.

Перейдемъ же къ тому , чтобъ я могъ показывать , какіе знаки можетъ имѣть человекъ камнемъ спраждающій. И хотя оныхъ есть премножество , однакожь одинъ только способъ достовѣрные знаки камня показываетъ. И такъ у кого въ пузырь камень будетъ , оному часто мочиться хочется , и чувствуетъ въ такъ и около луны тяжесть. Боль также въ сихъ часпахъ почти всегдашняя , и при движеніи верхомъ на конѣ и въ коляскѣ пріумножается. Умножается также , когда мочиться захочется , моча оная часто , или прерывается , или , будто бы поненькою нишечкою течетъ. Течетъ же моча , или водяная , или съ возгрями смѣшенная , или будто бы нѣкоторую иелуху въ себѣ имѣющая. Гдѣ движеніе передъ нѣмъ бываетъ , то и кровь съ великою болью , течетъ , или моча кровавая. Больные въ то время , а особливо ребята , обыкновенно попку чешутъ , или потягиваютъ. Часто также не хопя , и съ досадою , вздрачиваютъ. Прежесткая боль бываетъ , тогда , когда свѣжия самыя капельки уринныя испускать надобно , а въ шупору и испражниться похочется. Въ знакахъ сихъ всѣхъ есть то , что можетъ обманывать. Но въроятіе о камнѣ дѣлаютъ перстѣ въ задней проходѣ всунутый .

и къ пузырю пригнутой, а наибольше трубка, которая проходомъ уриннымъ въ пузырь всплавливается. Однакожъ и съ трубкою не во всякомъ случаѣ совершенно о камнѣ извѣстны быть могутъ лѣчащіе люди. Ибо, ежели маленькой камушекъ будетъ, можетъ уйти отъ трубки; ежели мягокъ и пещанъ, или въ перепонкѣ заключенъ, подозрѣніе о бородавкѣ какой нибудь здѣлаетъ, какія часпо въ пузырьъ вырастаютъ, или на внутренней пузырьной перепонкѣ окрѣплой. Чего ради лѣчащимъ недовольно того, что они трубочку въ пузырьъ впускаютъ; но какъ опущена будетъ, туда и сюда поворачивать должно, да бы шѣмъ, ежели камень въ какомъ нибудь мѣстѣ спрячется, или по большой части въ плевъ пузырьныя вопьется, однакожъ чрезъ долгое и любопытное испытываніе нашелся. А прямое и достовѣрное доказательство на то, что камень въ пузырьъ есть, быть можетъ, когда трубочка на камень попавши зазвенитъ. Много также пособствуеетъ и то, ежели узнаетъ, одинъ ли или много камней въ пузырьъ есть, движущся ли или прирослы, велики или малы, а припомъ цѣль ли пузырь, или плены порчу какую имѣютъ. Но это лучше проискывать должно, а особливо у ребятъ, перстомъ въ проходъ всунутымъ, нежели трубочкою въ пузырь опущенною.

§. 1360.

Не всѣхъ же каменною болѣзью страдающихъ лѣчить можно безопасно. Того ради рѣзать не должно того, у кого пузырь распухъ, и мозолностью окрѣпъ, у кого въ пузырьныя плевъ камушки вросли, у кого съ мочою нѣчто гнойное, или вонючее, испражняется; а наипаче, когда больной поясницею жалуется, и признаки попорченныхъ почекъ имѣются.

Г г г г з

Спа

Старость также удержатъ лѣчащаго человѣка можешь, будто бы очень испорченное состояніе будучи. Также всякая жилъ чувствительныхъ порча больнымъ негодною сѣю Хирургію дѣлаешь, и живота лишаешь, ежели очень великъ камень будешь, или въ плевѣ какойнибудь будешь заключенъ: Ежели же больной и сродники похотѣли бы сего пособія лучше оповѣдать, нежели никакого, разсуждая спрахъ, заключаешь надлежитъ, что никакой надежды шутъ не осмѣется. И никогда невольно подлинное здравіе обѣщать. Однако много надежды дѣлать можешь лѣша отроческаго, тѣло здоровое и мужественное. Камень, который не очень великъ, и не весьма малъ бываетъ, который нѣкоторую гладкость имѣетъ и умѣренную жесткость, и къ пузырю не приросъ, кажется также лѣченіе благополучные успѣхи имѣть будешь, ежели то, что съ мочою вонъ испражняется, не кроваво, ни гнойно не будешь.

§. 1361.

Того ради, гдѣ послѣднее испытать поставлено будешь, все осторожно весьма дѣлать надлежитъ. Понеже не во всякое время предпринимать то должно, но весною и осенью. Ибо внутренія особливо части, какъ солнечный жаръ, такъ и холодъ, повреждаетъ. Однакожь смотрѣть надобно, не воспослѣдуетъ ли изъ оплагательства бѣдствія. Чего ради, ежели больного оставишь до того времени, которое къ лѣченію способнѣйшимъ признавается, невозможно, чрезъ искусство пособлять тому должно, безмѣрной жаръ и безмѣрную стужу умѣренными дѣлать. Присемъ всегда не безопасное дѣло, не прѣуповѣвъ, какъ надлежитъ, человѣка, лѣчить начинать. Гораздо лучше его прѣуповѣлять пищею, нежели лѣкарствами. И
больной

больной долженъ употреблять ѣствы сокъ хорошій въ себѣ имѣющія , изъ которыхъ сокъ пипапельный легко движимый приуготовляться могъ бы. Не позволять же больному много и обжираться. За нѣсколько дней предъ лѣченіемъ, кровь изъ жилы кровес-возвращательной пуспить , ежели крайняя слабость или другое что ни будь препятствовать не будетъ. Послѣ того также очень хорошо , слабительное дать , что наибольше въ юнѣ день , когда операцію дѣлать , полезно клистеромъ произвести. Ибо заднепроходная кишка , ежели крѣпкимъ густымъ каломъ будетъ распялена , то какъ ножикомъ , такъ камнемъ , во время вниманія легко повредиться можетъ. Кромѣ сего , когда уже дѣйство производить время придетъ , Медикъ приказать долженъ вонъ выпить , какъ всѣмъ шѣмъ , кто дѣла тушь не имѣетъ , такъ особливо сродникамъ или знакомцамъ болящаго , которые разговорами , слезами или и самымъ смотрѣніемъ , у него великодушіе отнять могутъ. Въ помѣ дѣлѣ сполько опасности есть , что иногда весьма сильные люди отъ него такъ ослабѣваютъ , что , по вынятіи благополучно камня , однакожъ погода нѣсколько , вовсе опускающа.

§. 1362.

Когда въ нашемъ вѣку такъ много къ лѣченію каменную болѣзнію страждущихъ сыскано , что многія и дороги имѣются , которыми въ пузырь пройти и камень вынуть можно , то врачующіе согласиться должны , которое изъ сихъ лѣченій больному полезнѣйшее быть можетъ. Понеже не всякому одинъ способъ можетъ быть полезенъ. Того ради , ежели камень необыкновенно великъ будетъ , а пузырь не весьма поврежденъ и малъ , надлежитъ рѣзать по-

повыше костей надѣпородоудныхъ , напротивъ того , ежели пузырь сильно жмѣтъ будѣтъ , и будто бы скиррозной , то шѣйку пузырьную съ боку отворять должно. Тоже Франконіанское лѣчение , или ежели мальчикъ будѣтъ , Цельсовское употреблѣть надобно , гдѣ камень въ шѣйкѣ пузырьной такъ увязнетъ , что назадъ его просунуть , и трубки въ пузырь вставишь не возможно. Также въ природѣ камня множество различій естъ : Того ради , ежели гдѣ онъ гораздо шероховатъ будѣтъ , и ежели будто сучки имѣтъ будѣтъ , безопаснѣйшее самое дѣло , ХЕСЕЛЬДЕНОВЪ къ лѣченію употребить способъ. Ежели мягко и пещанъ , и съ мочою много песку будѣтъ выходить , лучше такоужь дорогою или МАРІАНОВОЮ поступать , только чѣмъ не было много камушковъ. Ибо мягкіе камушки велики не бываютъ. Иногда камушки въ перепонкахъ обернутые бываютъ ; или грибы и мясища негодныя на пузырь нарастаютъ. Въ такомъ случаѣ или Франконіанскимъ , или Хеселденскимъ способомъ въ рѣзани поступать : Этимъ , ежели камень , или грибокъ , въ низу въ пузырь споятъ будѣтъ , а тѣмъ , ежели въ верху. Однакожъ требуется шутъ , чѣмъ Врачъ во всѣхъ сихъ способахъ лѣченія былъ искусенъ , или хотя бы только надъ мертвыми шѣлами часпо дѣлавшій , а иначе : поступать должно по тому , въ копоромъ онъ упражнялся , и копорый ему у многихъ больныхъ удавался , хотя бы другой способъ былъ и лучшій.

§. 1363.

Которые въ нашемъ вѣку страдающихъ каменною болѣзнію лѣчатъ. Многіе поступаютъ по МАРІАНОВУ способу , или какъ говорятъ , съ великимъ рядомъ

рядомъ рѣжутъ. Чѣмъ большій снарядъ бывася , тѣмъ фиговатѣе все дѣлать должно , и чѣмъ только прорѣзывать требуется , не начинаючи дѣйствія , такъ разположить и въ готовности имѣть , чѣмъ дѣйствіе лѣчебное никакого замѣшательства не претерпѣло. Орудія къ сему дѣйствию потребныя. 1) Спицы изъ прѣкрѣпкой стали зѣланныя , и больше самыхъ трубочекъ , которыми мочу вонъ выпускаемъ , закорюченныя. Должны также длиннѣе , трубочныхъ эпихъ носковъ , носъ имѣть , и на горбатой или выгнутой сторонѣ , жолобокъ въ длину протянутый , на самомъ же кончикѣ пропиленный , отъ чего кажется ихъ и назвали , пупешесшвенникомъ , путевожомъ [ипинераріумъ]. За которое мѣсто Врачу держать , должны быть пополице , чѣмъ безъ причины не шатались. Надобно также камни вынимать желающему , какъ для того , что лѣжа бывають неровныя , такъ и для того , что въ пупи уринномъ нѣкоторыя различности имѣются , различной величины и полстопы , и различной кривизны спички имѣть. 2) Ножикъ широкой и обоудной , который будучи въ пятѣ своей неукрѣпленъ , обвязочкою и холстинкою разрѣзанною обвить должно , отъ чего не только неподвиженъ дѣлается , но и безъ опасности поврежденія крѣпко Врачъ держать можетъ. Однако гораздо лучше , чѣмъ на палецъ только отъ конца воспре было. Есть также нѣкоторые Врачи , которые дѣлають ножики въ черенѣ укрѣпленные , и изъ воспредѣвъ , одно къ таку обернутое , нѣсколько закорюченное , а другое , которое къ верху оборочено , почти прямое. Но гораздо хорошо по меньшей мѣрѣ два такихъ ножика въ готовности имѣть , у которыхъ первое это быть должно , чѣмъ были хо-

А А А А

рошо

рошо выпочены 3) Вождь жолобоватой [дукторъ каналуляпусъ] (Горжерешъ), по которому клещи въ пузырь всавываться должны. Требуется, чтобъ съ одного конца язычекъ имѣлъ, съ другого ручку нѣсколько поширѣ и налѣво согнутую. Въмѣсто этого и два употреблять можно, изъ нихъ одинъ женщиною, а другой мужчиною называютъ. Первый, будто жолобоватой вождь, язычекъ и рукоятку имѣетъ, а кромѣ того гребешокъ, во всю длину свою вождеву протянувший, на срединѣ высунувшійся. Въ другомъ вождѣ этого гребешка нѣтъ, и онъ не язычкомъ, но будто бы вилочками кончится. 4) Клещей нѣсколько, которыми камень вынимать надлежитъ; въ оныхъ первая эта доброта быть должна, чтобъ изъ спали были здѣланы хорошо закаленной, дабы иногда во время сильнаго дѣйствія не переломились. Послѣ того нѣкоторые великія, а другія малыя быть должны, и между обоими однѣ прямыя, а другія кривыя. Которою частью камень закусить имѣютъ, должны быть вызубрены, и нѣсколько вогнуты. 5) Крюкъ спальной, которой иногда въ пузырь всавывать надобно, или для маленькихъ камешковъ выпаскиванія, или и для великихъ, ежели онъ въ рану вошелъ, а клещами его захватить невозможно. Крюкъ этотъ будто клещи, долженъ быть вызубренъ. 6) Инструментъ (бупонъ) называемый, будучи на одномъ концѣ лошкою здѣланъ, на другомъ пулечку (бупонъ), на спинкѣжъ гребешокъ имѣетъ, слово въ слово какъ вождь, женщиною называемый, прякое употребленіе имѣетъ, очемъ нѣже объявлю. Кромѣ всего сего суденышко какое нибудь съ масломъ теплымъ подъ руками у него быть должно. Ибо каждой ин-

инструментѣ въ пузырь впускаемый , въ масло теп-
лое обмакивать должно. А припомѣ гораздо лучше
нѣкоторую сумочку себѣ подвязать , и въ нее инстру-
менты повкладыть такѣ , чтобѣ ручки онѣ повы-
сунулись (*) , нежели на блюдо раславши дать слу-
жильцу держать. Понесе онѣ не такѣ о своей дол-
жности печется , какѣ по примѣчается , что Врачъ
врачующій дѣлаетъ. На послѣдокѣ Врачъ имѣвши долженѣ
обвязки , или укрои , которыми такѣ больного свя-
зывать , чтобѣ онѣ не могѣ ворочаться.

(*) Фигурою такія сумки изобразили АЛХИЗІЙ на пом. мѣст. Таб.
7. и ГЕЙСТЕРЪ въ своемъ мѣст. Таб. 30 фиг. 6.

§. 1364.

Тутѣ всѣ надобности для лѣченія весьма нуж-
ныя представлены. Надлежитѣ же припомѣ спараться ,
какѣ больного положить. Весьма хороша сполѣ въ
готовности имѣти такой , которой бы не шатался ,
и не двигался ; на томѣ сполѣ или спулѣ обернувши
кладушѣ , чтобѣ за спиной конецѣ на двѣ или на
три ладони до краю споловаго не досталѣ , или широ-
кую какую ни будь доску такимѣ же расстояніемѣ
отѣ краю , чтобѣ она двигалась , поставитѣ должно.
Кѣ оной придѣлать сзади должно движимую подпорку ,
и прошивѣ той вдоль сполѣ подѣлать нѣсколько зазуб-
ринѣ вырѣзныхѣ , чтобѣ доска чрезѣ то могла выше
спавитѣся , и ниже опускаться (*). Междуѣ доскою и
краемѣ споловымѣ , мѣшокѣ соломою набитой , или ка-
мышѣ положить надлежитѣ , который бы подпираетѣ
могѣ. На нихѣ поспивается проспыня , и которымѣ мѣ-
стомѣ больному на доску ложитѣся , тутѣ подушки
подкладываютѣся ; въ то время больной на все это
кладетѣся , и унаравливается такѣ , чтобѣ ягодицы о
Д Д Д Д 2 край

276 РАЗЛИЧ ЛѢЧ. У СТРАЖ. КАМЕН. БОЛѢЗ. УПОТ.

край сплотовый оперлись, и раскорячивши нѣги пятъ къ ягодицамъ, а руки опущенныя къ мышцелкамъ наружнымъ ножнымъ приведены были. Однакожъ иногда случается, что руки только до колѣнъ довести можно, бываетъ. А чѣмъ ихъ удержать было можно, связать вмѣстѣ должно. Звѣрообразное кажется дѣло, и страхъ такой видячи больные многократно совсѣмъ умирали, длинную обвязку четвероконечную накинущи на шѣю, разными дорогами къ рукамъ и къ ногамъ ийти, и оными нѣсколько разъ обвертывать. Того ради гораздо лучше на руку пеплю наложить, и съ сѣ ногою или съ колѣнами вмѣстѣ связать.

(*) Фигуру такого сполы видѣть можно у АЛХИЗІА на похмѣст. таб. 8.

6. 1365.

Когда все сѣ такимъ порядкомъ учреждено будетъ, спарашся надлежитъ, чѣмъ посещики, каждой свою должность, порядочно исполняли. Тутъ надобно пять помощниковъ, которые бы весь порядокъ лѣченія сего знали, и не были боязливы. Трое сильнѣйше будутъ больного держать, изъ нихъ одинъ сзади больного, на столъ влѣзши, на плеча и на шѣю его ложится, двое съ боковъ спановятся, и каждой одну руку между ногою и рукою больного просунувши, будто бы пеплю натягивающъ, и тѣмъ больного еще неподвижнѣйшимъ дѣлаютъ, другимъ локтемъ, или лучше рукою при концѣ голени подлѣ лодыжекъ берушъ. Четвертый, съ праваго боку больного, позади того, кто ногу правую держащъ, на высокой стулѣ спановится, и тѣломъ какъ эгибается, чѣмъ будто бы на брюхо камнемъ спраждуваго человека хопѣлъ лечь. Эшопъ слово въ слово такъ

также искусенъ и оспороженъ быти долженъ, какъ шопъ, кто лѣчить хочеть. Понеже долженъ правою рукою мощну, шулящюю у больного на право легошенько держати, и тутже оба указательные перста правый и лѣвый подворотя другіе персты къ ладонямъ такъ къ проходу заднему просянути, чтобъ правый на шовъ мѣста между проходнаго, а лѣвый на лѣвую сторону така положи —, кожу нарочно тянуть, могъ. Чрезъ что дѣлается, что подлѣ шва такова на лѣвомъ боку, мѣсто между указательными перстами окажется, которое почти впрямь прорѣзывать можно. При всемъ этомъ пятого помощника должность соспоишъ въ помъ, широкой оной ножикъ или рѣзецъ, которымъ разрѣзъ разрѣзывается, Врачу врачующему такъ подавать, чтобъ воспреемъ обороченъ къ себѣ былъ т. е. черномъ подавать. И ежели лѣкарь не лѣвою рукою будетъ рѣзати, то пятой помощникъ завсегда съ правой стороны у него стояти долженъ.

§. 1366.

Когда все сіе распорядится, Врачъ беретъ совокъ [специллюмъ] жолобоватой такой, которой бы весьма сходенъ былъ съ проходомъ уриннымъ, сперва его, какъ велѣно (1338), въ масло теплое обмоча, въ пузырь съ крайнею оспороженностью опускаетъ и камень ищетъ. Оной нашедши, за рукоятку совокъ лѣвою рукою крѣпко беретъ, и глубже его въ пузырь опуска, такъ перехватываетъ, что съ швомъ лежащаго больного уголъ почти наровень поставитъ. Послѣ сего надобно, на совокъ рукою, будто бы опереться, отъ чего проходъ уринной нѣсколько внизъ воопустившись, и къ нему хребетъ совковъ шую спо-

А А А А }

роною

7. РАЗЛИЧ. ЛЪЧ. УСТРАЖ. КАМЕН. БОЛЪЗ. УПОТ.

роною, на которой жолобокъ имѣется, долженъ вну-
при такъ приписнуть, чѣмъ межъ перстами чеш-
вернаго помощника (1365) кожа мѣста между проход-
наго наискось нѣсколько внизъ приподнялась, и для
этого надобно рукоятку совкову немножко къ паху
правому наклонить.

§. 1367.

Послѣ того лѣкаръ беретъ ножикъ или рѣзецъ,
холстинкою обвернутый у подающаго упятаго помощ-
ника, кладетъ себѣ поперекъ въ ротъ, и держитъ.
Потомъ куда еще надобно будетъ кожу прорѣзы-
вать, положеніе совка, правымъ ручнымъ указатель-
нымъ перстомъ, опять обстоятельно изслѣдовать
надлежитъ. И когда узнаетъ, что жолобокъ совковъ
подъ нѣмъ мѣстомъ таковымъ лежитъ, которое межъ
перстами помощниковыми осталось, рѣзецъ или но-
жикъ, изъ рота взявши, беретъ такъ, какъ перо мы
беремъ когда пишемъ. Послѣ того острѣе ножикомъ, на
палецъ отступя отъ мошонки шулятной въ мѣсто
межпроходное вонзаетъ, и кожу почти до самого про-
хода задняго глубоко разрѣзываетъ. Тотчасъ же черенъ
ножиковъ такъ къверху поднять должно, чѣмъ
кончикъ почти прямо противъ жолобка совкова оста-
новился, въ которой и вонзить или опустить, чѣмъ
приписнувши опять черенокъ, къверху приподнять
его было можно, и проходъ уринной разрѣзать.
И этого будетъ довольно, ежели камень невеликъ.
По большой же части надобно совокъ къ хряцику,
которымъ кости надѣтородоудныя спаиваются, при-
цискивать, и въ томъ жолобокъ ножикомъ въ низъ
прорѣзывать; а чѣмъ и внутри до самой желѣзы
пред-

предстательной вновь проходѣ уринной прорѣзанѣ былѣ , ручка совкова нѣсколько кѣ заднему проходу наклоняется , и ножикѣ такѣ опускается , что одно рсирее кѣ верху , а другое кѣ низу обратится. Прорѣзавши оное мѣсто , когда надобно совокѣ вонѣ взять , должно и ножикѣ шупѣ же вынуть. Ибо сими двумя инструментами такѣ дѣйствовать надлежитѣ , что будто бы они вмѣсто спаяны были да и при разрѣзываніи раны , особливо о величинѣ камня разсуждать надобно , чтобѣ его способно было вонѣ вынуть.

9. 1368.

А ножикѣ вонѣ брать , приподнявѣ его кѣ верхнему краю раны разрѣзанной. Тогда шупѣ помощникѣ , который шуляпную мошонку держалѣ , возьметѣ ее вѣ лѣвую руку , а правою ножикѣ приметѣ , и концомѣ вѣ жолобокѣ совковѣ легонько упретѣ. Между пѣмѣ врачѣ вожда жолобоваатаго язычекѣ , съ боку ножичка вѣ жолобокѣ совковѣ вложитѣ ; и чтобѣ узнать подлинноль онѣ вѣ жолобокѣ , нѣсколько разѣ вѣ верхѣ и вѣ низѣ , а припомѣ и на бока движетѣ. И когда о шупѣ удостовѣрится , величѣ ножикѣ вонѣ взять , и наклонивши ручку совкову кѣ заднему проходу , вожда вѣ глубину пузыря опускаетѣ : это зѣлавши , чему подлиннымѣ извѣстіемѣ моча будетѣ , когда потечетѣ , совокѣ лѣвою рукою вонѣ вынимаетѣ , и отдаетѣ помощнику. Послѣ того , перемѣняя изѣ руки вѣ руку , вожда вѣ лѣвую руку беретѣ , да такѣ чтобѣ онѣ изѣ пузыря не выскочилѣ. И для того указательный перстѣ правой руки кладетѣ вѣ каналѣ вождсѣ , вождажѣ , вѣ низѣ наклоняя , не такѣ вѣ прямѣ вставлятъ должно , какѣ по перемѣнкамѣ приподнимаючи и

ниж-

380 РАЗЛИЧ. ЛѢЧ. У СТРАЖ. КАМЕН. БОЛѢЗ. УПОТ.

низапускаючи подвигать , чтобъ чрезъ шо проходъ отворился. Вынувши вонъ перстѣ по помѣе вождѣ клещи или прямыя , или кривыя , въ пузырь всунуть надобно , и потчасъ сѣи инструменты такъ повернуть должно , чтобъ вождѣ на верху здѣлался. И онъ въ шуже минушу почти вонъ вытаскивается. Которые по два вожда употребляютъ , когда потѣ , что мущиною называютъ , въ пузырь всунуть , такимъ же порядкомъ совокъ вонъ вынимаютъ : потѣмъ на гребень тогоже совка , разделину другаго , женщиною называемаго , накладываютъ , чтобъ по нему въ пузырь всунуть было можно. Многіе сихъ вождовъ по нѣсколько разъ нарочно разводятъ , чтобъ рана разширилась ; и тогда ихъ лѣвою рукою берутъ , чтобъ межъ ими клещи всунуть ; это здѣлавши вождовъ вонъ взявъ должно.

§. 1369.

Когда уже дойдетъ до того , чтобъ камень вытаскивать , а клещей впустить безъ насильства нѣкотораго не возможно , надлежитъ клещи полегоньку разтворить , и туда и сюда нагибать , чтобъ рана нѣсколько пораздалась. То здѣлавши , надобно клещи опять камня искать , для того , что какъ клещи найдутъ надъ него , и тамъ разинутся , то камень свободно можно будетъ захватить , неопасаяся , что и пузырь съ нимъ прищипнется. Должно же его бравъ за то мѣсто , гдѣ онъ со всѣмъ понокъ , а припомъ опасаться , чтобъ во время зжиманія клещей , камень внутрь не выскочилъ или не ушелъ. Чего ради , ежели совкомъ головастымъ (бушонъ) , который между клещами клещными всавывать должно , камень иначе положить не возможно , то лучше его съ клещами будто по-

опус-

опуститъ , и оныя нѣсколько порозинувъ , опять такъ ухватитъ , чтобъ его легко выпациитъ можно. Когда же примѣнитъ , что камень крѣпко клещами ухваченъ , не потчасъ прямо прищипывать , но клещи повертывая , да такъ , чтобъ то полегоньку дѣлалось , на обѣ стороны пошатывая ; а на послѣдокъ , къ проходу заднему привиснувъ , чтобъ камень чрезъ то свободнѣе выпациитъ. Но иногда великаго камня выпациитъ кажется бываетъ не можно , прищипки не перервавши и не разодравши постороннихъ частей. Оной нѣкоторые такъ вынимаютъ , крѣпкія нѣкоторые клещи всавываютъ , и его разламываютъ (*). Хотя же великое шупъ спараніе употребляется , однако не всегда во все ошеречся можно , чтобъ пузыря не повредить. И когда надобно бываетъ всѣ шмапки зонъ вынимать , то клещи часто въ пузырь всавывать должно , отъ чего могутъ смертныя воженія дѣлаться. Ради того гораздо лучше , ножикъ конецъ и обухъ шупый имѣющій въ разрѣзъ положить , и рану поширь разрѣзать.

(*) Такихъ клещей изображеніе представили ПЕТРЪ ФРАНКО , на мѣст. пом. стр. 137 изъ древнихъ , а изъ новѣйшихъ АЛХИЗІЙ на мѣст. пом. таб. 15 фиг. 1 и 2 , смотр. также и у ГЕЙСТЕРА въ наст. Жир. таб. 28 фиг. 7.

§. 1370

Но еще кромѣ того различности имѣются , которыя предразсужденія нѣкотораго пребудутъ. Ибо часто много камней бываетъ , а то прежде лѣченія , толькожъ не всегда , узнать можно , какъ одинъ выпациится , и на немъ гдѣ ни будь гладкость будитъ , надобно совокъ головастой всунуть. Ежели многіе камни найдутся , то по гребню совкову клещи бережненько вкладываются , и всѣ выпаскиваются. Однакожъ

Е с с с

ежели

если камни песчаные будутъ , не всегда дѣлать это надобно. Понеже клещами ухвачены будучи по большой части разсыпаясь , вынудши совокъ , или крючокъ , или ложку вкладываяшъ , и шѣми куски большіе каменные вынимаютъ. А копорые маленькіе , или песокъ , останушя , оныя тамъ и покидаются , ибо лучше и легче съ мочою вонъ вышпишь могутъ.

§. 137г.

Сверхъ сего иногда камень и къ пузырю прикрѣпляется , а то дѣлается не однимъ образомъ. Ибо въ плевы пузырьныя , иногда почти весь , иногда какимъ ни будь сучкомъ , враспывается , или нѣкакими будто мясишками прицепливается. Который въ плеву вросшій бываетъ , съ немалымъ бѣдствомъ клещами захватывается , и вытаскивается. Понеже пузырь инструментомъ повредить можно такъ , что почти вовсе неушолимое вожженіе воспослѣдуетъ. Напротивъ того чрезъ частыя примѣчанія изслѣдовано , что того человѣка вылѣчить можно , у котораго , или какимъ ни будь сучкомъ или мясишкомъ къ пузырю будучи приросшій камень , вынимается. Однакожъ крайне спараться надлежитъ , чтобъ камень , во время отдиранія , пузырь едвоившійся сильно въ движеніе не привеситъ ; того ради , гдѣ видно , что камень такъ держится , трудиться должно , клещи на обѣ стороны полегонку поварачиваютъ , камень отъ пузыря отдѣлать. Если и такъ онъ не податся , смотрѣть надобно , не можнѣ всунувши перстъ нѣсколько плевъ , въ которой камень держится , разрѣзать , однакожъ не безъ опасности шо дѣлать. Луч-
ше

ше бываеѣтъ камень въ пузырь оставиѣтъ , и рану за-
лѣчиѣтъ (*).

(*) Чѣмъ камень съ пузыремъ сросѣтъся могъ , многіе искусные
лѣкари тому не вѣрили , однакожъ , болѣе число ясными доказаѣтель-
ствами то утвердили. Не вѣриѣтъ тому въ давнее время РОССЕТЪ въ
книгѣ родовъ Цесарскихъ [инѣ парту Цезарео] стр. 239 , изъ новѣйшихъ
же руиѣний въ Сокров. Анат. 4 стр. 30 и далѣ. КОЛОТЬ на показ.
мѣстѣ стр. 115 и далѣ. ТОЛЕТЪ на пок. м. Гл. 8. стр. 44. АЛХИЗІЙ
на пок. м. стр. 24. МАРИНИ на пок. м. Гл. 8 стр. 142 и
ДУГЛАСЪ въ Липотом. Часп. 2 стр. 6 и далѣ. Нап. отивъ того оное
утвердившихъ я нахожу ЦЕЛСА на пок. м. и АРЕТЕА , ГАЛЕНА въ
Ісагог. Гл. 19. Пространѣе дѣло сѣе описалъ ПЕТРЪ ФРАНКО на пом.
м. стр. 117 и далѣ изъ новѣйшихъ премножество. Ле ДРАНЪ въ Тр.
о операц. стр. 271 и далѣ. И ГОУСТЕТОВО разсужденіе о камняхъ пле-
вою обросѣвшихъ , или мемоаръ де л'Акад. де Шир. Том. I. стр.
395. и далѣ.

§. 1372.

Когда уже камень вынуѣтъ будѣтъ , то широкою
чѣлкошорой , толстой и теплой свертокъ на рану
кладуѣтъ , которыми холодъ и воздухъ въ рану не до-
пускаеѣтся , и развязавши связки , которыми больной
связанъ , оборотѣ на брюхо , на кровать его кладуѣтъ.
Понеже кровь весьма рѣдко такъ течеѣтъ , чѣмъ ее
удерживаѣтъ было надобно. Не надобно и пѣмъ послѣ-
довать , которые или кноѣтъ , или широкую и гибкую
шрубку (*) въ пузырь въ рану вкладываюѣтъ , чѣмъ
осѣпатки каменные вонъ вышли. Понеже она , кромѣ
того , что ничего не пособствуеѣтъ , ежели пущъ до-
вольнѣо оѣтворенъ , болѣе еще вредѣтъ , когда раз-
рѣзъ пѣсной будѣтъ , и рану разбереживаючи ве-
ликія вожденія причиняеѣтъ , послѣ которыхъ не рѣд-
ко смерѣтъ , или еще чаще фистула дѣлаеѣтся.

(*) Гибкую такую шрубку первый кажется употребляѣлъ ТОЛЕТЪ
см. стр. у него на пом. м. стр. 117 фиг. 9.

Е с с с 2

§. 1373

§. 1373.

Когда больной не множо отдохнетъ ; подо-
ждавши часъ другой, рану обвязать надлежитъ .И по-
куда больной на кровать не положишся , надобно подъ
него нѣсколько шерстяныхъ суконокъ подослать ,
и на нихъ вощанку холстинную послать , чтобъ на
томъ текущее изъ пузыря скапливалось. Послѣ того
одну обвязку , копорую шѣйникомъ (коляре) [кол-
лѣръ де мизере] называютъ , на шѣю такъ наложитъ ,
что будто бы лямка нѣкая , до самого пупка
прошянулася , а другую , копорая на рускую букву
Т походитъ , больному подъ поясницу подложитъ дол-
жно. И ся поперешная часть прошедши однимъ кон-
цомъ черезъ конецъ первой обвязки съ шѣи висячей
брюхо опоясываетъ , другая межъ ноги вѣшается.
То здѣлавши срамотныя части и брюхо масломъ
розовымъ вымазать , и на него сложа холстину
вдвос наложитъ , а шулята другою холстиною подло-
женною приподнять должно. Въ то самое время другой
конецъ тойже обвязки поперешной , съ боку у пупка
узломъ завязать .Послѣ того и на рану посмотришь
надлежитъ , а то здѣлать такимъ образомъ гораздо хо-
рошо. Компрессъ длинной [спленіумъ] опнявши (1372),
понеже крови и мочи напился , другой такой же наложитъ
надобно. По компрессѣ томъ , конецъ другой обвязки ме-
жду ногами проходящій , такъ проводится , что будучи
разрѣзанъ , одною половиною по одному паху , другою по
другому накрестъ къ другой поперешной части брюхо
опоясующей , на обѣихъ сторонахъ приходитъ. Кро-
мѣ всего того , чтобъ рана не могла беречься , хотя-
тѣмъ что колѣна могутъ разходиться , и колѣна , подо-
славши какую ни будь подушку , чѣмъ ни будь связать
надобно.

§. 1374

§. 1374.

Никто не можетъ сумнѣваться , что претя-
жкая рана бываетъ ; которая въ проходѣ уринномъ
и въ пузырьѣ дѣлается для выниманія камня , и за-
лѣчивающа не можетъ , понеже прорѣзана и придавлена
бываетъ , ежели сперва не будетъ очищена : Того
ради прилѣжно примѣчать надлежитъ воженіе (399).
А припомъ весьма много къ благополучному излѣченію
поспособствуютъ въ кушаньѣ и питьѣ , въ воздухѣ
и въ другихъ вещей ненатуральныхъ прилѣжное при-
мѣчаніе (399 , 400 , 401 , 402). Итакъ въ первые
дни на рану во все ничего не класть , то только на-
блюдать надобно , чтобъ чистые и теплые свертки
на рану кладены были. Когда же воженіе нѣсколько
поклонится , и къ загноенію обратится , способы
въ то время лѣкарства въ гной приводящія (385).
Однакожъ и оныя употреблять надлежитъ такъ , чтобъ ,
дошедши до лѣкарствъ шло питающихъ , рана
къ скорѣ зажила.

§. 1375.

Приступлю я , теперь до того спраждущихъ кам-
немъ лѣченія , въ которомъ шѣйка пузырьная прорѣ-
зывается. И понеже въ ономъ многія различности
имѣются , то потчасъ о томъ лѣченіи скажу , ко-
торое РАВІЙ , отъ фрейеръ ІАКОБА изобрѣтенное ,
исправилъ. И оное РАВІЙ такъ расположилъ : больной
на сполѣ не такъ высокою , какъ въ дѣйстви Ма-
риановомъ дѣлается , навзничъ кладется , однакожъ
чтобъ голова и ягодицы на подушкахъ подложенныхъ
нѣсколько приподнялись , а плеча напротивъ того опу-
стились. Связываютъ его сімомъ , которымъ , нало-
жа его на запястья ручныя къ внѣшней споронѣ колѣнъ

Е с с с з.

про-

проптянутыя, привязываются (*). Потомъ въ совкѣ жолобоватомъ различество то есть, что какъ глубже жолобокъ имѣется, такъ только на мѣстѣ согнутомъ у совка жолобокъ. Когда онъ бываетъ въ пузырь всунутъ, ручка къ брюху, и къ правому больного паху, наклоняется, и тѣмъ дѣлается, что почти на самой срединѣ, между заднимъ проходомъ и между бугромъ лѣвой кости сѣдалищной, эггъ совковъ по чувствуется. Послѣ того, ставши на правое колѣно, лѣвою рукою совокъ крѣпко беретъ, правою ножикъ обоюдный, который въ томъ отъ всегдашняго отпѣненъ, что какъ весь не очень широкъ, такъ тонкимъ и узкимъ концомъ кончится (**). Покуда имъ кожа будетъ прорѣзывается, большимъ пальцемъ праворучнымъ, кривизну совкову оцупать должно, чтобъ извѣсшился, прямоли поставленъ, и не найдется ли что иное краемъ пузыря между совкомъ и покровами общими. А то засвидѣтельствуется совокъ, который около двухъ перстовъ въ ширину, отдвинувъ отъ прохода задняго, хотя въ этомъ дѣлѣ также нѣсколько различія причиняетъ возрастъ, величина и тучность тѣлесная.

(*) Смотри изображеніе силъ или пещей у ГЕЙСТЕРА на пом. и, Таб. 29. фиг. 10.

(**) Изображенія Инструментовъ, которые РАВІЙ употреблялъ, смотри у АЛБИНА въ реестръ збруи Анаш.

§. 1376.

И такъ по совку, который очень крѣпко держать надобно, кожа и подъ нею лежащія части, такъ глубоко прорѣзываются, чтобъ отъ того мѣста наченшись, гдѣ рѣзать въ Маріановомъ лѣченіи начинаютъ, до самага бугра кости сѣдалищной рана продолжилась. Послѣ того перстомъ указательнымъ лѣвой

лѣвой руки, и въ рану, и въ афедронѣ всавываючи жолобокѣ совковѣ ищущѣ; Оной ежели сущущѣ не на своемѣ мѣстѣ, то всячески стараются порядочно его поставити, чѣтобѣ афедрона не повредити, когда въ другой разѣ будущѣ рѣзати, иногда его также въ сторону припискиваютѣ. Припомѣ также больного увѣщиваютѣ, чѣтобѣ никуда не вертѣлся, а пособники, то, что кому поручено, съ удердіемѣ наблюдали. И тогда потѣже ножикѣ такѣ пустиши должно, чѣтобѣ конецѣ въ жолобокѣ уперся, по которому пузырь къверху, а больше къ низу прорѣзывати должно. Въ прѣтчемѣ же чѣто. до вождевѣ, до всавыванія клещей, до выниманія, камня принадлежитѣ, оное все только благо-разсмотрѣнія пребуетѣ. А потѣже повѣнне и нѣсколь-ко вкось разрѣзѣ дѣлается, вождевѣ съ великою осторожношью, впускати должно, чѣтобѣ отѣ пу-зыря неопшашнулись, и брюшинной плеввы и другихъ близкихъ частей не повредити. Также и перста для разширенія раны не всавывати, но клещи, которыхъ длиною ручекѣ, отѣ всегдашнихъ разнствѣ имѣютѣ, и будучи въ пузырь нѣсколько разѣ рустворяются. Прѣтчее все, и въ лѣченіи раны, также дѣлается, какѣ я выше предложилѣ (1373, 1374).

§. 1377.

Слѣдуетѣ инное лѣченіе, каторое отѣ изобрѣ-тателя ХЕСЕЛЬДЕНА, Хеселденіанскимѣ и называется. Обѣ немѣ говорятѣ чѣто отѣ равіанскаго произошло, и итѣ потѣжѣ самое будетѣ, ежели на разрѣзѣ посмо-триши. Однакожѣ были отѣ Авипора въ лѣченіи семѣ нѣкоторыя вещи перемѣнены, отѣ чего произошло, чѣто въ народѣ многіе Хесельденскіе лѣченія способы имѣ-

имѣются (*). А по некоторому онѣ самѣ поступаютъ , та-
кой есть (**). На столѣ въ при четверти аршина
вышиною , сукномъ засланный , навзничъ кладется
больной такъ , что только одна голова на подушкѣ
маленько приподнимается. Потомъ связаться и дер-
жаться долженъ , слово въ слово такъ , какъ въ Ма-
риановомъ лѣченіи мы объявили. Такимъ же образомъ
и совокъ закарюченный и жолобоваспой всавывать над-
лежитъ , только онѣ нѣсколько подлиннѣе и не столѣ-
ко закарюченъ быть долженъ. И когда онѣ такъ ,
какъ въ Равіанскомъ лѣченіи велился , вставленъ бу-
детъ , то помощнику оному который лѣвою рукою
мошонку шулятную держитъ , въ правую руку его
дасть , и онѣ какъ его рукою крѣпко держать , такъ
и на то думать что ему дѣлать надлежитъ прилѣж-
но смотрѣть долженъ.

(*) Смочи у ІАКОВА ДУГЛАСА въ те Гистори офъ те ла-
тераль Опер. Постскриптъ , этъ інъ , те Аппендиксъ то те Гистори.
Также у ГЕЙСТЕРА на пом. м. стр. 970 и далѣ.

(**) Издавъ онаго описаніе ШАРПЪ інъ те Третиизе онѣ те Опе-
раціонсъ офъ Сургери гл. XXI.

§. 1378.

Когда уже такъ совокъ поставленъ , что его
закарюченная часть , кожу съ боку у афедрона , ме-
жду швомъ таковымъ , и между костями сѣдалищною
и наддѣтвородоудною , наискось приподнимаетъ , то
лѣчащій Врачъ правое колѣно подогнувши , кожу и
подъ нею лежащій покровъ жирный , въ длину разрѣзы-
ваетъ , которая рана отъ боку мѣста между про-
ходного , подлѣ афедрона наченшись до бугра кости
сѣдалищной протягивается, Потомъ лѣвой руки ука-
зательный перстъ въ рану вложивши , совокъ жоло-
бокъ

бокѣ оццупываетъ, и ежели онѣ оподвинулся, то его такъ ставишь, чтобъ можно было по тому жолобку плевную прохода уриннаго часъ съ желѣзю пред-
стательною и самой пузырь съ боку разрѣзать. Которую рану такъ дѣлать надлежитъ, чтобъ, открывши плевную часъ прохода уриннаго, обухъ ножику въ жолобокъ совкоу вложился, а оспре-
къ кости лонной лѣвой оборотилось. А понеже въ этомъ разрѣзѣ страхъ есть, чтобъ въ низу лежащей кишки не повредишь, два перста лѣвой руки въ рану вкладываются, которые не допустятъ ранишь. При-
томъ же великая важность благополучнаго лѣченія въ томъ состоитъ, что жиръ не надлежитъ глубоко прорѣзывать, ни рѣзанія будто бы повторять, по-
неже онѣ этого весьма худыя болячки въ жирной плесѣ далеко расходятся.

§. 1379.

Когда проходъ отворится , ножикъ вонъ вынимается , и котораго разрёза самая глубина узка будетъ , ноготь указательнаго перста лѣвой руки въ жолобокъ совковъ вкладывается , въ негожъ по совку вождъ жолобоватой вставивъ должно такой , котораго ручка на лѣвую сторону клонится (*). А чтобъ подлинно и хорошо впустить его въ пузырь было можно , то лѣбачій врачъ съ правою рукою помощника того , который совокъ держитъ , за ручку берётъ , и оную къ себѣ наискось клонючи , кривизну отъ раны будто въ пузырь оборачиваетъ , по которой вождъ жолобоватой безъ опасенія въ пузырь приходитъ. Оное здѣлавши совокъ вонъ взять должно , и клещи , у которыхъ ручки нѣсколько длинны бытъ надобны (**), въ пузырь всавывающся , и ка-

мень выпаскивается въ чемъ вовсе никакого разнѣспвія нѣтъ, только имѣется въ кровешеченіи; понеже въ этомъ лбченіи больше печетъ, нежели въ Маріановомъ. Оное обыкновенно дѣлается изъ двухъ жилъ бьющихся, которыя отъ срамотныхъ начинаются, къ яблоку называемому спвольному, и къ железу предстательной приходятъ (***). Которая изъ нихъ повреждена будетъ, посмотрѣвъ надобно прежде удержанія ея, какъ сильно кровь будетъ печь. Чего ради, ежели такое великое теченіе будетъ, что лбченію мѣшать можетъ, то дѣлавши первый разрѣзъ тотчасъ остановить надобно, ежели же невеликое, дать печь, покуда камень выпадетъ. А ХЕСЕЛДЕНЪ великъ, ежели жила бьющаяся видна, ниткою ее завязывать (****), ежели же невидна, [эллихнѣумъ] свѣтильну изъ ношника правную въ рану кладутъ, которое лѣкарство къ удержанію крови способнымъ онъ призналъ. Протчее лбченіе отъ МАРІАНОВА не разнится.

(¹) Смотр. у ІАКОВ. ДУГЛАСА въ те аппендиѣсѣ фиг. 5, у ШАРПА на пом. м. Таб. 6 А. В. и у ГЕЙСТЕРА на мѣст. пом. Таб. 31 фиг. 9.

(**) Смотри изображенія у тѣхже авторовъ. Чтенія также достойно то, что ШАРПЪ о раствореніи ручекъ клещейныхъ и о зубахъ ихъ предложилъ на пом. м. Экспликац. Таб. 7.

(***) Смотр. у ВИНЗЛОВА въ тр. дю ба Ваншрѣ нум. 577, 578.

(****) Фигура иглы весьма кривой закорюченой имѣется у ІАК. ДУГЛАСА на пом. м. фиг. 12 и у ГЕЙСТЕРА на пом. м. Таб. 31 ф. 14.

§. 1380.

И это лбченіе отъ многихъ, и Аглинскихъ и Галло-Французскихъ лѣкарей, у страждущихъ каменною болѣзнію употребляется. Напротивъ того Фуль-

фульбертъ ни единого не нашелъ , кто бы способу его въ лѣченіи послѣдовалъ. А фульбертово лѣченіе такимъ образомъ распоряжается : Понеже самой пущь между желѣзою предстательною и лѣвымъ мочепочникомъ должно прокалывать , первое то , что больной передъ лѣченіемъ весьма долго не долженъ мочиться. А чѣмъ то легко здѣлалось , пшизану довольно пить дать , изъ кореня денгисъ канини , ликвириціе и изъ сѣмени льнянаго сваренаго. А при томъ почти большій страхъ путъ бываетъ , нежели въ Хесельденовомъ лѣченіи , чѣмъ не повредить кишки заднепроходной. Чего ради фульбертъ нѣсколько разъ слабительное даетъ , чѣмъ держащійся въ брюхѣ калъ кишки не расширявалъ , и передъ самымъ лѣченіемъ клистеромъ слабительнымъ на низъ производилъ.

§. 1381.

фульбертово же лѣченіе , какъ мѣстомъ , на которомъ разрѣзъ дѣлается , такъ и збруею съ другими не сходно. Изъ збруи имѣются 1) машинка , которую сперва НУККІЙ , для запиранія прохода уриннаго , выдумалъ , мягкою замшею оболочена и бархатомъ обшита ; 2) игла проегранная , въ трубчѣ своей воткнутая , не такъ толстая , какъ для выпуска воды изъ брюха употребляемая , да гораздо длиннѣе , чѣмъ тѣмъ крѣпче держаться могла , въ ручкѣ трубочкиной , колечко имѣющей. А при томъ на трубчѣ на верхней сторонѣ въ длину жолобокъ пропаяннѣе имѣется ; 3) ножикъ длинной , острой , уской , необоюдный , и въ черенѣ съ тупаго конца всажены ; 4) вождъ жолобоватой , который изъ двухъ частей одна съ другою совокупленыхъ здѣланъ , чѣмъ разрѣзъ можно поразширить , ежели понадобится ; 5) другой ножикъ серповидный , который

Ж Ж Ж Ж 2

ию-

иногда для разширенія раны между ручками клещевыми вкладывается. Сии инструменсты въ Фульбертиановомъ лѣченіи особенныя.

(*) Смотри ихъ фигуры: въ Фульбертовой книгѣ нувель методъ де тире ла пьерръ де ла везикъ на мѣст. пом. Таб. 1. Вождь желобоватой почти такой же, какъ и разширитель, который ПЕТРЪ ФРАНКО къ лѣченію женщинъ каменною болѣзью страдающихъ употреблялъ, и котораго фигуру выдалъ на пом. м. стр. 144.

§. 1382.

Когда къ самому лѣченію придетъ, больной слово въ слово какъ въ МАРИАНОВОМЪ кладется, и связанный держится. И тогда на удѣ дѣтородный машинка прежде помянутая накладывается, чтобъ мочѣ проходъ пересѣчь. Изъ помощниковъ же тотъ, кто мошонку шуляпную держитъ, мячъ лѣвою рукою въ самомъ низу на брюхо накладывается, шѣмъ пузырь припискивается, и въ лѣвой бокъ придвигаетъ. А между шѣмъ Врачъ лѣчащій указательный перстъ лѣвой руки, обмооча въ масло, въ проходъ задній всаивается, и какъ возможно отъ пузыря отводитъ, и понуждаетъ въ лѣвой бокъ отшатнуться. А подъ шѣмъ разумеется, чтобъ и самого себя не повредить, да припомъ можно бы было кожу намянутую и пузырь приписанный достовѣрнѣе проколоть. Послѣ того правой руки большой палецъ на кость лонную положить, лѣвый край внутренній бугра сѣдалищнаго ищемъ. Подъ сего, и на палецъ отъ прохода не такъ чернилами, или карандашемъ каменнымъ, какъ глазами, точка назначивается, и отъ шой почки черта къ верху протягивается, наблюдаячи протяженіе наровнѣ съ вѣпьями костей наддѣтородныхъ и сѣдалищной, и близко подъ мошонкою шуляпною, на двѣ или на три линіи, отъ шва такова, кончипся.

§. 1383

§. 1383.

Когда уже и мѣсто къ рѣзанію назначено будетъ , которое , смотря по лѣтамъ , по тучности и по другимъ причинамъ , должно перемѣнять , беретъ въ руки иглу прегранную , и въ пунктъ , подлѣ лядвеша находящейся , глубоко въ самый пузырь втыкаетъ (*). Игла такъ держится , чтобъ ни на которую сторону не клонилась , только , что жолобокъ , на верхней части на трубчкѣ адланнѣй , къ мошонкѣ шулятной обороченъ бываетъ . Когда разсудитъ , что игла въ пузырь вошла , а моча по жолобку на трубчкѣ адланномъ не печетъ , иглу изъ трубки взять надлежитъ , чтобъ большая свободность уринѣ печь адлалась . Гдѣ это усмотрится , что печетъ , то перемѣнивъ изъ руки въ руку иглу , ножикъ прямой долженъ взять въ правую руку , и обухомъ его въ жолобокъ , на трубчкѣ имѣющійся , въ самый острый кончикъ вложить . И въ пузырь также по этому жолобку всунуть , какъ то адлается , по мочи гораздо больше потечетъ . А чтобъ пузырь , сколько надобно , въ доль пространно отворенъ былъ , ручку ножикову приписнуть , и весь ножикъ къ верху приподнимаячи , изъ жолобка вынуть надлежитъ (**), напрошивъ того , какъ уже вонъ вынимать , то его въ верхъ приподнять , чтобъ и кожа довольно разрѣзалась .

(*) Это изъяснено у ФУЛЬБЕРТА на пом. м. Таб. 6.

(**) Смотри также Таб. 7.

(***) Смотри это на Таб. 8.

§. 1384.

Какъ скоро ножикъ вонъ возмется , то вожда , котораго ФУЛЬБЕРТЪ употребляетъ , чрезъ посредство языка жолобокъ трубочки той , въ которой игла

Ж ж ж ж 3

прес-

прегранная порчишѣ , вложитѣ надобно , и по немѣ вѣ пузырь всунуть должно. Когда всавывается , то жолобокѣ вождовѣ вѣ низѣ оборотитѣ надобно. Чего ради , какѣ вѣ пузырь придетѣ , что окажетѣ язычекѣ вождовѣ , на концѣ жолобка наглухо задѣланнаго придѣланнаго , потчасѣ иглу прочѣ взяти должно , и вѣ шужѣ минушу жолобокѣ совковѣ оборотитѣ. По этому жолобку Врачѣ перстѣ указательный правой руки вѣ прорѣзѣ всавываетѣ , наипаче для того , чтобѣ изслѣдовать , ежели не довольно разрѣзанѣ , чтобѣ его больше растворитѣ. Когда же найдетѣ , что путь довольно отворенѣ , клещи вѣ пузырь вставляются , и камень вынимается. Часто случается , что нижняя разрѣза часть клещамѣ мѣшается. И то какѣ отѣ кожи , такѣ отѣ мышки поперешной и отѣ часточки мышки подвижной тузенной , дѣлаться можетѣ. Нѣтъ никакой трудности ножикѣ серповидный между ручками клещными просунуть , и эти волокна распространитѣ. Другихѣ примѣчаній тутѣ не надобно , кромѣ одного , что трубочку какую ни будь гибкую , крѣпкою или другою мяконькою холстинкою обернувѣ , вѣ рану вставить. Понеже опасаться надобно , что глубока , и что наискось рана бываетѣ , которою пузырь отворенѣ , не оставалось бы испекаемое изѣ пузыря вѣ ранѣ , и не дѣлалобѣ смрадныхѣ болячекѣ , которыя вѣ этихѣ мѣстахѣ очищать весьма трудно. Какѣ болячекѣ избавиться , такѣ и кровь остановить можно , ежели будетѣ какая жила бѣющая повреждена , когда трубочка вставится.

(*) Обѣ этихѣ примѣчаніяхѣ смотри , что написалѣ Фульбертъ на пом. ж. стр. 678 и далѣе.

§. 1385.

Выше (1356 *) о новомъ нѣкакѣмъ лѣченіи мы объявили , которое ЛЕ КАТѢ за чепыре года отъ сего времени выдумалъ , и которое , сколько до части пузырной отворяемой касается , не много отъ Фульберпинова отлѣнно (*). Не надобно его просираннѣе изъяснять (**), напропивъ того и оное , которое недавно ЛЕ ДРАНѢ описалъ , который и творцомъ признавается (***). Каждой человекъ увидитъ , что оное лѣченіе изъ МАРІАНОВА и Хесельденова будто бы составлено. И понеже очень не много отъ Маріанова того разнствуетъ , которое выше мы описали , то довольно будетъ оное , въ чемъ подлинно есть различіе , представить ; а различіе въ этомъ состоитъ : Первое , оставивши способы связыванія , которые завсегда употребляются , и которыхъ больной не мало бояться долженъ , ЛЕ ДРАНѢ другіе выдумалъ , въ которыхъ двѣ песьмы имѣются , изъ нихъ одна на руку , другая на ногу накладываются , и оными обѣ шѣ части связываются (****). Послѣ того самъ лѣкарь мошонку шуляпную собравъ , въ обѣ руки дастъ помощнику , и великъ очень легонько держитъ : а припомъ того же помощника взявъ указательные персты протягиваетъ пакъ , чтобъ правой къ шву шáкову , другой лѣвой напротивъ того къ краю кости сѣдалищной , даже до самаго ея бугра протянулся. ЛЕ ДРАНѢ нигдѣ не объявилъ , какой ножикъ для перваго разрѣзыванія употреблять должно. Употреблялсяжъ за нѣсколько лѣтъ нескладной , у котораго и черенъ стальной былъ здѣланъ †. Кожу гораздо длинно разрѣзывать должно , начинаючи отъ того мѣста , гдѣ кости надъ

наддѣтородоудныя и сѣдалищныя спаиваются , продолжать дошуда , чтобъ конецъ разрѣза на полтора пальца пониже былъ того мѣста , отъ котораго совокъ находящійся въ проходѣ уринномъ внутрь пузыря закрючивася. Когда этимъ разрѣзомъ , которымъ яблочко [булбусъ] разрѣзывается , путь уринной отворенъ дѣлается , вмѣсто вожда совокъ нѣкоторой прямой съ широкимъ жолобкомъ , на концѣ язычокъ имѣющій †† , въ жолобокъ кашетеровъ вставлявается. И оной въ пузырь впустивши , какъ камень самой , такъ его величину и другія приключенія обстоятельно извискать должно , чтобъ можно узнатьъ , какія клещи на то употребить. Послѣ сего прямой оной совокъ внутри къ пропоку уринному приписывается такъ , чтобъ жолобокъ оной къ расстоянію тому оборотился , которое между заднимъ проходомъ и бугоркомъ кости сѣдалищной осталось ; надлежитъ по этому жолобку другой ножикъ внутрь всунуть , которымъ бы желѣзу предстательную съ устьемъ пузырьнымъ разрѣзать. Ножикъ необходимый бываетъ , а острѣе косое (анъ рондашъ) , въ самую длину , въ семь или восемь , а въ ширину въ семь линий бываетъ. И когда ножикъ вонъ возмется , Врачъ по обороченному жолобку совкову обыкновенный вождь (горжеретъ) въ пузырь вкладываетъ. Прочее все такъ , какъ въ Маріановомъ , дѣлается.

(*) См. у Фульберта гдѣ пом. м. Таб. 4 и 5.

(**) Описание лѣченія , которое ЛЕКАТЬ изобрѣлъ , можетъ быть въ нынѣшнемъ Комментаріи Корол. Акад. Наукъ Парижской будещъ напечатано , съ которымъ и подлинникъ сообщилъ.

(***) См. ЛЕДРАНЪ въ Тр. дес' Операц. стр. 304 и далѣе.

(****) Фигуру сей связи я представилъ въ Примѣч. Хирург. о камнѣ въ пузырьномъ Таб. 1 фиг. 1.

(†) См. примѣч. Таб. 1 фиг. 3.

(††)

(††) Изображеніе также есть, фиг. 5 и у ЛЕ ДРАНА на пом. м. стр. 272 фиг. 1.

§. 1386.

Однакожъ имѣющіяся и другія нѣкоторыя примѣчанія надобныя , которыя до захватыванія и выпаскиванія камня наипаче касаются. Когда , во время рѣзанія , моча вся выпечетъ , что дѣлаетъ , что пузырь сядетъ , тогда же пузырь часто отъ болѣзни сжимается , тогда всегда опасаться надобно , смѣло клещи внутрь всавывать. Никакой бѣды опасаться не можно всавываячи такъ , чтобъ гвоздь , которымъ ручки у клещей вмѣсто скавываются , до самого внутреннего края въ рану былъ всунуть. Гдѣ камень не крѣпко захватится , и внутрь уйдетъ , растворивши клещи , обѣ ручки ихъ по перемѣнкамъ , туда и сюда по дну пузырному , поворачивать должно. И тогда сказываютъ часто дѣлается , что который уйдетъ камень , списнувши ручки , крѣпко будетъ держаться. Многихъ примѣчаній и разсужденій въ камни пребуяютъ , которые очень велики бывають , весь пузырь наполняютъ , или , которые въ нѣкакой будто клѣточкѣ держатся. Совѣшуетъ ЛЕ ДРАНЪ , когда камень тащитъ вонъ должно , то клещи повернуть такъ , чтобъ кольца рукоятныя , за которыя держатся , одно къ кости наддѣпородоудной , а другое къ проходу заднему обернулось. Окончавши лѣчение , толстенькую оную трубочку въ пузырь опуститъ , ежели онъ отъ камня сожмется , или камень внутри останется , котораго вонъ взять было не возможно , или ежели во время самого лѣченія кровь такъ потечетъ , что надобно того бояться : Въ такомъ случаѣ трубочку тряпкою обертывать должно , и ее осыпать порошкомъ колофоннымъ.

3 3 3 3

§. 1387.

§. 1387.

Остается еще о томъ лѣченіи спраждущихъ каменною болѣзнію , которое или Цельсическимъ , или съ малою збрусю , называюмъ , нѣчто изъ Цельса предложить. Человѣкъ сильной и искусной на силу лѣвысокомъ садится , мальчика на взничѣ обороты на колѣна свой ягодицы положи беретъ ; и раскорячивши его нѣги , велитъ ему самому , пропянувши руки къ подколѣнкамъ или къ лодышкамъ , какъ можетъ ихъ сильно къ себѣ припягивать , тутъ же и онъ такъ ихъ будетъ держать , что на плеча его грудью своею наляжетъ. Къ этому человѣку еще съ боковъ двухъ человѣкъ сильныхъ спавятъ , которые спочивши около его , падать ему не дадутъ. Однакожъ мальчика на колѣна къ помощнику сажать завсегда не надобно , можно его да еще и лучше и порядочнѣе на столъ класть , какъ надлежитъ.

§. 1388.

Помощь врачъ , хорошенько ногти обрѣзавши , лѣвой руки два перста , указательный и средній , обмоча въ масло въ другъ полегоньку въ задній проходъ больному всавываетъ , а правой руки персты подъ самое брюхо легонько кладетъ. И такъ перстами въ проходъ всунутыми камень ищетъ , и какъ найдетъ , тщательно къ шейкѣ пузырьной приводитъ. Когда же на шейку пузырьную доведетъ , то подлѣ прохода зѣднего кожу длинно разрѣзаетъ надлежитъ до самой шейки , и оную въ другой разъ поперегъ прорѣзаетъ , чрезъ что путь уринной растворится , шкъ , чѣмъ разрѣзъ нѣсколько больше былъ камня. Ибо копорые не много разрѣзываютъ , то очевидно
большаго

больнаго въ погибель приводящѣ, понеже когда камень насильно вынимается, долженъ дорогу себѣ здѣлать, ежели се не будетъ. Изъ чего и крови печеніе и жилъ чувствительныхъ протяженіе, и вожженія быти могутъ.

§. 1389.

Когда путь отворится, то камень окажется, который ежели самъ не выпадетъ, то лѣвой руки персты такъ къ пузырю протянувши, чтобы назадъ отойти, ни иначе ускользнуть куды не могъ, правой руки указательный перстъ, повыше камня въ пузырь всунуть, и его вонъ выпустить. Ежели камень великоватъ будетъ, накинуть на него должно крючокъ между орудіями, къ Маріанову лѣченію надобными, представленный. Крючокъ всегда не безъ опасности вонъ вынимать, ежели имъ камень не будетъ хорошо держаться; для того, что когда камень внутрь уйдетъ, крючкомъ швомъ рану можно зацепить, и се расцарапать. Но ежели много камней въ будетъ, то персты до самого дна пузыря протянувши, къ ранѣ приводить и вонъ вынимать должно. Случишься же можетъ, что перстами ощупать ихъ не возможно. Для того совокъ, и по немъ клещи въ пузырь всавывающіяся, которыми камни извѣстнѣе вонъ могутъ быть взяты. Другихъ ошмѣнностей въ этомъ лѣченіи нѣтъ.

§. 1390.

Отъ сихъ лѣчений, которыя подъ костями лунными бывающъ, перейти должно къ тому, въ которомъ верхняя у пузыря часть въ самомъ низу брюха прорѣзывается. Передъ этимъ лѣченіемъ почти все то здѣлать должно, что дѣлается предъ Фульбертианскимъ.

З з з з 2

900 РАЗЛИЧ. ЛѢЧ. У СТРАЖ. КАМЕН. БОЛѢЗ. УПОТ.

анскимъ. Ежели больной не привыкъ въ себѣ долго мочы удерживать, то сперва надлежитъ пузырь въ самомъ лѣченіи водою или другимъ какимъ омовеніемъ теплымъ наполнить. Кому это нравится, что больного на столъ, или, что еще за лучшее почитается можно, на кровать сперва положить, не наливши воды въ пузырь, а то свободно и хорошо дѣлать можно, поставивши въ трубку такую, которую моча вытягивается, насосъ обыкновенный. А какъ омовеніемъ приспосойнымъ напалнивать, въ томъ различіе нѣкоторое есть. Ибо такъ наливать должно, чтобъ пузырь надъ костями лунными нѣсколько вспучился, однакожъ и всячески оберегаться надлежитъ, чтобъ пузырь отъ множества воды нечаянно налитой не распялился, отъ чего жилъ чувствительныхъ напряженія обыкновенно дѣлаются. Не мало надежды къ благополучному успѣху дѣлаетъ пузырь здоровой и пространной. Ежели будетъ попорченъ, а особливо сѣвеной, то или другой способъ къ лѣченію избрать должно, или приказать больному, чтобъ онъ много напившись, да еще марциальныхъ водъ, какъ можно долго, мочу въ себѣ держалъ. А понеже чрезъ то дѣлается, что пузырь о камень тереться не будетъ, то иногда пузырь опять разширивается. Когда уже довольно воды впущено будетъ, вынувши конъ трубочку, надобно пособику удъ дѣпородный дать держать, какъ для того, чтобъ проходъ уринной пересѣчь, такъ и для того, чтобъ по придавленіи въ низъ уда кожа напаянулась, которую въ самомъ низу на брюхѣ разрѣзать надобно.

§. 1391.

Я сказалъ, что больного или на столъ, или на кровать класъ должно, но гораздо лучше на кра-

кроватьѢ. ОднакожѢ какѢ на постелѢ , такѢ и на столѢ , инако расположить его , а не такѢ какѢ въ другихѢ операціяхѢ во всѢхѢ кладушѢ. Ягодицы повыше головы и грудей бытъ должны. Ежели на кровать положишся , нѡги , которыя черезѢ кровать будуще висѢтъ , къ ножкамѢ кроватнымѢ привязать должно , а за руки сѢ обѣихѢ сторонѢ стоящіе помощники крѢпко взявъ и держать могутѢ. Да и въ томѢ никакой опмѢны нѣтъ , когда больного на столѢ кладушѢ , кромѢ того , что нѡги какою ни будь веревкою къ ножкамѢ столовымѢ привязать должно.

§. 1792.

Поступлю теперь къ самому лѣченію , которое такимѢ образомѢ учреждается : Лѣкарь сѢ праваго боку у больного спановишся , и когда одинѢ изѢ стоящихѢ подлѢ его служителей , положи подлѢ пупка руку , кожу въ верхѢ натянетѢ , то онѢ кожу въ самомѢ низу на брюхѢ такѢ длинно въ прямъ разрѣзываетѢ , чтобѢ въ плоть до уда дошла , и былабѢ на четыре перста въ длину. УпотребляетѢ лѣкарь обыкновенной простой ножикѢ , и за нимѢ указательнымѢ перстомѢ лѣвой руки слѣдуетѢ. ПотомѢ тѣмже ножикомѢ стезю бѣлую нѣсколько покороче разрѣзать должно , чтобѢ не отворилась перепонка брюшинная , покуда пузырь окажется. Оный , вложивши въ разрѣзѢ сѢ верхняго конца указательный перстѢ лѣвой руки , другимѢ серповиднымѢ и плоснымѢ , къ лунѢ растворить. ТотчасѢ , какѢ только прорѣжется , чтобѢ перстѢ всунуть можно , указательный перстѢ тойже руки въ пузырь вставляется , и оной согнувши крючкомѢ пузырь приподнять надлежитѢ , чтобѢ на два перста ширины

З з з з з

своѢ

свободно разрѣзать его было можно. Верхній уголъ сего разрѣза близъ персѣи пониже уха начинается, а нижній глубоко позади костей лунныхъ проходить долженъ. Разрѣзавши пузырь, или персѣи, или клещи, или и крючокъ всавывается, и камень вынимается.

§. 1393.

Очень хорошо, потчасъ какъ только больной отъ камня освободится, рану такъ обвязать: Тряпочку мяконькую и чистенькую, гораздо пошире раны, на рану наложить. На тряпочку эту столько щипаныхъ тряпокъ накласть, чтобъ весь разрѣзъ наполнялся. И оное компрессами нѣсколькими, одинъ другого побольшими прикрывъ наложить, а брюхо салфеткою обвертѣть, и ту салфетку обвязкою нѣсколько разъ обведши, закрѣпить. Когда рана такъ опрыстана будетъ, больного на другую кровать положивъ, которая такъ убрана бываетъ, какъ индѣя сказалъ (1373). А понеже отъ печенія мочи тряпочки и карпея вложенныя мокнутъ, то почаще свѣжими перемѣнять. По прошествіи нѣкоторыхъ дней, кношѣ и подушечки наверхъ класть должно, нишкою связывая, и масью гной производящею намазывая. Рана, которою пузырь растворенъ, гораздо скорѣе заживаетъ, когда послѣ вѣдомаго времени, трубочка коротенькая, путемъ уриннымъ въ пузырь вставится, и тамъ оставится.

§. 1394.

Всѣ почти лѣкарѣ сіе ФРАНКОНОМЪ изобрѣшенное, и ДУГЛАСОМЪ возобновленное лѣченіе, уже близъ шестнадцати лѣтъ, отбросили. Однакожъ

за

за три года назадъ ЛЕ КАТѢ будто подновилъ. ОнѢ припомѢ много , а особливо въ инструментахъ перемѢнилъ. Оныя такіе здѢлалъ 1). Ножикъ крѢпкой нескладной , тому подобный , который у ГЕЙСТЕРА (*) есть кромѢ сего , что на обухѢ тупой горбокъ имѢетъ 2). инструментъ на крючокъ похожій , изъ спали весь здѢланный (Саспансеръ) 3). два другіе , крючкамъ подобные (Дилатато сюспансеръ) у которыхъ обухъ не подалеку отъ закорюченнаго мѣста , которое и широко , и нѣсколько выдолблено. 4) Лощка изъ спали здѢланная , у которой другой конецъ на крючокъ походить можетъ.

(*) въ издѣл. Хирург. Таб. 31 фиг. 8.

§. 1395.

Слѣдуетъ самое лѣченіе , которое ЛЕ КАТѢ такимъ образомъ располагаетъ : больной на кровать кладется , слово въ слово такъ , какъ выше (1391) сказано , кромѢ того , что голова на подложенной подушкѢ нѣсколько приподнимается. И кожу на брюхѢ въ самомъ низу , лѣкаръ у больного по правую сторону стоящій , такимъ же способомъ разрѣзываетъ. Когда проходъ къ пузырю довольно отворенъ здѢлается , то ножикъ оборотить должно , и позади костей лунныхъ въ пузырь всунуть. Оный пузырь , когда къ пупку прорѣжется , то бѣдственное иногда случаемое сему внутреннему опаденію отворачивается , которое должно случаться въ обыкновенномъ лѣченіи , чрезъ вытѣченіе омовенія , въ пузырь налишаго. Когда уже пузырь довольно разрѣзанъ , то ножикъ такъ оборачивается чтобъ на выпуклой у ножа на обухѢ части пузырь оперся. Въ то время ножикъ въ лѣвую руку передавши , правую рукою крючокъ подвемъ

подъемниковъ , съ боку подлѣ ножика , въ пузырь опускается , который имъ подхватя , приподнявши держать надобно , и къ разрѣзу внутреннему прижимать. Подъ симъ инструментомъ прощше два , одинъ за другимъ , въ пузырь вкладываются , такъ чтобъ рана пузыремъ съ обѣихъ сторонъ , къ наружному разрѣзу припаценымъ , разширилась. Изъ сихъ орудій лѣвое приставленный пущъ помощникъ держать долженъ , чтобъ лѣкаръ могъ правою рукою или ложкою , или клещами , или также самими перстами , въ пузырь всунутыми , камень между сими орудіями выпащить. Которая поступка въ томъ силу имѣетъ , что пузырь камнемъ шероховатымъ иногда повреждаться не можетъ.

§ 1396.

Надѣ копорымъ больнымъ ЛЕ КАТѢ первые опыты сего лѣченія дѣлали , понеже больной прежде очень боленъ былъ , въ горячку впалъ , въ которой ЛЕ КАТѢ , за холодомъ , не смѣли часто кровь пускать. Для того въ баню водяную его сажали , чтобъ вода раною въ пузырь проходила , и рану вымывала. Велѣли также болному на брюхѣ лежать , чрезъ что дѣлалось , что рана скоро зажила , какъ омовеніе въ природной пущъ проходило.

§. 1397.

Съ нѣкотораго времени споръ дѣлался между упражняющимися въ лѣченіи такимъ , которое бы изъ всѣхъ сихъ лѣченій наилучшее было ; а припомъ кажется , тѣ люди , которые такія лѣченія спраждающимъ каменною болѣзнію изобрѣли , по намѣреніе было , чтобъ выдумать какое ни будь , которое было бы другихъ превосходнѣе. Что наиболше изъ примѣру
ХЕ-

ХЕСЕЛЬДЕНОВА явствуется, онѣ, хотя много такихъ вылѣчилъ, у которыхъ прорѣзываючи пузырь надъ костями наддѣшородоудными, камень вынималъ, однако новый способъ къ лѣченію нашедши, прежній оставилъ. И сіе размышленіе, о наилучшемъ спржадущихъ каменною болѣзною, лѣченіи, я думаю немало людей къ смерти привело. Ибо ни одного нѣшъ лѣченія, изъ вышепредложенныхъ, которое бы при случаѣ предъ другими предпочестъ было не должно. Однакожъ спорить я не хочу, что Хесельденіанское, или, которое во обще боковымъ называется, многимъ камнемъ спржадущимъ полезно. Часто же лучше бываетъ по другимъ предпочестъ, въ которомъ пузырь въ самомъ низу брюха прорѣзывается. Что наибольшее примѣромъ шѣхъ ясно доказано быть можетъ, которые знатной величины камнемъ спржадупъ, или, у которыхъ такъ великъ пузырь, что, хотя немножко мочи задержатъ, то онѣ надъ костями лунными высунутся. О прочихъ причинахъ выше много представлено (1362).

§. 1398.

Часто бываетъ, что камень въ проходѣ уринной впадаетъ, и въ немъ останавливается, когда моча съ великимъ жиденьемъ испускается; въ которомъ дѣлѣ много различностей имѣется. Если больной недавно камень получилъ, и камень не великъ, вездѣ въ проходѣ уринномъ стоятъ можетъ, однакожъ чаще неподалеку отъ выхода, гдѣ стволъ уринной пространнѣе есть, которое мѣсто и называется [фосса навикулярисъ] т. е. докъ корабельной, или и въ плевной пропока уринаго части, противъ которой снаружи мѣсто между проходное лежитъ.

И и и и

у ко-

У копорыхъ прежде сего камень , а особливо Маріановымъ способомъ бываетъ вынутъ , понеже шейка пузырная и оная плевная прохода уриннаго часть сильно растянута будепъ , маленькіе камушки , опять родящіяся , мочою послѣ производимые , обыкновенно въ этихъ наибольше мѣстахъ останавливаются. А по также въ томъ случаѣ бываетъ , гдѣ камень маленькой , или песочные и мягкіе нѣкоторые оспапки внутри останутся. Бываютъ также камни , которые будучи весьма велики , пройти въ проходъ уринной не могутъ , однакожъ тою стороною , которая тонка какъ бы у кегля , въ шейку пузырную всавываются. Сіи камни могли бы весь просокъ уринной заспанавливать , ежели бы не имѣли въ себѣ сквознаго канала , или бы не были съ боку будто выдолблены , чшобъ мочѣ просокъ оставался.

§. 1399.

Такіе случаи весьма много въ лбченіи перемѣнѣ дѣлаютъ. Маленькой камушекъ въ какомъ бы мѣстѣ ни стоялъ , тотчасъ ножикомъ въ дѣло не вступать , но сваривши въ молоко травы , коренья и сѣмена мягчительныя , теплымъ удѣ дѣшгородный припаривать. Можно также къ уду и къ лунѣ суконки въ такомъ молоко сѣмачивая и выжимая класпъ , и ежели камень не далеко отъ шейки пузырной стоитъ , губку обмоча въ такомъ же вареніи напоя подкладывать. Пособствуютъ также бани , или изъ одной рѣчной воды , или изъ такой воды , въ которой мягчительныя травы будутъ варены. Клистеры поставляемые , нерѣдко камень вонъ выводипъ , то же дѣлаютъ масла теплыя мягчительныя , въ спволѣ впускаемыя.

(7)

(С) Весьма хорошо шутъ нѣчто о тѣхъ лѣченіяхъ предложить , какія въ самыя древнѣйшія времена , при стѣяніи камня въ проходѣ уринномъ , употребляемы были. ЦЕЛЬСЪ два кѣ лѣченію способа предложилъ , одно , камень спичкою ршастую вышаскивать : другое , потку съ боку разрѣзавши , вынимать. А при томъ велитъ , прежде разрѣзыванія , кожу конечную натянуть , чшсбъ вынувши камень , кожею цѣлою разрѣзъ закрылся. Кн. 7. Гл. 26. Послѣдовали ЦЕЛЬСУ , ПАВЕЛЬ Кн. 6. Гл. 60. АЛБУКАЗЪ. Кн. 2. Гл. 60. ГВИДОНЪ ДЕ ГАВАІАКОНЪ на мѣст. пом. ФРАНКОНЪ на пом. мѣстѣ. стр. 116. КУРМЕЛЕНЪ на пом. м. стр. 183. ПАРЕЙ Кн. 16 Гл. 40. ДЕ ЛЕАВ-СОНЪ на м. п. Гл. 7. ГИЛДАНЪ на м. п. Гл. 26. ГРЕНЕВЕАТЬ на м. п. стр. 57. ТОЛЕТЪ на пом. м. стр. 99 и далѣ. ДІОНИСЪ , на пом. м. стр. 234. ШАРПІЙ на м. п. Гл. 22. ЛЕ ДРАНЪ Операц. стр. 351 и далѣ , и новѣйшіе почти всѣ. Однакожъ многіе изъ новѣйшихъ спички ршастой , или крючковой употребляютъ не велятъ , ежели камень не будетъ близко подлѣ выхода стоятъ. А когда того здѣлать невозможно , то проходъ стволу или ножницами , или ножичкомъ разширить должно , и камень вытациить. Смотри въ первыхъ ТУАПІИ. кн. 3. Прим. глав. 8. фигуры различныхъ спичекъ или крючковъ изобразилъ ПАРЕЙ на пом. м. ГИЛДАНЪ на п. м. МАРИНИ м. п. фиг. 1. А при томъ имѣются нѣкоторыя разнствія въ томъ лѣченіи , которое рѣзаніемъ дѣлается. Наибольшее то есть , которое ОНБАЛЬТЪ дѣлалъ. Ибо онъ протокъ уринной отъ потки отдѣляетъ , въ томъ мѣстѣ , гдѣ камень внутри стоитъ , чтобъ можно было прорѣзать стволъ тамъ , гдѣ подъ поткою лежитъ , смотр. у ГАРЕНЖОТА Операц. Том. 2 стр. 289. Также и въ лѣченіи , раны разнствуютъ. Понеже многіе , вынувши камень , ничего въ стволѣ не кладутъ ; другіе , спичку изъ свинцу и изъ другой матеріи здѣланную , вставляваютъ. Есть и еще другія лѣченія отъ Авторовъ предложенныя. АЛБУКАЗІЙ на пом. м. буравъ представляеиъ , которымъ всунувши въ стволъ , камень повертѣтъ и разломить можно. Для безопаснаго всавыванія въ стволъ этого буравка , трубочку гыдумалъ ФРАНКОНЪ на пом. м. стр. 114 , смотр. также у ПАРЕА пом. м. гл. 39 и у ГИЛДАНА пом. м. , который лѣченія способъ нынѣ никто не хвалитъ. ПАРЕЙ на пом. м. велитъ сперва пробовать лѣкарства и руки , то есть , наливши въ стволъ масла мигдальнаго сладкаго , перстами камень вонъ выжимать , да то и отъ многихъ новѣйшихъ Авторовъ представлено. А понеже безъ сильнаго поврежденія въ стволѣ , камень такимъ способомъ вонъ взять часто бываетъ невозможно , то многіе Врачи небезъ причины разсудили , стволъ разрѣзывать и такъ лѣчить. Многотруднѣе Египтяне и Арапы новѣйшіе это дѣлали ; о чемъ у АЛЬПИНА о Медицинѣ Египетской въ кн. 3. въ гл. 14

И и и и 2

пред-

представлено, онѣ объявляютъ, что онѣ хотѣли изъ самаго пузыря, надуваніемъ онаго, камень вынимать. А онѣмъ изъ нашихъ Врачевъ и лѣкарей послѣдовали, первый: ГИЛДАНЪ м. п. стр. 187. ВАНЪ ГОРНЕ въ Микротехн. стр. 457. ПУРМАННЪ во второй части Хирургич. гл. 14. камень или завязкою или придавкою закрѣпивши, чтобъ назадъ не отошелъ, трубочкою нѣкакою въ протокъ уринной полгоньку надували, и чтобъ воздухъ вонъ не вышелъ, бережно завязывали. Когда довольно раздувался, то камушекъ полгоньку къ выходу прогоняли. Кажется очень хорошо, покуда еще трубочкою не будетъ надуваться, масла теплаго напустить, гдѣ близко выхода будетъ стоять. ФРАНКОНУ и другимъ казалось, что выкавыиваніемъ вонъ вышущи можно, однакожъ по отбросилъ ГИЛДАНЪ п. м. СОЛИНГЕНІЙ, для разширенія сѣвола, кношты, изъ пергаменту зѣбанные, одинъ другаго больше, употреблялъ, чтобъ боли великой не производъ м. п.

§. 1400.

Особенной способъ къ лѣченію есть, ежели камень, не подалеку отъ выхода, будетъ стоять. Нѣкопоры маленькіе щипчики въ сѣволъ всавываютъ, и камушекъ выпаскивать покушаются, отъ чего великая боль происходишь должна. Чего ради не всавываючи еще въ проходъ уринной щипчиковъ, лучше масла какова нибудь теплаго впустить, и когда вонъ пощипится, попытку съзади камня попыскивать, чтобъ камень не отдвигался назадъ; Иногда и пѣхъ слушаться можно, которые надуваючи пузырь проходъ уринной разширивать велѣтъ, и тогда выпаскивать. Которыми поступками ежели никакой помочи не здѣлается, то очень хорошо, устье сѣвола уриннаго малѣхонько разрѣзать, и камень, спичкою какою нибудь всунути, выковырнуть.

§. 1401.

Камушки въ эпихъ мѣстахъ останавливающіеся, будучи топчасъ въ другое мѣсто мочою подвижасмые, проходъ уринной по большой части немного вредятъ. Про-

Противное же тому дѣлается , у кошорыхъ между бульбомъ и шейкою пузырною камушки останавливающ-ся ; ибо часто случается , что песочикъ , съ мочою проходящій , будещъ ли то мѣсто очень тѣсное , или очень широкое , что случается у пѣхъ , у кошорыхъ напередъ сего камень изъ прохода уриннаго вырѣзанъ бываещъ , въ плевной его части останавливается. Можнѣ и то сказать , что оной песокъ повседневно долженъ ростъ , онъ чѣго дѣлается , что когда проходъ уринной разширится , мѣсто междупроходное вспухнѣтъ ; а камень такимъ образомъ путь себѣ прѣугоповляющій , болячку шуще дѣлаещъ , которая въ многія пронозы по большой часи раздѣляется , и фиспулою дѣлается.

§. 1402.

Отъ сей болѣзни только однѣмъ желѣзомъ избавляться можно. Тутъ лѣченіе то попребно , которое я Цельсическимъ назвалъ. Однакожъ не надобно персты въ задній проходъ всавывать , и въ передъ къ камню пригибать. Первымъ разрѣзомъ , кошорый длиненъ бытъ долженъ , кожа только разрѣзывается , другимъ самый путь уринный. И рѣжучи опасаться надобно , чтобъ прорѣзавши надъ какою нибудь выпуклиною пупъ , подъ которою пусто , не оспалось такое , которое можетъ прорваться , когда камень сильно потащится. Ради того лучше прорѣзавши нѣсколько пути уриннаго , спичку всунуть , и по ней сколько разрѣзать , чтобъ камень можно было легко подавливаючи вонъ взять. Иногда и самъ собою выпадѣтъ. Когда камень вытащится , то особливо о фиспулѣ думать надлежитъ. И къ лѣченію ся на-

И и и и 3

добно

910 РАЗЛИЧ. ЛѢЧ. УСТРАЖ. КАМЕН. БОЛѢЗ. УПОТ.

добно , чтобѣ что нибыло окрѣплое , все лѣкарствами гной приводящими искоренить , о чемѣ индѣ сказано.

§. 1403.

Такимѣ же способомѣ лѣчить надобно и тѣ камни , которые будучи малы , по большой части вѣ шейку пузырную заходящѣ , и вѣ ней опѣ непрестаннаго печенія урины , гораздо вырастающѣ . Однакожѣ надлежитѣ всю шейку , и пузырь съ боку отворить , куда бы такой камень выпащиться могѣ , безѣ великаго пузырнаго поврежденія . Могли бы такіе камни наковальнѣ подобными называться , однакожѣ тѣ , которые вѣ шейкѣ бывающѣ , больше на подобіе кегля вѣ ней споящѣ ; и апи также особеннымѣ образомѣ лѣчатся . Ежели зло это будетѣ не застарѣлое , можно отвѣдать , не можноль впуспивши трубочку , камень прогнать . Чаше же не можно бываетѣ . И тогда Франконіанскимѣ способомѣ вѣ лѣченіи поступить . Когда выпащиться , также шейку пузырную наблюдать должно , которая , какѣ опѣ камня окрѣпнѣтъ , употребить должно вещи мягчильныя , и гной производящія .

§. 1404.

Остается мнѣ теперѣ , о томѣ лѣченіи сказать , которое употреблятъ должно при камнѣ , который бы не давно передѣ тѣмѣ до середины пупи уриннаго прошолѣ , а чрезѣ то , что я выше (1398) предложилѣ , вонѣ выйпѣти не можѣтъ . Срединую пупи уриннаго я называю , которое снаружи опѣ бульба , до самой уздочки протягивается . Прежде всего кожу уда дѣтороднаго , крѣпко на крѣпко , натянуть , и закрывши плешку , ниткою завязать , или ежели того

того здѣлать невозможно , шо и съ голою плешкою позади камня обвязочкою обвязать , которою кожа назадъ оптянушая удержится. Тогда попытку взять лѣвою рукою шакъ , чтобъ большой палецъ былъ подлѣ камня , а указательный персть сверху , и кожу на бокъ опведши , пупъ уринной , гдѣ онъ подѣ удомъ лежишь , съ боку , впрямь надъ камнемъ , разрѣзать. То камень или самъ собою выпадетъ , или какимъ нибудь крючкомъ можно его выпащипы. Когда будетъ вынутъ , шо цѣлую кожу оплустить , а понеже ея рана закроется , шо рана поскорѣе заживетъ. Обвязывать же должно подушечкою , и обвязкою удѣ вокругъ обнимающею. И тогда рѣдко надобно бываетъ прубочку изъ свинцу здѣланную , въ сиволь уринной вставлятъ , чтобъ моча въ рану не шла.

§. 1405.

У женщинъ также , но рѣже , камни какъ въ почкахъ , такъ и въ пузырь родятся. Ибо почешныя прубочки , которыми моча протекаетъ , у нихъ ширѣ , нежели у мужчинъ. да и не столько женщины работаютъ или движенія имѣютъ , чтобъ множество земляныхъ часпицъ , отъ шѣла отдѣлялось , и въ почки съ кровью приходило. рѣдко также случается , чтобъ камень , который изъ почекъ въ пузырь проходитъ , нѣсколько знатно великъ былъ , а шо кажется отъ широты и короткости прохода уриннаго дѣлается. Отъ того слѣдуетъ , что маленькія камушки съ мочою вонъ выходятъ.

§. 1406.

Какія причины дѣлаютъ , что камень рѣдко нѣкоторой величины у женщины бываетъ , такія также по-

912 РАЗЛИЧ. ЛѢЧ. У СТРАЖ. КАМЕН. БОЛѢЗ. УПОТ.

пособствуютъ , что часто безъ рѣзанія вонъ вынимаются. Въ прежнія времена много было такихъ , которыми эпошъ лѣченія способъ нравился (*) , однакожь кажется особливо опъ ЛЕ ДРАНА такъ представленъ былъ , чтобъ камень съ большою безопасностію , вонъ выниматься могъ. Лѣченіе же такое есть. Женщину навзничъ на сполъ , или на кровати положишь должно , разширить ноги ; пласна къ ягодицамъ пригнуть , и велѣтъ двумъ помощникамъ держать. Потомъ Медикъ , раздвинувши части естественныя ; успѣе прохода уриннаго оцупавъ , въ оное трубочку , какою мочу у женщинъ вонъ выпускаемъ ; однакожь она съ жолобкомъ быть должна , въ пузырь вставить долженъ. По этой трубочкѣ вождъ съ жолобкомъ (горжеретъ) въ пузырь всавывается , которымъ уже начинается проходъ уринной разшириваться (**). Тогда взявши вонъ трубочку , клещи вложить должно такія , какія у мальчиковъ маленькихъ для выниманія камня употребляемъ. Эпи два инструмента немножко нарочно развѣспъ надлежитъ , чтобъ проходъ уринной разширился. Ихъ довольно шупъ будетъ , ежели камень маленькой ; а ежели великъ , котораго безъ опасенія , и безъ поврежденія шейки пузыря вонъ вынуть невозможно , первые клещи вынувши , надобно другія побольше вложить ; а припомъ , ежели проходъ уринной понемногу раздѣтся , по многіе однѣ другихъ побольше всавывать , покуда и шупъ довольно распорится , и клещи въ пузырь очушяся , которыми камень свободно взять вонъ будетъ можно. Ежели много камушковъ будетъ , каждой однѣмъ способомъ выпаскивать должно.

(*) Хочется здѣсь нѣчто о различныхъ камня лѣченіяхъ представить , какія у женщинъ дѣлаются. ЦЕЛЬСЬ такъ велѣтъ , ежели камень

камень въ проходѣ уринномъ будетъ стоятъ, то крючкомъ его вы-
таскивать; ежели будетъ великъ, то рѣзать такъ надобно, чтобъ
пузырь въ одномъ мѣстѣ прорѣзывать, когда будетъ дѣвица больна,
а когда женщина, то въ другомъ. Ибо женщинѣ, въ естество
всунувши персты, между проходомъ уриннымъ и костью и дѣш-
родоудною, надъ камнемъ разрѣзывать, дѣвицѣ подъ самымъ лѣвымъ
краемъ, такъ какъ мужчинѣ, персты въ задній проходъ вложе.
Однакожъ въ обоихъ мѣстахъ разрѣзывать надобно поперегъ въ
лн. 7. гл. 26. Послѣдуетъ ЦЕЛЬСУ АЛБУКАЗИЙ въ томъ, что
до способа, какъ персты всавывать, касается. А что до мѣста каса-
ется, одѣвицѣ не говоритъ, гдѣ рѣзать надобно, напротивъ того
у женщины великъ камень къ саму низу лона отводить, и
сверхъ его разрѣзывать. А при томъ прибавляетъ нѣкоторыя благо-
разсмотрѣнія о кроветеченіи, которому изъ такъ глубокой раны ве-
ликому быть надлежитъ, въ кн. 2 гл. 61. А ГВИДОНЪ ДЕ КАВЛАІА-
КО м. п. почти ни трехъ словъ о семъ дѣйстви не написалъ, такъ коро-
ткопишетъ. ПЕТРЪ ФРАНКОНЪ тоже самое представляетъ такъ, что
персты подставлятъ, хотя бы женщина была или дѣвица, и хотя
въ задній проходъ или въ естество все одно, только нѣкоторую
в томъ отмѣну кладетъ, а о мѣстѣ никакого различія не упоминаетъ,
которое рѣзать должно. м. п. гл. 34. При томъ увѣщеваетъ, что
остерегаться надобно, чтобъ влагалища маточнаго не надрѣзатъ;
это лѣченіе новѣйшіе ЛѢКАРИ говорятъ, что только у однѣхъ дѣвицъ
дѣлать надобно, и называли малымъ приуготовленіемъ [кумъ парво
аппарату]. Кажется, что это лѣченіе ШАРПЪ похваляетъ, ежели
будетъ камень очень великъ. м. п. гл. 23. Другое лѣченіе говорятъ
женщинамъ прилично, которое называютъ съ великимъ приборомъ
[кумъ магно аппарату]. Случаетсяжъ, когда камень невеликъ бы-
ваетъ, то безъ ножика; ежели великъ, проходъ уринной рѣзаніемъ
разширивать принуждены бываемъ. Прежнему лѣченію должно быть
въ домъ еще во время ФРАНКОНОВО, который онсе и отбросилъ,
м. п. И не было отъ всѣхъ такъ принято. ГИЛЬДАНЪ велитъ спер-
ва спичку немножко закорюченную жоловатую въ проходъ уринной
вставлятъ, а по сей спичкѣ вождя и по тому вождю клещи.
Однакожъ желаетъ, чтобъ камень достовернѣе ухваченъ былъ, два
перста лѣвой руки въ влагалище маточное всавывать, и къ пу-
зырю протягивать, въ гл. о Липотоміи. Вез. т. е. о выниманіи кам-
ня изъ пузыря гл. 22. И отъ того лѣченія немного отмѣнно оное,
которое ТОЛЕІЪ списалъ, и назвалъ съ малою зорчею [кумъ парво
аппарату], разсуждаячи, будто стѣ того зпо дѣйствіе именуется
такъ что персты подъ пузырь подкладываются, и камень крючкомъ
онъ вынимается м. п. гл. 17. Смотри также у МАРИНИ м. п. гл.
12. стр. 200. Лѣчение же съ великимъ снарядомъ [кумъ магно аппа-
рату]

914 РАЗЛИЧ. ЛБЧ. У СТРАЖ. КАМЕН. БОЛБЗ. УПОТ.

ршту] у ТОЛЕТА такъ описано. По спичкѣ вожды впускаются , и между ими , когда нарозно разведутся , и путь уринной разширится , клещи въ пузырь всавываются , которыми камень , какъ у мужчинѣ , вонъ вынимается. Сіе лбченіе предложенное я видѣлъ у ѦЕВЕНИНА , на п. м. гл. 49 , у ГРЕНЕВЕЛТА на п. м. стр. 53 и далѣ , у ДЕ ЛАВНАУ п. м. глав. 10 стр. 128 и далѣ , у САВІАРДА въ Прим. Хир. 72 , у МОНИСА на п. м. стр. 236 : у АЛГГІЯ на п. м. гл. 18. стр. 89 и далѣ , у ГАРЕНЖОГА въ Тр. де Операт. Т. 2. стр. 83. Многіе изъ сихъ авторовъ совѣтуютъ , ежели камень больше сыщется , нежели какъ обнѣмъ думается , и безъ разорванія шбйки выпущи пѣ не можно , то оный или въ пузырь разломить , или проходъ уринной нѣсколько разрѣзать. Этомъ разрѣзѣ уже давно ПАРЕЙ неопытно дѣлашь разсудилъ , ежели его я прямо понимаю на п. м. кн. 16. гл. 47. ибо то особливо темно , что господишъ КОЛОТЬ пишеть. Не испышѣмъ же почѣсть можно то , что у ДЕ ЛОСОНА о камнѣ женскомъ я вижу на п. м. часть 2. гл. 12. Лбченіе у женщинѣ дѣйствуемое особенное есть , которое боковымъ хотѣли бы называть. Обнѣмъ МАРИАНЪ пишеть , хотя кажется , что онъ въ немъ не упражнялся. п. м. гл. 22. Можетъ быть , что оно тожъ самое будетъ , которое тремя только словами предложилъ ГУРМЕАНЪ п. м. стр. 182 и далѣ. Подлинно въ немъ упражнялся ФРАТЕРЪ ІАКОБЪ , понеже изъ многихъ отъ МЕРІА и НОЭЛЛА представленныхъ примѣровъ явствуется. Смотръ у МЕРІА п. м. и по немъ у РАВІА , однакожъ этомъ разсуждалъ , что сіе лбченіе только дѣвицѣмъ прилично , смотр. у ГЕРЦА п. м. стр. 50. А МЕРІЙ это лбченіе бросивши , другое выдумалъ , которое такъ распоряжается. Спичку или совокъ жолобозатой въ пузырь всавывается , но иногда больше закорюченный , нежели какой зѣвсегда употребляется. Этимъ шбйка пузырьная въ влагалище вписывается , чтобъ вмѣстѣ съ нимъ и разрѣзать было можно. п. м. гл. 4 стр. 30. Сего лбченія годность или пользу свидѣтельствовать могутъ кажется примѣры тѣхъ женщинѣ , у которыхъ камень въ стволѣ впадши , по разрѣзаніи влагалище внутри вынутъ былъ такъ , что онъ и мочу въ себѣ могли держать. На послѣдокъ и сіе придаютъ надлежитъ , что ГИЛЬДАНЪ нѣкогда женщину , каменною болѣзнію страдающую , прорѣзавши въ самомъ низу брѣха пузырь , вылѣчилъ , смотр. Опер. Хир. въ Сопинѣ и Примѣн. 68. Такое же лбченіе , ежели камень будетъ великъ , отъ ИВАНА ДУГЛАСА представляется п. м. Часть 10. Да и сумѣвать я не для чего , что путь безопаснѣе поступать можно , нежели у мужчинѣ , понеже пузырь у женщинѣ и пространнѣе , и выше лежитъ.

(**) Кажется что противъ сего никакъ спорить не лзя , что лучше камень вынимать , путь уринной разширяючи , нежели раз-

разрѣзываютъ. Ибо всякъ знаетъ , какъ части тѣла нашего , будучи пресильно распалены , опять въ прежнее состояніе приходятъ. И безъ того обойтись не возможно , чтобъ проходъ уринной не раздался , хоть будетъ и прорѣзанъ , ежели камень очень будетъ немалъ. Есть также примѣры многіе камней , которые бывали такъ велики , что путь уринной и разрѣзаніемъ расширенъ былъ , однако надежды не было , чтобъ безъ разсѣанія шейки вонъ взять было можно , однако или сами собою выходъ дѣлали , или , помаленьку расширяючи проходъ уринной , вонъ вынуды были такъ , что моча по желанію испускалась и держалась мѣла , См. стр. у Славк. ГЕЙСТЕРА п. м. стр. 1029 и далѣ. Однакожъ великое стараніе прикладывать должно , чтобъ проходъ уринной полегонку расплавлять. ИВАНЪ ДУГЛАСЪ представляетъ , ежели камень будетъ невеликъ , то кноты изъ губки гредкой вощаной или воскомъ напоенной , или изъ корня ЭНЦІАНЕ дѣлать , и въ проходъ уринной вкладывать надобно такъ , чтобъ одинъ послѣ другаго побольше вставлятъ пошуда , покуда путь этотъ такъ растворится , что клещи въ него будутъ всунуть можно , и камень вытащить. Я бы думалъ о томъ лѣченіи , которое ЛЕ ДРАНЪ предложилъ , что удачнѣе быть можетъ , что клещи одинъ послѣ другихъ побольше такъ и вожды одинъ другаго побольше , вкладывать , а начинать тѣмъ , который ЛЕ ДРАНЪ выдумалъ , для маленькаго онаго ножичка , которой къ желѣзу предстательной просавывать должно , и которой въ томъ страждущихъ каменную болѣзнь употреблется , о которомъ выше я объявилъ (1385).

§. 1407.

Вынувши камень , ежели не будетъ какою болѣзнію больна , то не надобно ее многими лѣкарствами обезпокоивать ; однакожъ ей покойной быть должно , и чтобъ колѣна вмѣстѣ связаны были , также очень хорошо время дать проходу уринному , чтобъ онъ по прежнему узокъ дѣлался. Ежели же опасность будетъ , чтобъ то очень скоро не дѣлалось , подлежитъ слѣдовать ЛЕ ДРАНОВУ совѣту , и влагалище изъ нутри довольно водою теплою , въ которой будутъ варены травы и корни вязущія , припаривать. А припомъ также хорошо , губку обмоча въ такой водѣ , прибавивъ маленько уксусу , и выжавши , на всѣо естество накладывать.

§. 1408.

Когда же до того дѣло дойдетъ, что ножикомъ дѣйствовать надобно, то какъ поступить должно. Женщинъ такимъ же образомъ, какъ и мужчинъ при лѣченіи камня скручивають, на сполъ класть должно. И не излишнее же есть, руки и нѣи у больной связать и съ боковъ сильныхъ двухъ человѣковъ поставивъ, которые бы могли ее держать. И тогда вождъ (горжеретъ) въ проходъ уринной вложить должно, у котораго передъ шѣмъ, гдѣ онъ язычкомъ кончится, будто бы спичку придѣлану имѣетъ, въ палецъ большой шириною, и жолобокъ глубокой на себѣ имѣющую. Сперва вождъ не далъ этой спички въ проходъ уринной всавывается. И повернувши его такъ, чтобъ жолобокъ къ лѣвому стегну оборотился, ножикъ такимъ образомъ, какъ то сказано, ЛЕ ДРАНѢ дѣлаетъ (1385), всунуть надобно, и уринной проходъ, рану съ боку дѣлаючи разрѣзаетъ. Когда путь отворится, и ножикъ вонъ вынется, то перстъ указательный правой руки въ жолобокъ вождовъ вкладывается, и шѣмъ путь уринной полгоньку отворяется. Отворивши такъ дорогу, стараться, чтобъ клещи способные, вложить, и чтобъ камень вонъ вынуть было можно.

(*) Способъ сей лѣченія былъ отъ ЛЕ КАТА изобрѣтенъ, онъ меня (говоритъ авторъ) чрезъ письма тому училъ, и съ ними инструменты прислалъ, которыми дѣлается. Ножикъ много на томъ походятъ, который [цистотомумъ т. е. пузырепрорѣзанныкъ называется, и въ томъ лѣченіи употребляется, въ которомъ у мужчинъ, шѣйку пузырную отворяетъ, смотр. примѣч. наши о лѣченіи камня Таб. 2. Фиг. 1. и ДІОНИСЬ П. М. Таб. 2. К. Однакожъ не схожъ въ этомъ. Весь ножикъ прямъ и острее имѣетъ длиною около двухъ пальцевъ поперешныхъ, въ самой ширинѣ 8 или 9 линей будетъ. Концы престоиры, и съ боку жолобокъ проведенъ, въ которомъ какая была бы надобность, не обдѣлывалъ.

§. 1409.

§. 1409.

Не много несходно то лбченіе , которое ЛЕ ДРАНЬ у женщин употребляетъ , когда камень шакъ великъ будетъ , что его въ разширенный путь уринной , вынуть не можно. Ибо какъ спичка жолобоватая въ пузырь всунется , и жолобкомъ къ спегну лбвому оборотится , маленькой оной ножичекъ , который выше (1385) описанъ , по жолобку впускается шакъ , что путь уринной , до самой шейки пузыря разрѣжется. Однакожъ при разрѣзываніи великъ перспъ въ естество подкладываетъ , чтобъ влагалища не повредить. Послѣ того Врачъ , вынувши ножикъ , вожда , и по немъ перспъ и клещи всавываетъ , и камень вонъ вынимаетъ.

(*) ЛЕ ДРАНЬ , гдѣ сѣ лбченіе описываетъ , особенный также способъ къ лбченію разрѣзанной раны представляетъ. Ибо говоритъ , что клетчатое сложеніе , пузырь объемлющее , легко возжигъ получить можетъ. Того ради трубочку толстенькую вставить должно , покуда возжигъ въ загноеніе обратиться. Тогда кнотъ мастью гноепроизводною обмазать и туда вложить должно. Въ кнотъ также тоненькую трубочку класъ можно , чтобъ теченіе мочи не удерживалось , смотр. ЛЕ ДРАНЬ въ Тракт. о Операц. стр. 335. Приложено тамъ примѣчаніе , которое понудило ЛЕ ДРАНА сѣ лбченія способъ выдумывать. Однакожъ не видно , чтобъ онъ въ немъ искусился.

§. 1410.

Прежде сказано , что нѣкоторые хотѣли , ежели камень великъ будетъ , чтобъ пузырь надъ костями дѣтородными отворять. О которомъ лбченіи и о подобномъ также у женщинъ собственно это одно сказать должно : впустивши клисперъ способный въ пузырь , и трубочку вонъ вынувши , нѣкоторой помощникъ два перста въ естество вложить долженъ , и тѣмъ путь уринной заперши , клисперу выходъ перервать. Можно также

полкачикъ изъ корки пробойной зѣланной и воскомъ обвожденной всунуть. Однакожъ такого лѣченія у непознавшихъ мужа дѣлать не позволяется. Того ради у таковыхъ полезно кажется быть можеть, трубочку подобную той (*), какую ЛЕ КАТЪ выдумалъ, проходомъ уриннымъ въ пузырь вспавить, и закорюченное мѣсто, на которомъ жолобокъ въ длину проведенъ, внутри къ противной пузыря части приписнуть, который такимъ образомъ и безъ мочи безопасно разрѣзать можно.

(*) Смотри инъ Медик. Эссейсъ Вол. 5 Таб. 6 фиг. 4.

О РОЖДЕНІИ НАТУРАЛЬНОМЪ

И

О ВЫНИМАНІИ МЛАДЕНЦА ИЗЪ УТРОБЫ.

ДЕ ПАРТУ НАТУРАЛИ ЭТЪ ДЕ ЭМВРІУЛЬЦІА.

§. 1411.

У лѣкаря часто помочи требуютъ роженицы, которымъ ежели способствовать хочеть, надобно ему имѣть знаніе частей женскихъ, матки женской, какая бываетъ у всякой женщины, а особливо у брюхатой, рождающихъ, и роженицъ. Знать долженъ матошныя связки, и устье ея, которое устьемъ внутреннимъ, или устьемъ шолудивымъ называютъ, и сего, что въ маткѣ носящихъ, и роженицамъ въ какія времена приключается, перемѣны и ворочанія. При томъ кости, изъ которыхъ лоно составляется, и которыя съ мужескими несходны, разсуждать должно и знать припомъ,

чпю

О ВЫНИМАНІИ МЛАДЕНЦА ИЗЪ УТРОБЫ 919

что до младенца въ утробѣ касается послѣ , пупокъ или пуповину , и какія пуповина имѣетъ жилы бѣющіяся , и жилу кровезовращательную , мѣсто , покрывала , и вода , которая сими держится. Въ знаніи всѣхъ сихъ и другихъ вещей утвердиться потѣ можетъ , кому часто случай дастся , беременныхъ рождающихъ и роженицъ пѣла по смерти вскрывать.

§. 1412.

Но хотя все сіе Лѣкаръ будетъ знать , однако пособствовать не много можетъ женщинамъ , ежели не будетъ въ употребленіяхъ. Чего ради надлежитъ ему сперва быть у рождающихъ , которыя легко и порядошными родами младенца рожаютъ , а потомъ и у другихъ , у которыхъ , или живаго или мертваго младенца рукою и орудіями вынимають надобно.

§. 1413.

Беременности многія примѣты имѣются , которыя всѣ собрать надлежитъ , понеже каждая изъ нихъ не постоянна , то и обманывать могутъ : ибо и въ нихъ почти нѣтъ ничего неперемѣннаго. И такъ женщина младенца понесшая признавается , у которой крови помѣсячно не пойдутъ , у ней шипки ядрѣкшъ , и желѣзы въ кружкахъ около соска находящіяся салными называемыя , побольше раздуваются , которой обыкновенная пища омерзѣетъ , и рвоту производитъ , которая необыкновеннаго жадничаетъ , и въ томъ не преодолимомъ желаніи , которое прихотью называютъ , мучится. Беремянные также часто болью зубною страждутъ. Около трехъ мѣсяцовъ брюхо надувается , оно тугонько будучи , персту , какъ подавишь , гораздо не уступаетъ , а пупокъ нѣсколько вылучится. Это же больше усматривается у пѣхъ ,

ко.

которыя часто рождали , а у первораждающихъ не такъ. Послѣ того около четырехъ или пяти мѣсяцовъ чувствуется , какъ матерью самою въ маткѣ , такъ ежели снаружи руку на брюхо наложишь , движеніе живаго , и будто играющаго , младенца. Сіе младенца въ употребѣ ворочаніе отъ другихъ движеній раздѣлять надлежитъ , которыя отъ вѣтра на низъ проходящаго , и кишку надувающаго , также и отъ судорогъ , которыми иногда кишки будто переворачиваются , произходятъ.

§. 1414.

Достовернѣйшую же примѣту имѣть можетъ повивальница , ежели она персты указательный и средній , обмоча въ елей , въ срамоту женскую вложитъ , и внутреннее устье маточное ощупаетъ. Понеже сіе устье , которое у небеременныхъ , къ срамотѣ обернуто бываетъ , и перстомъ ощупывается , высоконько , или будто вѣнкомъ обнято и зажато , а какъ матка начнетъ раздуваться , то къ низу и къ проходу заднему склоняется такъ , что въ послѣдніе мѣсяцы трудно бываетъ и ощупывать. Оное же въ тѣ времена помаленьку расширяется , выпучившееся его мѣсто полого дѣлается , а на послѣдокъ и это и то устье будто бы сравниваются. Кому повивальничнаго дѣла учиться желаніе есть , тому должно сіи различности , которыя въ различныя времена , когда беременна бываетъ , и когда родитъ , случаются у многихъ женщинъ , весьма прилѣжно примѣчать.

§. 1415.

Беременнымъ ничего вреднѣе нѣтъ , какъ , ежели будутъ такихъ и сякихъ лѣкарствъ преизлишне употреблять , и въ благополучномъ здравіи состояніи ,
не

неблагополучнаго пособія искать. беречься имъ надобно , отъ насильныхъ шѣлесныхъ трудовъ , къ которымъ не пріобыкли , отъ незапныхъ душевныхъ страстей , чѣмъ безвременно не донося не выкидывали. Это также быть можетъ , ежели боспроками и другими узкими одеждами одѣвающиеся брюхо стягивающъ , или брюхо нѣсколько обвислое , высокіе черевики употребляющія , напряженіемъ прямыхъ мышекъ приподнимающъ. Въ послѣдніе мѣсяцы больше бѣсть надлежитъ , а изъ того превеликая погрѣшность произошла отъ худо оное толкующихъ , или отъ кривотолковъ , буди бы беременной ничего опасаться не надобно. Можно всякое кушанье , хотя весьма крѣпкое употреблять. Изъ кушаньяжъ , которое въ желудкѣ неварится , сырость , а изъ сырости многія , какъ женщинѣ такъ и младенцу въ утробѣ смертельныя болѣзни рождаются. Можно ей кушать часто , но помаленьку , а пить нѣчто тонкое , въ трудахъ прилѣжно обращаться по ея природѣ и по привычкѣ , покуда устанетъ. Которыя будутъ полнокровны , и которыя пріобыкли кровь уже метать , тѣмъ около двадцатой недѣли , и по исполненіи мѣсяцовъ опять передъ родами нѣсколько пустишь. Надобно же разсуждать и о силѣ ея , чѣмъ послѣ кровопусканія осталось столько мочи , чѣмъ въ одной женщинѣ двое удовольствованы быть могли , то есть , мать и младенецъ. А притомъ очень изрядно пособствуетъ беременнымъ , а особливо тѣмъ , которыя изобильнымъ кушаньемъ довольствуются , а притомъ мало работаютъ , почаще однако спустя нѣсколько времени слабительное давать , и вредную матерію въ низъ прогонять. Однако ежели будетъ оставаться

К к к к

сы-

сырость, то не надобно того наблюдать, чему по-
собствуешь воздержностью и малояденіемъ. Внутрь
лѣкарства легкія давать надлежитъ, между которы-
ми ревень лучше всѣхъ дѣйствительнымъ признанъ.
А гдѣ не будетъ на низѣ дѣлаться, очень не худо
клизмы спавить беременной, только чтобы не бы-
ли остры, ни очень горячи. Многія при послѣднихъ
дняхъ въ воду теплую садятся, ванны употребля-
ютъ, чтобы чрезъ то женскіе уды разслаби, кото-
рое дѣйствіе полезно быть можетъ тѣмъ, которыя
тѣломъ ядрены, и которыя въ первой разѣ родить
намѣряются; то же самое другія не шакъ за нужное
какъ за преизлишнее почтеть могутъ.

§. 1416.

Есть, такіе люди, которые не думаютъ, чтобы
младенецъ въ маткѣ по натуральному, и какъ над-
лежитъ, лежалъ (*), и то съ правдою сходно, что
въ первые мѣсяцы такъ бываетъ. Но, однакожъ по
большой части въ послѣдніе мѣсяцы въ такомъ по-
рожденіи находятъ, что будто бы прямо сидѣлъ,
лицемъ къ мышкамъ чревному беременной женщины
оборотясь (**). При послѣднихъ дняхъ голова на-
клоняется, къ устью маточному низходитъ, и оно
растворяетъ. Это какъ дѣлается, то въ самомъ
низу брюха, и снаружи перемѣна почувствуется,
понеже она ниже опустится, и у тѣхъ, которыя
много рождали, обвиснетъ. Сіе младенца положеніе
хотя ненатуральное, однако весьма часто бываемое.
Протолковать также должно примѣты, которыя по-
казываютъ, что время рожденія настойтъ, о ко-
торыхъ тожъ самое, что о знакахъ беременности
сказали, повторить надобно. Женщина, какъ теперь
мы

О ВЫНИМАНИИ МЛАДЕНЦА ИЗЪ УТРОБЫ. 223

мы сказали, по большей части чувствуетъ, что брюхо въ низъ опускается, часто ей мочиться хочется, а моча иногда чуть идетъ, да и то не безъ трудности. Изъ естества потечетъ вода возгреваемая, съ копорою иногда и кровь смѣшена бываетъ. Напоследокъ боль въ поясницѣ здѣлается, и та переймами, не ровно. При концѣ оныя болѣзни въ лядвѣ и въ нѣги проходящъ, нѣги также, какъ гораздо напрягутся, трясущся. Однакожъ эта боль не такая бываетъ, какъ бываетъ рѣзъ въ животѣ, или боль въ кишкѣ ободочной, тамъ боль бываетъ по мѣстамъ и весьма больная, въ естество не бросается, и на низъ не проходитъ, и часто по приложеніи теплыхъ припарокъ и по испущеніи въ низъ звукъ брюшной, проходитъ. Самый достовѣрный знакъ томъ, если повивальная бабушка обрѣзавши у перста на рукѣ ноготь, обмоча его въ масло, въ женской удѣ вложивъ, и узнаетъ, по тѣмъ дѣлающимся болямъ, что устье матошное растворилось, и въ немъ плену влажностью распяленную перстомъ ощупаетъ. Сей перепонки ровный и круглый по большей части горбѣкъ значивъ, что тутъ головка и рожденіе порядочное будетъ.

(*) Смотри. ЛА МОТЪ Третье десъ Аккушемъ Кн. 1 гл. 21 стр. 119.

(**) Смотри. МОВРИСО кн. 2 гл. 3 стр. 215 г. фиг.

§. 1417.

Когда же устье матошное довольно растворится, надобно женщину прямо, и навзничъ, или на спулѣ къ тому здѣланномъ, или поперегъ кровати такъ положить, чтобъ ее бедрами ягодицы прижались. Съ боковъ нѣкоторыя женщины должны

К к к к 2

стоятъ

стоять, и бѣдра у родилницы на розно разводиль, а ежели она на кровати навзничъ положена, то и ноги поддерживать. Которыя на стулѣ родящъ, оныхъ ноги на подспавленныхъ подношкахъ опираются, и ради того сильными напуживаніями, насилуваніями или жиленьями родамъ пособствовать могутъ. А на стулѣ или на кровати женщину класть должно, о томъ часто споры бывають. Ежели, ни младенецъ въ утробѣ, ни матка не будетъ такъ лежать, какъ по натуральному водился, то больше мнѣ кажется способнымъ къ тому стулѣ, на которомъ женщина оная можетъ опираться, и собравшись больше съ силою рождаемое вонъ изгоняетъ. Въ иныхъ случаяхъ лучше почтѣе можно кровать, о чемъ ниже скажу. Ничего же такъ беречься не надобно, и ничего нѣтъ вредительнѣе, какъ то, что повивальницы понуждаютъ женщинъ, чтобъ онѣ надсядаючись поскорѣе рождали, говоря, прибавь матушка силки, прежде того что утѣе матошное хорошо не распворилось, и прежде того, покуда подлинно не освѣдомишься, что младенецъ правильно расположенъ. Понеже такими безвременными трудами теряются силы, и не рѣдко, ежели младенецъ попергъ лежитъ, или инако устроенъ будетъ, ручка и другія части въ утѣе матошное со всѣмъ низходящъ, что послѣ того оныя члены не возможно бывающъ опять навадъ вправить, да и младенца выправить, и руками способно вонъ вынуть. При такихъ напугахъ или жиленьяхъ утѣе матошное гораздо ошворяется, то оно елеемъ или другимъ какимъ жирнымъ надобѣмъ поливать должно, чтобъ рождаемое свободнѣе вышшишь могло.

§. 1418.

Когда же боль [переймы] такъ отчасу больше дѣлается будущъ, напоследокъ прорываются плевры, выпекаютъ воды, которыя въ нихъ держатся, и которыми оныя части слизи дѣлаются, головка младенческая низпускается, и наибольшее устье матошное разверзаетъ, однакожъ въ немъ останавливается, тогда женщина не мало себя пособивуетъ, ежели она силою для изшествія вонъ понашужилась, понеже по большой части какъ плечики къ устью матошному приближаются, то новая остановка и препятствіе дѣлается, оное приумножая силу и боль претерпѣвая преодолювать надобно. Въ то самое время повивальница руками беретъ младенца, и вонъ его вынимаетъ.

§. 1419.

Коликократно же младенецъ вытащенъ и будетъ, пупокъ на полтора пальца отъ брюшка отступя лишнюю толстенькую завязать, и перерѣзать, завязавши и ту часть пуповины, которая отъ послѣда или отъ мѣста протягивается. Послѣ того слѣдуетъ мѣсто или послѣдъ, который ежели очень крѣпко держатся будетъ, вытащить должно. Ради того повивальница перерѣзанной пуповины конецъ лѣвою рукою взявши обернетъ около перстовъ, правую же по пуповинѣ до самаго послѣда доходящъ, и оный полегоньку тащитъ и потряхиваетъ, покуда оный не выпадетъ. Ежели за пуповину сильно тянутъ, что иногда случается, что она перерывается, и бѣдственное отъ того крови теченіе дѣлается, или съ мѣстомъ самая матка вывернется, и вонъ выпадетъ. А между тѣмъ, когда повивальница около сего работаетъ, велѣтъ женщинѣ, чтобъ духъ за-

К к к к 3

держивала

держивала , и покашливала , понеже стисненіемъ отъ преграды грудобрюшной брюшныхъ внутренностей мѣсто лучше вонъ выходитъ. Не худо между тѣмъ какой ни будь женщинѣ у роженицы рукою брюхо подавливать и поширать , однако съ крайнею умѣренностью.

§. 1420.

Гдѣ мѣсто не слѣдуешь за младенцемъ , что часто случается , и совершенно къ маткѣ приросло , въ томъ оное несогласіе между лѣжащими имѣется , что одни за нужное признають мѣсто потчасъ , обмоча въ масло персты ручные въ матку всунуть , отдѣлять , и вонъ вынимать , другіе же естеству по препоручають , и утверждаютъ , что оно при зжиганіи матки , безъ употребленія всякой силы прогоняется , и вонъ выпадаетъ. На оба мнѣнія опыты имѣются , которыми оное доказывается. Того ради которые велятъ спѣшно дѣлать , за нужное быть почитають , чтобъ повивальница принявши младенца руку потчасъ въ матку , покуда еще устье распворено , вложила , и персты между маткою и мѣстомъ , то есть между самимъ краемъ , такъ расположила , чтобъ мягкіе перстовъ коньчики къ маткѣ , жесткіе ноппи къ мѣсту , обернуты были , чтобъ мѣсто такъ отдираючи , будто отъ матки отдѣляли , и съ принужденною кровью , и съ другими внутри находящимися , вонъ вынула. Прибавляють къ тому , что въ то время рука безъ всякой досады вся внутри быть можетъ , а какъ матка сожмется , то устье ея такъ сузится , что руки внутрь всунуть будетъ не можно. Велятъ также , если мѣсто или цѣлое или разорванныя его части , отъ не-

скусной

искусной: повивальницы въ маткѣ оставлены будупѣ , то обмочивши перстѣ указательный въ масло , опять устѣ матошное растворитѣ , и другой къ тому вложитѣ , и такимѣ же случаемѣ пропчѣе персты , покуда вся рука внутрь войдетѣ , и такѣ все , что въ маткѣ ни будетѣ , вонѣ вынутѣ . Понеже доказываютѣ , что изѣ разорванныхъ , и въ маткѣ оставленныхъ шмапковѣ отѣ мѣста: часто кровь бѣдственнo хлыщѣтѣ , и рѣдко утoляетсѣ , ежели матка не сожметсѣ , а матка сжиматсѣ не можетѣ , ежели не опорожниетсѣ . Придаютѣ еще , ежели отѣ печенія крови никакой бѣды не воспослѣдуетѣ , то оное въ маткѣ оставшееся , напоследокѣ испортитсѣ : такѣ , что порча и въ матку , а отѣ матки во всѣ шѣлесные соки распространитсѣ , или оныя остатки мясами безобразными , которыя заносомѣ [моле] называютѣ матошнымѣ , не рѣдко съ женщиною до глубокой старости спарѣющіяся . Заносы такіе не только препяществуяутѣ , впредѣ женщинамѣ , въ употребѣ зачинать , но и страшные и препяжкіе болѣзней роды производятѣ (*). А другіе , желающіе противнымѣ путемѣ поступать , доказываютѣ , что этоѣ способѣ мѣсто отдираетѣ , весьма бѣдственѣ , понеже матку испортитѣ , и въ ней вожженіе произвестѣ , не рѣдко оставитѣ болячку , и различнородныя опухоли да еще и открытаго рака опасатсѣ , можно . Не столькожѣ бѣдствія бываетѣ , когда мѣсто добровольно отпадетѣ во время сжиманія матки , это чуть не завсегда дѣлаетсѣ , понеже матка въ нижней и внутренней своей части мышку имѣетѣ и волокна вокругѣ протянутыя , которыхѣ дѣйствіемѣ оное вонѣ изгоняетсѣ (**).

(*)

(*) Смотр. у Ю. ВАРАНДЕА о Аффектахъ женскихъ кн. 2 гл. 11. Между многими другими у ЛА МОИТЬ претъ де-кушенисъ кн. 5 гл. 1 стр. 725, и преученаго мужа и мнѣ великаго прѣтеля госп. Д. Ю ВАЛЕНТА, ГАРТРАНЦТА диссерт. о незапущеніи мѣста прирослаго вынимать, въ Липсѣи 1735 года.

(**) Между сими первый есть ФРИД. РУУВІЙ протъ дес. 2 Примѣч. 10 стр. 30 и въ Тракт. Анатом. о мышкѣ надѣ въ машкѣ примѣченной, въ Амстерд. 1726 года.

§. 1421.

Ежели же о сихъ великаго содержанія спорахъ, которые у Медиковъ завсегда дѣлались, и нынѣ дѣлаются, начать говорить, то кажется съ правдою сходно, что не безобѣдственное дѣло, ежели мѣсто вонѣ не будетъ взято, да или все, или его части, въ маткѣ оспанутся. А припомѣ когда рука въ машку всавывается; то съ мѣстомъ можно все вонѣ взять, что внутри часто остаётся, запеклая кровь, заносы, которые ежели вонѣ не бываютьъ взяты, то новыя болѣзни послѣ родовъ причиняютьъ. Много же родовъ и временъ обѣдственныхъ бываютьъ, когда мѣсто крѣпко прирослое насильно отдѣляется. Чего ради всеконечно безопаснѣе кажется, по принятіи младенца поспѣшъ вонѣ вынуть и мѣсто. Но понеже часто случается, что того безъ крайней боли дѣлать не возможно, да и къ выниманію его весьма спѣшишь не надобно, то многіе въ этомъ дѣлѣ искусные люди приказываютьъ, ежели что не принудитъ, какъ на примѣрѣ сильное кровное печеніе, то женщинѣ дать нѣсколько времени, чтобы отъ труда могла отдохнуть, и съ силою собраться. Ежели же припомѣ на стулѣ она родила, то на кроватку на вѣнчѣ ее положить должно, понеже въ такомъ положеніи не такъ легко самая машка за выпаскиваемымъ мѣстомъ выпаскивается. Часто же быва-
етъ

стѣ, что нѣсколько матка сожмется, мѣсто, которое бы съ начала развѣ бы насильно вонѣ пащитъ безѣ труда, пошягивая и потрясывая полегоньку пуповину, само вонѣ вынадастѣ (*).

(*) Сіе мѣсто предложилъ изѣ всѣхъ АЛЕКС. МОНРО въ тѣ. Медикал. Ессамс. кн. 2. Примѣч. 11 стр. 220.

§. 1422.

Когда младенецѣ родится, и мѣсто выдетѣ, то женскую срамоту сукномѣ нагрѣтымѣ прикрыть надлежитѣ, чшобѣ воздухомѣ, матка пюгда отккрытая, не повредила. Женщину на кроватку положить должно, и ежели она много ужѣ раждала, обвязкою брюхо нѣсколько пугонько обвязать. Такая обвязка излишнею быть можетѣ у первородныхѣ; понеже оною разслабой матки плесы брюшинной и мышекѣ чревныхѣ безсилію, ежели оное будетѣ, пособствовать можно. Она же обвязка, ежели пуго обвязана будетѣ, и очень особливо матку будетѣ давить, всякой женщиנѣ очень вредительна быть можетѣ.

§. 1423.

Двойнишныя младенцы каждой имѣетѣ свою крышку, и свою пуповину. Она же послѣдняя часть, которую новѣйше плацентою, а Рускіе послѣдомѣ или мѣстомѣ называютѣ, иногда раздѣлена, а иногда такѣ сроспшаяся бываетѣ, что разнять не разодравши не возможно. Ежели послѣ рожденія, и послѣ за-вязанія пупка, у женщины брюхо не опадаетѣ, но твердо бываетѣ, и отѣ руки на брюхо наложенной не подается, то повивальница, покуда еще мѣста не выпашитѣ, по пуповинѣ слѣдовать, и руку въ матку вложивши, нѣтъ ли другаго младенца,

Л л л л

вну-

внутри, изслѣдовать должна. Ежели младенецъ въ маткѣ будетъ, то онъ переймами и родильницаыными напугами также къ низу подвинется, и ежели прямо сложень, родится. А лучше ежели совершенно узнаеть, чпоо младенецъ въ утробѣ есть, въ самомъ рожденіи поворонѣе поступить, ради чего оболочки, ежели еще цѣлы, перстами прорвать, ношки сыскать и младенца выпашить. Ежели близнецы въ маткѣ, и плеввы ихъ уже прорваны, оныя свободно взятые за нѣги выпаскиваются, но въ томъ стараніи и осторожности требуется, чтобъ лѣкаръ обоихъ младенцовъ, захватя по одной ногѣ у младенца, вмѣстѣ не припащилъ. Мѣсто двойнишное оное напередъ выпаскивать должно, которое къ первому рождаемому принадлежитъ.

§. 1424.

Теперь уже приступить надобно къ пѣмъ случаямъ, гдѣ рождаемое, само собою выптись не можеть, лѣкарскою рукою поправлять и вынимать должно, или также орудіями выпаскивать, котораго случая многія причины и приключенія бывають, которые крайняго благоразумія и скромности требуютъ. Прежде же всего эпо изслѣдовать должно, живоль рождаемое въ чревѣ, или уже въ маткѣ матерней умерло, котораго случая мы многіе имѣемъ признаки, но оныя, какъ выше донесено, при времени беременности, всѣ обманывать могутъ, прилѣжно соравнишь, и по неложнымъ признакамъ разсудить долженъ лѣкаръ.

§. 1425.

И такъ рождаемое мертвое, изъ видимыхъ признаковъ узнать можно. Ежели женщина по брюху уда-
рна

рена будетъ , ежели упадетъ съ высока , или другимъ способомъ сильно повернется и повредится , или ежели нѣчто иное приключится , наприкладъ , ежели женщина нечаянно испугается , бояться будетъ , или въ какое надчаяніе придетъ , ежели она чрезъ нѣсколько дней слабости бояться будетъ , а послѣ того не будетъ слѣдовать жаръ , ежели часто обмороки будетъ имѣть , ежели на лицѣ цвѣтъ въ новую блѣдность претворится , и поблѣднѣетъ , ежели глаза опяжеляютъ , посизѣютъ и впадутъ , ежели изъ рта запахнетъ , питъки опускаются , брюхо опадетъ , и въ немъ недвиженіе младенческое , но нѣкоторая тяжесть почувствуется. Достовернѣйшія же примѣты такія , какъ въ самой болѣзни утѣе матошное отворено будетъ , и на шѣло мертвое рука наложенная холодъ , а не бѣненіе жилъ бьющихся будетъ чувствовать , и ежели отъ него кожица слезетъ , ежели смрадной мокроты полугной и съ тою мокротою , которая по естеству во внутренней или средней [инѣ амніо] бываетъ , и калъ , или какъ называютъ [меконіумъ] , мараіе младенца употребнаго течетъ. Однакожъ случится можетъ , что иногда живъ будетъ младенецъ , а мы никакого движенія жилъ бьющихся чувствовать не можемъ въ удѣ , который утѣемъ внутреннимъ матошнымъ сильно будетъ давленъ , отъ котораго уда , ежели онъ Антоновымъ огнемъ пораженъ будетъ , и кожица отдѣлится можетъ. Ежели младенца также живаго , жопка или ягодички будущъ обвернушы , и ихъ , и младенческое брюшко , когда онъ вдвое низходитъ , утѣе матошное захватитъ , и давитъ вонъ будетъ , то калъ младенческой изъ раждаемаго живаго выдавливаеця , и съ тою мокротою вонъ выходитъ.

§. 1426.

Рождаемое же мертвое, ежели прямо сложено, такимъ же пупемъ, какъ живой младенцѣ обыкновенно вонѣ выходитъ. Иногда, ежели онѣ поперегъ или инако лежать будетъ, онаго весьма хорошо ношиками повернуиъ, и рукою лѣкаръ вонѣ выпасиъ, о которомъ выправливаніи рождаемаго пеперь объявиъ должно. Ежели же голова при успѣ матошномъ стойтъ и скрозь его, или ради величины, или ради сложения непорядочнаго удовъ, или за пѣснопою женскихъ ложеснѣ вышпи вонѣ не можетъ, въ такомъ случаѣ орудіями тому пособствовати надобно. Къ тому за нѣсколько годовъ назадъ выдуманы великія и широкія клещи, которыя такъ принаравливаются, что полюсами ихъ головку младенческую захватя, не только мертвыхъ, но и живыхъ рождаемыхъ, вонѣ выпаскиваютъ. Ибо оными орудіями не только младенца захвативъ, но и успѣ матошное разширитъ, нѣсколько можно (*). Другіе нѣкоторое сіло употребляютъ, которое избѣспными и приноровленными орудіями на голову младенцу накладываютъ, и такъ въ силѣ запутаннаго припятиваютъ, и все пѣло вонѣ выпаскиваютъ. А припомъ пишуиъ, что такимъ способомъ и живыхъ младенцовъ вынимати можно (**). Въ такихъ случаяхъ весьма часто случается, ежели подлинно избѣспно, что рождаемое уже мертвое, что оно крѣчкомъ вынимаютъ.

(*) Фигуру клещей сихъ, или какъ называютъ, волоча [экстректорисъ] видѣти можно въ ВИЛХІАН. ГИДФАРД. и Казесѣ ивъ Мидвифри, который примѣчати его представляютъ, что онъ это орудіе часто употребляетъ. Другую фигуру представлялъ АЛЕКСАНДРЪ БУТТЕРЪ, лѣкаръ эдимбургской, въ не медицинскъ Эссейс кн. 3
прим.

ОВЫНИМАНІИ МЛАДЕНЦА ИЗЪ УТРОБЫ 933

прим. 20 стр. 320. Присовок. ЭДУНА. ШАПМАН. 5. Эссай онъ не
выпроремешъ офъ Мидифери гл. I. стр. 13.

(**) Объ такомъ силѣ (филлетѣ) пишетъ ШАПМАННЪ на мѣст.
пом. стр. 12.

§. 1427.

Это же въ самой скорости дѣлать должно ,
чтобъ при такой женщинѣ , которой самой собою
умереть надлежало , не показаться , что ее умертвили.
Ибо не надлежитъ касаться руками до такой женщи-
ны , которая чрезъ многие дни будетъ родами мучить-
ся и отъ бессонницы измучится , и изнеможенъ , или
обезсилѣетъ , которая будетъ въ горячкѣ лежать , у
которой жилы обьющіяся надлежащими ударами не
будутъ биться , но движущаяся , и временемъ стоятъ ,
которая къ сну больше надлежащаго будетъ клониться ,
у которой брюхо и чашки дѣпородныя распухнутъ ,
за шѣмъ , что возженіе уже въ нихъ есть .

§. 1428.

Если же рождаемое орудіями вонъ вынимать со-
глашенось будетъ , напередъ всего женщина должна
помочиться , или мочу , ежели что ни будь напураль-
ному мочи испражненію препятствовать будетъ , по
трубочкою серебряною въпроходъ уринной вставленною
вонъ выпустить (1338). Должно же навзничъ женщи-
ну поперстъ кровати , подложивъ подъ нее шюфакъ или
камышъ , такъ положить , чтобъ самой низъ брюха
видѣнъ былъ , и чтобъ женскими бедрами ягодицы
приписнулись. Съ боковъ два сильные человека сѣсть
должны , и держа съ спѣгна и бѣрцы , претѣхъ помощ-
никъ сзади на все шѣло налягаетъ , и не пускаетъ
оному во время выпаскиванія рождаемаго за онымъ
двинуться. Тогда лѣкаръ прилѣжно ногти обрѣзавши
персты полегоньку въ маслѣ смоча , въ срамоту

Л л л л з

опу-

опускаетъ , дабы мертваго раждаемаго состояніе и положеніе ощупать , и найттиъ , гдѣбъ крючокъ всунуть было можно. Но покуда еще сіе не дѣлается , ежели головка близко лежишъ , но велика , надлежишъ шемячко отворишъ и мозгъ вынушъ. Прободается перепонка , у младенцовъ на самой верхушечкѣ на головкѣ бываемая , кошую ошдушиною или шѣмачкомъ (фонпанеллямъ) называющъ , или ножницами , или другимъ орудіемъ , котораго различные образцы есть (*). Послѣ того мозгъ или голыми перстами , или другимъ орудіемъ на подобіе ложки здѣланнымъ вытаскиваютъ. Крайне же опасаться должно , чтобъ шероховатостью или жесткостью костей головныхъ дѣшородныхъ частей женскихъ не повредить. Потомъ крючокъ , со всѣхъ сторонъ гладкой , и острее короткое имѣющій , въ срамоту впускающъ , и , или за глазъ , или за ухо , или за ротъ , или за затылокъ , или и за самую великую черепа головного дыру , скрозъ которую спановая жила проходитъ , задѣваютъ. Прейзрядно же крючкомъ за ухомъ , гдѣ у взрослыхъ отростокъ пишиный бываетъ , задѣвается. Однакожъ спараться надлежишъ , когда крючокъ припятивается , чтобъ острый его конецъ въ успіе матошное или въ женской удѣ не оборвался , изъ чего крайняя опасность къ смерти воспослѣдовать можетъ. На ручкѣ у крючка примѣна имѣется , по которой познавается , къ какой части острее онаго обернуто.

(*) различными къ тому выдуманы орудія ИВРИЦЕМЪ и Преславн. ФРИДИЕМЪ Аргенторатскимъ , и другими , у которыхъ ножиковъ конецъ въ футлярѣ спрятанный , съ боку или винтомъ или другимъ способомъ движется.

§. 1429.

Вложивши такъ крюкъ , правою рукою Лѣкаръ долженъ его полегоньку къ себѣ припятьгивать , лѣвою же , внупръ вложивши , сколько возможно , младенца поправляешь . Но сіе , что во всѣхъ сихъ лѣченіяхъ непремѣннымъ почипается , прилѣжно памятовать должно , когда руку или орудіе въ машку опускать , нѣчто въ ней дѣлать Лѣкаръ долженъ , надобно ему въ то время , какъ машка отъ боли сожмется , дѣйствовать перестать , а какъ машка растворится , и боль утолится , дѣло свое продолжать , и то , что въ намѣреніи положено , дѣлать . Ибо которые , во время болѣзней руку внупръ вкладывать , или младенца поправлять , или какой ни будь членъ согнутый развестъ отваживаются , шѣмъ случиться можетъ , что машка прорвется , и женщина незапною смертію скончается , у которой по смерти младенецъ обыкновенно въ брюхѣ находится (*) Когда же раждаемое крючкомъ будетъ вытащено , прочее дѣлать должно такъ , какъ я выше уже объявилъ (**).

(*) Смотр. у ГИЛДАНА Сто и Прим. 64 Сто 4 Прим. 57. Эфем. Нат. Кур. Сто 3 Прим. 19 стр. 21. и Прим. ГЕЙСТЕРОВО въ Акт. Нат. Кур. Вол. 1 Прим. 186. Стр. 397. и ЕГОЖЕ дисерт. о вырѣзываніи младенца изъ машки машерней и о прорваніи машки , въ Алшд. 1720. года.

(**) Раждаемое иныи особенными орудіями вынимать старались . Машину ФРАНЦИСКЪ МАВРИЦІЙ изобрѣлъ (le tire pesh de МАВРИСО) , искусно гораздо вымыслена , но ею безопасно младенца захватить не возможно . Смотр. у МАВРИЦІА въ пом. м. кн. 2. гл. 32. стр. 367. Ю ПАЛФИНЪ Гандавенской Лѣкаръ , представилъ двѣ полосы , гораздо широкія , закорюченныя , которыми бы младенческую голову съ обѣихъ сторонъ захватывать , и воцъ вытаскивать можно . Смотр. у Пресл. ГЕЙСТЕРА Нат. Хирург. Часъ 2. Разд. 5. гл. 152. стр. 1046. и Таб. 33. Фиг. 16. Слѣ ПАЛФИНОВЫ орудія для того охотно здѣсь представляю , что мнѣ кажется , онѣ поводъ подали къ изобрѣненію оныхъ клещей , о которыхъ выше упомянуто.

млануто. Еще иное изобрѣшеніе имѣется славнаго Мужа въ Повивальничномъ дѣлѣ у гражданъ Аргенторатскихъ Госп. Д. Ю. ІАК. ФРЕДІА, онѣ иное иеФалѣмоу или Тиретете, изобрѣлъ. Смотр. Акта Эрудитъ 1729 года въ Августѣ мѣсяцѣ стр. 347. Таб. 4. фиг. 1. Въ другомъ мѣстѣ (§ 12) сказано, что лѣкаръ многихъ орудій употребляетъ не долженъ, а особливо повиваніе того наибольше учинѣ, кто, гдѣ дѣло дѣлать руками можетъ, тому конечно орудія ненадобны.

§. 1430.

Ежели раждаемое мертвое поперегъ лежитъ, то лѣчащаго намѣреніе быть должно, чтобъ ножки сыскавши и вмѣсто сведши, оное вонѣ выпацишь. Случитсяжъ можетъ, что припацивши такъ младенца, опорванная головка въ мапкѣ оспанется. Оную потчасъ вонѣ вынуть должно, или перстомъ въ ротъ всунутымъ, или клещами, или оными теперь описанными орудіями, изъ которыхъ клещи и то орудіе, которое славн. Д. ФРЕДІЙ употреблялъ, другихъ орудій способѣе кажутся. ПЕТРЪ АМАНДЪ, лѣкаръ ФРАНЦУССКОЙ, выдумалъ съточку, которою головку, такъ опорваную выпаскивать узаконилъ (*).

(*) См. де нувелль обсервацийъ сюръ ла Прашкѣ дѣс Аккушеманѣ. Прим. 73. стр. 235.

§. 1431.

Сколько же разъ раждаемое мертвое поперегъ, а его рука или иная часть въ близи будеть, и въ устьѣ матошное высунется, младенцажъ выправить, и на ножки оборотить не возможно, что иногда обыкновенно случается, для того, что устьѣ матошное раздуто и вождено бываетъ, руки внутрь всунуть не возможно, и что самое раждаемое, и его часть, въ близи находящаяся распухла, и согнуться не можетъ. тогда

тогда сіи затрудненія до того доводятъ , ежели младенца цѣлой не выхотитъ , то разрѣзаннаго вонъ вынуть должно. Разрѣзываетсяжъ младенецъ инымъ крючкомъ , который на внутреннемъ боку во все острее выпачивается. Симвъ крючкомъ , или чпюмнѣ гораздо безопаснѣе кажется , ножикомъ закорюченымъ серповиднымъ , у котораго на кончикѣ шарикъ имѣется , перерѣзываются мяса торчащей руки близъ состава съ лопаткою и плечико въ кругъ поворачивая больше , а не тащучи , изъ нѣдра своего извлекается. Тогда уже лѣкарю спараться должно руку вложить , и ноги искать. Ежели же и тогда рука въ устье матошное не пролѣзетъ , то пѣльцо онымъ крючкомъ колоть должно , испустивши изъ него мокроту и вынувши внутренности тогда здѣлать , и пакъ , или рукою , или другимъ крючкомъ , а припомъ два конца имѣющимъ выпачитъ вонъ должно (*). Великое спараніе прикладывать надобно , чтобъ крючокъ , на гнилое пѣльцо накинупый , не свалился , въ чемъ сколько бѣдствія бываетъ , о томъ выше показано. Смыло къ такому страшилищному лѣченію способу спѣшитъ не надобно , безъ котораго обойтись часто бываетъ возможно , ежели лѣкарь благовременно призванъ будетъ , и ежели онъ въ дѣлахъ своихъ искусенъ , рождаемое не прямо сложеное на ноги поправитъ и ношками его выпачитъ можетъ.

(*) Еще другимъ манеромъ здѣланное орудіе или ножикъ съ колечкомъ , на перстѣ указательный надѣваемымъ нарисъванный , посмотрѣи инъ ше Медикаль Исачъ Вол. 5 Цимѣч. 39 стр. 445.

§. 1432.

Но сверхъ того это не о мертвыхъ младенцахъ только , но и о живыхъ , разумѣться можетъ. Ра-

М м м м

ждаемое

ждаемое же, хотя еще въ плевахъ своихъ заключено будеть, лише бы устье машошное отворено было, можно узнать, что оно поперегъ лежитъ, ежели переймы будутъ сильно брать, и оная перепонка не шаромъ, какъ опъ головки бываетъ, перспомъ ощущается, но почти ровна и зыбка или дрябла. А по прорваніи сихъ плевъ, состояніе младенца перспомъ чувствовать можетъ Лѣкаръ, котораго младенца большіе пальцы доказательствомъ бываютъ, котораго бока рука или нога въ близости будетъ. А роды, которыя такъ сложены бываютъ, ежели не будутъ повернуты, рождаются не могутъ, а то самое, какъ изъ доселѣ предложенныхъ разумѣть можно, въ самомъ началѣ дѣлать должно, въ которое время женщина еще не весьма болью ошягощена бываетъ. Чего ради, ежели изъ состоянія перепонокъ почувствуемъ Лѣкаръ, что рожаемое не прямо лежитъ, то надобно безъ замедленія оныя перспомъ проколотъ, и разорвать, а младенца поправить и вонъ выпащитъ. Младенецъ поправляется, ежели Лѣкаръ, какъ я выше объявилъ, помазавши масломъ руку въ машку всунетъ, а то дѣлать надобно, какъ боль утешается, а при-тѣхъ обстоятельствевахъ, какъ уже объявлено, трогать не надлежитъ. Когда вся рука въ шакѣ случаи подвигаяся внутри очутится, долженъ Лѣкаръ, перспами ноги извискать, и ухватя за нихъ младенца вонъ выпащитъ. Понеже такимъ порядкомъ не трудно выпаскивается, лише бы онъ до жопки выпянувшись былъ, пупъ тотчасъ накрывши сперва тепленькою холстинкою, обѣими руками возьмется, и шакъ повернется, чтобъ его личико къ мѣсту межпроходному женскому обернулось. Плеча ежели тому пре-

препятствуютъ , то ихъ перстами припнуть можно. Ежели обѣихъ ногъ найти не возможно , припнуть одну , которая ближе , за которою другая послѣдуетъ. Того ради всѣ ношками къ устью оборачиваются , и живые выпаскиваются , у которыхъ шѣйка , лице , уши , грудь , спинка , брюшко , близко будуще не меньше , и пѣ , которые ношками оборотятся , по обычаю Агрипповъ , низходяще , которыхъ оборачивать не надлежитъ. Также ежели руку въ матку вложить и ноги найти можно , не надлежитъ удъ вблизи находящійся , и который уже въ устьѣ матошномъ спойтъ , выправлять , понеже оный припнутымъ ногамъ добровольно воспослѣдуетъ.

§. 1433

Не рѣдко младенцы оборотятся къ маткѣ ягодицами рождаются. Сіе ежели благовременно усмотритъ Лѣкарь , то ему должно жопку нѣсколько назадъ опехнуть , и такимъ способомъ пѣло прямое здѣлать , послѣ того ноги сыскать , и за нихъ ухватя младенца вонъ вытащить. Но гдѣ ягодицы назадъ свободно вправить невозможно , то Лѣкарь обѣихъ рукъ указательные персты въ пахи младенцу поставитъ , и такъ его въ двое идущаго вытащить можетъ , къ чему обширность или величина частей дѣтородныхъ много пособствуетъ.

§. 1434.

Случается иногда , что пупокъ , когда младенецъ еще въ маткѣ бываетъ , наружу выходитъ , и виситъ , которое приключеніе крайнюю и смертельную бѣду младенцу принести можетъ. Прежде всего взять за пупокъ , и пробовать , бѣются въ немъ

М м м м 2

жилы

жилы бѣющіяся , изъ чего разумѣтся , что младенецъ еще не умеръ. Понеже такому младенцу поспѣе пособствовать должно , и его сыскавши нѣго скоро выпаскивать вонъ надлежитъ. Ибо , ежели матерьними и нечастыми переймами вонъ выходитъ , давливаясь пупокъ , останавливается въ жилахъ бѣющихся и въ жилъ крововозвращательной его кровь , и младенецъ , будто бы удушенный , не вышедши на свѣтъ , живота лишается.

§. 1435.

Также знать надобно , что затрудненія , какими беременныя обременены бывають , не всегда отъ младенца худо сложенного дѣлаются , но и отъ матки , ежели она инако лежитъ , а не такъ , какъ надобно , по естеству лежать , и наискось наклоняся. Иногда , а особливо у женщинъ тучныхъ , у которыхъ брюхо и самая матка съ своими связками отъ частыхъ родовъ уже разслабла , она на кости гребенныя напередъ высунувся будетъ висѣть. Сие ежели случится , то младенецъ такъ опрокидывается , что головою своею о кость крестцовую женскую обопрется. Отъ чего слѣдуетъ , что у нее и устье матошное къ кости копчиковой повернется. Чего ради устье матошное трудно бываетъ перстомъ ощупывать , понеже верхній край только чувствуется. Сие все при первыхъ переймахъ очень хорошо узнать можно , и тогда надобно , женщину не на спулѣ , но на кровати , навзничъ , а припомъ ягодицы приподнявъ положить. Лѣкарю надлежитъ одною рукою женщины такъ лежащей брюхо помаленьку , и крайнюю употребляя умѣренность , подавливать другою рукою перстомъ , а припомъ въ самые переймы , сколько

ко

ко возможно, въ устье мапошное вложивши, шбйку ея помаленьку приподнимать, чпобъ матка прямбе здблалась. Нбчто пособствовать можетъ у молодыхъ, ежели кость копчикову нбсколько въ низъ придавишь.

§. 1436.

Порокъ сему прошивной есть, ежели мапошное дно гораздо запрокинется, и къ хребту женскому будшо бы привязано будетъ. И въ семъ случаѣ устье мапошное не на своемъ мбстѣ, и повивальница перстомъ оцупаетъ, чшо подъ костями гребенными близъ протока уриннаго кроется. Младенецъ же, впрощемъ хотя хорошо и прямо сложенъ будетъ, когда захочетъ выходить, маткою наискось лежащею сжимающеюся къ костямъ гребеннымъ опускается, о которыя головою упершись вонъ выптнть не можетъ. Къ такому случаю кажется нбчто пособствовать можетъ, ежели у женщины лоно будетъ тбсно, и ежели она во время беременности часто навзничъ лежать будетъ. Напрасные же бываютъ всѣ женскіе труды и жилбня, ежели напередъ и матка, и самъ младенецъ не будетъ хорошо сложенъ. Въ семъ случаѣ, не принимаяся лбкаръ ничего дблать, долженъ приказатъ женщинѣ помочиться, послѣ того онъ перспомъ обмоча въ масло, подъ костями гребенными, устье мапошное, всунутымъ перстомъ, какъ возможно разширивать, а припомъ во время переймовъ оное помаленьку назадъ, и къ мбсту междупроходному, подавливать, а другую руку на брюхо повыше костей гребенныхъ наложитъ, и употребляючи крайнюю скромность, нбсколько поприпискивать долженъ. Между шбмъ ко-

М м м м з

гда

гда перстѣ въ устьѣ матошное вложить можно , голову , въ кости гребенныя упершюся , также свобода и назадъ отводить надобно . А что около сего полегоньку и нѣжно обходиться должно , оное всякъ знаетъ . Въ такомъ времени хорошо не навзничъ лежать , но прямо и голову напередъ больше наклоня , и на колѣнкахъ стоять . Гдѣ какъ матка , такъ младенецъ прямо сложены будучи , то женщина къ переймамъ должна прибавлять свой напуги , отъ которыхъ младенецъ взволнуется . Однакожъ ежели руку въ матку вложить можно , то и тутъ кажется лучше , младенца ухватя за нѣги вытащить .

§. 437.

Также матка на бокъ наклоняется , а то иногда у маленькихъ женщинъ бываетъ , у которыхъ матка будучи велика , не можетъ въ лоно вмѣстаться , по сверхъ его поднимается , и такъ въ бокъ легко свисывается . Гораздо часто это бываетъ ; ежели кишки въ правомъ боку слѣпая , въ боку лѣвомъ ободочная , копорая тамъ бываетъ вдвое скорченная , вѣтрами или каломъ наполненная въ близи лежащую матку давятъ , и въ противную сторону подвигаютъ . Много и по причиняетъ , ежели женщина во время беременности на одномъ боку лежать пріобыкнетъ . Сей порокъ познавается , ежели брюхо не ровно будетъ , но на одномъ боку больше , а на другомъ меньше выпучится . Устьѣ матошное въ противной сторонѣ , по большей части подъ костью сѣдалищною , или и подъ другою костью гребенною прячется , который порокъ случается , ежели матка такъ искосится , что дно ея не только на одинъ бокъ , но и на заднюю сторону склонится . Ежели же матка въ бокъ напри-

примѣръ правой склонился, устье матошное, какъ выше объявилъ, будетъ лежать на кишкѣ задне-проходной, и находится въ лѣвомъ боку. Въ сихъ также случаяхъ прямо поставивъ женщину должно, и устье матошное, сколько возможно будетъ, править. Часто напередъ всего неослѣнно надобно бываетъ клистеръ слабительный ставить, ежели передъ родами мало на низъ и рѣдко будетъ. А больше да и очень хорошо шуй поступать, ежели устье внутреннее отворено, сыскавши и захвативши ношкі младенца вонъ выпустить. Ибо во всѣхъ сихъ случаяхъ первые часы къ лѣченію весьма благополучны, а упустя оныя, и женщина и младенецъ умирающъ, какъ то часто самимъ дѣломъ видано.

§. 1438.

Ни въ чемъ опмѣннаго лѣченія не требуетъ и крови печеніе, уливъ называемое, которое иногда случается, покуда еще младенецъ не родился. Ибо о томъ, которое къ выкидыванію младенца опасность дѣлаетъ, здѣсь рѣчи не будетъ. Ежели крови не много течетъ, велѣтъ въ покоѣ себя содержать, а припомъ другія употребляя надлежитъ вспомошествованія, которыя индѣ (417, 418) я подробно изъяснилъ. Ежели же спремленіемъ кровь течетъ, разумѣется, что отъ мѣста или послѣда, нѣкопоя часть отъ матки оторвалась, то изъ устьицевъ разтворенныхъ сосудовъ ея кровь течетъ. Сіе самое утверждается, ежели очевидная причина будетъ, на примѣръ по маткѣ снаружи ударено будетъ, отъ паденія, плясання, или отъ иного шѣлеснаго труда, или отъ испужанія содрогнется. Иногда также младенецъ вупкомъ своимъ опущанъ, и будпо пешлею

за-

задавленъ бываетъ, котораго, какъ онъ вонъ ищитъ, прѣготовляется, тащитъ, и послѣдъ отъ матки отдираетъ. Находятся также женщины, у которыхъ послѣдъ, и то, что мѣспюмъ называемъ, въ самомъ устьѣ оспанавливаются, которые, когда во время переймовъ устьѣ оное разширивается, нарочно разходятся, чпо изъ пространныхъ жилъ бѣющихъ устьищевъ, а когда еще онъ перервутся, то кровь бѣдственно льется. Одно пособіе отъ сего крови печенія имѣется, младенца потчасъ и съ посѣщеніемъ, а при томъ нѣсколь-ко силы прибавивъ, выпащитъ. Перстъ въ масло обмоча въ устьѣ матошное вложитъ должно, хопя оное не множо разинулось, какъ одинъ въ устьѣ останеся, то другой перстъ всунуть должно, и такимъ способомъ всѣ прочіе. Когда же такъ перстами отворяется устьѣ матошное, то боль поднимается, отъ которыхъ младенцевъ вонъ исходитъ. Вложивши внутрь руку, ежели почувствуется послѣдъ или перепонки, то ихъ перстами попроколотъ, и прорвать покровы, и младенца съскавъ нѣги безъ замедлѣнія вонъ выпащитъ должно. Однакожъ я видѣлъ недавнаго писателя, который другою дорогою въ лѣченіи поступилъ; велитъ возбуждая переймы, натуральное рожденіе поскорѣ дѣлать. Боль возбуждаетъ, всунувши въ устьѣ матошное перстъ, оное помаленьку разшириваетъ. Представляетъ же, что разбередивши такъ мзнку, чтобъ она скорчивалась, устья сосудовъ кровь точащихъ зжимающа и кровь удерживается, и самый младенецъ вонъ изгоняется. Ради того, чтобъ matka лучше могла узка дѣлаться, разширивши матошное устьѣ, прорывать надобно покровы, чтобъ воды вытекли. А то самое опытами

дока-

доказываетъ , что такимъ способомъ съ меньшимъ бѣдствіемъ женщины , а припомъ , которыя уже почти кровью изошли , младенцовъ могли родить , и все теченіе оспунавлялось (*). Надобно напослѣдокъ изслѣдовать , который способъ лѣченія бѣднымъ женщинамъ болѣшую безопасность причинять можетъ.

(*) Смотри Комент. о кровотеченіи матошномъ беременныхъ въ Акад. Хирург. вол. 1 стр. 358 издан. въ 4.

§. 1439.

Тяжелъ и бѣдственъ или сожалѣтеленъ случай есть , ежели натуральными дорогами младенцъ выпыти не можетъ , а то отъ различныхъ причинъ случается. Иногда удовъ срамотныхъ и костей сложеніе и фигура , а припомъ превеликая узкость , тому препятствуютъ (*). Иногда устья естественныя между собою отъ рожденія запертыя бывають , иногда же , будучи болячками осыпаны , чрезъ худое лѣченіе при залѣченіи срастаются. Какимъ образомъ ихъ разрѣзавши и нарочно разведши лѣчить надобно бываетъ , вскорѣ , гдѣ о Аптретахъ говорено будетъ , (1443) предложу. Ежели младенцъ отъ мокроты раздуется , что временемъ бываетъ , и ежели лѣкарь подлинно извѣстенъ , что онъ умеръ , то ему должно перстомъ указательнымъ пѣло исколотъ , чпобъ руками или крюкомъ можно было вытащить , когда мокрота изъ него выщедится. Ибо мало надежды бываетъ , чпобъ родильница оспалась жива , ежели ножикомъ устье матошное прорѣжется , и разширится , а то я начиналъ , чпо знатный Профессоръ зѣлать осмѣлился (**). Ежели въ естествѣ будетъ крайняя пѣснопа , а къ оному прикладываемыя припарки и другія вещи , которыя къ размягченію много

Н н н н

пособ-

пособствуяиѣ , вообще употреблены будутѣ , оспается еще пособіе , которое хотя не подлинно извѣстное и гораздо отважное есть , однако здѣлать надлежитѣ , понеже одно оспалось. Дѣйствіе сіе разрѣзомъ Кесарскимъ (секціо-Цезареа) называютѣ ; въ которомъ дѣйсвиіи , прорѣзавши у роженицы брюхо и машку , раждаемое вонѣ вынимается. Никогда въ небреженіи сего имѣтъ не надлежитѣ , но тотчасъ и неопуская времени дѣлать должно , ежели роженица , покуда еще младенца не родитѣ , да умретѣ , и пожелается или отпѣдать , или совершенно младенцу жизнь даровать (**). Однакожъ великую мудрость къ тому употребитѣ должно , чтобъ женщины не рѣзали , которая кровью истекла , въ силѣ ослабѣла , или жестокостію болѣзни , нестерпимою болью мучилася , обмороками испавается , и будто бездушна лежитѣ , еще жива будучи , никакой не употребивъ умѣренности (†). Но уже чрезъ многіе опыты открылось , и такъ утверждено , что никакого сумнѣнія не осталось , что не рѣдко благополучно оканчивался сей способъ лѣченія , когда оной и надъ живыми женщинами дѣланъ , и изъ ихъ разрѣзанной машки раждаемое или живое или мертвое вынимано. (††). Сверхъ всего сказываюиѣ , что были и такія женщины , надъ которыми сіе сумнительное и бѣдственное лѣченіе дважды , и по нѣскольку разъ , дѣйсвуемо было (†††).

(*) Смотри случай въ Комментар. Акад. Хирург. стр. 646.

(**) БОМА СИМСОНІЙ , знатный Профессоръ Шкотской , смотри те Медикал. Эссейсъ Вол. 3 Прим. 19 стр. 315. устье маточное мозолистое разрѣзалъ женщинѣ , которая попростествіи двадцати четырехъ часовъ умерла , хотя изъ пѣхъ разрѣзовъ ни какого кровотеченія не восносѣдовало.

(***)

О ВЫНИМАНІИ МЛАДЕНЦА ИЗЪ УТРОБЫ. 947

(***) Смотри ГЕЙСЕРОВУ диссертацию выше при § 143омъ * представленную.

(†) Сенатъ Венеціанской узаконилъ, по которому берется надобно, чтобъ женщинъ беременностію умершихъ, у которыхъ рождаемое еще живое надобно вынимать, крестъ на крестъ не рѣзать, но просто, какъ иногда Лѣкари дѣлаютъ, которые у живыхъ матерей такую операцію обыкновенно дѣлаютъ. Сего меня научилъ Преславн. ВИНЗЛОВЪ въ Вопрос. медик. Хирург. Толи безрѣшнѣ и безвиннѣ, что для сохраненія матери младенца изъ утробы крючкомъ повивальничимъ выпаскивать, или то, что для сохраненія съ матерью младенца брюхо и матку разрѣзывать? въ Люпедѣи 1744 года.

(††) Что до рѣзанія Кесарскаго [адъ секціономъ Цезареамъ] принадлежитъ, почти все собралъ Лѣкарь французской СИМОНІЙ въ Коммент. Акад. Хирург. Вол. 1 стр. 623. Уже древніе отъ прорѣзаной матки ЦЕЗОНЕСЪ т. е. вырѣзанными называны. Смотри у ПЛИНІЯ Истор. Натур. Кн. 7 глав. 9 Т. 1 издан. ГАРДВИНОВА, стр. 378, или Цезаресъ, смотри у негожъ на пом. м. Однакожъ о началѣ сего именоваія гораздо споритъ ЭЛІЙ СПАРТІАНЪ въ житіи эліа Вера. въ Истор. Августе Скриптор. Т. 1 стр. 224. Присов. тутъ СЕКСТА ПОМПЕЯ ФЕСТА о Знамен. Словъ Кн. 3 стр. 61. Онъ объявляетъ, что Цезаресъ отъ Латинскаго слова [цезаріесъ длинные и хорошіе волосы] названы. Между недавними первый въ эту дорогу лѣченія вступилъ, кажется, *ὁ ἑρξότομος* Гельветиниъ, онъ около 1500 году собственную свою жену излѣчилъ такъ щастливо, что она послѣ того двойни, и еще четырехъ младенцевъ родила. Смотри у БАУГИНА въ прибавленіи къ РОССЕТУ стр. 162. Это же самое дѣйствіе послѣ того особеннымъ трудомъ изъяснилъ, и въ лѣченіи упражняющимся выхвадилъ ФРАНЦИСКЪ РОССЕТЪ въ Третъ нуво де л' истеротоматоки у Енфантсманъ цезаріанъ, а Пари, 1581 года, которую книжечку теперь Славный КАСПАРЪ БАВГІНЪ на Латинской языкъ перевелъ, и къ ней другія примѣчанія присовокупилъ. На Латинскомъ языкъ оную издалъ, и много пополнилъ самъ РОССЕТЪ въ 1590 году, у которой надпись: *Усеротомотоміас*, т. е. Цезарей партусъ Ассерціо истеріоогика. (Кесарскаго рожденія изъясненіе съ историческимъ объявленіемъ) и въ томъ же году Стихи написалъ, у которыхъ надпись: Діалогусъ Апологетикусъ про Цезарео парту инъ малеволі куюдсамъ Псеудопропей диктеріа. т. е. разговоръ защищающій Кесарское рожденіе, прѣтивъ недорожелателя нѣкотораго ложнаго защитника злорѣчій. Пожеже многихъ имѣлъ противниковъ, о которыхъ посмотри теперь упомянутое поминовеніе. ПАРЕЙ будучи въ то время очень знаменъ, объ эпюмъ способъ лѣченія и объ успѣхъ его сумнѣ-

И н и н з

вался,

вался, въ кн. 23 гл. 31 стр. 702. Различныя въ тѣхъ Комментаріяхъ сего лѣченія благополучно учиненнаго имѣются повѣсти, по части изъ Авторовъ выписанныя, а о тѣхъ части которыя не очень давно въ Лютеціи неуспыннымъ стараніемъ многихъ лѣкарей примѣнены были, къ которымъ придадимъ примѣчанія въ Те Медикаль Ессаіхъ Вол. 5. Р. I. Примѣч. 37 стр. 439 и 38, стр. 444. Но симъ дѣйствіемъ не только раждаемое въ маткѣ лежащее выпаскивается, но также у другихъ, у которыхъ къ трубѣ Фаллопиевой, или къ другой внутренности прирастаютъ, въ матки, въ одномъ только брюхѣ заключенные, иногда чрезъ многіе годы носятъ. Такое раждаемое было, другія примѣчанія уже оставимъ, въ Муссипонтанѣ отъ ЛАВРЕНТІЯ СТРАУССІА особливимъ стараніемъ описанное въ разрѣшеніи случая: Муссипонтанскаго [инъ резолюціоне Казусѣ Муссипонтани] въ Дармштадтѣ. 1662 года. Совокупити тутже ОМУ БАРТОЛИНА о Необыкновенныхъ младенца раждаемаго проходахъ [де инсолиписѣ партусѣ війсѣ] гл. II. стр. 74. Также и того младенца употребнаго отъ РУДОЛФА ЯКОВА КАМЕРАРІА описаннаго и нарисованнаго въ Диссерт. о Младенцѣ употребномъ 46 лѣтъ въ Тубингѣ 1720 года. Другіе многіе случаи въ сей Диссертациі присовокупляются. Иногда такія раждаемыя, въ брюхѣ старѣющіяся, дорогу себѣ, сквозь перепонку брюшинную и сквозь мышки чревные, произведши великой гной, отворяютъ. См. у БАРТОЛИНА въ пом. м. гл. 5. изъ РОССЕТА и изъ другихъ Авторовъ. Присовокупитися должна Історія дѣвѣ Фетостратипо филицименте Інсторію далле партия деретане скрипта да ГЮВАНЪ ДОМЕНИКО САНТОРИНИ, инъ Венеціа. 1727 года 9: 30. Гдѣ также многіе примѣры отъ Авторовъ предложенные имѣются. Кости поврежденныхъ младенцевъ заднимъ проходомъ выпаскивались были ЛИТТРИЕМЪ Академикомъ Французскимъ. Смотр. Комм. Акад. Наукъ Корол. 1702 года стр. 313, и изъ другой женщины, въ присутствіи Преса. САНТОРИНА лѣкарь НИКОЛАЙ ПУТАНА, тотже случай, о которомъ САНТОРИНЪ въшеперь у помянутомъ трактатѣ пишетъ, въ книжечкѣ нѣкоторой описалъ, которая издана въ Венеціи 1727 года. У другой еще женщины одинъ младенецъ въ болячку на пупкѣ выпущенъ былъ, а другаго младенца косточки проходомъ выкакала. Смотр. те Медикаль Ессаіхъ пом. м. Прим. 38. стр. 441. Раждаемое же такое, прорѣзавши брюхо, вынулъ АВРААМЪ КИПРИАНЪ Профессоръ Франкверанскій, которой издалъ о семъ случаѣ письмо въ Лейденѣ 1700 года. Женщина вытерпѣвши такую операцию и вылѣчившись, опять сына, а послѣ того двойни родила, пом. м. стр. 14. Совокупити тутъ о рѣзаніи Кесарскомъ, кромѣ РОССЕТА, Третѣ де л'Операционѣ Сезаріанѣ парѣ ЖАНЪ РЮЛО, а Пари 1704 года. и

Воор-

О ВЫНИМАНІИ МЛАДЕНЦА ИЗЪ УТРОБЫ 949

Вооршеллингъ ванъ де Ноодъ заакеликсидъ деръ Кеизерлике Снео доор. ДИОНИСИУСЪ ВАНЪ ДЕРЪ СТЕРРЕНЪ, томъ Лейденъ, 1682 года.

(††) Смотр. Комм. Академ. Хирург. дом. м. стр. 637.

§. 1440.

Но ежели сверхъ чаянія, гдѣ другимъ способомъ пособить не будетъ въ состояніи, а захочется ему отъбѣдать здѣлать такую операцію, то надлежитъ женщинамъ навзничъ лежать, да такъ, чтобъ томъ бокъ, который рѣзать хотятъ, наверху былъ. рѣжется подлѣ бѣлой спези, длинно въ длину, отъ пупа почти до костей наддѣтородоудныхъ, прорѣзывая мышцы чревные и плеву брюшинную, однакожъ смотрѣть надобно, чтобъ не повредить жилы бьющияся верхобрюшной [эпигастрика]. Здѣлавши этомъ разрѣзъ, матка окажется, которую въ другой разъ, и больше къ шѣкѣ, нежели ко дну, разрѣзать, понеже ко дну мѣсто или плевъ матошныя прирастаютъ, которыя повредить бѣдственное есть дѣло. Ежели изъ жилъ бьющихся кровь будетъ течь, надобно позавязать. Вынимаются въ разрѣзѣ и младенцы, мѣсто и плевъ, которое все отъ матки отдѣлится надобно. Сіе все здѣлавши, рану по большей части сшиваніемъ заворачиваютъ, и прикладываютъ лѣкарства, гниль отворачивающія. На послѣдокъ на рану спрунъ наводится, то на нее суконку наложитъ, или нѣчто иное привязать надлежитъ, чѣмъ бы она припискивалась. Понеже послѣ такой операціи кила дѣлается (*).

(*) Смотри: МИХАИЛА ДЕРИНГІЯ эпистолу къ ГВИЛІЕЛЬМУ ФАБРИЦІЮ, ГИЛДАНУ о килѣ матошной, въ Виттеб. 1612 года. Находится также въ ГИЛДАНОВЫХЪ Оперсахъ стр. 893.

Н Н Н Н 3.

§. 1441

§. 1441.

Срамотной удѣ женской , послѣ трудныхъ родовъ крайне напрученъ будучи , часто распухаетъ , къ которому прикладывать должно припарки жидкія теплыя водяныя или молошныя съ правами смягчительными вареныя. Ежели мѣсто междупроходное будетъ порвано , рану обмыть должно виномъ теплымъ , и женщина прощянувши и вжавши нѣги мѣсто лежать должна , а чпобѣ онѣ не раздвигались , когда , спать будетъ , можно ихъ связать. Есть нѣкоторые люди , которые рану въ мѣстѣ междупроходномъ сшивать велѣтъ (*).

(*) Смощи въ Записк. Нап. Кур. Сочн. 7. Прим. 44. стр. 90.

БЕЗПРОХОДНЫЯ.

"А Т Р Н Т О I.

§. 1442.

Атρητοι (), Атрета [безпроходныя] называются женщины , у которыхъ естество бываетъ заключено , что соинія имѣть не могутъ. Тутъ или перепонка противъ срамоты лежать будетъ , или бока срамотные одинъ съ другимъ сроснутся , а то бываетъ или отъ рожденія матерня , или приключается , когда болячки въ этихъ мѣстахъ подѣлаются , то оныя край и плены чрезъ худое лѣченіе заживаючи срастаются. Ежели у двушекъ сіе случается , которыми на плашѣ носить время приходитъ , кровь въ сіи мѣста спекается , а выпиты ей нѣкуды , то у нихъ жилъ чувствительныхъ напряженіе бываетъ , горячкою съ возженіемъ , и другими прешажкими

и

и смертельными различными болѣзнями мучатся. Ежели перепонка будепѣ препящствовать, оную безѣ труда разрѣзать можно, ежели же мясомѣ срамота зарастепѣ, и то ежели во чревѣ матернемѣ случится, такое злоключеніе часто никакимѣ способомѣ неизлѣчивается. Неменьшее же запрудненіе и то въ себѣ имѣепѣ, ежели плевы послѣ болячекѣ заживаючи, вмѣсто сошедшихъ, сросшутся.

(*) "Ατρητοι κατὰ τὰ γυναικία μόρια ПАВЕЛЬ кн. 6 гл. 81 стр. 92 издан. Алдова.

§. 1443.

Женщина навзничъ, такимѣ подобіемѣ, какѣ въ родахѣ прудныхѣ ее кладутѣ, на кровати такѣ кладется, чѣтобѣ срамота совсѣмѣ оказалась. Ежели плева шутѣ сыщепся, то ножикомѣ ее прорѣжутѣ, и выпускаютѣ то, что шутѣ будепѣ, кровь, или другія мокроты. Ежели же спрупомѣ край одинѣ съ другимѣ сросшутся, легоньку ихѣ разрѣзать, и на-розно раздѣлить должно, прилѣжно спараяся, чѣтобѣ прохода уриннаго не повредить. Чего ради ошворивши срамоту, вложить надобно кношѣ великой и толстой какимѣ ни будь лѣкарствомѣ для удержанія крови или для заживленія способнымѣ посыпавши, или помочивши. Нѣкоторые кѣ тому употребляютѣ трубку толстенькую, изѣ слоновой кости здѣланную, частыми и великими дирками испроверченую, чѣтобѣ вытекать могла вся мокрота. Кноша или трубки до тѣхѣ порѣ вынимать не надобно, покуда не залѣчипся все, и спрупѣ ненаведешся.

МАТ-

МАТКИНО ВЫПАДЕНІЕ.

УТЕРИ ПРОЦИДЕНЦІА.

§. 1444.

Случается иногда , что самая матка и оная срампны часть , которую ложеснами называють , выпадаетъ (*). Матка послѣ родовъ , когда бываетъ успіе опворено , иногда вывернувшись выпадаетъ , а наибольше , ежели крѣпко посадь будеть держаться , а за пуповину сильно будеть тянуть , или , ежели повивальница рукою не мѣсто , да матку захватитъ и вснѣ шацинѣ. Рѣдко матка опѣ боли послѣ родовъ обыкновенно сильно женщину мучащей , вонѣ выпрокидывается. Сей родъ злоключенія узнавается по самому опухоли состоянію , ежели оная кругловапа будеть висѣть (**). Въ лѣченіи сего злоключенія медлить не надлежитъ , но потчасъ рукою матку спрятать должно. Женщина покойно себя содержать , и такъ лежать должна , чтобъ нѣги протянуты , вмѣсто жаты , и обвязкою обвязаны были. Гдѣ выпадшая матка не бываетъ потчасъ вправлена , а будеть сжимающимся внутреннимъ устьемъ давиться , то женщины часто скоро и незапною смертию умирають , и великое воженіе и Антоновъ огонь у нихъ дѣлается.

(*) Великой нѣкогда споръ былъ , можетъ ли самая матка вонѣ выходить. Смотр. Дав. Ваиъ деръ Бекке о выпаденіи матки.

(**) См. тр. примѣч. и фигуру въ рувишевыхъ прим. Анаст. Жирург. прим. 10 стр. 16 фиг. 12.

§. 1445.

Но вся матка съ устьемъ внутреннимъ вонѣ выходитъ , и изъ естественныхъ частей выпадаетъ , ежели

сжели его такъ называемыя связки , которыми матка на своемъ мѣстѣ держится , съ другими частями расслабнутъ (*) , или , сжели самая матка , на подобіе скирра , окрѣпляя будущъ , распухнетъ , и такъ будучи тяжела , вонъ выпадетъ (**). И это злоключеніе не всегда отвратить можно , понеже гдѣ оно застарѣетъ , тутъ мало надежды остается , и гдѣ въ маткѣ скирръ , или открытый ракъ [карцинома] , всѣ сіи чрезъ лѣченіе хуже становятся. Ежели связки расслабнутъ , онымъ въ скорости пособить можно. Должно женщину навзничъ положить , и по , что выпало , полегоньку рукою вправить и спрятать. Употребить тутъ можно жидкія припарки и курева изъ вещей подавляющихъ. Но сіи лѣкарства могутъ вредить , сжели ими сильно удержана будущъ матерія ; чего ради употреблять гораздо лучше пестрики , которые въ естество всунутые будучи , не допускаютъ опять маткѣ вонъ выпасть. Дѣлаются же они изъ корки пробошной , и воскомъ обващиваются. А чтобъ крови плотной или мѣсячной , и другимъ мокротамъ въ срамоту спекающимся выходъ былъ , должно толкачикамъ быть испроверченымъ , а припомъ , чтобъ они были такъ велики , какъ могутъ въ естество вмѣститься (***). Сверхъ всего того , что представлено , спокойство тутъ пребудетъ , и чтобъ женщина навзничъ лежала. Иногда дѣлается , сжели злоключеніе будетъ свѣжее , и женщина молодая , по вспарываніи на время сихъ пестиковъ , матка на мѣсто свое приходитъ , и тамъ остается. А другимъ запычки шакія во всю свою жизнь неопмѣнно надобны бывають.

(*) Смотр. РУВИШЕВО на пом. ж. примѣч. 9 фиг. 11.

(**) Пом. ж. прим. 7 фиг. 8 и Г. ВАНЪ САНДЕНЪ диссерт. о выпаденіи матки въ регіомонт. 1712 года.

О О О О

(...)

(***) пѣсти ки нарисованныя видѣтъ можно въ ГЕЙСТЕРОВЫХЪ
васпагл. таб. 34. Другой способъ или образецъ описывается отъ
БОМЫ СИМСОНА въ ще Медикаль эссайсѣ Вол. 3 Прим. 18 стр. 311.

§. 1446.

Чаще же всѣхъ сихъ пороковъ случается шомъ
порокъ , что срамотная , или такъ называемыхъ
ложеснѣ , оболочка разслаби вонъ выходитъ , копо-
раго случая различные способы также и различныя
фигуры бывающѣ. Иногда край со всѣмъ кругомъ
ослабѣвши вонъ выпасть ей дають , и она на подобіе
баланы изъ срамоты виситъ. Иногда на одномъ
боку то , что разслабленѣ , безцѣрно вздувается , ко-
порая опухоль подлинное и превеликое дикое мясо бу-
детъ значить. А то , что вонъ выпадетъ , не рѣдко
вожженіе получаетъ , а иногда оное бередица и же-
спочеетъ , понеже платьемъ претца. Злоключеніе по
большой части происходитъ отъ того , ежели отъ
частыхъ и трудныхъ родовъ , или отъ преизлишняго
мокроу печенія , также отъ прикладыванія снару-
жи вещей мягчишельныхъ , плены разслабѣющѣ.

§. 1447.

Злу такому , ежели оно свѣжее будетъ , пособ-
ствовать можетъ лѣкаръ , ежели онъ то , что вонъ
выпало , спрячетъ , и припарки жидкія и куренія , силу
подавляющую въ себѣ имѣющія , будетъ употреблять.
Надобно же женщину въ покоѣ содержать , и вслѣтъ
сжавши нѣги и пропянувши навзничъ ей лежать. Что
же выше о лѣкарствахъ , плотяное удерживающихъ ,
сказано , и здѣсь крайне памятовать надлежитъ , чего
ради очень хорошо въ то время , когда хотятъ кро-

ВИ

ви быть, отъ всѣхъ лѣкарствъ воздержаться. Ежели вожженіе будетъ оказываться, надобно упоиребить припарки жидкія, къ тому способныя. Гдѣ же въ пѣхъ срамотныхъ пленахъ великая слабость будетъ, шамъ совершеннаго излѣченія надѣяться не возможно, чего ради, наложивши обвязку оноо выпадшее, обвязать должно, чтобъ отъ наружныхъ досадительныхъ приключеній не бередилось. Ежели же сіе очень вздуется, и къ корню будетъ тонко, ножикомъ перерѣзать, или, что еще безопаснѣе, завязывая прочь опнять можно (*).

(*) Смѣтр. фигуру въ МЕККЕРЕНОВЫХЪ прим. т. 54. За нѣсколько лѣтъ назадъ, великая такая глыба изъ естества вислячая, прежде была завязана, напоследокъ, ножикомъ отрѣзана, и женщина выздоровѣла.



О о о о о

РЕЗСТРЪ



РЕЭСТРЪ

число значить §., а (*) примѣты.

А

Ангисома смотр. черепъ головной, [энгисома виде калваріа].

Аневризма [Аневризма], жилъ бьющихся разширеніе, съ различіе [эксъ дифференціа] 419; подлинной описаніе [вері дескрипціо], тамже примѣты [номе] 421 и далѣ; причины [кавзе] 424 и далѣ; окончаніе, конецъ, [экзитусъ] 429; лѣченіе различное [кураціо варіа] 431 и дал. и 443; неподлинной, ненастоящей, описаніе [спуріи дескрипціо] 420; примѣты [номе] 423; притчимы [кавзе] 428; окончаніе, конецъ [экзитусъ] 430 лѣченіе [кураціо] 436 и далѣ; для чего кусочковъ купоросныхъ къ жилъ бьющейся поврежденной прикладывать недолжно [куръ глеба эксъ випроло вулнерате артеріе нонъ обыцѣнда] 444; по залѣченіи аневризмы оставшуюся въ удѣ или членѣ слабость какимиъ способомъ можно искоренить [постъ аневризматисъ кураціономъ реликтамъ мембри дебилитасъ, ква раціоне толленда] - - 445.

Анкилоблефаронъ [Анкилоблефарумъ] - - 331 и далѣ.

Анкилосисъ (*αγκυλωσις*), есть недвижность въ составѣ съ опухолью жесткою, произшедшая отъ заматеренія близъ состава кости переломленной, или отъ связокъ крѣпковатыхъ, или отъ дичи костяной подлѣ состава, или отъ сгущенія частей состава подмазывающихъ - - 1214 и дал.

Анthonъ огонь [Гангрена] 169; его мѣсто частіе всѣхъ случающеся [эксъ седесъ фреквентиссима] 56 и 170; причины [кавзе] 55; различныя опасности въ разсужденіи причинъ, которыя также различны бызаяютъ [варіа дискримина раціоне кавзарумъ, кве эціамъ варіа сунтъ] 178 и далѣ; знаки [сигна] 171 и далѣ; предназначенованіе, предназначіе [прогносисъ] 189; лѣченіе различное и остро, ожности какія припомъ примѣчать надлежитъ [кураціо варіа отъ кавтеле інъ азъ обсерванде] - - 191 и дал.

Анфракъ смотр. Карбункулъ [Анфракъ виде Карбункулусъ].

бѣдра

бедра [фемурб], ея костью безвмешною составъ [эюсб кумб покса артикулусб] 1191; сб берцомъ и чашкою колѣбною [кумб крусе этб пателла] 1202; ея переломъ [эюсб фрактура] 1271 и далѣе; рѣдко вывихивается, а чаще переламывается [раро луксатурб, сеніусб франгитурб] 1192; въ какомъ случаѣ она вывихнувшись можетъ [ква окказіоне іалюдб люксатурб] 1193 и далѣе; знаки, что она вывихнута или переломлена [сигна, іалюдб люксатумб эссе вель фрактумб] 1195 и далѣе; какимъ образомъ она вывихнута быть можетъ [квибусб модисб іалюдб люксари посситб] 1197 и далѣе; вывихнутой бедра припадки, приключенія [люксати феморисб симпшомата] 1199; чтобъ изъ состава не выскочила, иногда можно предохранить т. е. зберечь [не эксб артикуло аксцидѣмб інтердумб потестб аверши] 1201; вправливается [репонитурб] 1200; бедра отниманіе или отрѣзаніе, смотр. отнятіе, отрѣзаніе членовъ [феморисб ампутаціо, виде ампутаціо].

Безпроходные [Апрете], т. е. проходовъ задняго или передняго неимѣющіе. Апретб [Апретусб], у котораго задній проходъ, или дѣтородный удб не проколотъ, и оное быть можетъ или по природѣ или отъ болѣзни; то есть мясомъ или плевою зарастетъ и проходъ запретъ. Составлено сіе слово изъ α лица, и τίτρεω проверчиваю, просвердливаю, пробуравливаю, прободаю. Сей порокъ или недостатокъ называется апрезіа, будшо бы непроверченость - - - - - 1442.

Беременности примѣчанія или знаки (гравидитатисб ноте) 1413 и далѣе;

берцово членосоставленіе сб бедрою и сб чашкою колѣбною (шибие артикулусб кумб феморе этб пателла) 1202 и далѣе; сб дудкою или сопѣлкою (кумб фибула) 1206; и сб лодыжкою (этб тало) 1208; вывихивается (люксатурб) 1204 и далѣе; берца переломленіе [шибие фрактура] - - - - - 1275.

Близнецовъ рожденіе [гемеллорумб партусб] - - - - - 1423.

Боль [долорб] 48; пронзительная отъ поврежденной жилы чувствительной [акутусб а лезо нерво] 448 и далѣе; боль зубная [денціумб] смотр. зубы [дентесб]; боль тяжкая при ранахъ бѣду прознаменуетъ [грависб инб вулнерибусб перикулумб сигнификамб] 450; ея причины [эюсб кавзе] 447; прошивъ ея вспомошествованія [адверсусб зумб авкзиліа] 451 и дал.

Болячка [улькусб] 892; разнствіе имѣетъ отъ раны [диффрѣтб а вульнере] 336; оной мѣста [эюсб седесб] 893; причины [кавзе] 894 и далѣе; роды различныя [генераліа]

варіа] 896 ; различная изъ нихъ выходитъ мокрота [варіусъ
эксъ іисъ эффертуръ гуморъ] 897 ; примѣты [номе] 898 ; пред-
знаніе [прогносисъ] 899 ; лѣченіе различное [кураціо варіа] 900
и далѣе болячка въ мозгѣ, смотр. мозгъ головной [улкусъ церебри
вид. церебрумъ, болячекъ плены или роговой различные роды [уль-
церумъ корнѣа варіа генера] 311 ; оныхъ причины [эорумъ кавзе]
309 и далѣе, и лѣченіе [эѣтъ кураціо] 312 и далѣе ; болячекъ фран-
цусскихъ на частяхъ дѣтородныхъ лѣченіе [ульцерумъ венерееорумъ
инъ гениталибусъ кураціо] 917 и далѣе ; оныхъ, которые по наукѣ
дѣлаются исторія [эорумъ, квартѣ фіунтъ, гисторія] 926 и далѣе.
бородавка [верука] - - - 886 и далѣе.
брыжеишная рана [мезентеріи вульнусъ] - - - 667 и 676.
брюшныхъ ранъ зашиваніе [гастрорафіа] , сложено изъ γατ'уε
брюхо , чрево , и τέμνω сѣку , рѣжу ; смотр. брюшныя чрев-
ныя раны [вид. абдоминисъ вульнера].
бубонъ [бубо] ; паховикъ , опухоль въ паху или подъ пазухою
его , и килы паховой знаки [эюсъ эѣтъ бубоноцелесъ сигна]
123 ; Францусско-болѣзненный [венереусъ] 124 и далѣе ; морово-
язвенный , морово-повѣтренный [пестиленсъ] 127 ; стѣ пре-
избылія пасоки попросту [эксъ лимфе редунданція] [вахсбей-
ленъ] 128.
На бѣлкѣ глазомъ опухоль [хемосисъ] , отъ которой глазная черно-
та впухлою показывается - - - 276.
общенства животныхъ припчины [рабіи аниманціумъ кавзе] 501.

В

Вередъ [фурункулусъ] - - - 102 и дал.
Висш ая мышка [кроматифтесъ мускулусъ] , ея поврежденіе [эюсъ
лезіо] - - - 544.
Воды болѣзнь [гидрофобія] , сложено изъ ἵδωρ вода и Φόβος
боюся - - - 500 и дал.
Водяная болѣзнь [анасарка] , водной опухоль сильной по всему тѣлу
713 ; ея лѣченіе [эюсъ кураціо] - - - 737.
Водяная болѣзнь головная [гидроцефалумъ] 733 ; ея два рода [эюсъ
дуо генера] 744 ; знаки [сигна] 745 и далѣе ; причины [кавзе] 748 ;
лѣченіе [кураціо] - - - 749 и дал.
Водяная болѣзнь мошношулятная [гидропсъ скропи] , ея отлѣна стѣ
водяной болѣзни мошонкшулятисей [эюсъ дифференція абъ ги-
дроцеле] 863 и 733 ; лѣченіе [кураціо] - - - 873 и дал.
Водяная болѣзнь по всему тѣлу [левкофлегматія] - - - 733.
Вода-

- Водяная глазоболь [гидрофтальміа] 733 ; ея причина и лѣченіе [эюсѣ кавза эѣѣ кураціѣ] - - - 754.
- Водяная болѣзнь въ брюхѣ [асциписѣ] 733 ; ея причины и лѣченіе [эюсѣ кавзе эѣѣ кураціѣ] - - - 755 и дал.
- Водяные пузыри подѣ кожей [фликтена] - - - 310.
- Вожженіе [Инфламмаціѣ] 29 и далѣе ; оное знать нужно [эюсѣ но пи-
цѣ нецессарѣа] 28 ; подлинное и неподлинное [вера эѣѣ спу ѣа] 33 ;
мѣсто [седесѣ] 34 и далѣе ; причины [кавзе] 35 , 37 и далѣе ; примѣ-
ны [номе] 48 ; прознаменованіе [прогносисѣ] 60 ; окончаніе раз-
лично [экзитусѣ варѣтисѣ] 52 ; лѣченіе [кураціѣ] 53 , 61 и далѣе ; оного
прилѣжное гораздо примѣчаніе въ ранахѣ потребно [иллѣтисѣ дилиген-
ціѣ обсерваціѣ инѣ вультерибусѣ нецессарѣа] - - - 390.
- Вожженіе , гниль или наростъ подѣ деснѣ [парулисѣ] , сложенное
изъ парѣ близѣ , подѣ , и ѣлов десна - - - 1087 и дал.
- Впускники [каѣ тересѣ] , ихѣ различные роды [эорумѣ варѣа генера]
1338 и далѣе ; оныхѣ впуска нѣ въ пузырь уринной причина [эюсѣ ди-
миттенди инѣ везѣ камѣ раціѣ] - - - 1141 и дал.
- Вспученіе рѣны головной [эмфизема капитисѣ вульчери] 519 ; въ гру-
дной ранѣ напослѣдокъ случающееся [пекторисѣ вульчери супер-
венѣисѣ] 621*** ; его лѣченіе [эюсѣ кураціѣ] - - - 644.
- Вывихнутыя чашки и что къ познанію оныхѣ совершенно надобно
[люксата эѣѣ кве адѣ эорумѣ когнитѣонемѣ нецессарѣа] 1090 и дал.
и 1101 ; у дѣтей рѣже случаются [инѣ пуэрисѣ раѣѣора] 1102 , вывих-
нутыхѣ чашекѣ различіѣ многіѣ [люксаторумѣ дискримина варѣа]
1103 ; причины [кавзе] 1104 ; знаки [сигна] 1105 и далѣе ; какіѣ отѣ
нихѣ происходятъ обѣдствіѣ [кве экѣ ѣисѣ орѣунтурѣ перикула]
1109 ; ихѣ вправливаніе [эорумѣ репозиціѣ] 1110 и далѣе ; прочіѣе
лѣченіе [реликва кураціѣ] 1114 и далѣе ; всякой же членѣ вывих-
нутой смотри въ его мѣстѣ [сингулосѣ арѣтикулосѣ люксатосѣ
видѣ суисѣ лоцисѣ].
- Вѣка верхняго опаденіе [пальпобре суперѣорисѣ казусѣ] 577 и далѣе ;
сшиваніе [сутура] 585 ; [скарѣфикаціѣ видѣ скарѣфикаціѣ].
- Вѣко нижнее короче верхняго и заворочено , такѣ что глазѣ зажму-
риваться не можеть [экѣтропѣумѣ] - - - 582 и далѣе.

Г

- Ганглій [гангліонѣ] , пухлина въ частяхѣ сухожильныхѣ и жилъ
ночувствительныхѣ - - - 772 и далѣе.
- Герпесѣ [герпесѣ] огонь лѣтучій 166 ; его различные роды и
отѣ рожи отѣѣна [эюсѣ варѣа генера эѣѣ адѣ арѣзипелатѣ
дифѣференціѣ] 919 ; лѣченіе [кураціѣ] - - - 920 и далѣе.
- Глаза болятѣ , глазоболь [оѣфѣталміѣ] 275 и далѣе ; оной причины [эюсѣ
кавзе]

- кавзе] 284 и далѣе ; въ ней вредны бывають вещи холодительныя , подавляющія , и спиритуозныя [инѣ эа ноцентѣ , кве рефригерантѣ , репримунтѣ , этѣ спиритуоза] 286 ; оной прознаменованіе [эюсѣ протгносисѣ] 287 и далѣе ; въ ней что примѣчать должно [инѣ илла кве обсерванда] 290 ; всякой оной болѣзни лѣченіе [сингулорумѣ эюсѣ генерумѣ , кураціо] 291 и далѣе ; острой и долг.временной различіе [акуте этѣ лонге дискрименѣ] 282 ; сухая липота [арида] [вид. хирофшаміа] ; повѣтреная [эпидемика] 283 ; влажная [гумида] 277 ; сея лѣченіе [гуюсѣ кураціо] 295 и далѣе ; по временамъ случающаяся и цыкгошная [періодика этѣ скорбутика] 283 ; венерическая , французскобольная [венереа] , тамже оной лѣченіе [эюсѣ кураціо] 308.
- Глаза различными влажностями слизки дѣлаются [окули варіисѣ гумидисѣ лубрикантурѣ] 957 ; огнемъ поврежденные какѣ лѣчить должно [игне лези квомодо куранди] 228 ; оболочки наружныя [пунице экстерне] 275* ; дѣлы остаются въ воспѣ , когда вѣка межѣ собою слѣплены бывають [кусподіунтурѣ инѣ варіолисѣ , си палпсбре интерѣ се глютинате сунтѣ] 285* ; глазныя раны [окулорумѣ вульнера] 586 ; флеботоміа , кровопусканіе [флеботоміа] 299 ; какѣ масти въ нихѣ класть [квомодо унгвенста инѣ илосѣ кониціѣнда] - - 313*.
- Глазная судорога [страбисмусѣ] , смотр. страбисмусѣ , которою зѣница на всѣ свѣтоны тянется - - 1328.
- Глазѣ вонѣ выскочилѣ [протгносисѣ] виде протгносисѣ - 281.
- Гниль кожная [педарфрокаце] 1032 ; оной причины [эюсѣ кавзе] 1065 , 1071 ; ея исторіа [эюсѣ гисторіа] 1066 ; лѣченіе [кураціо] 1073.
- Гнилости причина , и какія вещи оную въ нашемѣ тѣлѣ производять [путрединисѣ радіо , этѣ кве эамѣ инѣ ностро корпоре фациунтѣ] - - - - 169**.
- Гной [пусѣ] 54 ; какія лѣкарства производять [кве мовентѣ медикамента] 384 и далѣе ; его различность въ ранѣ [эюсѣ инѣ вульнере дифференціа] 348 , 351 ; перемѣняется отѣ принятыхъ вещей [мутатурѣ абѣ ассумптісѣ] 100* ; смотр. чирей безверхушешный [абцессусѣ] , загноеніе [суппураціо].
- Гной въ груди собраніе [эмпіѣма] 647 и далѣе ; иногда проходитѣ теченіемѣ гноеватокальнымѣ или гноеватоуриннымѣ [сольвитурѣ квандохве альви этѣ урине пуруленто профлуѣо] 653 ; онаго Хирургическое дѣйствіе [эюсѣ Хирургіа] - 646 и дал.
- Гной собраніе подѣ пленую роговою главною [гипопіонѣ] , сложено изѣ ѣтѣ подѣ и тѣмѣ гной , гипопіонѣ 320* ; его знаки причины и лѣченіе [эюсѣ сигна кавзе этѣ кураціо] - 321 и дал.
- Голова на бокѣ искривленная , кривошія [капутѣ обстипумѣ] 1124 ;
- ГОЛОВА

головной ударъ безъ раны [капитисъ контузіо сине вульнере] 521 и далѣ ; къ ранамъ головнымъ которыя раны принадлежатъ ? [адъ капитисъ вульнера кве реферантуръ] 509 и далѣ ; которыя бѣдственны [кве перикүлоза] 541 и далѣ ; съ начала нѣкоторыя и легкія раны временемъ смертоносны бывають [абъ иниціо левтора аликвандо мортифера фтунтъ]. 512 ; ихъ предсказаніе недоуѣдомо [эорумъ прогностисъ инцрта] 513 ; головныя наружныя части часто не безъ бѣдствія повреждаются [капитисъ экстерне партесъ сепе нонъ сине перикүло ледунтуръ] 514 ; простой раны на головѣ лѣченіе [вульнерисъ симплицисъ инъ капите кураціо] 515 и далѣ ; раны порубленной лѣченіе [вульнерисъ коллизі кураціо] 518 ; послѣ сего часто случается эмфизема т. е. раздутіе [илли сепе супервенитъ эмфизема] 519 ; и вожженіе и рожа [этъ инфламмаціо этъ эризипеласъ] 520 ; головной съ зашѣкомъ составъ [капитисъ кумъ церви с артикулюсъ] 1120 ; ежели сей повредится , то что слѣдуетъ [си гиль эксцидитъ , кве секвантуръ] - - - 1123.

Гоноррею одержанную или осшавленную временемъ опять шечь прииудить надлежитъ [гонорреа суппресса интердумъ ревоканда] 124 ; отъ остановленія ея скоровременно глазоболь венерическая. [эксъ эа репенте котибита офthalmъта венереа] - 283*.

Горбъ [гибберъ] , его разные роды [эюсъ варіа генѣра] 1142 ; причины [кавзе] 1143 ; лѣченіе [кураціо] - - 1146.

Горла дыхательнаго прорѣзываніе [бронхотоміа] 614 и далѣ ; утоплымъ и удавленнымъ надобно лѣчать [аквисъ субмерсисъ этъ префокатисъ анъ адгигенда] - - - 618.

Горячка ранчая , то есть отъ раны или припадошная. [фебрисъ вульнераріа вель симптоматика] - - 49 и далѣ.

Градина [халазійонъ] , пуклинка маленькая или кишечка на вѣкахъ случающаяся , на градину схожая - - - 770.

Грибъ мозгоголовный смотр. мозгъ головной [фунгусъ церебри виде це;ебрумъ].

Грудинной кости переломъ [сперни фрактура] 1266 ; просвердливаніе [трепанацио] - - - 654.

Грудныя раны [пекторисъ вульнера] ; сныхъ извѣдываніе [эорумъ эксплораціо] 620 и далѣ ; наружныхъ лѣченіе [экстернаумъ кураціо] 622 и далѣ ; въ нихъ увязшую пулю свинцовую какъ вынимать [гисъ ингеренсъ плумбеа глансъ квомодо экстрагенда] 645 ; ранъ вънутрь груди проходящихъ знаки [эорумъ , кве инъ кавумъ пенетрантъ , индича] 627 и далѣ ; прознаменованія [протисисъ] 634 ; лѣченіе [кураціо] - - 635 и далѣ.

Губныя раны [лаброрумъ вульнера] 597 ; губа залыта т. е. прегубость [лабрумъ лепоринумъ] - - - 598 и далѣ.

П п п п

Ди-

Жестокую мать когда надобно прорѣзывать [дура матеръ , квандо инциденда] 567 и далѣ ; открытой и испорченой лѣченіе [патифакте алѣнаптекве кураціо] - 569.
 Жесткая и сухая глазная болѣзнь [ксерофтальміа] 278 ; оной лѣченіе [эюсѣ кураціо] - 301.
 Жила бьющаяся [артеріа] , при поврежденіи ея большой бѣдствія , [эюсѣ вульнерате маіорисѣ перикула] 353 ; знаки и лѣченіе [сигна эѣѣ кураціо] 446 ; ежели будетъ разрѣзана въ нѣкоторой части , то что слѣдовать можетъ [индизе аликва партіе кве супервеніунѣѣ] 354 ; какъ завязывать должно [квомодо винциѣнда] 242 и далѣ ; къ давленію , къ тѣсненію жилы бьющейся толенной машина [адѣ крурэлемѣ артеріамѣ компримендамѣ машина] 244* ; жилы бьющейся межреберной перерѣзанной знаки [артеріе интеркосталисѣ прецизе сигнала] 628 ; лѣченіе [кураціо] 643 ; какъ эти придавливать [квомодо геѣѣ комприменда] - 1263.
 Жилъ чувствительныхъ растяженіе послѣ ранѣ случающееся [нерворумѣ диспендіо вульнерибусѣ супервеніансѣ] - 355, и 455.

3.

Заволока [сетацеумѣ] 939 и далѣ ; похваляется во время глазной бо-
 лѣзни долговременной [лавадатурѣ адѣ офѣталмїамѣ хроникамѣ] 306.
 Загнаиваніе , въ гной пришествіе [суппурацио] 54 ; тому какія вещи пособствуютъ и дѣлаютъ оное [эамѣ кве юванѣѣ эѣѣ фаѣѣунѣѣ] 80 и далѣ ; будущаго въ гной пришествія знаки [футуре ноте] 84 ; ужъ имѣющагося признаки [презентисѣ индиція] 85 и далѣ ; изъ того вредности какія [эксѣ ѡа ноксе] 87 ; часто удерживается при лѣченіи ранѣ , и отъ чего [сепе когнѣтурѣ инѣ вулнерумѣ кураціоне , эѣѣ унде] , 391 ; такого приключенія знаки , окончаніе и проч. [гуюсѣ реи сигнала , эвентусѣ и проч.] 392 и дал.
 Заднепроходныя мышки и сосуды [ани мускули эѣѣ ваза] 989 ; около его чирей безверхушешный или абсцессѣ , язвыны , фистулы и сихъ вредностей причины [цирка иллюмѣ абсцессусѣ , ульцера , фистуле , гарумѣ ноксарумѣ кавзе] 990 и далѣ ; будущаго впредъ чирей безверхушешнаго знаки [футури абсцессусѣ сигнала] 992 ; его лѣченіе [эюсѣ кураціо] 993 и далѣ ; фистулѣ три рода [фистуларумѣ трїа генера] 997 и далѣ ; какъ ихъ пробовать [илле квомодо эксплоранде] 1001 ; ихъ предузнаніе , предзнаніе [галларумѣ прогносисѣ] 1002 ; лѣченіе [кураціо] 1003 , заднего прохода выпаденіе [ани проциденція] 1022 и далѣ ; задній проходѣ неразтворенный [анусѣ псеключусѣ] - 1026 и дал.
 Запорѣ [обструкціо] , того причины [эюсѣ кавзе] 37 и далѣ ; для
 П и п п 2 чего

чего во время его умножаются движенія жизненныя , и горячка дѣлается? [курб эа дапа , авгеантурб мопусб вишалесб , эпб эксцитетурб фебрисб] 32 ; онб прищиною вожженія [эстб ин-фламмаціонисб кавза] - - - 35.
 Затылошныя раны обдственныя [окципишисб вулнера перикүлоза] 547.
 Злчій глазб [лагофталмусб] , сложено изъ лаγύς зацб и οφθαλ-
 μος глазб - - - 580 и дал.
 Ъб зянїяхб , ѡб горлб горитб [фавцїумб ардорб] , шого лбченїе [эюсб кураціо] 137 ; вожженїе [инфляммаціо] , его лбченїе [эюсб кураціо] - - - 138.
 Зостерб или лбшучїй огонь , смотр. герпесб [зостерб виде герпесб].
 Зубы [дентесб] , ихб исторїя [эорумб гисторїа] 1074 и далб ; во время вырбзыванїя зубовб , когда зубы вырбзываются какимб обра-зомб боль утишатб [денциціонисб долоресб квомодо мишиганди] 1077 и далб ; зубы отб чего повреждаются [дентесб кве ледунтб] 1079 и далб ; какїя вещи ихб невредными хранятб [кве зосб туэнтурб] 1081 ; боль зубная [денцїумб долорб] 1082 ; гниль , червоточина [карїесб] 1083 ; выпаскиванїе , выдергиванїе [эвульсіо] - - - 1084 и дал.
 Збиды крайнее разширенїе , шукб ѡб глазу , [мидрїасисб] 1309 и 1322.

И.

Инструментовб лбкарскихб , снарядб нужный или неоптббно надобный [Инструменторумб хирургикорумб аппаратусб нецессарїусб] 12 и дал.
 Ипопїонб [гипопїонб] 320* ; его знаки , причины и лбченїе [эюсб сига , кавзе эпб кураціо] - - - 321 и дал.
 Источникб [фонтикулусб] 926 , различные манеры , какб его дб-латб [варти эумб эксцитанди моди] 928 и далб ; которыя мбста на источникб полезны , приличны или безопасны [кве-намб седесб фонтикуло оппартуне синтб] 927 ; на верхушкб или на макушкб головной [инб суммо капите] 930 ; на запылкб [инб нуха] 931 ; на плечб , на бедрб , на голени [инб брахіо , феморе , круре] 932 ; его беречь способб [эумб консерванди раціо] 933 ; его потребность [эюсб узусб] - 934.

К.

Камни подб языкомб [калькули субб лингва] 608 ; изб почекб можно ли вынимать [ренумб анб эдуци поссинтб] , 1356 ; о Нефрошмїи , п. е. о выниманїи изб почекб камня исторїя [нефро-

[нефротоміе гисторіа] 1356** ; камней пузыреуринныхъ причины [калькулорумъ везице кавзе] 1358 ; примѣшны [нѣше] 1359 ; ихъ разрѣзывать вынимать должно [или секціоне экзименди] 1356 ; исторія , какъ камень вырѣзывать, вынимать, исторія о выниманіи камня [липоміе гисторіа] 1356* ; она бѣдственна естъ [за естъ перикүлоза] 1357 , 1360 ; къ тому большаго какъ приготовить надобно [адъ эамъ эгеръ квомодо препарандусъ] 1361 ; во многихъ больныхъ осовливымъ манеромъ должно поступать [диверса раціоне дебеть фіэри инъ варіисъ эгрисъ] 1362 и 1397 ; которое великимъ приборомъ дѣлается , того способъ [эюсъ , кве магно аппарату фитъ , методусъ] 1363 и далѣ ; вырѣзывать съ боку по манеру равіеву [секціо латералисъ секундумъ равіумъ] 1375 и далѣ ; по манеру Хесельденову [Хесельденумъ] 1377 и далѣ ; по манеру Фульбертову [Фульбершумъ] 1380 и далѣ ; ле Дранъ [ле Дранъ] 1385 ; вырѣзывать по манеру Цельсову или съ малымъ приборомъ [секціо Цельсига вель кумъ парво аппарату] 1387 и далѣ ; вырѣзывать дѣлающееся высокимъ приборомъ или подчеревинымъ [секціо , кве фитъ альшо аппарату вель гипогастрика] 1390 и далѣ ; камней на пути уринномъ стоящихъ лѣчение [калькулорумъ инъ урине ипшнере интересценціумъ кураціо] 1398 , и далѣ ; камнемъ не такъ часто страждутъ женщины [калькуло фемине раріусъ лаборантъ] 1405 ; изъ нихъ вынимаются часто безъ рѣзанія [инъ гисъ экстрагитуръ сепе сине секціоне] 1406 ; какъ его чрезъ разрѣзаніе вынимать [исъ квомодо секціоне толлендусъ] 1408 и дал.

Камень изъ пузыря вырѣзывать , вынимать смотр. камень , [липоміа виде калкулюсъ]

Карбункулъ [карбункулусъ] - - - 107 и дал.

Каракатица въ ноздряхъ [полипусъ наріумъ] - - 776 и дал.

Кашникъ , аэрома [аперома] - - - 759.

Кила настоящая [гернѣа вера] , ея описаніе [эюсъ дескрипціо] 795 , 788 ; отъ бубона разнство имѣетъ [а бубоне диффертъ] 123 ; оной различныя роды [эюсъ варіа генера] 789 и далѣ ; въ ней плева брюшинная рѣдко прорывается , но только раздвигается , [инъ за перитонеумъ разо румпитуръ , седъ таншумъ диудитуръ] 794 , пупошная кила [ἔξωμ.Φαλός или σμ.Φαλοκήλη] 789, 801 и далѣ ; кила чревная [гернѣа вентралісъ] 790, 821 и далѣ ; паховая кила [βυβωνοκήλη] 791 , 824 и далѣ ; кила мошонкопуляшная [ορχεοκήλη гернѣа скроталисъ] 791 , 842 и далѣ ; кишечная кила , сальнишная кила , [εγτεροκήλη , επιπλοκήλη] 791 ; кила бедерная или голенная , [μυροκήλη гернѣа феморалисъ]

вель круралисъ] 792, 848 и далѣе; кила пузыреуринная [κυστοκῆλη гернѣа везице] 793, 850; килы неподлинныя [гернѣа спурѣа] 852; ὑδρομ. Φαλος 796, 852; σαρκῶμ. Φαλος 796, 853; πνευματόμ. Φαλος 796; ὑδροκῆλη 797, 861 и далѣе; σαρκοκῆλη 798, 854 и далѣе; κιστοκῆλη, жилонапряжная кила; 799, 875 и далѣе.

Кила мясная шулятная смотр. кила [саркоцеле вид. гернѣа], избъ сарξ мясо и κῆλη опухоль; по нѣмецки карнифель флейш-брухъ.

Кила пузырная, смотр. кила [цистоцеле виде гернѣа].

Кила кишечная, смотр. кила [энтероцеле вид. гернѣа].

Кирсокилонъ [кирсоцеле] смотр. кила [гернѣа].

Кишки [интестина], ихъ раны [горумъ вулнера] 664; бѣдствєнны [перикүлоза] 674; зашиваются [сууншуръ] 693 и далѣе; ранє-ныхъ ихъ лѣченіе [эорумъ вулнерашорумъ кураціо] 698; въ рану на брюхъ выпадшее, попрежнему въ брюхо вкладывать должно [перъ абдоминиъ вулнуъ пролапса репонеда сунтъ] 686 и далѣе; кишки заднепроходной сосуды и мышки [интестини ректи ваза этъ мускули] 989.

Жишкѣ сшиваніе, [эитерорафе] 693 и дал.

Кишты [шурунде] 20; вредны бывають при ранахъ грудныхъ [иоцентъ инъ пекторисъ вульнерибуъ] 639*.

Копчикова кость, хвостецъ, вихрецъ [кокциксъ]; его съ костью крестцовой связь, и сея вывихъ, [эюъ кумъ оссе сакро комиссура этъ гуюъ вмоціо] 1151 и дал.

Корка Перувианская похваляется противъ Антонова огня отъ слабости произшедшаго [кортекъ Перувиануъ лавашуръ адъ гангренамъ экъ имбециллишате оршамъ] 205.

Кости луча съ плечною костью, составъ [радѣй артикулуъ кумъ гумеро] 1177; съ лактемѣ [кумъ кубито] 1178; съ запястьемъ [кумъ карпо] 1185; переломъ [фрактура] 1269.

Кости [осса], ихъ составы и спайки [эорумъ артикули этъ комиссура] 1092 и далѣе; хрящики [картилатинесъ] 1098; связки [лигаменты] 1096 и далѣе; мозгъ костный [медулла] 1031; п-ева на костная выѣшная [мембрана сеу періостіумъ экстернумъ] 1029; внутренняя [интернумъ] 1030; ихъ строеніе [эорумъ структура] 1028; болѣзни [морби] 1032 и далѣе; болѣзней сихъ сравненіе съ нѣкоторыми болѣзнями мягкихъ частей [морборумъ горумъ компараціо кумъ квибусамъ морбисъ моллѣорумъ парціумъ] 1034 и далѣе; на нихъ родятся часто различныя опухоли [уперъ

илилисъ

- иались наскунтурь сепе варіа туморумь генере] 1036, сихь
лбченіе [горумь кураціо] 1037 и далбе; переломы [фрактура],
смотр. переломь [вид. фрактура], вывихнушыя части [люксація
вид. люксація.]
- Кости цблой распухлость, экзостосись [гиперостосись] - 1032.
- Костяная дичь, нарость, распухлость [экзостосись] 1032; хорошей
распухлости или нарости причинны [бенигне кавзе] 1041 и далбе;
худой или зловредной причинны, знаменія и лбченіе [малигне
кавзе, индиція эпб кураціо] - 1043 и дал.
- Кровь [сангвись]; причинны, которыми оная скрозь сосуды прогоняется
[кавзе, квибусь исб перь ваза пропеллитурь] 31; ея теченіе гдб
можно стерпивать, и гдб удерживать надлежить [эюсб про-
фузіо уби толеранда, уби супприменда] 403; удерживается раз-
личными способами [систитурь варіись модись] 238****, 242
и далбе; 404 и далбе; гдб опасность есть, що какь по-
ступать, и какія лбкарства употреблять? [уби примешурь, квале
режимень сервандуиб, эшб кве ремедіа адгигенда] 417; послб
оного печенія какь вь силу приводить? [постб замь квомодо
виресб рефиціенде] 418; изь матки предь родами [эксб ушери-
анте паршумь] 1438; крови изь сосудовь вытеклой и вь груди
державшейся и сгустившей знаки [сангвинись экстра ваза мисси
эпб инь пекторе герентись конкретикве ситна] 630; когда и
какимь образомь оную можно вонь взять [квандо акь квомодо
гикь эвокари квеатб] - 635 и дал.
- Эпб Кровепусканія иногда ббда случается [вене секціо аликвандо
периккулумь адфертб] 1276; инструменты, которыми дблается
[инструмента квибусь перфицитурь] 1277 и далбе; какимь
образомь оную исполнять [квомодо институюенда] 1280 и далбе;
вь при намбренія оная кровь пускается [приплищемь инь фи-
немь целебратурь] 1282 и далбе; на разныхь мбстахь пускается
[инь варіись корпорись седивусь фитб] - 1286 и дал.
- Кровотеченіе [геморрагіа вид. сангвинись профузіо].
- Кровепусканіе изь жилы бьющейся [артеріошоме] 1294 и дал.

Л.

- Лазоревое ббзьмо [глаукома] - 1309 и дал.
- Лакоть [кубитусь]; его составь сь плечомь и лучомь [эюсб ар-
тикулуь кумь гумеро эпб радіо] 1177 и далбе; вывихивается
[люксатурь] 1179; вправливается [репонитурь] 1180 и 1182;
обвязка кб сему составу вывихнутому способная, приличная [фас-
ція гуикь артикулю люксамо идонеа] 1183; лактя переломь
[кубити фрактура] - 1269.
- левкома

Левкома [левкома] спрупиѣ или пашно толстое свѣпшащееся на роговой глазной пленѣ	-	-	-	319.
Легкаго раненаго знаки [пульмонисѣ вулнерати сигна]	627	и далѣе ;		
б31 , б33 ; лѣченіе [кураціо]	-	-	-	641 и дал.
Липкость жесткая глазобольная , [склерсфталмиа] , изб σκληρός				
жесткій , твердый и οφθαλμία боль глазная	279 ;	оной лѣченіе		
[эюсѣ кураціо]	-	-	-	302.
Личныя раны [фаціи вульнера]	-	-	-	576.
Лопатка [скапула] , ея составѣ съ плечемѣ [эюсѣ артикулюсѣ кумѣ				
гумеро] 1162 ; и съ ключикомѣ или съ дужкою [эѣб югулѣ]				
1154 ; ея переломѣ [эюсѣ фрактура]	-	-	-	1257 и дал.
Лѣкарѣ каковѣ быть долженѣ [хирургусѣ квалисѣ эсе дебеатѣ]	11 ;			
его зоруѣ , снаряжѣ [эюсѣ супеллексѣ]	-	-	-	12 и дал.

М.

Матка [ушерусѣ] , оной выпаденіе [эксѣ проциденціа]	1444	и далѣе ;		
ея ложеснѣ выпаденіе [эюсѣ вагине проциденціа]	1446	и далѣе ;		
Матка наискось лежащая причиною бываетѣ трудныхѣ родовѣ				
[ушерусѣ обликве ситусѣ партусѣ диффицилисѣ кауза]	1435	и далѣе ;		
матка раненая [ушерѣ вулнусѣ]	668 ;	маточная рана бѣд-		
ственна [перикүлозумѣ]	677 ;	смотр. рѣзаніе кесарское [виде		
секціо цезареа].				
Медицеская должностѣ въ случаяхѣ хирургическихѣ [медици инѣ ка-				
зибусѣ хирургичесѣ оффиціумѣ]	-	-	-	7.
Меликира Цельсова [мелицера Цельси]	-	-	-	357 и 486.
Меликиринѣ опухоль [мелицерисѣ туморѣ]	-	-	-	759 и дал.
Миндалины [тоисилле] ; ихѣ вожженіе [эарумѣ инфламмаціо]	135	и далѣе ;		
загноеніе [суппураціо]	139 ;	въ болячки претвореніе [экзул-		
цераціо]	-	-	-	914.
Мозгѣ кссѣный различный [медулла оссѣумѣ варѣа]	-	-	-	1031.
Мозга головного потрясеніе [церебѣи коммоціо]	511*	; грибѣ [фунгусѣ]		
571 и далѣе ; болячка [улькусѣ]	-	-	-	570.
Мозоль [клавусѣ]	-	-	-	890 и дал.
Мозоль , затвердѣніе , заматереніе , окрѣпѣлость , твердостѣ , жест-				
кость въ фистулѣ что такое , и какимѣ образомѣ искоренитѣ				
его можно [каллюсѣ инѣ фистула квидѣ ситѣ , эѣб квомодо				
тоалли поссиѣнѣ]	-	-	-	943 , 949 и дал. 955.
Мокса [мокса]	-	-	-	936.
Молошница [афѣе]	-	-	-	923.
Мочитѣся трудно [урикѣ редденде диффикультасѣ]	1329 ;	оного лѣченіе		
[гюсѣ кураціо]	-	-	-	1330 и дал.
Мясишко , мясо въ спѣсѣ мочендпускательномѣ [карункула инѣ				
уретра]	-	-	-	1335
				мѣста

мѣста младенческаго извлеченіе, выниманіе [секундарумъ экстракцію] 1419; о томъ раздорѣ [де за контроверсія] - 1420 и дал.

Н.

Надѣсница [эпулисѣ] т. е. на деснахъ выросъ при послѣднихъ коренныхъ зубахъ случающаяся, такъ что рта разинуть не можно; изъ еті на и 8ЛОУ десна - - - 1089.

Надкостіе наружное, надкостная плева наружная [періостіумъ экстернумъ] 1029; внутреннее, внутренняя [интернумъ] 1030; какими вещами дѣлаютъ, что оно въ новъ рождается [квивусѣ эффицитуръ утѣ илюдѣ ретаскатуръ] - 524 и дал.

Наискось проколотъ черепъ головной, смотри черепъ головной [діакопе вид. калварія].

Наросъ на пупкѣ мясная изъ сарξ мясо и оμφαλος пупокъ смотр. кила [саркомфалосъ вид. гернія].

Насосы, спринцы, сифоны [сифонесѣ] - - - 25.

Насѣканіе на кожѣ [скарификацію куписѣ] 1297 и дал. на лодышкахъ [маллеолѣрумъ] 1300; рѣзаніе ноздрей [наріумъ] 1299; вѣсковъ [пальпеврарумъ] - - - 2998.

Незалуна, фимосисѣ [фимосисѣ] - - - 877 и дал.

Неотлуна [парафимосисѣ] т. е. конечную плотью закрывать плѣшку невозможность - - - 882 и дал.

Нефроптоміа смотри почкѣ рѣзаніе.

Ноготь, ониксѣ [ониксѣ] - - - 320.

Ногшоедица [паронихія вель панараціумъ] 140 и далѣе; ея четыре рода и ихъ лѣченіе [кватуоръ эюсѣ генера этѣ горумъ кураціо] - - - 144 и дал.

Ноздри [наресѣ], ихъ каракатица см. каракатица [эарумъполипусъ, виде полипусѣ], насѣканіе, мѣлко разрѣзаніе [скарификацію] 1299; раны вульнеръ] 592; короткихъ ноздрей лѣченіе [куртарумъ наріумъ кураціо] 593; костей носовыхъ переломъ [оссіумъ насѣ фрактура] 1247 и дал.

О.

Обвязки [фасціе] - - - 14 и дал.

Огонь лѣтучій смотри [терпесѣ] его различные роды и отъ рожи отмѣна [эюсѣ варіа генера этѣ абѣрисипелате дифференція] 919; лѣченіе [кураціо] - - - 620 и далѣе.

Ожженные части, ожога [адуста]; ихъ различность въ разсужденіи причины и мѣста 215 и далѣе; лѣченіе различное - 222 и дал.

Опухоль хрустальная [туморъ кристаллинусѣ] 881; опухоли въ мѣшечкахъ [туморесѣ цистици], которые въ свихъ собственныхъ пленахъ заключаются [кѣи суа туника инклюдунтуръ] 758 и дал.

Р Р Р Р

Опу-

Опухоль бѣлая, смотри [падаротисѣ] - - 771.
 Опухоль, [милицисѣ шуморѣ].
 Осколки въ кишкѣ заднепроходной [кондиломаша илѣ интешти-
 но ректо] - - 119 и далѣе.
 Отморозы, отзнобы [перитонесѣ] - - 209 и дал.
 Ошголоскѣ, смотри черепъ головной [резонитусѣ вид. калваріа].

П.

Палецъ большой [поллексѣ], его составъ съ костью прапезною вы-
 вихивается - - 1190.
 Параламписѣ [паралимписѣ], струнѣ толстой и сѣющей въ глазѣ 319.
 Пахъ лая кила, смотри кила [бубоноцѣ виде герна].
 Переломы [фракта] ихъ причины [эорумѣ кавзе] 1219 и далѣе; знаки
 [сигна] 1222 и далѣе; прознаменованіе, предсказаніе [прогносисѣ]
 1225 и дал. для лѣченія ихъ что надлежитъ знать [адѣ горумѣ
 кураціонѣ мѣ квалумѣ регрумѣ когниціо нецессаріа] 1221; самое
 лѣченіе [апса кураціо] 1227 и далѣе; временѣмъ и вывихнушая
 кость и переломлена бываетъ [аликвандо люксатумѣ осѣ ацтамѣ
 фрактумѣ асѣтѣ] 1119; каждой кости переломы смотри въ сво-
 емъ мѣстѣ [сингулорумѣ оссѣтумѣ фрактурасѣ виде суо. люко].
 Печенка раненой припадки [гепатисѣ вунераша симптомаша] 665;
 прознаменованіе [прогносисѣ] - - 675.
 Пиззакі, кисточки [пеницилли] - - 21.
 Пизиды, пизиды [гирудинесѣ] - - 1017.
 Падаротисѣ [падаротисѣ], опухоль бѣлая и мягкая внутрь въка 771.
 Пластыри [эмпластра] - - 23.
 Плена роговая отъ влажноты вспуклая или раздутая и темная [корнеа
 гуморе тургида аѣтъ опака] 316; ея струпики [эосѣ пикастридесѣ]
 317; ихъ свѣжисѣ лѣченіе [гарумѣ реценціумѣ кураціо] 318; тол-
 спыя и свѣтлыя можноты согнать [крассе аѣтъ сплендентесѣ нумѣ
 толли квантѣ] 319; чирышкы смотр. чирей [ульцѣра виде улькусѣ].
 Плеча отнятіе, смотри отнятіе отрѣзываніе, [брахій ампутаціо
 виде ампутаціо]. Переломъ [фрактура] - - 1268 и дал.
 Плечо, рамо [гумерусѣ] сего отнятіе см. отнятіе, отрѣзаніе [эосѣ
 ампутаціо виде ампутаціо], его членосоставленіе, составъ съ
 лопаткою [эосѣ артикулюсѣ кумѣ скапула 1162; съ лучемѣ ж
 съ лактемѣ [кумѣ радио аѣтъ кубито] 1177 и далѣе; вывихъ
 [люксатурѣ] 1163 и далѣе; вправливается различными способами
 [репонитурѣ варіа радіоне] 1165 и далѣе; переломъ [фрактура]
 1267.
 Плосина, порогъ, катаракта, смотри подшодѣ, подшеченіе [ката-
 ракта виде суффузіо].
 Плосина

- Плюсна [песъ инферіоръ] , ея составъ съ костью таранною [эксъ арти кулусъ кумъ паліо] 1208 ; вывихивается [луксатуръ] 1210 и дал.
- Подавляющихъ лѣкарствъ вредность [репримендіумъ нокса] 77 ; а особливо въ вожженіи желѣзъ - - - 113.
- Поднебennыя болячки [палатши ульцера] - - - 916.
- Подушечекъ различные роды или манеры [пульвиллорумъ варіа генера] 19 и далѣ.
- Подливъ , подтѣкъ [суффузіо] 1301 ; онаго исторія , повѣсть и о по- длинномъ онаго мѣстѣ несогласица , тамже* [гуюсь гисторія эѣ де вера эюсъ седе контроверсія] , его признаки [эксъ индиція] 1302 ; различные роды [варіа генера] 1304 и далѣ , 1308 , 1321 ; причины [кавзе] 1306 и далѣ ; предсказаніе [прогносисъ] 1310 ; лѣченіе кушаніемъ и лѣкарствами [кураціо перъ виктумъ эѣ медикамента] 1311 ; ручное дѣйствіе [хирургія] 1312 и далѣ.
- Позвонка первого шѣйнаго съ затылкомъ составъ [вертебре приме колли кумъ окципите артикулусъ] 1120 ; сего позвонка со вторымъ соединеніе [гуюсь кумъ секунда вертебра комиссура] 1121 и далѣ ; всѣхъ позвонковъ шѣйныхъ хребетныхъ и поясничныхъ составы [вертебрарумъ оміумъ цервицисъ , дорси эѣ лум- борумъ артикули] 1131 ; и связи [эѣ лигамента] 1132 ; позвонки вывихиваются [вертебре луксантуръ] 1135 ; сего приключенія признаки [гуюсь реи индиція] 1137 ; позвонки вывихнутые какъ вправлять способъ отъ древнихъ вре- менъ показанъ [вертебрасъ эѣтасъ репонеѣи модусъ а ве- терибусъ тѣ адитусъ] 1138 ; подлинное лѣченіе [вера кураціо] 1139 ; связокъ очень растянувшихся причины [лигаменторумъ нимисъ диспенторумъ кавзе] 1140 ; и лѣченіе [эѣ кураціо] 1141 ; позвонковъ переломъ [вертебрарумъ фрактура] 1264 и далѣ.
- Почекъ рѣзаніе , смотри камень пузырный , нефротоміа [нефрото- міа вид. калкулусъ].
- Почечуй слѣпой и его причины и лѣченіе [геморроидесъ цеце эѣ- ромъ кавзе эѣ кураціо] 1015 ; его безмѣрное теченіе [эѣрумъ флюксусъ ниміусъ] - - - 1014.
- Почешный камень смотр. камень [ренумъ калкулусъ вид. калку- лусъ] , раны [вульнера] - - - 666 , 678.
- Полсы наильные , наильники , подпруги [перизомата] 807 , 833.
- Преграды грудобрюшной раненой припадки [дѣафрагматисъ вульнѣра- ти сумптіомата] 662 ; сдѣствія [перикуля] - - - 672.
- Природа , естество , натура [натурса] , что чрезъ нее разумѣтъ писатель [квидъ перъ эѣмъ интеллигатъ авторъ] - - - 32*.
- Прижигальники [кавтеріа] 926 ; ихъ употребленіе [эѣрумъ узусъ] 935.

- П,имочки глазныя водяныя часто вредятъ [коллаирѣ аквосо сепе
ноц нѣтъ] - - - - - 313*.
- Прозоденіе брюха [парацентезисъ абдоминасъ] 755 и дал. пузырь
уриннаго [везице] смотри пузырь уринной [виде везикамъ].
- Просвердливать въ какихъ мѣстахъ можно [препаначіо уби инсти-
туэнда] 564 ; къ тому какіе инструменты надобны [дѣ аамъ
инструментъ румъ аппаратусъ] 562 и далѣ ; къ дѣланію онаго
причины [аамъ перфицѣнди раціо] 565 и далѣ ; грудной кости
просвердливаніе [стерни] - - - - - 654.
- Пролѣвъ съ многими обломками оболонку и мозгъ головной повреж-
дающими , смотри черепъ головной [экпіѣсма видъ калваріа].
- Промежности между проходной или така чирейбъ зверкушешный [пе-
риче абсц-ссусъ] 1319 ; прообразаніе [секціо] 1350 и далѣ ; болячки
[у щері] 13, 52 фистула [фистула] 1355 ; прорывъ , перерва-
ніе , раздраніе въ родахъ трудныхъ [руптуса инъ парту диф-
фидилъ] - - - - - 1441.
- Пропосисъ гласъ вонъ выскочилъ , [проптосисъ] - - - - - 281.
- Птеригіонъ , значить плевочку жильчючувствительную на оболоч-
кѣ глазоу роговой нарастающую [птеригіумъ] 320* и 324 и дал.
- Пузырь уринный [везикъ] ; его камень смотр. камень пузыреури-
ныи [эюсъ ка въкулюсъ , виде калькулюсъ] ; кила смотри кила
[герніа видъ герні] ; прокалоте [парацентезисъ] 1345 и далѣ ;
рана [въ внусъ] 669 ; она не всегда бываетъ смертоносна [токъ
нонъ семперъ лепалъ] - - - - - 676.
- Пузырь дѣлающій шпанскія мухи [весикаторіа] - - - - - 937 и дал.
- Пупокъ при рожденіи завязывать должно [умбиликусъ инъ парту
лигандусъ] 1419 ; ежели изъ матки будетъ висѣть , что дѣ-
лать тогда надобно [си экъ утеро вропендетъ , квидъ фацѣэн-
думъ] 1434 ; пупошная кила , смотр. кила [умбилици герніа
виде герніа].
- Пупошная мясная наростъ , изъ старъ мясо и оμφαλός пупокъ смотр.
кила [саркомфалосъ виде герніа].
- Пупошная кила , смотр. кила , сложено изъ еѣ изъ и оμφαλός
пупокъ , [аксомфалосъ виде герніа].

Р.

- Разрѣшеніе , разбитіе вожженія [резолүціо инфламмаціонисъ] 53-
ракъ [канцеръ] , обѣ немъ повѣсть [эюсъ гисторіа] 265 ; ракъ груд-
ной и его лѣченіе [канцеръ маммарумъ эль эюсъ кураціо] 270 ;
на губахъ [лаброрумъ] 271 ; рака лѣченіе всякими возможными
мѣр-

мбрами чрезъ лѣкарства собственно къ тому служащими [канкри
кураціо палліатива] - - - 272 и далѣе.

рана [вульнусъ] 335 ; разнствіе имѣетъ отъ болячки [диффертъ
абъ ульцъ ре] 336 ; ея мѣста , причины , знаки [эюсъ зедесъ ,
кавзе , сигна] 337 ; и далѣе , ранъ (различные роды [вульнерумъ
варіа генера] 341 ; раны частей внутреннихъ по какимъ знакамъ
узнавать [вульнъ ра партіумъ интернаумъ эюсъ квибусъ сигнисъ
когносценда] 361 ; ранъ смертоносность [вульнерумъ летали-
пасъ] 362 и далѣе ; какимъ образомъ разщупывать или извѣдывать
[вульнера эксплоранди раціо] 358 и далѣе ; при лѣченіи ихъ что
лѣкарь посовѣдуетъ [адъ эорумъ кураціонемъ кве Хирургусъ
конфертъ] 371 ; изъ раны все находящееся въ ней должно вы-
чищать [вульнусъ дебетъ абъ ингертибусъ пургари] 372 ; и
какимъ образомъ [этъ кромодо] 372 ; раны вычищенной знаки
[вульнерисъ пурганши сигна] 395 ; рану мясомъ наполнять [адле-
житъ [вульнусъ карнибусъ импендумъ] 395 , на нее струпъ наво-
дить [эи цикатриксъ индценда] 396 ; при всякой раны почти не-
обходимы горячка и вожженіе [и въ омни вульнере фере нецессаріа
фебрисъ этъ инфламмаціо] 349 и далѣе ; при лѣченіи оной ,
какъ кормить и лѣкарства внутрь принимать способъ [инъ эюсъ
кураціоне викусъ этъ медикаменторумъ оре сумендорумъ раціо]
399 и далѣе ; также въ воздухъ , въ душныхъ во всѣхъ страст-
ныхъ и въ блудодѣніи умѣренности дежанья [эціамъ аэрисъ
этъ аними патематумъ венерисъ кве раціо табенда] 402 ; раны
иногда сшивать должно [вульнера аликвандо суи дибентъ] 376 ;
и какъ [этъ кромодо] 377 и далѣе ; держаться много могутъ
приложеннымъ пластыремъ спаивающимъ [кон пинери мультамъ
поссуитъ импозито ампластро глупи анте] 380 ; раны простой ,
свѣжей исторіа [вульнерисъ симплицисъ реценписъ гисторіа]
346 и далѣе ; лѣченіе [ку, аціо] 375 , 381 , 383 ; рана оца-
рапленая ссадненная [вульнусъ коллизумъ] 709 ; произведеніемъ гноя
очищать надлежитъ [мото пуре пургандумъ] 374 ; оной лѣченіе
[эюсъ кураціо] 384 и далѣе ; рѣдко , но временемъ и сію сши-
вать надлежитъ [таро , седъ аликвандо токъ суи опортетъ] 382 ;
раны стѣ ружья забланныя [вульнера склопето илапа] 461 и да-
лѣе ; раны ядъ въ себѣ имѣющія обдѣшвенны [вульнера , кве вирусъ
табендъ , перикүлоза сути] 488 ; угрызеніемъ ядовитыхъ и об-
шешныхъ животныхъ забланныя временемъ и безъ вреда проходятъ
[кве вененапорумъ этъ рабидорумъ анималумъ морзу инферу-
пуръ , аликвандо сине нокса сунъ] 494 ; оныхъ предсказаніе
[эорумъ прогностисъ] 493 ; лѣченіе [кураціо] 495 и далѣе , 505 и
далѣе ; а особенно всѣхъ частей раны , можно видѣшь на ихъ собствен-
ныхъ

Р Р Р Р 3

ныхъ мѣстахъ [сингулярумъ парцѣумъ вульнера виде суисъ
лсцисъ].

распухлость блѣдная , мягкая , холодная , и безбольная [эдема]
727 и далѣе ; конечной плоти [препуцій] - - 881.

рѣбніе , воженіе ; отѣкъ , флегмонъ [флегмоне] 72 ; отѣбно отъ
ржи и отъ чирья бѣрверхушешнаго [диффертѣ абъ эризипелате
ѣтѣ абсцессу] 73 ; его причины [эюсъ кавзе] 74 ; бѣдства [пери-
кула] 75 ; лѣченіе [кураціо] 76 и далѣе ; рѣбніе глаза [флегмоне
окули] 281 ; сего лѣченіе [гуюсъ кураціо] - - 305.

Ребры [косте] ихъ съ позвонками составы [гарумъ кумъ верте-
брисъ артикули] 1133 и далѣе ; вывихивающіяся [люксантурѣ]
1149 ; ихъ вѣ правливанье [эарумъ репозиціо] 1150 ; переломъ
[ф. актура] - - 626 и 1260 и дал.

рѣсѣ т. е. дырочка вѣ куткѣ глазомъ , которою непрестанно будто
вода течетъ [рѣсѣ] - - 329.

Родильницѣ каѣ класть или сажать [партуріанціумъ ситусъ] 1417.

Родины , роженіе , роды [партусъ] ; оныхъ , ежели приближаются ,
признаки [эюсъ см инстатъ , индиція] 1416 ; оныхъ исторія
[эюсъ гисторія] 1417 и далѣе ; послѣ родовъ у женщины брюхо
повязкою должно обвязывать [постѣ вумъ фемине вентерѣ фас-
ція винціандусъ] 1422 ; трудны бывають , ежели матка косо ле-
жатъ будетъ [диффицилисѣ си абъ обликво утери зипу] 1435 и
далѣе ; двойгевъ , близнецовъ [гемеллорумъ] 1423 ; который жоп-
кою изъ матки выходитъ [кви обьерзисъ клунибусъ утеро эмер-
гитъ] 1433 ; поперекъ идущаго живаго какъ вынимать [транс-
верзусъ вивусъ квомодо экстрагендусъ] 1432 ; дѣя чего порядочною
дорогою временемъ младенцѣ родиться не можетъ [кусъ перѣ на-
туралесъ віасъ аликвандо эксклуди неквеатъ] 1439 ; мертваго
младенца признаки [мортуи индиція] 1425 ; такого какъ выни-
манъ надлежитъ [гикъ квомодо экстрагендусъ] 1426 и далѣе ;
послѣ родовъ когда срамотныя части надсажены будутъ и бѣюшина
порвется , то какъ пособствовать [постѣ партурѣ пудендисъ
вексатисъ ѣтѣ перинео рупто квомодо суккуррендумъ] 1441.

Рожа [эризипеласъ] 156 ; ея примѣты [эюсъ ноте] 157 ; разнствіе
имѣетъ отъ отѣка [диффертѣ а флегмоне] 73 ; и отъ лѣту-
чаго огня [ѣтѣ абъ герипте] 919 ; ея причины [иаллюсъ кавзе]
157 и 159 и далѣе ; три рода [трѣа генера] 158 ; мѣста
[зедесъ] 157 и 160 ; предзнаменованіе или предсказаніе , предузна-
ніе и лѣченіе лѣкарствами внутренними [прѣгисисъ ѣтѣ кураціо
перѣ ремендіа интерна] , и наружными [ѣтѣ экстерна] 163 и да-
лѣе ; и какихъ оберегаться [ѣтѣ кве фугѣнда] 167 ; послѣ ея оста-
лую

лую опухоль жесткую и болячку какъ лѣчить [постъ иллюдъ ре-
маненсъ шуморъ дурусъ апкве улькусъ квомодо пракшандумъ]
168 ; она временемъ послѣ раны на головѣ бывшей случается
[иллюдъ аликвандо капиписъ вульнери супервенишъ] - 520.
рука вывихивается [манусъ люксатуръ] - 1186 и дал.
рѣзаніе кесарское [секціо цезареа] - 1439 и дал.

С.

Сальникъ [оментумъ] ; оной связывать способъ [иллюдъ вициѳанди
раціо] 684 ; въ рану выпавшаго или высунувшагося и испортив-
шагося лѣченіе [эксъ вульнере пролапси коррупшкве кураціо]
683 и далѣе.

Сальнишная кила [эпилодеде виде герніа].

Саалуподобная опухоль , спешакома [спешакома] - 759 и дал.

Свертокъ [воальвулюсъ] - 814.

Свищъ смотри фи шуля.

Синево, багровость [экхимозисъ] 712 ; ея лѣченіе [эюсъ кураціо] 723 и дал.

Сифоны , насосы , спринцы [сифонесъ] - 25.

Скирръ , шкирръ [скиррусъ] 58 , 254 ; его мѣстѣ [эюсъ зедесъ] 254 ;
причины [чавзе] 59 , 255 и далѣе ; прознаменованіе [прогносисъ]
259 и далѣе ; шкирровъ два рода [скирри дуо генера] 262 ;
хорошаго или незловреднаго лѣченіе [бенигни кураціо] 267 и далѣе ;
зловредный дѣлается часто изъ незловреднаго [малигнусъ оритуръ
сепе эксъ бенигно 263 ; зловреднаго примѣты [малигни номе]
264 ; вырѣзываніе или искорененіе [экстирпаціо] - 269.

Слойка отъ кости отдѣленіе или отлупленіе [эксфолаціо] 1039.

Слѣпога отъ ранъ бровейныхъ [цедипасъ эксъ вульнерибусъ супер-
диѳорумъ] - 1327.

Сокъ клѣбкой въ членосоставленіяхъ , смотри мелицера [синовіа виде
мелицера].

Ссставовъ различные роды [артикулѳорумъ варіа генера] 1092 ; са-
ло , шукъ [аксунгіа] 1099 и далѣе ; при ранахъ ихъ что слу-
чается можеть [эорумъ вульнерибусъ , кве акцидантъ] 357 ,
485 и далѣе.

Стафилома [стафилома] - 587 и далѣе.

Справисмъ [спрабисмусъ] глазная судорога , которою зѣница на всѣ
стороны тянется - 1328.

Струпъ 352 ; какимъ способомъ оной наводитъ [квомодо индуценда]
396 ; отъ чего онъ безобразнымъ дѣлается [эамъ деформесъ кве
сраціунтъ] 397 ; какимъ образомъ оное безобразіе можно отвра-
тити [квомодо текъ посситъ аверпи] - 398.

Судорога глазная , смотри справисмъ. - 1328.

Суконки изъ холстины [панна эксъ линтео] - 24.
Сушакъ

кумъ медицинъ некусѣ] 6 ; какъ ея учиться должно [квоmodo дисценда 8 ; ея писателъ наилучше [эюсѣ скрипторесѣ пошми] - 27.
Холодъ , стужа [фригусѣ] ; какъ онъ проходитъ въ тѣло [эюсѣ эффектусѣ инѣ корпусѣ] 207 ; ознобленныхъ членовъ лѣченіе [эо ригендіумѣ мемброрумѣ куратио] - 208 и далѣе.
Хребетная кость раздвоенная [сина бифида] 787 ; вѣтреная , см. гниль костяная [вентрѣа виде педарфракаѣ].

Ч.

Частей дѣтородоудныхъ чиръи или язвы французскія [генитиаліумѣ ульцера венереа] - 917 и далѣе.
Чашка коленная [пателла] ; оной съ бедрою и съ берцомъ связь [эюсѣ кумѣ феморе вѣтъ шибѣа некусѣ] 1203 ; вывихивается [луксатурѣ] 1204 и далѣе ; часто разламывается [сепіусѣ франгитурѣ] - 1272.
Челюсть нижняя [максилла инферіорѣ] ; ея составъ [эюсѣ артикулусѣ] 1125 ; вывихивается [эксцидитѣ] 1126 и далѣе ; челюсти переломъ [максилла фрактура] - 1251 ; и далѣе.
Червоточина , гниль костная [каріѣсѣ оссѣумѣ] 1032 ; ея знаки [эюсѣ сигна] 1040 и 1046 и далѣе ; причины [кавзе] 523 , 1040 и 1049 ; предзнаменованіе [прогносисѣ] 1050 и далѣе ; лѣченіе [кураціо] - 1052 и далѣе.
Черепъ головной перепонки надчерепноголовой лишенный [Απόχρημα смотр. калваріа].
Черепъ головной впрямъ проколотъ , см. черепъ головной [эккопе виде калваріа].
Черепъ головной вдавленіе см. черепъ головной [фласисѣ виде калваріа].
къ Черепу головному перепонки своей наkostной не имѣвшему что прикладывають? [калваріе періостіо suo нуда не кве аппликанда ауксиліа] 524 и далѣе ; ежели онъ будетъ зашибенъ то трюко вредъ получаетъ [эа перкусса трибусѣ модизѣ влоатурѣ] 527 ; такового вреда различные роды [гуюсѣ лезіонисѣ варіа генерѣ] , едра мѣсто , екиоті ежели прямо проколотъ , диакоті ежели наискось αποσμηπαριουμός ежели изъ черепа головнаго нѣчто будетъ выколото , или будто бы до отомъ выхвачено 528 ; черепа головнаго вогнутое , вдавленіе φλάσιу или θλάσιу [калваріа депрессіо] ; того лѣченіе [эюсѣ кураціо] 556 ; εσ-φλασις или ενθλασις когда кость вдавленная , будетъ еще
с с с с и раз-

и разломана, ежели вся кость разломаная отъ черепа отдѣлилась и выпала 529, 557 и далѣе; ἐκπίσμα гдѣ многіе обломки бывають, и гдѣ оныя упадають, оболонку надъ мозгомъ и мозгъ повреждаютъ 529; ἑγγύσιωμα когда кость ломаная одною стороною на низъ опадетъ, а другою въ черепъ держится, καμάρωσις называется, гдѣ кости разломаны, подняты, и будто бы печуркою стоятъ 529; черепа головного щели [калваріа фиссуры севу ρήγμα] 530; щель великая [ρωγμα] тамже, τριχοσμός щелочка 530, 548; ἀποχίμα ш. е. пропывная щель или откликъ, отголосокъ [контрафиссура вель резонансусъ] 530***; сего различные образы [гугусъ вари моди] 531; не безтрудности залѣчиваются [нонъ фациле курантуръ] 548; подъ черепомъ головнымъ мокрота изъ сосудовъ истекшая, какія можетъ причинить бѣдствія [зубъ калваріа гуморъ экстра ваза миссусъ, кве табеатъ перикула] 535; какъ его отпуду можно достать [гикъ квомодо адуцендусъ] 561 и далѣе; черепа головного буравомъ провѣрченнаго лѣченіе [калваріа модіоло эксцизе кураціо] 573; швы его ударенные, зашибенные бѣдствіе причиняють [эюсъ сутуре перкуссе перикулюмъ адферунтъ] 545; при разломленномъ или расколотомъ черепѣ головномъ не всегда буравъ требуется [фракта вель фисса калваріа нонъ земперъ модіолюмъ реквиритъ] 552; черепъ головны снаружи и до мозга средостѣннаго проломленный буравомъ должно вывѣрчивать [калваріа экстринзекусъ, этъ адъ диплоснъ, перкусса модіоло эксциленда] 553.

Черная, темная вода въ глазѣ [амавросисъ] - 1309, 1322 и дал.

Чесотка глазобольная, изъ ψώρα короста, чесотка и οφθαλμία глазная болѣзнь, [псорифталміа] 280; ея лѣченіе [эюсъ кураціо] - - - - - 304.

Чирышскъ [анхилопсъ] и собраніе влажности крупиночкамъ и меду или нѣкоторой кашкѣ подобный, межъ купкомъ глазнымъ большимъ и глазмъ. Тутъ оболочка нѣкоторая псбольшей части бываесть, и не причиняетъ болѣзни, но нечаянно начинаесть прибавляться, а присходитъ часто отъ бывшаго напередъ сего вожженія въ мясѣ слезномъ, которое чирышкомъ оканчивается, который ежели прорвется, и язвinkою адѣляется, то больше не будетъ Анхилопсомъ называться (Α'ρχιλωψ, но переимѣняеъ свое имя, и будетъ называться Α'γίλωψ смотр. [эгилосъ] - - - - - 969.

Чирей безверхушешный, абсцессъ разнствіе имѣетъ отъ отѣка [абсцессусъ диффертъ афлегмоне] 73; не весьма [нонъ фациле] 96; однако

однако временемъ и нездорбый должно разбъзывать [интердумъ шаменъ крудусъ инцидендусъ] 96 , 993 ; отвореѣся прижига- тельными [аперитуръ адуреншибусъ] 97 ; ланцетомъ или [бъцмъ- [скальпелло] 98 ; чирья безверкушешнаго отвореннаго лбченіе [абс- цессусъ аперти кураціо] 99 и далѣе ; рѣдко въ разбъшеніе приво- дится мочою [раро сольвитуръ перъ уринамъ] 88 ; смотри гной [пусъ] , загнаиваніе [суппураціо].

Члены , уды отнимать въ которое время надлежитъ [ампутаціо квандо инстипуэнда] 229 и далѣе ; древнихъ лбкарей способъ [ветерумъ методусъ] 231 ; къ тому снаряжъ , приготовленіе ; приборъ [эюсъ аппаратусъ] 237 и далѣ ; перстовъ отниманіе [дигитурумъ] 232 и далѣ ; руки [манусъ] 236 плеча [брахій] 240 и далѣ ; членовъ отнятыхъ лбченіе [мемброрумъ шрун- каторумъ кураціо] 246 и далѣ ; отниманіе рамена [ампутаціо гумери] 249 ; рамени изъ состава [гумери въ артикуло] 251 ; голени [крурисъ] 248 ; Вердуиновъ и Сабуриновъ способъ [Вер- дуини атъ Сабурини методусъ] 252 ; бедра [феморисъ] - 250.

Чреватыхъ какъ класть или какъ беременнымъ съ собою по- ступать [гравидарумъ режимъ] - - - - 1415.

Чревные раны осторожно должно извѣдывать [абдоинисъ вульнера кауте эксплоранда] 660 и далѣ ; которыя внутрь проколятся [кве интусъ пенетрантъ] 671 ; которыми внутреннія части по- вреждены [квibusъ интерне партесъ лезе сунтъ] 655 и далѣ и 661 ; ихъ лбченіе различно [эорумъ кураціо варіа] 680 и далѣ и 700 ; и далѣ ; новою разбъкою какъ разширивать ихъ [нвъ сек- ціоне квомодо ампланда] 689 ; ихъ зашиваніе или гасстр рафіа [эорумъ сатура вель γαστρορραφία] 659 , 702 ; ихъ послѣ зашиванія сего лбченіе [эорумъ постъ ганкъ кураціо] 705 ; изъ нихъ частно кила брюшная остается [эксъ инсъ зепе герніа вентрисъ релинкви- туръ] 659 , 790 , 821 ; изъ поврежденія стези бблой , какія ббдствія производятъ [линса альба леза , кве инде отантуръ пирикула] - - - - 657 и далѣ.

III.

Шары или мячи [пиле сеу гломи] - - - - 21.
Шулятной мошонки кила , смотри кила [скротъ герніа виде герніа] ,
водяная болѣзнь [гидропсъ] смотр. водяная болѣзнь [виде гидропсъ]
оной возженіе [эюсъ инфламмаціо] - - - - 134.
Шбйныя раны [цервицисъ вульнера] - - - - 609.
Шбѣ [коллумъ] ; ея раны [эюсъ вульнера] - - - - 610 и дал.
С с с с 2 Щель

Щ.

Щель напротивной стороны, смотри черепъ головной [контрафигасури
виде калваріа].

Щель смотри черепъ головной [римъ виде калваріа].

Щечнымъ ранѣ [маларумъ вульнера] - 194.

Щ.

Щиглопсѣ [этилопсѣ] имени производство; смотр. фистуху слезную
315 [виде фистуламъ лэкримаремъ]

Щкостазисѣ смотри кости распухлость хорошей причины [бестигне
кавзе] 1441 и далѣ; зловерной причины признаки и лѣченіе
[малитне кавзе инициѣ эпѣ курацѣ] - 1443 и далѣ.

Щикавма [эпикаума] естѣ сыпь струповатая на черномъ крушкѣ
глазномъ случающаяся; сложенное слово сіе изъ епѣ надѣ и каіѣ
жгу пожѣ чно и [энкаума] - 311.

Щеласисѣ смотри черепъ головной [эсфласисѣ виде калваріа].

Я.

Язвина не глубокая [бопрѣонѣ] и отъ худой мокроты кожину, ко-
торою плена роговая покрывается сбѣдающею дѣлается, у дре-
вникъ называется *αχλὺς* мракъ - 311.

Язвина или чирышекъ бѣлой въ дыркулѣ или въ кругѣ райка глазного
занимающій часточку бѣлка и черноты [аргемонѣ] изъ *αχλὺς* бѣлый.

Языкѣ [лингва], его камушки [эюсѣ каалькули] 608; разбѣшеніе [ре-
золюцѣ] 607; язвинки, болячки [ульцера] 915; раны вуль-
нера] 606.

Язычка возженіе [уве инфламмацѣ] - 135 и дал.

Яндѣ возженіе [пестхикулорумъ инфламмацѣ] - 129 и далѣ.



ФИГУРЪ ИЗЪЯСНЕНІЕ.

ТАБЛИЦА I.

- Фиг. I.** Кноповъ родъ , которые кнопы Французы называютъ ле Мешъ и онъ при лѣченіи свищей или фистулъ , около задняго прохода случающихся , наибольше употребляются §. 20. 1009.
- Фиг. II.** Мячики , или клубки небольшіе , по Французски Пелотъ называемые. Въ лѣченіи килъ въ рану вкладываются §. 21. 839.
- Фиг. III.** Клубокъ или свертокъ большой , по Французски ле Капо накладывается тамъ , гдѣ рука или нога отрѣзываема будетъ §. 21. 239.
- Фиг. IV.** Свертки маленькіе , которыми , по повертѣннй черепа головнаго буравомъ , дыры наполняются. §. 21. 563 , 2. 571.
- Фиг. V.** Тряпочка края ошипаные имѣющая , которая , вмѣсто кнопа , въ раны грудныя вкладывается §. 22. 639.
- Фиг. IX.** Маленькія орудія или инструменты серебряныя , спичечки или кончики осприя спальныя имѣющія. Ихъ ВООЛГУЗІЙ называлъ надрѣзниками [скарификаторіа] , которые для исполненія левкомы , и другихъ струновъ плевы роговой глазной употреблялись могутъ §. 319 320.

ТАБЛИЦА II.

- Фиг. X.** Машина СЕНФФІЕВА для припискиванія Аневризмы §. 432.
- а) Винтъ , посредствомъ котораго мячикъ b) приписывается къ опухоли.
- cc) желѣзные крючки , на которые ремни dd) обматываютъ плечо надевающагося.

ТАБЛИЦА III.

- Фиг. VI.** Но. 1. и 2. Ножечекъ , у котораго кончикъ закорюченъ. Надобный къ отворенію пусулъ или прыщиковъ въ глазу горящихъ §. 228. и 310.
- Фиг.**

Фиг. VII. Винтъ , пресъ , который у насъ покойный ГА-
ГЕМЕЕРЪ здѣлалъ §. 237*.

Фиг. XI. Игла большая и широкая серебряная , къ завя-
зыванію жилы бывоущей при лѣченіи Лневризмы
способная, ПЕГИТОМЪ изобрѣшенная §. 438.

ТАБЛИЦА IV.

Фиг. XII. Клещи , которыми косточка вынимается ,
послѣ того какъ черепъ проверченъ бываетъ ,
онѣ ШАРПА нарисованныя §. 562*.

Фиг. VIII. Инструментъ , онѣ нѣкоторыхъ употребляемый
для обрѣзыванія краевъ въ дирѣ буравомъ про-
свердленной , вмѣсто ножика вырѣзываемаго , онѣ
будучи тупъ внутрь себя лезье имѣющій. §. 562.

Фиг. XVII. Сурингомъ СЕНФЛЕВЪ §. 954.

ТАБЛИЦА V.

Фиг. XIV. Инструментъ на концѣ вырѣзанный , которымъ
узлочка язышная подхватывается , чтобъ без-
опасно ее подрѣзать было можно §. 607.


Фиг. XV. Другой инструментъ , для такоужъ употре-
бленія здѣланный , въ которомъ ножечекъ ма-
ленькой съ боку движимый привинченъ смотрѣ-
на помянуш. м. §. 607.


Фиг. XVI. Ножечекъ обоюдный , на концѣ булавочку имѣ-
ющій для разширенія грудныхъ ранъ способ-
ный §. 637.

ТАБЛИЦА VI.

Фиг. XIII. Инструментъ , которымъ оба глаза закрыва-
ются и припискиваются §. 589, 754.

Фиг. XVIII. Машина для вправливанія плеча здѣланная
§. 1175.





φиг. VII

таб. III

φиг. XI


φиг. VII

φиг. VI.


но. 2.

но. 1.


но. 2.




фиг. XVII.




фиг. VIII.




фиг. XII.







XV.




XV.



XV.





φυσ. XIV.



φυσ. XVI. παβ. V.



φιτ XVIII



φιτ XIII